四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

子部第六九册目次

景岳全書六十四卷（二）（明）張介賓撰　清康熙五十年賈棠刻本　〇〇一

景岳全書六十四卷（二）

（明）張介賓撰

清康熙五十年賈棠刻本

景岳全書小兒則目錄謨集

卷之四十
小兒上
總論一　初誕法二
護養法三　初生兒看病法四
看小兒壽夭法五　脉法六
聲音七　顏色八
藥餌之誤九　小兒診治大法十
撮口臍風十一　驚風十二

論驚風證治十三　急驚風十四
慢驚風十五　大驚卒恐十六
驚啼十七　發搐十八
夜啼十九　發熱二十
外感發熱二十一附按　外感發熱弗藥可愈二十二
諸熱辨證二十三　內熱證二十四
小兒上論列方二十五
卷之四十一
小兒下
吐瀉二十六附按　霍亂吐瀉二十七
論瀉利糞尿色二十八　吐乳二十九
五疳三十　盜汗三十一
腹脹腹痛三十二附按　痞塊三十三
癲癇三十四附按　溺白三十五
變蒸三十六　小兒下論列方三十七

景岳全書小兒則目錄終

會稽　張介賓　會卿著
瀛海　賈　棠　青南訂

小兒則上

總論一

小兒之病古人謂之啞科以其言語不能通病情不易測故曰寧治十男子莫治一婦人寧治十婦人莫治一小兒此其言小兒之難也然以余較之則三者之中又爲小兒爲最易何以見之蓋小兒之病非外感風寒則內傷飲食以至驚風吐瀉及寒熱疳癎之類不過數種且其臟氣清靈隨撥隨應但能確得其本而撮取之則一藥可愈非若男婦損傷積痼癡頑者之比余故謂其易也第人謂其難謂其難辨也余謂其易謂其易治也設或辨之不眞則誠然難矣然辨之之法亦不過辨其表裏寒熱虛實六者洞然又何難治之有故凡外感者必有表證而無裏證如發熱頭痛拘急無汗或因風搐搦之類是也內傷者止有裏證而無表證如吐瀉腹痛脹滿驚疳積聚之類是也熱者必有熱證如熱渴躁煩秘結癰瘍之類是也寒者必有寒證如清冷吐瀉無熱無煩惡心喜熱者是也凡此四者即表裏寒熱之證極易辨也然於四者之中尤惟虛實二字最爲緊要蓋有形色之虛實有聲音之虛實有脈息之虛實如體質強盛與柔弱者有異也形色紅赤與青白者有異也聲音雄壯與短怯者有異也脈息滑實與虛細者有異也故必內察其脈候外觀其形氣中審其病情參此數者而精察之又何虛實之難辨哉必其果有實邪果有火證則不得不爲治標然治標之法宜精簡輕銳適當其可及病則已毫毋犯其正氣斯爲高手但見虛象便不可妄行攻擊任意消耗若見之不眞不可謂姑去其邪諒亦無害不知小兒以柔嫩之體氣血未堅臟腑甚脆略受傷殘萎謝極易一劑之謬尚不能堪而況其甚乎矧以方生之氣不思培植而但知剝削近則爲目下之害遠則遺終身之羸良可嘆也凡此者實求本之道誠幼科最要之肯綮雖言之若無奇異而何知者之洮然也故余於篇端首以爲言然非有眞之見者固不足以語此此其所以不易也

陰陽應象大論曰善診者察色按脈先別陰陽審清濁而知部分視喘息聽聲音而知所苦觀權衡規矩而知病所主○按

此論雖通言診法之要然尤於小兒爲最切也

初誕法二

小兒初生飲食未開胃氣未動是誠清虛之腑此時開口調燮極須得宜保嬰諸書皆云分娩之時口含血塊啼聲一出隨即嚥下而毒伏於命門因致他日發爲驚風發熱痘疹等證此說固似有理然嬰兒通體無非血氣所結而此亦血氣之餘何以毒遽如是即使果之亦必從便而出何以獨留爲害無足憑也惟是形體初成固當爲之清楚其法於未啼時用軟帛裹指挖去口中之血乃用後法幷拭去口中穢惡以清

臟腑此亦初誕之要法不可無也

開口法凡小兒初誕宜以甘草細切少許用沸湯泡汁以淡爲妙不宜太甜乃用軟帛蘸汁徧拭口中去其穢濁隨用胡桃肉去皮嚼極爛以稀絹或薄紗包如小棗內兒口中使吮其汁非獨和中且能養臟最佳法也○若母氣素寒小兒清弱者只以淡薑湯拭口最能去胃寒通神明幷可免吐瀉之患此法最妙人所未知也拭後仍用核桃法如前○一法以牛黃半分同硃砂研勻蜜調如前與吮爲佳極能辟痰邪去穢惡除熱安神然必母氣多熱小兒肥盛者可用清弱者不宜用○一古法拭口多有用黃連者不知黃連大寒大苦而小兒以胃氣爲主安得初生即以苦劣之氣相犯致損胃氣則他日變嘔變瀉由此而起矣大非所宜○一古法多用硃砂開口者按陳文中曰小兒初生便服硃砂輕粉白蜜黃連本欲下胎毒不知此皆傷脾敗陽之藥輕粉下痰損心硃砂下涎損神兒實者服之軟弱弱者服之易傷反致變生諸病是固不可不察也

護養法三 出保嬰撮要

巢氏曰小兒初生肌膚未實宜用舊絮護其背不可太煖更宜

數見風日則血氣剛強肌肉緻密若藏於重幃密室或厚衣過煖則筋骨軟脆不任風寒多易致病衣服當隨寒熱加減但令背煖爲佳亦勿令出汗恐表虛風邪易傷乳哺亦不宜過飽陳氏所謂忍三分寒喫七分飽頻揉肚少洗澡要肚煖頭凉心胸凉皆至論也又須令乳母預慎六淫七情厚味炙煿則乳汁清寧兒不致疾否則陰陽偏勝血氣沸騰乳汁敗壞必生諸病若屢用藥餌則臟腑陰損多變敗證可不愼歟大抵保嬰之法未病則調和乳母既病則審治嬰兒亦必兼治其母爲善

小兒飲食有任意偏好者無不致病所謂爽口味多終作疾也極宜慎之嘗見王隱君曰余幼時酷嗜甘餚忽一日見餚中有蜒蚰伸頭而出自此不敢食餚至長始知長上爲之此可爲節戒之妙法

初生兒看病法四

初生兒以手捻其頭摸其頤頷不作聲者爲無病總有病以手指探其口雖發聲而從容啞指者其病輕若即發聲不啞指而色或青紅兼紫者此落地受寒之甚也其病重須急辨其形色虛實而治之若牙關緊閉不納乳或硬而不軟其病極重也此驚邪入足太陽經及足陽明經而然須急治之庶可平復

一初生兒肥胖色嫩日覺好看者此其根本不堅甚非佳兆且亦最易感邪凡邪入腑者近在第二三日見之其證吐乳夜啼發哭腹鳴皆胎驚之證然猶淺而易治○若邪之入臟者遠在六七日見之此臍風噤風撮口風之候其病深而難醫若大聲口噤舌大痰壅者不治蓋五六日間病傳心肺脾三經也此風氣甚盛而無所洩故形見於喉口牙關聲音也○其面額青紫黑色者不治爪甲青黑者不治臍青黑者亦不治○凡父母肥者不可生肥兒父母瘦者亦不可生肥兒生而肥胖必常以藥斂之使其肥肉堅實而轉微黃之色則吉不然則凶○生兒怯弱必須以藥扶助之若七日之內肌肉頓肥則必病矣過此以往漸肥者不足慮也治肥之法宜清痰濕解胎毒預防其風氣亦不可過用峻厲以傷脾氣○又嘗看小兒元氣厚薄厚者十無一失薄者十無一生然其中有死者有不死者則以病之所生有真僞也凡怯弱者宜專培脾腎爲主

看小兒壽夭法五

看小兒法以聽聲爲先察色爲次凡聲音清亮者生有回音者生澁者病散而無出聲者不壽○忽然大聲而無病者須細看其身恐有瘡毒即須治之○臍帶中無血者生臍帶銀白色者生短帶紫脹者於斷帶之後捻去紫血可保無虞○額皮寬者壽○卵縫通達黑色者壽初生下如水泡之狀者險○面轉微黃之色者吉○生下粉白花色者必主臍風而死○生下皮寬肉瘦五六日頓肥者亦必有臍風之患○生下皮肉不光者死○泣不出聲者死○泣而無淚者死○舌如豬肝者死○口角上有紫色如蝦鬚者死○髮粗長者生細

軟不放者死〇陰物不起者死〇陰囊不收者死白者死赤者死〇無糞門者死〇臀肉不生者死〇股肉不生者不壽〇面無彩色者夭〇臍帶短大紫色者夭〇生下渾身銀白色者夭〇生下有齒者大凶致傷父母不然必傷自身〇生下未幾即撒尿者敎父毋蕩家財在世一生勞苦

脉法 六

凡小兒形體旣具經脈已全所以初脫胞胎便有脉息可辨故通評虛實論曰乳子病熱脉懸小者手足溫則生寒則死乳子病風熱喘鳴肩息者脉實大也緩則生急則死此軒岐之

診小兒未嘗不重在脉亦未嘗不兼證爲言也自水鏡訣及全幼心鑑等書乃有三歲以上當察虎口寅卯辰風氣命三關之說其中之可取者惟曰脉從寅關起不至卯關者易治若連卯關者難治若寅侵卯卯侵過辰者十不救一只此數語乃於危急之際亦可用辨吉凶至若紫爲風紅爲傷寒青爲驚白爲疳及青是四足驚赤是水驚黑是人驚黃是雷驚之類豈此一線之色果能辨悉如此最爲無稽烏足憑也卽今幼科所尙無不以此爲科套全不知脉而信口胡猜試問其心果亦有的確之見否涵然無據而欲以人子爲嘗試良

可嘆也故凡診小兒旣其言語不通尤當以脉爲主而參以形色聲音則萬無一失矣然小兒之脉非比大人之多端但察其强弱緩急四者之脉是卽小兒之肯綮蓋强弱可以見虛實緩急可以見邪正四者旣明則無論諸證但隨其病以合其脉而參此四者之因則左右逢源所遇皆道矣再加以聲色之辨更自的確無疑又何遁情之有此最活最妙之心法也若單以一脉鑿言一病則一病亦能兼諸脉其中眞假疑似未免膠柱實有難於確據者然法不可廢最所當察故擇其得理者幷附於左亦可以見其槩

錢仲陽曰小兒之脉氣不和則絃急傷食則沉緩虛驚則促急風則浮冷則沉細脉亂者不治

薛氏曰凡看脉先定浮沉遲數陰陽冷熱沉遲爲陰浮數爲陽浮主風沉遲主虛冷實主有熱緊主癲癇洪主熱盛沉緩主虛瀉微遲有積有蟲遲濇主胃脘不和沉主乳食難化沉細主乳食停滯緊絃主腹中熱痛牢實主大便秘沉而數者骨中有熱絃長是肝膈有風緊數乃驚風爲患四肢掣顫浮洪乃胃口有熱沉緊主腹痛有寒虛濡者有氣又主慢驚芤主大便利血

聲音七

聲由氣發氣實則聲壯氣虛則聲怯故欲察氣之虛實者莫先乎聲音如內經諸篇有曰言而微終日乃復言者此奪氣也○有曰氣海有餘者氣滿胸中悗息面赤氣海不足則氣少不足以言○有曰心氣虛則悲實則笑不休○有曰手少陰虛則不能言○有曰內奪而厥則為瘖俳此腎虛也○華元化曰陽候多語陰證無聲多語者易治無聲者難榮○凡此皆聲音虛實之辨故彼聖人者聞聲知情無所不達此聲音之學所以不可忽也

顏色八

脉要精微論曰夫精明五色者氣之華也赤欲如白裹朱不欲如赭白欲如鵞羽不欲如鹽青欲如蒼璧之澤不欲如藍黃欲如羅裹雄黃不欲如黃土黑欲如重漆色不欲如地蒼五色精微象見矣其壽不久也

玉版論要篇曰色夭面脫不治百日盡已色見上下左右各在其要上為逆下為從女子右為逆左為從男子左為逆右為從

五色篇曰官五色奈何曰青黑為痛黃赤為熱白為寒是謂五官○又曰以色言病之間甚奈何曰其色麤以明沉夭者為甚其色上行者病益甚其色下行如雲徹散者病方已

經脉篇曰凡診絡脉脉色青則寒且痛赤則有熱胃中寒手魚之絡多青矣胃中有熱魚際絡赤其暴黑者留久痺也其有赤有黑有青者寒熱氣也其青短者少氣也

凡察色之法大都青白者少熱氣病主陰邪黃赤者多熱氣病主陽證○青主風氣主肝邪主脾胃虛寒主心腹疼痛主暴驚傷心膽之氣主驚風當察兼色以分急慢○白主氣虛甚則氣脫主無火主脾肺不足白兼青者主慢驚主大小腸泄

瀉○赤主火主痰熱主傷寒熱證主煩渴主急驚躁擾主閉結主陽邪喘促主癰瘍痘疹○黑屬水主陰寒主厥逆主痛極沉黑主危篤○黃主積聚主疳塊主脾病主脹滿主脾疳黃兼白者主脾寒脾弱主氣虛神怯黃兼青者主脾虛泄瀉主慢脾風黃兼赤者主疳熱○兩顴鮮紅或作或止者謂之而戴陽乃真陰虛弱此非陽證也不得以熱赤同論

錢氏曰左頰為肝右頰為肺額上為心鼻上為脾下頦為腎隨證施治之

藥餌之誤九

小兒氣血未充而一生盛衰之基全在幼時此飲食之宜調而藥餌尤當慎也今舉世幼科既不知此大本又無的確明見可惟苟完目前故凡遇一病則無論虛實寒熱但用海底兜法而悉以散風消食清痰降火行滯利水之劑總不出二十餘味今之用藥稱當何其誕也夫有是病而用是藥則病受之矣無是病而用是藥則元氣受之矣小兒元氣幾何能無陰受其損而變生不測耶此當今幼科之大病而醫之不可輕任者正以此也又見有愛子者因其清黃瘦弱每以為慮而詢之庸流則不云痰火必云食積動以肥兒丸保和丸之類使之常服不知肥兒丸以苦寒之品最敗元陽保和丸以消耗之物極損胃氣謂其肥兒也而適足以瘦兒謂其保和也而適足以違和耳即如抱龍丸之類亦不宜輕易屢用余嘗見一富翁之子每多痰氣或時驚叫凡遇疾作輒用此丸一投即愈彼時以為神丹如此者不啻十餘次及其長也則一無所知癡然一癡物而已豈非暗損元神所致耶凡此克伐之劑所以最當慎用故必有真正火證疳熱乃宜肥兒丸及寒涼等劑真正食積脹滿乃宜保和丸及消導等劑真正痰火喘急乃宜抱龍丸及化痰等劑即用此者亦不過

中病即止非可過也若無的實證可據而偶見出入之病則多由虧損元氣悉當加意培補方是保赤之主倘不知此而徒以肥兒保和等名乃欲藉為保障不知小兒之元氣無多病已傷之而醫復伐之其有不萎敗者鮮矣此外如大黃芒硝黑丑芫花大戟三稜蓬朮之類若非必不得已皆不可輕易投也

小兒診治大法　十

凡小兒之病本不易察但其為病之源多有所因故凡臨證者必須察父母先天之氣而母氣為尤切如母多火者子必有火病母多寒者子必有寒病母之脾腎不足者子亦如之凡骨軟行遲齒遲語遲囟門開大疳熱脾泄之類多有由於母氣者雖父母之氣俱有所稟但母氣之應在近父氣之應在遠或以一強一弱而偏得一人之氣者是皆不可不察至若稍長而縱口縱欲或調攝失宜而自為病者此又當察其所由辨而治之如果先天不足而培以後天亦可致壽雖曰先天但得而或父母多慾或稟養失宜則病變百端雖強亦夭此中幾可以微有知常知變也

撮口臍風　十一

初生小兒撮口臍風者，因胎中受熱或月內不慎，觸犯風寒所使，遂致發熱撮口，眼閉口噤，啼聲如鴉，或舒不能出聲，或舌上如粟，或口吐白沫，或吮乳不得，氣息喘急，甚者舌強面青，腹脹青筋，吊腸牽痛。百日內有甚者多不治。○臍風者，以斷臍之後，爲水濕風邪所侵，因致腹脹臍腫，四肢柔直，啼不吮乳，甚則發搐。若臍邊青黑，手拳口噤者，是爲內搐，不可治。○凡治此之法，痰盛者當先治痰，火盛者當先清火，若無火無痰者，專當溫補脾胃。○凡新臍不盈尺，多患此者，齒齦有泡如粟，以綿裹指，蘸溫水擦破，口即開，不用藥。七日內患此者，百無一生。○臍風果因浴拭外傷皮膚者，用綿灰或枯礬末摻之即愈。○若因剪臍短少，或因束縛不緊，或因牽動風入臍中，或因鐵器斷臍，冷氣傳於脾絡，以致前證者，口內有小泡，急掐破，去其毒水，以艾灸臍中，亦有得生者。治法多端，無如灸法。○若因乳母肝脾鬱怒，或飲食生冷辛熱，致兒爲患者，當治其母。

錢氏云：撮口因浴後拭臍，風邪所入而作，用益黃散補之。

陳無擇云：視其牙齦有泡，擦破之，口即開。用真白殭蠶略炒爲末，蜜調敷唇內。

保嬰集云：小兒百日臍風馬牙，當作胎毒，瀉足陽明之火。用鍼挑破，以桑樹白汁塗之。

田氏治噤風，用天南星爲末，加片腦少許，以指蘸薑汁擦牙齦，立開。○或用牛黃，以竹瀝調服一字，隨以猪乳滴於口中。

驚風十二

驚風之要領有二：一曰實證，一曰虛證，而盡之矣。蓋急驚者，陽證也，實證也，乃肝邪有餘而風生熱，熱生痰，痰熱客於心膈間，則風火相搏，故其形證急暴而痰火壯熱者，是爲急驚。此當先治其標，後治其本。慢驚者，陰證也，虛證也，此脾肺俱虛，肝邪無制，因而侮脾生風，無陽之證也，故其形氣病氣俱不足者，是爲慢驚。此當專顧脾腎以救元氣。雖二者俱名驚風，而虛實之有不同，所以急慢之名亦異。凡治此者，不可不顧其名以思其義。

論驚風證治十三

小兒驚風，肝病也，亦脾腎心肺病也。蓋小兒之真陰未足，柔不濟剛，故肝邪易動，肝邪動則木能生火，火能生風，風熱相搏則血虛，血虛則筋急，筋急則爲掉眩反張、搐搦強直之類，皆肝木之本病也。至其相移，木邪侮土則脾病而爲痰、爲吐瀉

木盛金衰則肺病而為喘促為短氣木火上炎則心病而為驚叫為煩熱木火傷陰則腎病而為水涸為血燥為乾渴為汗不出為搐為痓此五臟驚風之大概也治此之法有要存焉蓋一曰風二曰火三曰痰四曰陽虛五曰陰虛但能察此緩急則盡之矣所謂風者以其強直掉眩皆屬肝木風木同氣故云驚風而實非外感之證今人不明此義但為治風必須用散不知外來之風可散而血燥之風不可散也故凡如防風荊芥羌活獨活細辛乾葛柴胡紫蘇薄荷之類使果有外邪發熱無汗等證乃可暫用如無外邪則最所當忌此用

散之不可不慎也所謂痰火者痰凝則氣閉火盛則陰虧此實邪之病本也若痰因火動則治火為先火以痰留則去痰為主火之甚者宜龍膽草山梔子黃連黃柏石膏大黃之屬火之微者宜黃芩知母玄參石斛地骨皮木通天麻之屬痰之甚者宜牛黃膽星天竺黃南星半夏白芥子之屬痰之微者宜陳皮前胡海石貝母天花粉之屬此外如朱砂之色赤體重故能入心鎮驚內含水銀故善透經絡墜痰降火雄黃之氣味雄悍故能破結開滯直達橫行冰片麝香乃開竅之要藥琥珀青黛亦清利之佐助而已又如殭蠶全蝎蟬蛻之

屬皆云治風不知殭蠶味鹹而辛大能開痰涎破結氣用佐痰藥善去肝脾之邪邪去則肝平是即治風之謂也全蝎生於東北色青屬木故善走厥陰加以鹽味鹹而降痰是亦同氣之屬故云治風較之殭蠶此其次矣蟬蛻性味俱薄不過取其清虛輕脫之義非有實濟不足恃也凡驚風之實邪惟痰火為最而風則次之治實之法止於是矣然邪實者易制主敗者必危蓋陽虛則陰邪不散而元氣不復陰虛則營氣不行而精血何來所以驚風之重重在虛證不虛不重不竭不危此元精元氣相為並立有不容偏置者也故治虛之法當

辨陰陽陽虛者宜燥宜剛陰虛者宜溫宜潤然善用陽者氣中自有水善用陰者水中自有氣造化相須之妙既有不可混又有不可離者如此設有謂此非小兒之藥此非驚風之藥者豈驚風之病不屬陰陽而小兒之體不由血氣乎若夫人者開口便可見心又烏足與論乾坤合一之道諸補之法具詳如左

一驚風反張強直轉筋等病在經筋篇曰足少陰之筋病足下轉筋及所過而結者皆痛病在此者主癇瘛及痙在外者不能俛在內者不能仰故陽病者腰反折不能俛陰病者不能

仰○又曰經筋之病寒則反折筋急熱則筋弛縱不收陰痿
不用陽急則反折陰急則俛不伸

急驚風十四

急驚之候壯熱痰壅竄視反張搐搦顫動牙關緊急口中氣熱
頰赤唇紅飲冷便結脉浮洪數此肝邪風熱陽盛陰虛證也
治此之法當察緩急凡邪盛者不得不先治其標○若痰甚
喘急者宜抱龍丸琥珀散清膈煎梅花飲之類主之○火盛
而煩熱者宜凉驚丸抑青丸或黃連安神丸牛黃散及山梔
黃連龍膽草之屬○火盛燥熱而大便秘結者宜瀉青丸或

以爲湯煎服之或利驚丸亦可○若外感風寒身熱爲驚者
當解其表宜抑肝散倍加柴胡或參蘇飲五積散星蘇散之
類擇而用之○若表邪未解而內亦熱者宜錢氏黃龍湯○
若驚氣漸退而火未清者宜安神鎮驚丸○凡以上者皆急
則治標之法但得痰火稍退即當調補血氣如後附薛氏之
法或參用慢驚諸治以防虛敗此幼科最要之法前哲有云
小兒易爲虛實攻伐之藥中病即止不可過劑誠至言也○
大抵此證多屬肝膽脾腎陰虛血燥風火相搏而然若不順
其陰過用祛風化痰之藥則脾益虛血益燥邪氣綿延必成

慢驚矣此中陰虛之義者人所不知當因小兒補腎論始見
其詳論載第二卷二五

東垣曰急驚者風木旺也風木屬肝下邪盛必傳克於脾欲治
其肝當先實脾後瀉風木

婁全善曰急驚屬木火土實木實則搐而有力及目上視動劄
頻驟土實則身熱面赤而不吐瀉偃睡合睛治法宜凉宜瀉
而用凉驚利驚等丸亦有因驚而發者以致牙關緊急壯熱
等證此內有實熱外挾風邪當截風定搐若痰熱尚盛宜微
下之痰熱既泄急宜調養胃氣搐定而痰熱少退即宜調補

脾氣

薛氏曰此肝經血虛火動生風若風生則陰血愈散陰火愈熾
火動則肺金愈虧肝邪愈盛宜滋肝血養脾氣若屢服祛風
化痰瀉火辛散之劑便宜認作脾虛血損急補脾土○若風
火相搏發熱抽搐目瞤筋攣痰盛者用四物鈎藤鈎以生肝
血清肝火用四君子加當歸以補脾土生肺金○若肝經血
燥發熱驚搐目瞤筋攣痰盛者用六味丸以滋腎水四君子
加芎藥以補脾土○若肺金剋肝木用地黃丸以益肝血加
芍藥木香以平肺金○若屢用驚藥而脾胃虛寒者須用六

君子湯以補脾土丁香木香以培陽氣○若脾土虛寒腎水反來侮土而致中寒腹痛吐瀉少食等證者用益黃散以補脾土而瀉水庶幾不致慢驚矣○但治小兒當審察虛實凡證屬有餘者病氣也不足者元氣也故有餘當認爲不足思患須防庶少失矣

慢驚風 十五

慢驚之候多由吐瀉因致氣微神緩昏睡露睛痰鳴氣促驚跳搐搦或乍發乍靜或身涼身熱或肢體逆冷或眉唇青赤面色淡白但其脈遲緩或見細數此脾虛生風無陽證也○小

兒慢驚之病多因病後或以吐瀉或因誤用藥餌損傷脾胃所致然亦有小兒脾胃素弱或受風寒則不必病後及誤藥者亦有之總屬脾腎虛寒之證○治慢驚之法但當速培元氣即有風痰之類皆非實邪不得妄行消散再傷陽氣則必致不救○凡脾土微虛微寒而內不寒者可平補之宜六神散四君子湯或五味異功散○脾腎俱虛而臟平無寒者宜五福飲且陰血生於脾土又宜四君子加當歸棗仁○脾氣陽虛微寒者宜溫胃飲理中湯五君子煎○脾氣虛寒多痰者宜六君子湯或金水六君煎○脾腎陰陽俱虛而寒者惟理陰煎爲最妙○脾腎虛寒之甚或吐瀉不止者宜附子理陰煎再甚者宜六味回陽飲或四味回陽飲量兒大小與之○脾腎虛寒泄瀉不止者宜胃關煎

薛氏曰保嬰集云急驚屢發屢用攻瀉則脾損陰消而變爲慢驚者多矣當補脾養血佐以安心清肺制木之藥最爲切當竊謂前證多因脾胃虧損肝木所勝外虛熱而內真寒也但用五味異功散加當歸佐以釣藤飲以補脾土平肝木亦多得效如不應用六君加炮薑木香溫補脾土更不應急加附子以回陽若用逐風驅痰之藥反促其危也○愚按附子溫

中回陽爲慢驚之聖藥也如元氣未脫用之無有不效氣脫甚者急宜炮用之

保嬰撮要曰凡元氣虧損而至昏憒者急灸百會穴若待下痰不愈而後灸之則元氣脫散而不救矣此乃臟腑傳變已極總歸虛處惟脾受之無風可逐無驚可療因脾虛不能攝涎故津液妄泛而似痰者但當以溫補脾胃爲主若不審其因泛用祛風化痰之劑則脾氣益傷陰血益損病邪益甚而危矣

嬰童百問云吐瀉不止乃火虛則身寒口中氣冷土虛則吐

實證而痰盛者宜清膈飲，虛證而痰盛者宜六君子湯，或只用異功散之類。

大驚卒恐 十六

小兒忽被大驚，最傷心膽之氣。口問篇曰：大驚卒恐則氣血分離，陰陽破散，經絡厥絕，脈道不通，陰陽相逆，經脈空虛，血氣不次，乃失其常。此《內經》明言受驚之病有如此。矧小兒血氣尤非大人之比，若受大驚，則其神氣失散，潰亂不堪，尚何實邪之有？斯時也，收復正氣猶恐不暇，顧可復為清散耶？即如朱砂、琥珀之類，不過取其鎮重之意，亦非救本之法。今幼科諸書皆以大驚之證例作急驚論治，誤亦甚矣。不知急驚慢驚一以風熱，一以脾腎之虛，皆不必由驚而得，而此以驚恐致困者，本心膽受傷，神氣陡離之病，所因不同，所病亦異，胡可以同日語也。

治大驚氣散之病，當以收復神氣為主，宜秘旨安神丸、七福飲、茯神湯、團參散、獨參湯之類，加金銀等物煎服之。

驚啼 十七

小兒驚啼，證本與驚風不同，亦與大驚卒恐者有異。蓋小兒肝氣未充，膽氣最怯，凡耳聞驟聲，目視驟色，雖非大驚卒恐，亦能怖其神魂，醒時受怖，寐則驚惕，或振動不寧，或忽爾啼叫，

皆神怯不安之證。總宜安神養氣為主，如獨參湯、團參散、秘旨安神丸之類，皆其所宜。若微煩熱者，宜生脈散；熱甚者，宜朱砂安神丸，或導赤散。〇驚哭多淚，忽啼忽止者，是驚惕；啼叫無淚，聲長不揚者，是腹痛。

發搐 十八

搐，抽搐也，是即驚風之屬，但暴而甚者謂之驚風，微而緩者謂之發搐。發搐不治則漸成驚風矣。雖錢氏等書皆以時候之氣分五臟之證為論治，然病變不測，有難以時氣拘者，是不若察見在之形證，因臟腑之虛實，隨宜施治者之為得也。總之，小兒之實證無他，惟東方之實及中央之滿耳。蓋東方木實則生火生風而為熱為驚，中央土實則生濕生滿而為痰為積。知此二者，則知所以治實矣。〇若小兒之虛證則五臟皆有之，如心虛則驚惕不安，肺虛則氣促多汗，脾虛則為嘔吐，為暴泄，為不食，為痞滿倦臥，為牙緊流涎，為手足牽動；肝虛則為筋急血燥，為抽搐勁強，為斜視目瞪；腎虛則為二便不禁，為津液枯槁，為聲不出，為戴眼，為肢體厥逆，為火不歸源。知此五者，則知所以治虛矣。〇然此虛實之證，固亦多有疑似者，但以形色聲音脈息參而察之，則無有不燁然者。諸

治實之法當從急驚治虛之法當從慢驚及如後夜啼諸治
法已盡其蘊當并察之總之諸言實者乃邪氣之實非元氣
之實也故治此者切不可傷及元氣若病已久尤當專顧脾
腎則根本完固諸無不愈矣
錢仲陽曰驚癇發搐男左視無聲右視有聲女右視無聲左視
有聲此相勝也蓋左爲肝部右爲肺部金木相勝故耳○若
握拳拇指在內女爲順拇指在外男爲順順則易治逆則難
治
薛氏曰寅卯辰時搐而發熱作渴飲冷便結屬肝膽經虛熱用

柴芍參苓散作渴引飲自汗盜汗屬肝膽經血虛用地黃丸
目吻流涎屬肝木尅脾土用六君子湯○巳午未時發搐若
兼作渴飲水屬風火相搏以地黃丸補肝導赤散涼驚丸治
心若作渴飲湯體倦不乳土虛而木王也用地黃丸以補腎
六君子湯以補脾○申酉戌時微搐而喘目微斜身似熱睡
而露睛人便淡黃屬脾肺虛熱用異功散若手足逆冷或喘
瀉不食屬脾肺虛寒用六君炮薑木香久病而元氣虛者用
六君子六味丸二藥主之○亥子丑時微搐身熱目睛緊斜
吐瀉不乳厥冷多睡屬寒水侮土用益黃散未應用六君薑

桂○傷風發搐口中氣熱呵欠手足動者名假搐用大青膏
發散風邪○傷風發搐口氣不熱肢體倦怠用異功散補脾
土鉤藤飲清肝木○若因風邪內鬱發熱而變諸證者當理
肺金清風邪○若外邪既解而內證未除當理肺補脾○若
停食發搐嘔吐乳食者宜用消食丸○若傷食後發搐身熱
困睡嘔吐不思乳食者當先定搐後用白餅子下之○若食
既散而前證仍作或變他證者脾土傷而肝木乘之也用六
君子加鉤藤鈎以健脾平肝○若肺經虧損而致驚搐等證
者當補脾肺以平肝心則驚搐自止矣○如手足冷汗搐眉

搐肚日夜不止名真搐當用人參湯川烏全蝎等藥平其胃
氣○百日內發搐真者內生風二三次必死假者外生風雖
頻發不死○百日內搐亦有因乳母七情厚味所致者當兼
治其母而以固胃爲先不可逕治其兒也○若涎入心脾則
不能言用涼心鎮驚下痰之藥逆搐者不治○若吐瀉後變
證者亦不治○大凡發搐因風者則面青目赤因驚則叫呼
搐搦因食則噯吐氣悶脾肺虛則生粘痰喉間作鋸聲此乃
心火不能生脾土脾土不能生肺金以致肺不能主氣脾不
能攝涎故涎氣泛上而喉中作聲耳若用祛風治痰之劑則

氣散陰消而促其危矣

夜啼十九

小兒夜啼不安按保嬰等書云夜啼有二曰脾寒曰心熱也夜屬陰陰勝則脾藏之寒愈盛脾為至陰喜溫而惡寒寒則腹中作痛故曲腰而啼其候面青手腹俱冷不思乳食是也亦曰胎寒宜鈎藤飲寒甚者理中丸○若曲腰啼叫哭而無淚者多係腹痛宜木香散或用溫胃飲加木香○若脾胃寒甚而兼帶作瀉者宜陳氏十二味異功散○若過用乳食停滯作痛邪實無虛而啼者宜保和丸和胃飲加減主之甚者宜消食丸○若陰盛陽衰心氣不足至夜則神有不安而啼陣者宜四君子湯五味異功散或七福飲秘旨安神丸○若面青手冷陽氣虛寒心神驚怯而啼者宜五君子煎或六味異功煎甚者宜七福飲加炮乾薑肉桂○若兼泄瀉不乳脾腎虛弱也宜六神散甚者養中煎胃關煎○若兼吐瀉少食脾胃虛寒也宜五君子煎溫胃飲或六味異功煎加炮木香○若大便不化食少腹脹脾氣虛弱也宜五味異功散或五君子煎加木香○若面色白黑睛少至夜分陰中陽虛而啼者此肝腎之不足也宜六味丸八味丸理陰煎○若見燈見火

愈啼者心熱也心屬火見火則煩熱內生兩陽相搏故仰身而啼其證面赤手腹俱煖口中氣熱是也火之微者宜生脈散導赤散火之甚者宜硃砂安神丸人參黃連散○若肝膽熱甚木火相搏者宜柴胡清肝散○大都此證或因吐瀉內亡津液或禀賦腎陰不足不能滋養肝木或乳母恚怒肝火傷金當用六君子湯補脾土以生肺金地黃丸壯腎水以滋肝木若乳母鬱悶而致者用加味歸脾湯乳母暴怒者加味小柴胡湯乳母心肝熱搏者柴胡清肝散○若因驚夜啼者宜從前驚啼論治

發熱二十

小兒發熱證其最要者有四一則外感發熱二則瘡毒發熱三則痘疹發熱四則疳積發熱凡此四者之外如飲食驚風陰虛變蒸之類雖亦有之然各有其說均當詳辨

一發熱當辨虛實如實則面赤氣粗口燥唇瘡作渴喜冷飲水大小便難或掀衣露體煩啼暴叫聲洪脈強伸體而臥睡不露睛手足指熱皆為實證實以邪氣有餘或可散邪或宜清火○虛則面色青白氣怯神倦恍惚軟弱口鼻微冷不喜寒涼飲湯安靜泄瀉多尿悲驚惕上盛下泄抱腹喜按作涼

作溫夜則虛汗臥則露睛屈體而臥手足指冷脈息緩弱皆為虛證虛以正氣不足最宜調補或兼解邪雖有發熱外證必不可妄用寒涼及任意消散克伐等劑

外感發熱治法　十一

凡小兒無故發熱多由外感風寒若寒邪在表未解者必有發熱頭痛或身痛無汗或鼻塞流涕畏寒拘急脈見緊數者是也○凡暴感者極易解散一汗可愈但察其氣血平和別無實熱等證或但倦怠昏睡者則但以四柴胡飲或五柴胡飲為主酌兒大小而增減其劑此法先固其中次解其表庶元氣無傷而邪且易散最為穩當極妙之法有云小兒何慮乃堪此補及又有補住邪氣之說皆寸光昧理之談不可信也○若胃氣微見虛寒者宜五君子煎加柴胡或以理陰煎加減用之最妙○元氣頗強而能食者宜正柴胡飲○兼內熱火盛而外邪未解者宜一柴胡飲或錢氏黃龍湯○壯熱火盛往來寒熱者宜柴芩煎○寒氣盛者宜二柴胡飲○寒邪盛而中氣微虛者宜五積散○傷寒見風身熱兼嗽而中氣不虛者宜柴陳煎若中氣不足而兼熱兼嗽者宜金水六君煎○冬受寒邪至春夏而發熱者是為小兒正傷寒但取效

稍遲然治法不能外此

新按　余之仲兒生於乙卯五月於本年初秋忽爾感寒發熱脈微緊然素知其臟氣屬陰不敢清解遂與芎蘇羌芷細辛生薑之屬冀散其寒一劑下咽不惟熱不退而反大瀉作連二日瀉不止而喘繼之愈瀉則愈喘斯時也將謂其寒氣盛耶何以用溫藥而反瀉將謂其火刑金耶豈以清瀉連日而尚堪寒涼將謂其表邪之未除耶則何以不利於發散束手無策疑懼已甚且見其表裡俱劇大喘垂危又豈淺易之劑所能挽回因沉思良久漸有所得乃用人參二錢生薑五片煎汁半盞然未敢驟進恐再加喘必致不救因用茶匙挑與二三匙即懷之而旋走室中徐察其呼吸之進退然喘雖未減而亦不見其增甚乃又與三四匙少頃則覺其鼻息似乎少舒遂放膽與以半小鍾更覺有應自午及酉完此一劑適一醫至急呼曰誤矣誤矣焉有大喘如此而尚可用參者速宜以抱龍丸解之余諾之而不聽乃復以人參二錢五分如前煎湯自酉至子盡其劑劑完而氣息遂平齁齁大睡瀉亦止而熱亦退矣此所以知其然者觀其因瀉反喘豈非中虛設有實邪自當喘隨瀉減是可辨也向使誤聽彼醫易以清

則中氣一脫即當置之死地必仍咎余之所用參也嗚呼是孰非何從辨哉余因紀此以見溫中散寒之功其妙有如此者

外感發熱弗藥可愈（二十一）

凡小兒偶然發熱者率由寒熱不調衣被單薄柔弱肌腠最易相感感則熱矣余之治此不必用藥但於其熟睡之頃夏以單被冬以綿被蒙頭松蓋勿壅其鼻但以稍煖為度使其鼻息出入皆此煖氣少頃則微汗津津務令上下稍透則表裏通達而熱自退矣若冬月衣被寒涼汗不易出則輕搜著身赤體相貼而上覆其面則無有不汗出者此余近年養兒至妙之法百發百中者也若寒邪甚者兩三微汗之無有不愈然此法惟行於寅卯之際則汗易出而效尤速

諸熱辨證（二十二）

一小兒發熱若熱隨汗退者即外感證也〇其有取汗至再而熱不退者必癰毒痘疹之候俟其形見當於本門求法治之〇若是瘡毒但當辨其陰陽陽證宜清火解毒陰證宜托裏助陽方治詳具外科〇若汗出熱不退別無癰毒而耳後紅筋燦然及眼如包淚或手指尖冷脈緊數者必是痘疹方治詳具痘疹門

一小兒飲食內傷本無發熱之證蓋飲食傷臟則為脹為痛為吐為瀉本非肌表之病焉得發熱故經曰邪之生於陽者得之風雨寒暑生於陰者得之飲食居處陰陽喜怒此自不易之理也今人但見小兒發熱則多言為食而妄行消導謬亦甚矣〇其或飲食內傷風寒外感表裏兼病而發熱者亦常有之然此當察其食之有停無停酌而治之亦非可混行消耗蓋恐內本無滯而妄加克伐則虧損中氣以致外邪難解則病必滋甚

一小兒疳積發熱此緣飲食內傷所致然必成疳成痞陽明鬱積既久所以內外俱熱是非暴傷飲食者之比亦非肌表發熱者之比方治詳具疳積條

一小兒有陰虛發熱之證及變蒸發熱之說凡陰虛發熱者此即小兒勞損證也亦名為童子勞此當於虛損門求法治之〇至若變蒸之說則辨在本條并當詳察

錢仲陽曰潮熱者時間發熱過時即退來日依時而發此欲發驚也〇壯熱者常熱不已甚則發驚癇也〇風熱者身熱而口中氣熱乃風邪外感也〇溫熱者肢體微熱熱不已則發驚搐〇壯熱惡風寒為元氣不充表之虛熱也〇壯熱不惡

風寒為外邪所客表之實熱也○壯熱飲湯為津液短少裏之虛熱也○壯熱飲水為內火銷爍裏之實熱也○脈尺寸俱滿為重實○尺寸俱弱為重虛○脈洪大或緩而滑或數而鼓此熱盛拒陰雖形證似寒實非寒也○熱而脈數按之不鼓此寒盛格陽雖形證似熱實非熱也○發熱惡熱大渴不止煩躁肌熱不欲近衣其脈洪大按之無力或兼目痛鼻乾者此血虛發熱也當補其血○如不能食而熱自汗出者氣虛也當補其氣

內熱證 十四

內熱與外熱不同內熱以五內之火熱由內生病在陰分故內熱者宜清涼不宜升散升散則內火愈熾火空則發也外熱以肩膂之邪風寒外襲病在陽分故外熱者宜解散不宜清降清降則表熱愈留外內合邪也此外熱內熱之治其不同者有如此欲分內外之辨則外熱者其至必驟內熱者其來必緩但察其絕無表證而熱在臟腑七竅三焦二陰筋骨肌肉之間者皆是內熱之證○內熱之證亦有虛實實者宜從正治虛者當從反治反正之間有冰炭之異非可混也

凡實熱之在內者古法治分五臟宜從正治○心熱者宜瀉心湯導赤散安神丸○肝熱者瀉青丸柴胡飲子龍膽湯○脾熱者瀉黃散○肺熱者輕則瀉白散地骨皮散重則涼膈散○腎熱者滋腎丸滋陰八味丸實熱則宜疏下虛熱則宜調補○肢體熱輕則惺惺散重則人參羌活散○大便秘者大黃犀角散四順清涼飲○餘熱不退者地骨皮散○大小便血者保陰煎○血熱妄行者清化飲○三焦火盛上下熱甚者抽薪飲○小水熱痛者大分清飲○陽明內熱煩渴頭痛二便秘結者玉泉散○陽明火盛兼少陰水虧者玉女煎

凡元氣虛而為熱者必真陰不足皆假熱證也宜從反治○心脾肺氣虛假熱者五君子煎人參理中湯○五臟氣血俱虛假熱者五福飲○肝腎真陰不足假熱者輕則六味地黃湯甚則理陰煎○肝腎血虛假熱者大營煎五物煎○肝腎陰虛上熱下寒則陽無所附而格陽為熱者六味回陽飲或八味地黃湯○肝經血虛生風而熱者四物加天麻鈎藤鈎○汗後血虛而熱甚者六神散加粳米○汗後氣虛而惡寒發熱者補中益氣湯○汗後陰虛陽無所附而熱者四物湯加參芪○汗後陽虛陰無所附而熱者四君子加芎歸○久從溫補而潮熱不退脈見滑大者五福飲加地骨皮或知

一凡嬰兒諸熱有因別證而作者當從所重者而治之○若乳下嬰兒當兼治其母以調之

小兒上論列方 二十五

四君子湯 補一　五君子煎 新熱六
五味異功散 補四　六君子湯 補五
團參散 小一　六味異功煎 新熱七
四物湯 補八　五物煎 新因三
金水六君煎 新和一　五福飲 新補六
理中湯 熱一　人參理中湯 熱一
七福飲 新補七　溫胃飲 新熱五
四味回陽飲 新熱一　胃關煎 新熱九
理陰煎 新熱三　六味回陽飲 新熱二
獨參湯 補三六　生脈散 補五七
六味地黃丸 補一二一　養中煎 新熱四
茯神湯 小六十　八味地黃丸 補一二二
大營煎 新補十四　滋腎丸 寒一六七
滋陰八味丸 新寒十七　保陰煎 新寒一
清化飲 新因十三　補中益氣湯 補三一

益黃散 和十九　六神散 小五一
加味歸脾湯 補三四　小柴胡湯 散十九
柴胡飲子 小二十　柴胡清肝散 寒五九
一柴胡飲 新散一　二柴胡飲 新散二
人參黃連散 小十七　四柴胡飲 新散四
五柴胡飲 新散五　二黃犀角散 小九
正柴胡飲 新散六　柴芩煎 新散十
錢氏黃龍湯 小九　柴陳煎 新散九
五積散 散三九　四順清涼飲 攻二五

星蘇散 小四　參蘇飲 散三四
珠砂安神丸 寒一四一　惺惺散 小二三
釣藤飲 小六六　黃連安神丸 寒一四
瀉白散 寒四一　瀉黃散 寒五七
秘旨安神丸 小七一　瀉心湯 寒二七
抑肝散 小六七　安神鎮驚丸 小七六
瀉青丸 寒一五一　抑青丸 小九八
東垣涼膈散 痘八三　抽薪飲 新寒一
龍膽湯 小八一　大分清飲 新寒五

玉泉散 新寒十五　　玉女煎 新寒十二
地骨皮散 小三二　　導赤散 寒一二二
大青膏 小六八　　消食丸 小一七
清膈煎 新寒九　　和胃飲 新和五
利驚丸 小九七　　涼驚丸 小九六
抱龍丸 小八五　　琥珀散 小八一
牛黃散 小二七　　梅花飲 小八三
白餅子 小二九　　肥兒丸 小百十一
保和丸 小三五　　木香散 痘二一

陳氏十二味異功散 痘二一　　人參羌活散 小二六

備用方

其列小兒方中所當詳閱

景岳全書卷之四十上終

小兒則 下

會稽　張介賓　會卿著
瀛海　賈　棠　青南訂

吐瀉 二七六

小兒吐瀉證虛寒者居其八九實熱者十中一二但察其脈證無火面色清白氣息平緩肢體清涼或神氣疲倦則悉是虛寒之證不得妄用涼藥古人云脾虛則嘔胃虛則吐者是也蓋飲食入胃不能運化而吐者此脾氣虛弱所以不能運也

寒涼入胃惡心而吐者此中焦陽氣受傷所以不能化也若邪在中焦則止於嘔吐若連及下焦則并為瀉矣故在中上二焦者宜治脾胃連及下焦者宜調脾腎若非實熱火邪而妄用寒涼消伐者無有不死

一小兒虛寒嘔吐凡無故吐瀉察其無火者必生冷寒氣傷胃所致今小兒所病大約皆是此證宜養中煎或溫胃飲為主治其次則五君子煎理中湯冬朮煎若兼血虛燥渴者宜五君子加當歸若兼脾腎虛寒或多痰涎或兼喘促宜理

陰煎甚者人參附子理陰煎爲最妙勿謂嘔吐不宜熟地也
○若脾氣無寒或偶有所觸雖吐而不甚者宜五味異功散
○若脾中寒滯氣有不順而嘔吐者宜藿香安胃散○若上
焦不清多痰兼滯者宜六君子湯或更加砂仁炮薑木香
一小兒傷食嘔吐若誤食不宜之物或停積滯濁以致吐者必
胸膈脹滿或肚腹作痛此其中必有餘邪宜和胃飲益黃散
○若但有食滯而胃不寒者宜大和中飲小和中飲○若食
滯兼痰而吐者宜二陳湯六安煎苓朮二陳煎○若飲食雖
滯而因脾虛不能運化者此其所重在脾氣不在飲食止宜

養中煎溫胃飲或理陰煎聖朮煎之類以培其本不可因飲
食之故而直行消伐也
一小兒胃熱嘔吐者其證極少蓋內熱者多不致吐即亦有之
其必多食炙煿甘甜之物以致滯積胃口或夏間冒暑及臟
氣素熱者乃有之凡治熱證必須詳辨的確勿得以假熱作
眞熱也○凡胃火內熱嘔吐者察其證必煩熱作渴喜冷察
其脈見必洪大滑數火之甚者宜瀉黃散玉泉散或竹葉石
膏湯　若有痰食之滯兼火作吐者宜二陳湯加石膏黃連
山楂或加山査麥芽之類○若脾胃虛弱而兼火者宜人參

安胃散或橘皮竹茹湯○若胃火嘔吐作渴者宜竹茹湯○
若夏月胃熱傷暑者必煩熱大渴吐瀉宜五苓
香薷飲或十味香薷飲或竹茹湯或石膏竹茹湯若冷之甚
者宜益元散玉泉散之類然亦有陰陽之辨若因大暑
過用生冷以致傷脾胃而爲吐瀉者此屬暑中之陰則宜溫中
如前虛寒治法或用五苓散亦妙凡本條之藥絕不可用
薛氏曰凡暑令吐瀉手足發熱作渴飲冷者屬陽證宜清涼之
劑若手足並冷作渴飲湯者屬陰證宜溫補之劑故病有屬
陰者誤用寒涼之藥死後手足青黯甚則遍身皆然於此可

驗
一小兒吐瀉幷作者本屬內傷然有因寒氣自外而入內犯臟
氣而然者有因生冷不愼致傷胃氣而然者有因中氣本弱
飲食失宜而然者邪傷陽分則爲吐邪傷陰分則爲瀉若吐
瀉幷作則陰陽俱傷之證也此當察其有滯無滯詳辨其虛
實而治之○若吐瀉初起邪滯未淸者必有胸腹脹悶實滯
等證此宜先用和胃飲苓朮二陳煎之類以淸上焦之氣○
若吐瀉初起腹脹腹痛而拒按者宜先用胃苓湯或五苓散
加乾薑木香之類以分下焦之淸○若上焦脹滯或所吐既

多而漏惡不已此其上焦必尚有物但察其形氣脈色總惟
胃虛而然若虛寒不甚者宜五味異功散然虛寒不[illegible]土故
惟五君子煎六味異功煎及養中煎溫胃飲之類皆最宜也
○若下腹寒痛而可按可揉或腹寒喜熨或泄瀉多有泄
乃不止此其下焦必空虛已極惟脾腎虛寒不能司攝而然
非胃關煎不可其稍輕者或用四君子加肉豆蔻補骨脂丁
香之屬若虛中兼滯者或助胃膏亦可酌用○其或果由胃
火則火逆於上熱蓄於下亦能為吐為瀉然必有火證火脈
者方是其證乃宜大小分清飲或用香連丸或如前胃熱條
叶條參而治之然此證最少不得輕易混用

吐瀉新按

余季子於丁巳正月生於燕邸及白露時甫及半周余見新涼
日至虞衣被之薄恐為寒氣所侵每切囑眷屬保護之而眷
屬不以為意及數日後果至吐瀉大作余即用溫胃和脾之
藥不效隨用理中等劑亦不效三日後加人參三錢及薑桂
吳茱肉豆蔻之類亦不效至四五日則隨乳隨吐吐其半而
瀉其半腹中毫無所留矣余不得已乃用人參五六錢製附
子薑桂等各一二錢下咽即吐一滴不存而所下之乳則白

潔無氣仍猶乳也斯時也其形氣之危已萬無生理矣余含
淚靜坐書室默測其故且度其寒氣犯胃而吐瀉不止若舍
參薑桂附之屬尚何術焉伎已止此窘莫甚矣思之思之忽
於夜半而生意起謂其胃虛已極但藥之氣味略有不投則
胃不能受隨拒而出矧附子味鹹亦能致嘔必其故也因自
度氣味酌其所宜似必得甘辣可口之藥庶乎胃氣可安尚
有生意乃用胡椒三錢搗碎加煨薑一兩用水二鍾煎至八
分另盛聽用又用人參二兩亦用水二鍾煎至一鍾另盛聽
用用此二者取其氣味之甘辛純正也乃用茶匙挑合二者
以配其味凡用參湯之十加椒薑湯之一其味微甘而辣正
得可口之宜遂溫置熱湯中徐徐挑而與之陸續漸進經一
時許皆咽而不吐竟得獲效自後乳藥皆安但瀉仍未止也
此自四鼓服起至午未間已盡二兩之參參盡後忽爾躁
擾呻吟煩劇之甚家人皆怨謂以嬰兒嬌嫩臟腑何堪此等
熱藥是必燒斷肚腸也相與抱泣余雖疑之而不為亂仍寧
神熟思之意此藥自四鼓至此若果藥有難堪何於午前相
安而此時遽變若此其必數日不食胃氣新復而倉廩空虛
饑甚則然也傍有預備之粥取以示之則張皇欲得其狀甚

急乃與一小盞輒鯨吞虎嚥又望其餘遂復與半碗猶然不
足又與半碗遂寂然安臥矣至次日復加製附始得瀉止全
愈嗚呼此兒之真生固有天命然原其所致之因則人之臟
氣皆繫於背褥薄夜寒則寒從背俞而入內干於臟中必深
矣原其所治之法則用藥既當而氣味不投無以相入求效
難矣及其因饑發躁使非神悟其機倘妄用清涼一解則全
功盡棄害可言哉故余筆此以見病原之輕重氣味之相關
及診治之活變有如此者雖然此特以己之見故可信
心救療如是設以他人之子有同是病者於用參數錢之時

見其未效不知藥未及病必且煩言吠起謗其誤治改用苦
寒無不即死而仍歸罪於用參者此時黑白將焉辨之故再
贅其詳用以廣人之聞見云

都閫錢旭陽長郎年及兩週季夏間以生果傷脾因致先瀉後
痢旭陽善醫知其不過傷於生冷乃與參朮薑桂溫脾等藥
瀉痢不愈而漸至唇口生瘡乃謀之余曰此兒明為生冷所
傷今不利溫藥將奈之何余曰此因瀉傷陰兼之辛辣遽入
而虛火上炎耳非易以附子不能使火歸原也因用二劑而
唇口瘡痛咽腫倍甚外見於頭面之間而病更劇矣又謀之

余曰用藥不投如此豈真因濕生熱耶余診之曰上之脈息
下之所出皆非真熱本屬陽虛今熱之不效雖屬可疑然究
其所歸寒之則死必無疑也意者藥未及耳旭陽曰何有
一證似疑其寒今其所用湯散必欲煎濃極熱者余等不能
入口不敢則安然吞之卽其瘡口腫痛如此所不顧也豈其
證[illegible]是矣是[illegible]增附子一錢五分及薑桂因與人
參熟地之屬其瀉漸止瀉止而喉口等證不一日而全收矣
疑似之間難辨如此使非有確持之見萬無一生矣余自經
此以來漸至不惑後有數兒證治大同者俱得保全噫此不

惑之道其要何居在知本之所在耳臨證者可無慎哉

附按

薛氏治一小兒每飲食失節或外驚所忤卽吐瀉發搐服鎮驚
化痰等藥而後發搐益甚飲食不進雖參朮之劑到口卽
嘔余用白朮和土炒黃用米泔煎數沸不時灌半匙仍嘔次
日灌之微嘔再日灌之欲嘔此後每服一二匙漸加至半杯
不嘔乃濃煎服而愈

一小兒瀉而大便熱赤小便澀少此熱蘊於內也先以四苓散
加炒黃連一劑其熱頓退又用七味白朮散去木香二劑熱

瀉頓止後以四君升麻調理而痊

一小兒九歲食炙煿之物作瀉飲冷諸藥不應肌體消瘦飲食少思余用黃連一兩酒拌炒焦爲末入人參末四兩粥丸小豆大每服四五十丸不拘時白湯下服訖瀉愈又用五味異功散加升麻服月餘而瘥後不戒厚味患疳積消瘦少食發熱作渴用大蘆薈丸爲主以四味肥兒丸爲佐熱渴漸退却以四味肥兒丸爲主以五味異功散爲佐而痊後又不禁厚味作瀉飲冷仍服肥兒丸異功散而痊

霍亂吐瀉二十七

小兒霍亂吐瀉者必以寒涼傷胃或時氣陰濕或飲食失宜皆能致之然此與前吐瀉並行者稍有不同蓋霍亂者猝而甚吐瀉者徐而緩霍亂者傷在一時吐瀉者其傷以漸此其所以有異也○若暴疾霍亂而胃口未清脇腹仍滿者宜先用和胃飲苓朮二陳煎或大小和中飲或小分清飲或神香散之類主之俟胃口稍平即宜五味異功散或溫胃飲五苓散之類調補之○若霍亂初起便覺神疲氣倦而胃口別無脹滯者此其胃氣已傷即宜溫補如養中煎溫胃飲之類不得槩行清利也

論瀉痢糞尿色二十八

古人有以小兒瀉痢糞黃酸臭者皆作胃熱論治此大誤也蓋飲食入胃化而爲糞則無有不黃無有不臭者豈得以黃色而酸臭者爲熱乎今以大人之糞驗之則凡胃強糞實者其色必深黃而老若方是全陽正色若純黃不老而糞有嫩色則胃中火力便有不到之處再若淡黃則近白矣近白之色則半黃之色也糞色半黃則穀食半化之色也糞氣酸腥則穀食半化之氣也穀食半化則胃中火力盛衰可知也若必待其青糞白氣味不臭然後爲寒則覺之遲矣故但以糞色

之老淡糞氣之微甚便可別胃氣陽和之成色智者見於未然而況於顯然乎余故曰古人以糞黃酸臭爲火者大誤也再若小水之色凡大便瀉痢者清濁既不分小水必不利小水不利其色必變即淸者亦常有之然黃者十居八九此因瀉以陰陰亡則氣不化氣不化則水涸水涸則色黃不清此自然之理也使非有淋熱痛澀之證而但以黃色便作火治者亦大誤也

吐乳

小兒吐乳雖有寒熱之不同然寒者多而熱者少虛者多而實

若少食由胃弱而然但察其形色脈證之陰陽則虛實寒熱自有可辨熱者宜加微清寒者必須溫補乳子之藥不必多用但擇其要者一二三四味可盡其妙如參苴飲五味異功散之類則其要也若兒小乳多滿而溢者亦是常事乳行則止不必治也若乳母有疾因及其子或有別證者又當兼治其母宜從薛氏之法如左

薛氏曰前證若小兒自受驚或乳母恚怒致兒吐瀉青色者宜用異功散○若母食厚味而乳熱者用東垣清胃散○母飲酒而乳熱者用葛花解酲湯子服一二匙○若飲燒酒而乳

熱致子身熱或昏憒服冷米醋三五杯多亦無妨兒服一匙○若母停滯生冷而乳冷者母服人參養胃湯子服調中丸○若母停滯而變熱乳者母服大安丸子服五味異功散○若母鬱怒傷肝脾而乳熱者用歸脾湯逍遙散○若母脾虛血弱而乳熱者用六君子加芎歸○若母氣血虛而乳熱者子母俱服八珍湯○若母勞後發熱而乳熱者子母俱服補中益氣湯○若因怒動肝火而乳熱者用五味異功散加柴胡山梔○若吐痰涎及白絲水者木乘脾土虛寒證也用六君子加柴胡木香○大凡吐乳瀉青色者屬驚法當平肝補脾吐瀉而白色者屬寒法當溫補脾土○前證若手足指熱者屬實手足指冷者屬虛此亦驗法也

五疳證 三十

錢仲陽曰小兒諸疳皆因病後脾胃虧損或用藥過傷不能傳化乳食內亡津液虛火妄動或乳母六淫七情飲食起居失宜致兒為患凡疳在內者目腫腹脹瀉痢青白體漸瘦弱疳在外者鼻下赤爛頻揉鼻耳或肢體生瘡大抵其證雖多要不出於五臟而五臟之疳不同當各分辨治之○肝疳者一名筋疳亦名風疳其證白膜遮睛或瀉血而瘦宜用地黃丸

以生腎○心疳者面黃頰赤身體壯熱宜用硃砂安神丸以治心異功散以補脾○脾疳者一名肥疳體黃瘦削皮膚乾澁而有瘡疥腹大嗜土宜用四味肥兒丸以治疳五味異功散以生土或用益黃散○肺疳者一名氣疳喘嗽氣促口鼻生瘡宜用人參清肺湯以治肺益氣湯以生金○腎疳者一名骨疳肢體瘦削遍生瘡疥喜臥濕地用地黃丸○鼻疳用蘭香散諸瘡用白粉散○若患潮熱當先補肝後瀉心若妄以硝黃等藥利之則成疳○若患癖當消磨若誤以巴豆硼砂下之或傷寒誤下皆能成疳○其初病者為熱疳用黃連

丸久病者爲冷疳用木香丸冷熱相兼者用如聖丸津液短
少者用七味白术散○凡此皆因大病脾胃虧損內亡津液
所致當固脾胃爲主而早爲施治則不變敗證也
楊氏曰無辜疳者腦後項邊有核如彈丸按之轉動軟而不疼
其內有虫不速鍼出則內食臟腑肢體癰疽便利膿血壯熱
羸瘦頭露骨高宜用大蘆薈丸蟾蜍丸○丁奚者手足極細
項小骨高尻削體痿腹大臍突號哭胸陷宜用肥兒丸大蘆
薈丸○哺露者虛熱往來頭骨分開翻食吐虫煩渴嘔噦宜
用肥兒丸大蘆薈丸○走馬疳者牙齒蝕爛蓋齒屬腎腎虛

受熱殘火上炎致口臭齒黑甚則齦爛牙宣宜敷雄黃散服
蟾蜍丸○若作渴泄瀉腫脹勞瘵等證當詳參方論而治之
○蓋疳者乾也因脾胃津液乾涸而患在小兒爲五疳在大
人爲五勞總宜以調補胃氣爲主
又楊氏曰又有疳傷者五臟虫疳也其名甚多姑舉其要○虫
疳者其虫如絲出於頭項腹背之間黃白赤者可治青黑者
難治○蛔疳者皺眉多啼嘔吐青沫腹中作痛肚腹青筋唇
口紫黑頭搖齒痒○脊疳者身熱羸黃煩渴下利拍背有聲
脊骨如鋸齒十指皆瘡頻嚙指甲○腦疳者頭皮光急滿頭
并瘡腦熱如火髮結如穗遍身多汗顖腫顖高○疳渴者日
則煩渴飲水不食夜則渴止○疳瀉者毛焦唇白額上青紋
肚脹腸鳴瀉下糟粕○疳痢者停積宿滯水穀不聚瀉下惡
物○疳腫者虛中有積肚腹緊脹脾復受濕則頭面手足虛
浮○疳勞者潮熱往來五心煩熱盜汗骨蒸嗽喘枯悴渴瀉
飲水肚硬如石面色如銀○大抵其證雖多要不出於五臟
總宜以五臟之法治之
景岳曰按楊氏云疳者乾也在小兒爲五疳在大人爲五勞然
既云爲乾又云爲勞豈非精血敗竭之證乎察前諸法俱從

熱治多用清涼雖此證眞熱者固多而元氣既敗則假熱者
尤多也即前所用亦有地黃丸異功散益黃散益氣湯之類
恐此數方有不足以盡之其或血氣俱損有非大補不可者
陰虛假熱脾敗腎虧又有非溫補不可者貴在臨證酌宜仍
當以虛損治勞之法參用庶得其善
薛氏曰按疳證或以哺食太早或嗜食甘肥或服峻厲之藥重
亡津液虛火熾盛或因稟賦或乳母厚味七情致之各當調
治其內○若口舌蝕爛身體壯熱腮唇赤色或作腫痛腹膈
煩悶或掌熱咽乾作渴飲水便赤盜汗嚙齒虛驚此心經內

外疳也宜安神丸之類主之○若鼻外生瘡眼目赤爛皮膚似癬兩耳前後項側缺盆兩腋結核或小腹內股玉莖陰囊睾丸腫潰小便不調或出白津或咬指甲搖頭側目白膜遮睛羞明畏日肚大青筋口乾下血此肝經內外疳也用蘆薈蘆薈丸主之○若頸項不生髮或生瘡瘍或髮成穗或人中口吻赤爛腹痛吐逆乳食不化口乾嗜土泄下酸臭小便白濁或合目昏睡惡聞木音此脾經內外疳也用肥兒丸主之○若鼻外生瘡咽喉不利頸腫齒痛欬嗽寒熱皮膚皺錯欠伸少氣鼻癢出涕衄血目黃小便頻數此肺經內外疳也用

地黃清肺飲主之○若腦熱吐痰手足逆冷寒熱往來滑泄肚痛口臭作渴齒齦潰爛爪黑面黧身耳生瘡或耳出水或食自髮此腎經內外疳也用地黃丸主之○凡疳熱上攻或痘毒上升為患甚速名為走馬疳急用雄黃散搽牙散馬鳴散擇而用之服蟾蜍丸輕則牙齦腐爛唇吻腫痛可治甚則牙齦蝕落腮頰透爛不治

盜汗（三十一）

小兒元氣未充腠理不密所以極易汗出故凡飲食過熱或衣被過煖皆能致汗東垣諸公云此是小兒常事不必治之然汗之根本由於營氣汗之啟閉由於衛氣若小兒多汗者終是衛虛所以不固汗出既多未免營衛血氣愈有所損而衰羸之漸未必不由乎此此所以不可不治也大都治汗之法當以益氣為主但使陽氣外固則陰液內藏而汗自止矣

治法凡小兒無故常多盜汗或自汗者宜以團參散為主或參苓散四君子湯五味異功散及白术散之類俱可擇用○若其甚者宜大營煎人參養營湯或十全大補湯○若心經有火而見煩渴者宜生脈散一陰煎○若肝脾火盛內熱熏蒸血熱而汗出者脈必洪滑證多煩熱宜當歸六黃湯或加

減一陰煎○若陽明實熱汗出大渴者宜仲景竹葉石膏湯○若因病後或大吐大瀉之後或誤用剋伐之藥以致氣虛氣脫而大汗亡陽者速宜用參附湯六味回陽飲或芪附湯之類庶可挽回也○大都汗多亡陽者多致角弓反張項強戴眼等證此太陽少陰二經精血耗散陰虛血燥而然速宜用大營煎人參養營湯或十全大補湯之類方可解救若作風治鮮無一生矣○前汗證門有詳論可法所當參閱○余之兒輩有於襁褓中多盜汗者但以人參一錢泡湯與服當夜即止久不服參必又汗出再服再止其效如神凡養兒者

亦可以此為常法

腹脹腹痛三十二

小兒腹脹腹痛多因食積或寒涼傷脾而然內經曰痛者陰也又曰痛者寒氣多也有寒故痛也東垣曰寒脹多熱脹少皆主於脾胃故凡小兒肚腹或脹或痛雖曰多由積滯然脾胃不虛則運化以時何致作脹是脹必由於虛也若胃氣無傷而腹中和煖則必無留滯作痛是痛多由乎寒也故治痛治脹者必當以健脾煖胃為主若無火證不得妄用涼藥若無拒按堅實等證不得妄用攻藥

一治法凡小兒肚腹膨脹或時常作痛黃瘦常用調理之法惟芍藥枳實丸加減用之為宜且善止腹痛或大健脾丸楊氏啟脾丸和中丸之類皆可酌用○若偶爾傷脾氣促困倦外見腹脹而內不脹者此脾氣虛也宜五味異功散或六味異功煎○若脾胃陽氣不足虛寒作脹或畏寒或手足冷或兼嘔瀉者宜五君子煎溫中散溫胃飲六君子湯或溫中丸○若兼脾腎陽虛或水泛為痰或喘促痛脹泄瀉宜理陰煎加減主之○若脾胃氣虛而兼泄瀉者宜六味異功煎或六君子湯加木香或四君子湯　若胃口偶有留滯大痛而脹者宜排氣飲或益黃散○若宿食偶有不消而暫為脹滿者宜大小和中飲或和保丸消食丸○若有堅積停滯脹滿拒按形氣俱實者宜赤金豆白餅子紫霜丸之類攻下之○凡諸未盡當於腹痛腫脹二門參酌為治

余初年在京治一五歲鄰女適經菓鋪見有鮮巴豆其父誤以為松仁以一粒與食之嚼而味辣即吐出而已半咽矣少頃大瀉十餘次後次日即致肚腹通身悉皆腫脹絕口不食因求治於余或謂宜黃連綠豆以解毒或謂宜苓五皮以利水余曰大攻之後豈非大虛之證乎能再堪苦寒以敗脾否大瀉之後又尚有何水之可利遂單用獨參湯及溫胃飲以培脾氣不數劑而復元如初夫既以大瀉而何以反脹若是因此一證乃知大虛大寒而致成腫脹者類多如此　新按

痞塊三十三

小兒多有痞塊者總由口腹無節見食必啖食上加食脾胃化之不及則胃絡所出之道未免漸有留滯留滯不已則日以益大則成痞矣或以感寒發熱之後胃氣未清此時最宜擇食節食若不知慎則食以邪留最易成痞此實人所不知也

蓋痞塊既成必在腸胃之外膜膈之間故非可以消伐之劑推逐而去者若但知攻痞則胃氣益弱運化失權不惟不能消痞且致脾土虧損則痞邪益橫而變證百出矣故治此者當酌其緩急專以培補胃氣為主外則用膏用灸以拔其結絡之根庶為萬全之策

一凡調理脾胃之法若痞邪未甚宜芍藥枳實丸加減用之為善或大健脾丸及錢氏啟脾丸皆可擇用○若脾胃氣虛食少微寒宜五味異功散○若脾胃虛寒者宜調中丸溫胃飲五君子煎○若兼胃脘停積食滯作脹者宜保和丸消食丸或大小和中飲○若脹急堅實形氣尚強不得不瀉者宜赤金豆白餅子○若痞久成熱致動陽明之火而牙口潰爛成疳者宜蘆薈丸胡黃連丸或蟾蜍丸○此外如貼痞膏及灸治之法俱詳載積聚門

癲癇　三十四

錢仲陽曰小兒發癇因血氣未充神氣未實或為風邪所傷或為驚怪所觸亦有因妊娠時七情驚怖所致若眼直目牽口噤涎流肚膨發搐項背反張腰脊強勁形如死狀終日不醒則為痓矣○凡治五癇皆隨臟治之每臟各有一獸之形通用五色丸為主仍參以各經之藥發而重者死病甚者亦死○如面赤目瞪吐舌嚙脣心煩氣短其聲如羊者曰心癇心虛者用養心湯發熱飲冷為實熱用虎睛丸發熱飲湯為虛熱用安砂妙香丸○面青脣青兩眼上竄手足攣掣反折其聲如犬者曰肝癇肝之虛者用地黃丸搐搦有力為實邪用柴胡清肝散大便不通用瀉青丸○面黑目振吐涎沫形體如尸其聲如豬者曰腎癇用地黃丸紫河車丸之類腎無瀉法故皆從虛治之○面如枯骨目白反視驚跳反折搖頭吐沫其聲如雞者曰肺癇肺氣虛者用補肺散面色萎黃者土不能生也用五味異功散面色赤者陰火上衝於肺也用地黃丸○面色萎黃目直腹滿自利四肢不收其聲如牛者曰脾癇用五味異功散若面青瀉利飲食少思用六君子加木香柴胡○若發熱抽掣仰臥面色光澤脈浮者病在腑為陽證易治身冷不搐覆臥面色黯黑脈沉者病在臟為陰證難治○凡有此證先宜看耳後高骨間若有青脈紋先抓破出血可免其患此皆元氣不足之證也須以紫河車丸為主而以補藥佐之設若泛行剋伐復傷元氣則必不時舉發久而變危多致不救○又有驚癇風癇食癇三種治驚癇宜比金

丸茯神丸錢氏養心湯辰砂妙香散清神湯虎睛丸之類主之風癇用錢氏牛黃丸消風丸星蘇散之類主之食癇用妙聖丹主之

薛立齋曰妊娠若遇驚恐則必內應於胎故一月足厥陰脉養驚則肝有病二月足少陽脉養驚則膽受病三月手少陰脉養驚則心受病四月名爲離經五月足太陰脉養驚則脾受病六月足陽明脉養驚則胃受病七月手太陰脉養驚則肺受病八月手陽明脉養驚則大腸受病九月足少陰脉養驚則腎受病是臟腑納氣於丹田自肝至腎十經滋養而生此則胎中所致也若既生之後或驚怪所觸或乳哺失節或乳母飲食起居六淫七情臟氣不平亦致是證須察見證屬於何經更別陰陽以兼補脾胃爲上否則不時舉發甚至不救

附按

薛氏治一小兒患前證吐痰困倦半餉而甦諸藥不效年至十三而頻發用肥厚紫河車生研爛入人參當歸末搗丸桐子大每服二五十丸日進三五服乳化下一月漸愈又佐以八珍湯全愈

又一兒七歲發驚癇令其恣飲人乳後發漸疎而輕至十四復發用乳不效亦用河車丸數劑而愈常用加減八味丸而安後至二十三歲復發而手足厥冷仍用前法佐以八味丸十全大補湯而痊

又治數小兒皆以補中益氣湯六君子湯六味八味等丸相間用之皆得全愈

癇證治論義及大人證治諸法俱詳載癲狂門所當參閱

溺白

小兒便如米泔或溺停少頃變作泔濁者此脾胃濕熱也凡飲食不節者多有此證然亦有氣虛下陷而然者○若脉證兼火者當清利宜導赤散或四味肥兒丸○若飲食過傷兼脹滿者宜保和丸大安丸○若形氣不足或黃瘦或嘔泄者宜五味異功散或四君子湯或補中益氣湯○若肝腎火盛移熱膀胱者必兼痛澁須熱宜七味龍膽瀉肝湯○若脾胃本虛而復兼濕熱者宜四君子湯加炒黃連○若止見溺白而別無痛熱脉證則但節其生冷水果及甘甜等物不久自愈切不可因其溺白而遽用苓連梔子之類多致傷脾而反生吐瀉等證漸至羸敗者是皆誤治之害也不可不察

變蒸

巢氏云小兒變蒸者以長血氣也變者上氣蒸者體熱錢仲陽
曰變者易也小兒在母腹中乃生骨氣五臟六腑成而未全
自生之後即長骨脈臟腑之神志自內而長自下而上故以
生之日後三十二日一變變每畢即情性有異於前何也長生
臟腑意志故也何謂三十二日長骨添精神人有三百六
十五骨除手足中四十五碎骨外有三百
二十數自下生骨一日十段而上之十日百段三十二日
計三百二十段為一遍亦曰一蒸凡一周遍乃生虛熱諸病
如是十周則小蒸畢也故初三十二日一變生腎志六十四

日二變一蒸生膀胱九十六日三變生心喜一百二十八日
四變二蒸生小腸一百六十日五變生肝哭一百九十二日
六變三蒸生膽二百二十四日七變生肺聲二百五十六日
八變四蒸生大腸二百八十八日九變生脾智三百二十日十
變五蒸生胃此所謂小蒸畢也又手厥陰心包絡為臟手少陽經
三焦為腑此一臟一腑俱無狀故不變不蒸也太倉云氣入
四肢長碎骨於十變後六十四日為一大蒸計三百八十四
日又六十四日為二大蒸計四百四十八日又六十四日為
三大蒸計五百一十二日至五百七十六日變蒸既畢兒乃

成人也變者生五臟也蒸者養六腑也每經一變一蒸情態
即異輕則發熱微汗其狀似驚重則壯熱脈亂而數或汗或
吐或煩啼躁渴輕者五日解重者七八日解其候與傷寒相
似其治法平和者微表之實熱者微利之用紫霜丸黑散子柴
胡散有變蒸而不乳多啼者當歸散調氣散主之
錢氏方論並全嬰方論云變蒸者以長血氣也變者上氣蒸者發
熱也輕則體熱虛驚耳冷微汗唇生白泡三日可愈重則寒
熱脈亂腹痛啼叫不能乳食食即吐哯五日方愈若方以黑
散子紫霜丸主之竊謂此乃小兒所不免者雖勿藥可也兒

前藥乃屬峻厲非惟不能勝病又傷元氣而損之恒之
余嘗見一小兒至一變發熱有痰投以抱龍丸一粒卒至不
救觀此可驗矣若不熱不驚略無證候而暗變者為受胎氣
壯實故也
張氏曰小兒變蒸之說古所無也自西晉王叔和始一言之繼
自隋唐巢氏以來則日相傳演其說益繁然以余觀之則似
有未必然者何也蓋兒胎月足離懷氣質雖未成實而臟腑
已皆完備及既生之後凡長養之機則如月如苗一息不容
有間百骸齊到自當時其而日不同豈復有此先彼後如一

變生腎，一變生膀胱，及每變必三十二日之理乎？又如小兒之病與不病，余所見所治者，蓋亦不少，凡屬違和，則不因外感，必以內傷，初未聞有無因而病者，豈真變蒸之謂耶？又見保護得宜而自生至長毫無疾病者不少，抑又何也？雖有暗變之說，終亦不能信然。余亦爲此辯者，何非迷之謬，欲違其遺賊者？此及如前薛氏之戒，皆不可不察也。明達者以爲然否？

小兒下論列方 二十七

理中湯 熱一　　理中丸 同上

十全大補湯 補二十　　養中煎 新熱四

溫胃飲 新熱五　　六味地黃丸 補一二一

理陰煎 新熱三　　胃關煎 新熱九

八味地黃丸 補一二二　　四君子湯 補一

五君子煎 新熱六　　加減八味丸 補一二三

六君子湯 補五　　歸脾湯 補三三

補中益氣湯 補三一　　八珍湯 補十九

白朮散 和三十　　人參養營湯 補二一

生脈散 補五七　　逍遙散 補九二

人參養胃湯 小[illegible]　　參薑飲 新熱八

團參散 小二五　　人參安胃散 小四一

益黃散 和十九　　大營煎 新補十四

人參清肺湯 寒二六　　一陰煎 新補八

二陰煎 新補十一　　加減一陰煎 新補九

參附湯 補[illegible]八　　芪附湯 補[illegible]

五味異功散 補四　　參苓散 補[illegible]

安神丸 寒一四三　　當歸六黃湯 寒六四

茯神湯 小六十　　清神湯 小六一

六味異功煎 新熱七　　虎睛丸 小百一

調中湯 小二　　調中丸 小三

六味回陽飲 新熱二　　保和丸 小三五

和中丸 和八七　　苓朮二陳煎 新和四

六安煎 新和二　　二陳湯 和一

芍藥枳朮丸 新和十八　　大安丸 小[illegible]六

大健脾丸 和八五　　啟脾丸 和八六

和胃飲 新和五　　排氣飲 新和六

大和中飲 新和七　　小和中飲 新和八

竹茹湯 和[illegible]　　地黃清肺飲 小六九

五苓散 和一八一　瀉黃散 寒五七
錢氏養心湯 補九〇　四苓散 和一八二
胃苓湯 和百九十　朱砂安神丸 寒一四一
益元散 寒百十二　小分清飲 新寒十
辰砂丸香散 因十五　蘭香散 小百十
玉泉散 新寒十五　東垣清胃散 寒五四
柴胡飲 小二十　導赤散 寒一二二
葛花解酲湯 和一二四　星蘇散 小一七
香連丸 寒百十　五物香薷飲 和百七十

比金丸 小百　消風丸 小百四
十味香薷飲 和一七一　妙聖丹 小百五
紫河車丸 小百九　橘皮竹茹湯 和一二二
消食丸 小一七　胡黃連丸 小一二三
藿香安胃散 熱七一　黃連丸 小一一
如聖丸 小一二六　竹葉石膏湯 寒五
黃柏丸 小百二十　木香丸 小百十
龍膽瀉肝湯 寒六六　白餅子 小一九
抱龍丸 小八五　錢氏牛黃丸 小九二

黑散子 小取　赤金豆 新攻二
四味肥兒丸 小百十一　馬鳴散 外八
大蘆薈丸 小百十五　大蕪荑湯 小百十八
蟾蜍丸 小一一　白粉散 外一九六
揀牙散 外一五　雄黃散 外三
聖术煎 新熱二五　助胃膏 小六
絹香散 新和二十

景岳全書卷之四十一終

景岳全書麻疹詮目錄　謨集

卷之四十二

麻疹詮

述原 一　名義 二
疹逆順 三　疹脉 四
疹證 五　疹期 六
麻疹初熱 七　疹出沒 八
疹形色 九　疹涕 十
疹吉凶 十一　總論治法 十二
疹禁忌 十三　疹發熱 十四
疹咳嗽 十五　疹吐瀉 十六
疹飲食 十七　疹飲水 十八
疹渴 十九　疹汗衄 二十
疹躁妄狂亂 二十一　疹咽痛 二十二
疹唇口瘡 二十三　疹腹痛 二十四
疹後諸證 二十五　附麻疹 二十六
水痘 二十七　論列方 二十八

景岳全書麻疹詮目錄終

會稽　張介賓　會卿著
瀛海　賈　棠　青南訂

麻疹詮

述原 一

景岳子曰：疹之與痘，原非一種。雖痘之變態多證，而疹之收斂稍易，然疹之甚者，其勢凶危，亦不減於痘，最爲可畏。蓋疹毒痘毒本無異也。第古人重痘而忽疹，多不詳及，故後人亦無所宗法。余實悵之。自得羅田萬氏之刻，見其理透法精，鄙念斯慰。今悉從其訓，備述於此。璧其中稍有裁訂，亦不過正其疑似，詳其未詳耳。使此後患疹者，幸獲迷津之指南，亦以見萬氏之功爲不少矣。

名義 二

疹者，痘之末疾，惟二經受證，脾與肺也。內應於手足太陰，外合於皮毛肌肉，是皆天地間沴戾不正之氣，故曰疹也。然其名目有異：在蘇松曰沙子，在浙江曰瘄子，在江右湖廣曰麻，在山陝曰膚瘡，曰糠瘡，曰赤瘡，在北直曰疹子。名雖不同，其證

則一切疹在痘前者可發以表之今在痘後出疹者尤為常痛

疹逆論

萬氏曰疹以春夏為順秋冬為逆以其出於脾肺二經一遇風寒勢必難出且多變證故於秋冬為不宜耳夫天行不正之氣致為人之疾疹然古人於痘疹二字始終歸重於痘並不分別疹為何證所以一諸歸於一途耶思當時重痘不重疹故爾略之致使後人不得心法所而害事者往往有之今以吾家四代傳流以及今日心得之法開載於後用此應疫定不差矣敢有毫釐隱匿天其鑒之

疹脉論

凡出疹自熱起至收完但看右手一指脉洪大有力雖有別證亦不為害此定存亡之要法也

景岳曰按此則陽證得陽脉之義若細軟無力則陽證得陰脉矣元氣既弱安能勝此邪毒是即安危之基也故凡疹得陰脉者即當識為陰證而速救元神宜用傷寒溫補托法參酌治之若執以麻疹為陽毒而槩用清寒則必不免矣

疹源論

疹雖非痘之比然亦由胎毒蘊於脾肺故發於皮毛肌肉之間但一時傳染大小相似則未有不由天行厲氣而發者此其源雖內發而證多屬表故其內為胃與肺而外為太陽以與傷寒類其為毒也但古名不同火補於太陽經受之故其為證則有欬嗽噴嚏面腫腮赤目胞浮腫或淚汪汪鼻流清涕呵欠悶頓乍涼乍熱手足稍冷夜臥驚悸或惡心嘔噦或以手指面目鼻者是即出疹之候便宜用解毒散邪等藥不使留停於中庶無他患且凡是疹證必其面赤中指冷而多嗽又必大熱五六日而後見紅點遍身此其所以與痘與傷寒有異也

疹欲盡發而不留疹欲盡出則無病邪氣鬱遏則留而不去正氣損傷則困而不伸毒歸五臟變有四證歸脾則泄瀉不止歸心則煩熱不退而發驚歸肺則欬嗽血出歸腎則牙齦爛而疳蝕

程氏曰麻疹初出類傷風寒頭疼欬嗽熱甚目赤頰紅一二日內即出者輕必須解表忌見風寒葷腥厚味如犯之恐生痰涎變為驚搐必致危矣如初起吐瀉交作者順乾嘔霍亂者逆欲出不出者危亡立至

徐氏曰痘自裏而出於臟故重疹自表而出於腑故輕

景岳曰痘疹之屬有四種曰痘曰疹曰麻曰斑也痘則陸續漸出自小而大或稀或密部位顆粒有辨也疹則一齊發出大者如蘇子次者如芥子小者如蠶子而成粒成片者是也麻則最細而碎如蚊迹模糊者是也斑則無粒惟成片紅紫如雲如錦者是也大都疹與麻斑同類所發斑與痘之屬所症則本非其類也蓋痘毒本於肝腎出自中下二焦是以終始不妨於食而全賴水穀為主所以能食則吉不能食則凶故治痘者不可不顧脾胃麻疹之毒則由表邪不解而內犯太陰陽明病在上中二焦所以多不能食故治麻疹者但宜解

散火邪邪散則自能食矣是痘疹之治當各有所重者如此

疹期六

出疹之候初熱一日至次日雞鳴時其熱即止止存五心微熱漸見欬嗽鼻流清涕或腹中作痛飲食漸減到申酉之間其熱復來如此者四日用手滿按髮際處甚熱其面上熱少減

分欬嗽連聲面燥腮赤眼中多淚噴嚏頻發或忽然鼻中出血至五日其熱不分晝夜六日早時其疹出在兩頰下細細紅點至午時兩手背並腰下及渾身密密俱有紅點七日普遍掀發其鼻中清涕不流噴嚏亦不打七日晚兩頰顏色漸淡此驗出疹之要法

凡疹熱六日而出一定之規也若醫人無識用藥太早耗散元氣及至出時變害多矣或欬而緩者或掐 一二日間變症或作大害或合目而躁此皆人用藥不當之害也若察治法定不在五日內用藥必待見疹方用徐徐升表然用藥亦有次第凡一劑必作十餘次飲之兒疾在皮膚之間若作 次服則藥性催之太急每致喘嗽甚故當慎之

景岳曰按此聶氏之法言醫人用藥太早恐致耗散元氣故必待見點而後施治及作一次服恐藥性催之太急皆惟恐

無益而反以致害此固其心得之法也然以愚見則醫有高下藥有宜否但使見有確真發無不當則於未出之前或解或補必有得愈防之方以消消其毒者既出之後亦必有善調之方而不攻緩急者此在乎醫之善與不善不在早與不早也嘗見聶氏之說治者多見誤不暇以為甲令推此聶氏之說所以不可不辨

凡疹熱五六日必出矣醫人用藥見不能散必欲見疹不效醫人見熱嗽不能除或以別證治之主家又或更醫其遲之所以誤者多矣

麻疹初熱

麻疹發熱之初與傷寒相似惟疹子則面頰赤欬嗽噴嚏鼻流清涕目中有淚呵欠喜睡或吐瀉或手掐眉目面赤為異耳但見此候即是疹子便宜謹避風寒戒葷腥厚味古法用升麻葛根湯以表散疹邪今以宣毒發表湯代之更佳或蘇葉葛根湯亦妙但使皮膚通暢腠理開豁則疹毒易出不可作傷寒妄加汗下也妄汗則增熱而為衄血欬血為口瘡咽痛為目赤腫為煩燥乾渴為大小便不通妄下則裡虛為滑泄為滯下經曰必先歲氣毋伐天和言不可妄汗妄下也

凡疹初熱疑似之間切不可輕易用藥總有他證必待五日點下見疹方可用升表之劑疹多連打噴嚏鼻流清涕或流鼻血飲食減少好飲涼水只宜調理飲食戒麪食葷腥

一疹子初發熱時未見出現欬嗽百十餘聲不已上氣喘急面目胞腫時臥時起此火毒內蒸肺葉焦舉宜甘桔湯合白虎湯加牛蒡子薄荷主之○如疹出之後欬嗽口乾心煩者此毒在心肺發未盡也瀉白散加天花連翹玄參黃連主之

一疹子欲出未出之時宜早為發散以解其毒則無餘患若不預解使之盡出多致毒邪蘊於中或為壯熱日久枯瘁或成驚癇或為瀉痢或為欬血喘促或作疳䘌而死此雖一時戾氣之染然未有不由於人事之未盡也

疹出沒

一疹子出沒常以六時為準假如子後出午後即收午後出子後即收乃陽生陰成陰生陽長造化自然之數也凡此旋出旋收者輕若一出連綿三四日不收者乃陽毒太甚宜大青湯或用荊芥牛蒡子甘草玄參石膏桔梗主之○若逡巡不出者乃風寒外束皮膚閉密也宜荊防敗毒散主之

一疹已出而復沒者乃風寒所逼而然若不早治毒必內攻以

致痒瘍而死急用升麻湯加荊芥牛蒡子甘草熱服則疹必復出而安矣

一發熱六七日以後明是疹子却不見出此必皮膚堅厚腠理閉密或為風寒所襲或曾有吐瀉皆能伏也急用托裏散表之劑如麻黃湯去杏仁加蟬退升麻外用胡荽酒之類○如一向未更衣者必毒甚於內伏而不出宜涼膈散加牛蒡子主之

一疹子只怕不能得出若出盡則毒便解故治疹者於發熱之時當察時令寒暄酌而治之○如時證大寒以桂枝葛根湯

或麻黃湯發之○體弱人或升麻葛根湯或人參白虎湯發之○不寒不熱以荊防敗毒散發之○如寒疫時之氣以人參敗毒散發之○如熱一劑不出再作不出再服之外用胡荽酒又以苧麻蘸酒遍身戛之務令疹出如三四作更不出加腹中脹痛氣喘昏悶則死證也

景岳曰按此萬氏之法極得隨時制宜之善已盡發表之義矣然發表之義亦最不易即如營衛不足而疹有不能出者其證甚多若徒知發之而不知滋之則營衛有弱者非惟不能發而且恐窮其源矣此其或在脾胃或在血氣必得其源

麻子有潮如傷寒一表之法實亦有關於此

疹毒出盡則邪氣解散正氣自然和平如發熱煩悶或嘔吐或泄瀉此毒邪壅遏尚未出盡也○煩熱者黃連解毒湯○泄瀉者柴苓湯倍皮湯○並外用胡荽酒及苧麻戛法如前猶疹子出盡則煩熱自去嘔吐自止矣

疹有既收而餘毒未盡　日之外又復發出或至五六次不已者此因發熱之時不避風寒致令邪氣鬱於肌肉之間留連不散雖曾解散終屬未暢耳若兼雜證亦當隨證治之

疹形色　九

凡看麻疹初出之法多於耳後項上腰腿先見其頂尖而不長其形小而勻淨者吉也若色見通紅則疹發於心紅者火之正色也若疹色淡白者心血不足也養血化斑湯主之或四物湯加防風色大紅焰或微紫者血熱也或出太甚者並宜大青湯主之或四物湯去川芎加柴胡黃芩乾葛紅花牛蒡子連翹涼血滋陰而熱自除所謂養陰退陽之義○紫色五死一生之證也若黑色者則熱毒尤甚而十死一生之證此尤不可不明察之而混為施治也

凡疹初出色赤者毒盛之勢也但大便調咳嗽多右手一指脈轉重取皆有力聲勢重不硬但當發散調理若欬少右手一指脈無力雖三日後收其渾身疹發變為紫色壅滯於皮膚之間若用解利之藥其色漸轉紅色欬多流涕煩思飲食者生若投二三劑黯變者難療也

疹滯　十

凡疹出至一二三日必須周身俱透待收完看毒氣輕者清解即來就與飲食此不必服藥若清涕來並不思飲食者須要清肺解毒必使清涕出方可不用藥

疹吉凶　十一

或熱或退五六日而後出者輕
透發三日而漸沒者輕
淡紅滋潤頭面勻淨而多者輕
頭面不出者重
紅紫黯燥者重
咽喉腫痛不食者重
冒風沒早者重
移熱大腸變痢者重
黑黯乾枯一出即沒者不治

鼻扇口張目無神者不治
鼻青糞黑者不治
氣喘心前吸者不治

總論治法十一

一疹喜清涼而惡溫痘喜溫煖而惡涼此固其大法也然亦當有得其宜者如疹子初出亦須和緩則易出所以發苗之初只要發出得盡則毒便解非若痘之苗而秀秀而實而後毒解也痘至成漿之時若太溫燥則反潰爛不收是痘之後亦喜清涼也故治痘疹者無執冷熱無過寒必溫涼適宜使陰陽和平是爲得之

一痘宜內實可用補劑疹忌內實只宜解散惟初熱發表時略相似耳既出之後痘宜補氣以生血疹宜補陰以制陽何也蓋疹熱甚則陰分受其熬煎而血多虛耗陰金被尅故治以清火滋陰爲主而不可少動其氣若燥悍之劑首尾皆深忌也世知痘證所係之重而不知疹之殺人尤甚方書多忽而不備良可太息也矣

一斑疹之毒皆由於火內經曰炎暑之紀其病瘡瘍故或遇二火司天或司運之歲肺金受制感而發者居多輕則如蚊迹

之狀或鼎腫於皮膚間名曰痱疹重者如珠點紅暈或片片如錦紋名曰斑疹大抵色赤者吉色黑者凶其證似傷寒發熱凡三四日而出七八日而愈也凡此之類皆屬邪熱治之之法惟辛涼解利而已即若吐瀉亦斷不可用溫補也如豆瘡乾疱之類切勿輕用而切發之時尤不可大汗只宜升麻葛根透邪煎之屬微表之耳故用宜斟酌有不可一槩取必也

一標出不紅現而發熱轉甚或頭痛身痛煩躁者升麻湯或透邪煎

一色赤稠密身痛煩躁者升麻湯加紫草連翹
一寒熱併作頭痛背強者升麻湯加羌活防風連翹
一頭項面腫升麻湯加牛蒡子荊芥若脈強火盛熱渴者宜清降其火以白虎湯加減用之
一自汗煩渴氣壅脈數者化斑湯
一身熱煩渴泄瀉者茯苓湯或四苓散如夏月益元散
一熱甚小便赤澁譫語驚恐者導赤散同四苓散加辰砂夏月益元散加辰砂
一欬嗽甚者二母散麥門冬湯清肺湯

一喘者小柴胡湯去人參加五味子
一熱甚鼻衄或便血溺血熱甚者黃連解毒湯血甚者犀角地黃湯
一傷食嘔吐六君子湯加藿香乾葛或減去人參〇熱甚嘔吐者解毒湯〇小便不利而嘔吐者四苓散一二日不通者導赤散
一大便秘結發熱身痛者大柴胡湯腹脹氣喘者前胡枳殼湯
一咽喉不利甘桔湯兼風熱欬嗽者加防風
寒熱往來似瘧小柴胡湯如兼欬嗽去人參

一靨後身熱不除者升麻湯或去升麻加黃芩黃連各酒炒用
一下痢赤白腹痛者黃芩芍藥湯或加枳殼身熱腹痛者解毒湯
一餘毒未盡變生癰瘍瘡瘍者升麻湯加防風荊芥牛蒡子
景岳曰按以上葛氏治疹諸條皆極詳妥然其中惟瀉痢氣喘二證則最多疑似蓋此二證之在疹毒固當知其治矣然有不因疹毒者如俗醫但見是疹往往不深用寒涼不知有可涼者有不可涼者其有脾氣本弱而過用寒藥或以誤食生冷致傷脾胃而為泄瀉者亦多有之此一證也雖曰由疹而發而

實非疹毒之病矣但察其別無熱證熱脈而兼之色白氣餒者便須速救脾氣急從溫補宜溫胃飲五君子煎胃關煎之類主之若執謂疹毒本不可溫則無不危矣此瀉之當知本也又如氣喘一證大有虛實蓋十喘九虛若察其本非火證又非外邪而或以大瀉或以大汗而致喘者必皆氣脫之候此非六氣煎或貞元飲必不可也凡此二者皆不可不加細察而或者以氣促作氣喘則萬萬大誤矣又痘瘡總論中有因人因證之辨與此麻疹實同一理所當參閱故不可以麻疹之邪氣為實火而不知虛火之為害也

徐東皐曰痘雖疹易之說此俗談耳其有胃氣原弱所感入深又或因瀉利而發有不快或發之未透而隨見隨隱久之邪氣漸入於胃必瀉泄不已出而復出加之喘促則必危矣凡若此者又豈可以易言哉所以但有出疹若見虛弱急當先補脾胃其有欲出不出急當托裏發表以助之且首尾俱不可瀉一如痘證同也

疹禁忌十三

凡疹痧發表之後紅影出於肌膚切戒風寒生冷如一犯之則皮膚閉密毒氣壅滯遂變渾身青紫而毒反內攻煩躁腹痛氣喘悶亂諸證作矣欲出不出危亡立至醫家病家皆不可

不慎

一疹痧之證全在調治禁忌如雞魚炙煿鹽醋五辛之類直過七七之後方可食之惟宜食淡不可縱口致生他病也若誤食雞魚則終身皮膚粟起如雞皮之狀或遇天行出疹之時又令重出誤食豬肉則每歲凡遇出疹之月多有下利誤食鹽醋致令欬嗽則每歲出疹之月必多欬嗽誤食五辛之物則不時多生驚熱此痘疹之家皆所當慎也

疹發熱十四

淹疹非熱不出凡疹子欲出必遍身發熱或煩躁或頭眩或身體拘急及既出則身便涼諸證悉解此一層疹子隨即收者極輕者也如疹子既出而熱甚不減此毒盛者也宜大青湯解其毒便澀者宜黃連解毒湯合白虎湯或大連翹飲解其裏大便不通者局方涼膈散加牛蒡子主之

疹喘欬十五

凡疹證多嗽此頓出頓入之勢也但有疹毒須假嗽多而散故疹後旬日之內尚宜有嗽切不可見嗽多而治嗽也宜慎之疹證屬肺與脾胃肺受火邪則嗽多嗽多則頓出頭面并及四肢大腸受火邪則上連脾胃而為泄瀉若是瀉則嗽必減而

變為喘喘嗽二者皆屬於肺然嗽實喘虛得嗽者出得喘者入入則合眼多痰胸滿腹脹色白而毒不盡出證則危矣此疹之宜欬不宜喘而最不宜於泄瀉也

疹吐瀉十六

凡疹子初起發熱吐利純是熱證不可作寒論此乃火邪內逼上焦則多吐下焦則多利中焦則吐利並作自利者宜黃芩湯吐利者宜黃芩湯加半夏一錢生薑三片自利裏急後重宜黃連解毒湯合益元散

凡疹出一二日或三四日忽然大瀉嗽多者用升表之藥加以
分利治之若瀉而氣喘復見悶亂搖頭者凶
一麻疹現後大便下膿血或因泄瀉而變成膿血者或徑自利
者但看疹出多而色紅又多嗽者只宜表疹俟其收後方
宜解毒兼治其痢
一疹之初起最忌泄瀉然亦有始終泄瀉而不妨者稟之强弱
異也若因瀉嗽而變為喘者則危矣詳前喘嗽條
一身熱煩渴泄瀉者柴苓湯四苓散如熱甚或兼用益元散
一疹後作痢亦有看手咬指甲撕口唇皮及咬人等證當以解
毒分利藥治之若所下稠涎紅白相兼者務要用解毒之藥
○若晝夜有二五十次漸減至二三次或漸多敢有手一指
厚漸起清涕復來者方可望生○若痢變換色或成厚滿色
或如青菜色肛門如筒喘促音啞飲食不進午後頰紅皆不
治
景岳曰自古方書凡發揮未盡及用治未當者間亦有之而惟
於泄瀉一證則尤其為最何也蓋古人以泄瀉為熱者什九
故多用河間黃芩芍藥湯為主治而不知凡屬泄瀉最多脾
腎虛寒也即如出疹一證雖有因熱毒而瀉者然果係實熱

多不作瀉但致瀉者率由脾胃之弱若但知清火解毒則脾
必日敗而漸成厚滿青菜色及氣促絕食不治之證矣病而
至此豈猶熱耶總屬誤耳故凡治泄瀉者即雖是疹亦必察
其有無熱邪如無熱證熱脈即當於疹藥泄瀉條求法治之
庶最危者猶可望其生也故余於諸法之外而獨言其要者
有如此

疹飲食十七

凡出疹者多有五六日不飲食此胃為邪氣所侵亦為邪氣所
養故不食亦不妨切不可着意治之只宜治疹疹痊出盡毒
氣漸解即思飲食尤不可與麪食雖用粥飲每次只可少與
候氣清神爽身全不熱漸漸加添但宜少而頻也
凡出疹之先平昔過用麪食者或正出時喫麪食者或胃氣漸
開即思麪食而用早者因動胃火以致清涕不來身體作熱
兩眼看手咬指摳鼻撕口唇皮及撕眼劄毛者此皆疹後食
復之病也當清肺解毒加消導之劑治之

疹飲水十八

凡患疹之人不拘大小自起至收必皆喜飲涼水此不必禁但
宜少不宜多宜頻不宜頓則毒氣隨之漸解

疹渴十九

凡疹子渴喜飲水純是火邪肺焦胃乾心火內亢故也初熱發渴者升麻葛根湯加天花粉麥門冬渴甚者人參白虎湯合黃連解毒湯主之

疹汗衂二十

凡疹子發熱或自汗或鼻衂者不須止之此亦散越之義汗者毒從汗散衂者毒從衂解但不可太過如汗太多人參白虎湯或合黃連解毒湯衂太多者玄參地黃湯

疹躁妄狂亂二十一

凡疹有初熱而見煩躁譫妄狂亂者宜升麻葛根湯調辰砂益元散主之

一疹收之後餘熱未盡日夜煩躁譫語狂亂者辰砂益元散用燈心湯調下或四苓散加燈草黃連黃芩調水飛硃砂五分主之

疹咽痛二十二

痘疹咽痛亦是常候乃火毒上熏而然也勿以喉痺同論妄用針刺蓋此非喉痺纏喉原無惡血可去也痘疹喉痛只是咽乾作痛宜甘桔湯加牛蒡子或射干鼠粘子湯細細嚥之更以玉鑰匙吹之

疹唇口瘡二十三

凡出疹之先或有胃火及出疹之後餘毒不散此熱毒攻於牙齦上下故令唇口生瘡遇有此證須用溫米泔水洗十餘次急用解毒之藥治之若或失治多變走馬疳也

疹腹痛二十四

凡疹初熱一日至五六日之間多有腹痛之證此大腸之火鬱於皮膚之中故作腹痛俱不可認作傷食用消導之藥或以手揉俱能致害但解疹毒毒散則腹痛自止最宜慎之

疹後諸證二十五

凡疹後餘毒未盡隨當解之若停留日久不解則必致喘嗽或喉中痰鳴或為四肢冷痺或目無光彩面色青白或鼻孔如烟筒或嗽聲不出若右手一指脈靜取散亂重按全無則成難治之證矣

一疹子收後身有微熱者此虛熱也不須治之待血氣和暢其熱自退若熱勢太甚或日久不減宜用柴胡麥門冬散甚則黃連解毒湯或合人參白虎湯

一疹後熱不退皮膚枯毛竪肉消骨立漸漸羸瘦為骨蒸勞瘵

之證者宜萬氏柴胡四物湯主之或蘆薈肥兒丸加當歸連翹治之遲則變證爲斑則溺臍口鼻氣冷手足厥逆遂成慢脾風痰㾦不治之證矣脾

一疹後熱不除忽作搐者不可以急驚風同論宜導赤散加人參麥門冬送七味安神丸小便清者可治短少者難治如見多痰或用抱龍丸或以四物湯加麥門冬棗仁淡竹葉甘草龍眼肉黃連茯苓辰砂石菖蒲之類治之或以此藥爲末用蒸餅猪心血爲丸服亦可

一疹退後多有欬嗽之證若欬嗽不已者此餘毒未盡也用清肺飲加生甘草牛蒡子主之○若欬甚氣逆發而不已者此肺中伏火金虛葉焦也宜清肺飲或清肺湯合人參白虎湯六一散之類主之○若身熱頓嗽甚至飲食俱嗆出或欬出血者熱毒乘肺而然宜多用門冬清肺湯或加連翹或清金降火湯主之○若欬甚而面浮目腫胸高喘急血出口鼻面色青赤昏躁搖頭者死證也○又有肺氣本虛爲毒所遏而發喘不已但無欬血嗆食之證者宜用清肺飲倍加人參治之不可拘於肺熱之說有純用清肺解毒之藥也

一疹後餘熱未盡或熱甚而失血者四物湯加茵陳木通犀角

以利小便使熱氣下行則愈若血在上者去川芎

一疹後餘毒入胃久而不散以致牙齦黑爛肉腐血出臭氣衝人者名爲走馬疳用馬鳴散主之甚者急用人中白蘆薈使君子龍胆草黃連五靈脂浸蒸餅爲丸滾水服之以清胃火○若面頰浮腫環口青黑齒脫唇崩鼻壞者死證也

一疹退之後飲食如常動止如故乃卒然心腹絞痛遍身汗出如水者此因元氣虛弱失於補養外雖無病裏實虛損偶然爲惡氣所中謂之中惡此猝發而死之證

附麻疹　十六

痘之外有疹疹之外又有麻疹痲疹者亦疹之類即斑疹也但正疹則熱至五六日而後一齊湧出皆粒粒成瘡非若麻疹之皮紅成片也且麻疹之出則不拘三四日以火照之遍身如塗朱之狀此將出之兆出則細碎皮紅成片如蚊蚤之迹者即麻疹也亦或有六日始出出而又沒沒而又出不過一周時許世俗謂一日三出三日九出後方齊出透徹然亦有不拘者只三日間從面至胸背手足雖隨出隨沒然只要出透以遍身紅潤者爲實更看遍身膨脹眼亦封閉色有赤白微黃不同只要紅活最嫌黑陷及面目胸腹稠密纏鎖咽

瘀者爲逆發不出而喘者用炮所謂麻者以透身細發如麻
點有分處故也然又有通身但紅而絶無形點者是又謂之
火丹亦其類也故有家有夾疹夾麻夾丹等證總皆熱毒所
致俱當詳辨也

一麻疹初起宜欠發熱悉宜發散咳嗽鼻流清涕宜升麻葛根湯加
蘇葉葱白以解肌切忌大汗〇若潮熱甚者加芩連地骨皮
〇喘急者加瓜蔞砂仁散〇咳嗽加麻黃杏仁麥門冬石膏
〇咳甚熱甚者用涼膈散加元參牛蒡地骨皮〇泄瀉者宜四苓
散便紅合犀角地黃湯〇吐血衄血用犀角地黃湯加山梔
小便赤加木通　實熱煩躁小柴胡湯

一麻疹已出煩躁作渴者解毒湯合白虎湯〇喘而便閉者前
胡枳殼湯加五味子〇便秘甚者小承氣湯〇譫語煩悶者
導赤散〇小便如泔者四苓散加車前木通〇譫語如狂者
解毒湯調辰砂益元散〇大小便血者犀角地黃湯合解毒
湯〇吐血衄血解毒湯加炒山梔童便〇泄瀉解毒湯或四
苓散〇瘧兼泄瀉者亦宜用柴苓湯、煩熱大渴作瀉者白
虎湯加蒼术豬苓〇熱盛血瘀者解毒湯〇傷食嘔吐四君
子湯〇氣虛內熱作喘門冬散加人參

一麻疹初起及已出已沒一切雜證俱要詳察六日以前始終以
宜清涼雖已麻者亦清涼解毒不易當遵熱者虛則補實則
瀉寒則溫熱則涼方爲醫家之要妙若有疾亦有血虛而用四
物湯氣虛而用四君子湯陽虛則溫中理中之藥皆當因證
而用也

一麻疹收後餘毒內攻咽喉腫痛或咬牙口乾語神昏志亂者如
〇如熱未盡用化毒丹本宜忌先見前氣色若有所見須設法之
始終以升麻葛根湯爲主及消毒飲或六味消毒飲解
毒湯隨證選用仍忌魚腥葱蒜等物

水痘

凡出水痘先十數點　一日後其頂尖上有水泡二日三日又出
漸多四日渾身作痒瘡頭皆破微加壯熱即收矣但有此疾
須忌發物七八日乃痊

一水痘亦有類傷寒之狀身熱二三日而出者或欬嗽面赤眼
光如水或噴嚏或流涕但與正痘不同易出亦易靨治宜清
熱解毒爲主

麻疹論列方　八

附補

五君子煎　新熱六

六君子湯 補五　四物湯 補八
六氣煎 新因二十一　人參敗毒散 散三十六
化斑湯 寒一　白虎湯 寒二
人參白虎湯 寒三　小柴胡湯 散十九
大柴胡湯 攻七　荊防敗毒散 痘三一
甘桔湯 因一七五　解毒湯 痘五一
黃連解毒湯 寒一　麻黃湯 散一
升麻湯 痘一九　升麻葛根湯 散三十
透邪煎 新因二十　托裏散 痘四
局方涼膈散 攻十九　柴歸飲 新因十五
清肺飲 寒八七　清肺湯 痘一四五
柴胡橘皮湯 痘一九　仲景黃芩湯 寒百五
二勞散 痘百五十　射干鼠粘子湯 痘七七
麥門冬湯 小一四一　導赤散 寒一二二
錢氏柴胡四物湯 小一四一　門冬散 和一八七
柴苓湯 和一九二　養血化斑湯 痘十八
小承氣湯 攻二　益元散 寒百十二
門冬清肺湯 痘一七　大青湯 痘一五三

瀉白散 寒四二　清金降火湯 痘一四九
溫胃飲 新熱五　貞元飲 新補十九
柴胡麥門冬散 痘二四　胃關煎 新熱九
抱龍丸 小八五　玄參地黃湯 痘八六
大連翹飲 寒七八　玉鑰匙 外[illegible]
七味安神丸 小七二　胡荽酒 痘[illegible]八
馬鳴散 痘[illegible]八　犀角地黃湯 寒七九
四味消毒飲 痘四八　六味消毒飲 痘[illegible]九
蘆薈肥兒丸 小百一四　柴胡葛根湯 痘一七
前胡枳殼湯 痘九四　黃芩芍藥湯 寒百九

備用方

具列痘疹方未所當詳閱

景岳全書卷之四十二終

卷之四十三

痘疹上

總論 一　初辨痘疹 二
論脉 三　形色內外 四
日期 五　五臟證 六
分氣血 七　辨虛實寒熱 八
部位吉凶 九　痘形痘色吉凶 十
吉證 十一　凶證 十二

怪痘形證 十三　死證日數歌 十四
發熱三朝辨吉凶 十五　報痘三朝辨吉凶 十六
起痘三朝辨吉凶 十七　灌膿三朝辨吉凶 十八
結靨三朝辨吉凶 十九　落痂後辨吉凶 二十
痘瘡上論列方 二一

卷之四十四

痘疹中

總論治法 二二　熱證論治 二三
發熱三朝治款 二四　報痘三朝治款 二五
起發三朝治款 二六　灌膿三朝治款 二七
結靨三朝治款 二八　靨後落痂治款 二九
痘後餘毒發熱 三十　禁忌 三一
出不快 三二　陷伏 三三
痒痛抓破 三四　作痛 三五
頭面腫 三六　痘疔黑陷 三七
飲食 三八　咽喉口齒 三九
痘瘡中論列方 四十

卷之四十五

痘疹下

總論吐瀉 四一　嘔吐 四二
泄瀉 四三　寒戰咬牙 四四
煩躁 四五　喘急 四六
聲音 四七　驚搐 四八
昏睡 四九　腰痛 五十
腹痛 五一　腹脹 五二
厥逆 五三　發渴 五四
失血 五五　發斑 五六

潰爛五七　多汗五八
夾疹五九　夾斑六十
晝夜啼哭六一　大小便閉六二
目證六三　痘癰痘毒六四
痘瘡餘毒六五　痘瘡上品六六
痘瘡禁忌六七　痘瘡下論列方六八

會稽　張介賓　會卿著
瀛海　賈　棠　青南訂

痘瘡上

總論一

痘瘡一證，俗曰天瘡，原其所由，實由胎毒內藏，而復因時氣外觸，其毒乃發，故傳染相似，是亦天行疫癘證也。但考之內經，則止言癍胗，即今斑疹之屬也。故自越人、仲景、元化、叔和諸公，皆無一言及痘，可見上古本無是證，而今則何以有之？愚謂近代之人，必以醇酒五味，造作太過，較古人之恬淡相去遠矣。或者未信余言，第觀藜藿貧寒之家，即有不同。今之北虜亦不出痘，原其所由，實由是耳。豈東彼無胎毒耶？故凡多遭此害者，當以余言味之。

一、痘疹變幻百出，虛中有實，實中有虛，要非曲學偏見者可以窺其堂室。若用力心思，一有不到，則害不小矣。設或知證而不知形，此但以測其外；知形而不知脈，此但以測其內；知脈而不知本，則無以探其源；知本而不知因，則無以窮其變；知

因而不知變，則無以神其法。只此數者，人皆未能全之一，況有不能而強以為能，則致害於人，獲罪於天，能無畏乎。故余於痘疹一門，留心既久，積驗已多，因遍採先哲之最精於此者，如文中陳氏、仲陽錢氏、立齋薛氏、雅田萬氏、友梅程氏、東皋徐氏、改齋友氏，并其他雜錄等書，有選其精者，有發其未發者，有訂其疑似者，有因涉歷而吐其心得者，盡我愚衷，集而成帙，痘疹之秘，似無出此。

初辨痘證 二

痘疹發熱，大抵初時與傷寒相似，然傷寒之邪，從表入裏，故見各經之證；痘疹之毒，則從裏出表，故見五臟之證。如呵欠悶頓，肝證也；乍涼乍熱，手足稍冷，多睡，脾證也；面燥腮赤，咳嗽噴嚏，肺證也；驚悸，心證也；耳涼耳冷，腎證也。○又觀心窩有紅色，耳後有紅筋，目中含淚，或身熱手指皆熱，惟中指獨冷，乃知是痘證也。便當察其虛實，隨證治之。

辨痘歌

五指稍頭冷，驚來不可當。若逢中指熱，必定是傷寒。中指獨自冷，麻痘證相傳。女右男分左，分明仔細看。

看耳歌

耳後紅筋痘必輕，紫筋起處重沉沉。急須用藥相攻治，十個難求三五生。

看痘法

凡初有痘法，以紙燃蘸油照其頭面，次以手摸面頰，如紅色隨手轉白，隨白轉紅，謂之血活，生意在矣。若揩之不白，舉之不紅，是謂血枯，縱疏必危。○又看目睛，神光明爍，看舌尖紅活如常，無燥白之色，乃為吉兆，自可無虞。此觀痘疹之大法。

察脈法

凡看痘之法，一見發熱，即當先察其脈。蓋凡痘瘡將出者，未見形迹，必先發熱，既見發熱，脈必滑數，但得見滑數有神，而不失和緩之氣者，其痘必輕而少；若滑數加倍，而猶帶和緩者，其痘必多而重，倘亦無害；若滑數之甚，又兼弦躁，或芤急無神，而全無和緩之氣者，其痘必甚而危。故余於初熱時，便能預其吉凶。人多昏昧，而不知所從在脈也。凡診此之法，但全握小兒之手，而單以拇指診之，亦最易也。有診之法，此為第一，而今醫多不知之，亦以古人之未之及耳。

驗痘法

凡痘瘡最小而實者，名曰珍珠，如此則易壯易靨，若大飽滿者，

名曰大痘。此則先出而先收。四圍起而中心陷者。名茱萸痘。平穩不突者。名曰蒸餅痘。此則有肉有骨。稀者輕。密者重。

論脈 二

痘自發熱以至起脹。本從內出。陽之候也。亦宜六脈洪數。不宜沉細而遲。自貫膿收靨以後。毒已外解。陰之候也。脈宜和緩。不宜洪數。又曰。痘瘡之脈。中和爲貴。不可過於數盛。亦忌見微而。故曰。脈靜身涼者生。脈躁身熱者死。又陽病得陰脈者死。大抵四時以胃氣爲本。胃氣者。以四時之脈而皆兼和緩。即胃氣也。蓋滑數浮洪爲太過。太過爲實。實者邪氣實也。弦遲微弱爲不及。不及爲虛。虛者正氣虛也。故以太過不及之脈。而中無和緩之氣。是皆死候之脈。故曰人無胃氣則死。

形色情性 四

凡天行痘疹之時。有於未出之先。察其形色情性。可以預知吉凶也。○一觀其色。如面頰紅白明潤。與平日同而微緩者吉。如忽見紅赤而太嬌。或晄白而無彩。頓然改變。異於平時者凶。又如額有白紋。目有赤脈。目有黑氣。耳有斑痕者。皆大凶之兆。○一觀其形。凡精神暢快。行止便利。語言清亮者。無病而吉。若精神衰弱。動止遲慢。言語低微。異如平時者凶。又

原其壽相。如古人有夭相。則凡頭傾顱解。項小腳細。聲微目無精彩。或睛光露。神啼聲斷續。無喜無情而自語自笑。聰慧太早。肉浮骨嫩者。皆不吉之兆。○三觀情性。凡未發熱時。忽生喜心者。與父母愛戀不忍捨者。及開見怪異言語妄言者。皆凶兆也。

日期 五

痘瘡大約之數。發熱三日。報痘三日。起脹三日。貫膿三日。結靨三日。共十五日。乃大率常數。此其正也。惟痘瘡稠甚者。常過其期。痘疏者微者。常不及期。固有不可一例拘者。但得痘色明潤。根窠紅活。飲食二便如常。又無表裡雜證。雖遲數日不妨。故有當出不出。當起不起。當膿不膿。當靨不靨者。須詳察其證。或爲元氣虛弱。不能運行。則補其元氣。或爲雜證所致。不能通達。則去其雜證。又六日以前。痘發未盡。有雜證者當也。六日以後。痘已盡出。雜證當除。而不除者爲逆。須詳辨而急治之。

五臟證 六

痘疹之證。古人有云。痘自裏而出於臟。其毒深。故久熱而後出。爲血。疹自表而出於腑。其毒淺。故熱少易出。爲氣。余謂此

說未必然也蓋痘疹皆出於臟腑未有表裏不相通者但出於腑者在痘亦輕出於臟者在疹亦重所以凡是疹子必發熱至五六日而後出不可言易且疹子多屬肺經豈肺經非臟邪

一心經痘症心主火凡紅紫頂陷或上氣咬牙者心臟熱也心熱者肺亦熱心病者人參麥門冬生地黃當歸之類須清邪盛者務根解之藥〇脾經痘症多有吐瀉腹痛者缺二不發熱肚中疼斑疹腹內攻發多敗大遂發少更防癰可見痘疹腹痛乃為惡候當察腹痛吐瀉各條治之〇肺經痘症凡發熱

之聯喘息氣逆喉中涎響此肺經惡候也蓋毒火內蒸刑肺而然當參本條治之〇肝經之痘凡發熱之初多有驚搐等證蓋痘毒多熱熱則生風風熱相搏故發驚搐然有當速治者有不必治者詳見本條〇腎經痘症初發熱時便覺腰痛者腎與膀胱為表裏今毒由太陽傳入少陰所以腰痛此其毒陷陰分最非佳兆宜察本條治之

一毒歸五臟證有不同當詳辨也〇毒歸於心則為斑疹為驚悸為壯熱為咽乾為痛為渴為汗為丹瘤為癍瘡潰爛〇毒歸於肺則為欬為喘為痰為衄血為瘡乾燥皺揭為肩背痛〇毒歸於脾則為吐為瀉為脹為腹痛為倦怠為破裂為舌本強為手足痛為不食〇毒歸於肝則為悶亂為水痘為目痛為卵腫為乾嘔為筋急拘攣為吐蛔為寒戰咬牙〇毒歸於腎為腰痛為黑陷為失音為手足逆冷為咽乾痛為饑不欲食為多唾〇毒歸於腸胃為泄瀉為痢膿血為腹鳴矢氣為大便不通〇毒歸於膀胱為小腹滿痛為溺血為遺尿為小水不通為項腰痛為反張為目上竄〇以上五臟之證舉其槩耳凡諸證治俱備載各條之中宜詳究之

分氣血 七

一氣血各有所主〇凡痘之終始無非藉賴血氣但得血氣充暢則易出易收血氣不足則變證百出故治痘者必當先顧血氣然氣屬陽無形者也血屬陰有形者也故無形之屬皆氣主之有形之屬皆血主之是以氣主標血主本氣主發血主潤氣主形血主色氣主充實血主根基故氣能起脹以主郛郭血能貫漿以成飽滿若其為病則凡為白為陷為灰色為不起發為頂有孔為凹為癢為塌為浮腫為皮薄為不膿不滿為乾表不斂為肩臉不通等證皆氣之為病也又如為紫黑為乾枯為焦黑為血腫為黑陷黑靨為頭痛牙疳為

疔癰斑疹爲津液不達爲痘後餘毒皆血之爲病也此氣血之分固有如是然血無氣不行氣無血不至氣至而血不隨雖起發而貫必不周血至而氣不至雖潤澤而毒終不透故治此者有不可不兼顧也

辨虛實寒熱 八

一察痘之要惟在虛實二字蓋實者邪氣實也邪實者宜清宜瀉虛者血氣虛也血氣虛者宜溫宜補且痘本胎毒非藉元氣不能達非藉元氣不能收故凡欲解毒清火亦須照顧元氣使元氣無力則痘亦不能滿痘亦不能解故有不支何能堪此清解不此痘瘡之終始皆當以此的元氣爲主

一痘瘡表實裏虛者必易出易靨表虛裏實者必難出難靨若表裏之氣俱充實其痘必易出易靨故凡自始出以至十日之外外則渾身壯熱內則飲食二便俱如常此即表裏俱實者也其痘必光澤起發且易收易靨也

一表裏各有虛實○凡表虛者或惡寒或身不大熱或寒戰往來四肢厥冷或面青色白多汗惡風或怠惰嗜臥或痘色灰白或陷不起發不光澤或色嫩皮薄痒塌或頂不尖或不礙手或根窠不紅或低陷不能結痂脈必浮細而弱此皆表虛之證治宜溫補陽分○裏虛者凡痘瘡已出未出之間或為吐瀉或嘔惡或厭飲食或為少食不思飲食或食亦不化或為二便清利或為滑瀉或為不渴或為氣促聲微為神昏多睡為腹脹喘氣為脈弱無力此皆裏虛之證治宜溫補陰分

表實者為身熱壯熱無汗或發熱惡寒或身痛頭疼為眼紅鼻塞皮焦腫痛手足熱甚為痘色紅紫或腫疼為皮厚而硬為癰腫瘡疖為發熱疼痛為大熱是皆表實之證治宜清解表邪○裏實者為二便秘結胸膈脹滿為煩躁燥渴乾枯痘色紫黑為大渴狂躁或嗽痰涎喘粗為譫語狂躁為驚搐煩亂為脈洪數滑實是皆裏實之證治宜清解裏邪

張翼之曰吐瀉少食為裏虛陷伏倒靨灰白為表虛二者俱見為表裏俱虛用異功散救之甚至姜附靈砂亦可用若能食便秘而陷伏倒靨者為裏實輕則射干鼠粘子湯重則前胡枳殼湯下痢多血能食者為裏實若實其裏則結癰毒紅活綻突為表實若補其表則潰爛不結痂

一痘瘡表裏皆有寒熱虛則陽虛寒實則陰虛熱實則血氣壅遏而不寒熱則血氣沸溢而不斂然熱證多寒證最忌寒本性陰及諸峻燥之物若元氣虛弱者即有熱證總不可誤為實熱寒

證多虛。最忌芩連梔柏。及諸苦寒之物。雖形體頗盛。但見虛
脉虛證。總不可認作有餘。
表寒者。不起發。不紅活。根窠淡白。身涼。痒塌。倒陷。乾枯。皆肌
表無陽之證。治宜補陽溫表。
裏寒者。為吐瀉。為嘔噦。為腹脹。為腹痛。為吞酸。為不欲食。為
寒戰咬牙。氣臭喜熱。為二便清利。完穀不化。皆臟腑無陽之
證。治宜溫中補陽。
表熱者。為肌膚大熱。根窠紅紫。頂赤發斑。頭面紅腫。紫黑焦
枯。癰腫疔毒痛甚。皆火在肌表之證。治宜散邪解毒。

裏熱者。為煩躁狂言。口乾大渴。咽喉腫痛。內熱胷滿。小便赤
澁。大便秘結。衄血溺血。皆火在臟腑之證。治宜清熱解毒。
虛實寒熱等證。雖表裏之分。各有如此。然表之虛實。表之寒
熱。莫不由中氣之所使。故惟善治中氣。則未有表不和調者
也。是即必求其本之道。
一純陰無陽之證。凡痘瘡發熱。手足却宜和煖。若手足厥冷。必
其人曾有吐瀉。脾臟氣虛也。脾主四肢。所以冷為惡候。即有
外證。亦不可單用發散。久損脾胃之氣。此當溫中兼表。宜黃
芪建中湯。或六氣煎。五物煎。加防風、羌活、生薑、荆芥之類。以
補養脾胃血氣。而助痘瘡之成就也。

部位吉凶九

一五臟之屬。皆見於面。故但察部位。可知吉凶。蓋人之面部。左
頰為肝。右頰為肺。額上為心。頦下為腎。鼻為脾。上又目為肝
之竅。鼻為肺之竅。口為脾之竅。耳為腎之竅。舌為心之苗。若
痘疹未出之先。但得面中者部明潤者吉。燥暗者凶。又山根
為命宮。年壽為疾厄宮。此二宮紅黃光明者吉。青黑昏暗者
凶。

三陽之脉。皆會於面。正額為太陽脉之所會。唇頰為陽明脉
之所居。兩耳前後為少陽脉之所過。痘為陽毒。故隨陽氣而
先見於面。惟陽明經乃胃與大腸積陳受腐。血氣俱多之處。
故痘疹初發。但於本經口鼻兩傍人中上下。頤頰年壽之間。
先出現者為吉。如太陽經則水火交戰之處。少陽經則木火
相樂之鄉。若於其位先見者凶。凡起發收靨。亦皆如是。
一通身部位。皆有所屬。如頭為諸陽聚會之處。兩顴兩頰為五
臟精華之府。咽為水穀之通路。喉為呼吸之關門。胸腹乃諸
陽受氣之海。為心肺之所居。脊背乃諸陽之統會。為十二經
臟氣之所繫。凡此五處稍少者吉。○若頭額多者謂之蒙頭。

頸項多者謂之鎖項胸前多者謂之踊胸窠聚者謂之凡此
險鎖項則出入廢氣化絕踊胸則心腹逼血失守兩頰兩
頤多至成片或如金朱則肝盛剋脾凡此者至八九日部多
見骨挫傷或不能食最為險候故皆不宜多也惟四肢雖
諸陽之本然乃身所役使卒伍卑賤之職故雖多亦不致害
凡起發成漿收靨俱如此也○又心窩手足心謂之五心痘
俱多者必重若頭面胸項手足細碎稠密一樣者恐氣血衰
微脾胃虛弱不能周流灌注則無不危矣

痘形痘色吉凶十

萬氏曰形乃氣之充色乃血之華凡看痘者舍此更無他法是
故形貴尖圓起發若蒼皮厚硬而平塌者凶色貴光明潤澤
根窠紅活而慘黯昏黑者凶然形有起發而或致變者此色
不明潤根不紅活故耳若痘色光潔根窠紅活雖平塌亦猶
可治然色以紅活為貴而猶有圈紅與噀紅鋪紅之別圈紅者
一線淡紅緊附于根下而無散走之勢吉之兆也噀紅者血
雖以附而腳根色隱然不聚險之兆也鋪紅者痘色與肉
不分平鋪散漫凶之兆也以此察之則死生可判決矣○根
窠者血之基膿者血之成故六日以前專看根窠若無根窠

必不起發六日以後專看膿色若無膿色必不結痂此必然
之勢也

吉證十一

一看口唇舌尖紅活無燥白之色者吉
二看根窠紅潤圓活地白分明者吉
三看心窩頭上稀少者最為順候
四看痘頂出來不焦不紫者吉
五看顏色無黑陷痘內脹而黃如蒼蠟色外潤而黃如油色
者吉

一凡看痘之法須察部位分察多寡大抵痘少者毒少而吉痘
多者毒甚而凶如上而頭面次而咽喉前而胸腹後而腰背
下而四肢此五處但得一二處稀少而頭面別無危險即
吉候也若五處遍身皆密雖顆粒分明恐氣血不能周給
必難灌漿或既貫而不能收或既收而不能脫客強主弱而
外盛內虛小舟重載內力不勝任終不獲安此多寡之宜察
勿謂雖多亦吉也

凶證十二

痘未出而先喉痛嗽啞者不治已出五日內見者亦不治

痘未壯而先痂皴與黑陷者不治

痰涎壅盛氣急者不治。

痘未出已出。而抽搐狂亂。躁亂不寧者不治。

腹痛而瀉膿血者不治。

肌肉紫黑如被杖者不治。

漿水米粒不入口。或飲食嗆喉者不治。

眼內黑珠起浮油混睛者不治。

眼中神光不明。珠色轉綠轉赤者不治。

閉目昏睡。舌捲囊縮者不治。

頭溫足冷。悶亂飲水者不治。

吐瀉不止。藥食不停。不化直下。及肛門如竹筒者不治。

胃熱發黃。身如橘色。下利者不治。

痘初出即青晦焦黑者不治。

密如蠶種。全不起發。半片花搭者不治。

痘瘡痒癢。寒戰不止者不治。

舊有瘡痍。走漏氣血。血敗藥不效者不治。故曰不怕五心有瘡。只怕原瘡爛。原瘡即是未痘之先。有瘡泄去膿血。最爲內也。若果五心稀少。而飲食如常者。亦不妨也

痘後傷風傷食。肌肉瘦脫者不治

有除此之外。雖有集證險證。及痘之倒靨。但略有潤澤興起之意。須仗醫之高妙。患家之心切。必細心調理。自有可收全功者。

怪痘形證 十二

怪痘者。乃逆痘中之尤甚者。形證不一。不可不辨。

一痘初出時。面胸手足已見紅點。却不起發。不成膿漿。隨即收斂。若加氣促。聲啞。悶亂者。即死。此名內陷痘也。○此證若無煩躁。悶亂等候。名曰試痘。過五七日後必復發熱。而痘出

者其痘必重。

一痘瘡初出如蚊蚤所咬。三日後反不見者。名隱痘。五日死。

一痘子出現。三兩成叢。根脚堅硬。旋塊者。此名[illegible]痘。六七日死。

一痘子將出。身上有紅腫結硬處。似癰非癰。似癤非癤者。亦名痘母。三五日死。○以上二證俱宜真人解毒湯救之

一痘初出便成血泡。或水泡。隨即破壞者。此名爛痘。二三日死

一痘出後。遍身都是空殼。不作膿水者。此名空痘。八九日死

一痘當出現起發之時。中有乾黑者。此名鬼痘。宜用臙脂水塗之。勿使蔓延。若不急治。則作起作癢。當靨不靨。或多作番次

而出綿延日久而死
一痘出起發之時。中有痛甚如刀刺。叫哭不停者。此名痘疔。五六日死。
一痘當起發之時。枯燥不潤。痛伏不起。皮膚皺揭者。此名乾痘。五六日加煩滿喘急而死。
一痘於起發之時。皮嫩易破。摸之溫手者。此名溫痘。六七日癢塌而死。
一痘起發之時。痘色嬌艷。皮薄光潤。鮮紅可愛者。此名嫩痘。八九日後不能成痂。必痒塌而死。

一痘於起發養漿之時。痘頭有孔。漿水漏者。此名漏痘。五六日後痒塌而死。
一賊痘者。是諸痘未漿。而此痘先漿也。又名假痘。多在太陽喉口心胸等處。三日見者六日死。四日見者七日死。五六日見者十一二日必死也。
一痘出雖稀。根窠全白無血色。三四日後雖亦起脹。然按之虛空。此亦名爲賊痘。氣血太虛。至灌漿時必變成水泡。大如葡萄。皮薄若紙。抓破即死。
一膿水將成之時。其瘡自破。有孔而陷者。此名倒陷。

一將靨之時。不能成痂。皮脫骨黑者。此亦名倒陷。俱不治
一痘於收靨之時。不能成痂。皮肉潰爛。膿水淋漓者。此名痘癩。能食則生。不能食則死。○凡以上者。皆不治之證

死證日數歌 十四

初出頂陷連肉紅。過至九日一場空。又如血點帶紅紫。斑證只在六日中。發斑黑者在朝夕。斑青頃刻去匆匆。無膿痒塌期二日。不治腰疼及挺胸。報痘似痱如蚕種。舌捲囊縮命不寬。紫泡刺出黑血者。飲食嗆喉證俱凶。難療面腫痘不腫。青色黑陷及無膿。二便流利下腸垢。更有吐瀉出蚘虫。頭溫足冷

好飲水。痘先黴後藥難攻。氣促泄瀉渴不止。目無神者數當窮。聲啞失音叫與哭。痘色縱好也難終。有種氣急亦難治。庶幾貫好是傷風。見此宜服參蘇飲。起死回生須見功。

發熱三朝辨吉凶 十五

一初發熱時。身無大熱。或熱或退。神清氣爽。唇鼻滋潤。腹不疼。自始至終。皆飲食如常。大便稠黏。小便清利。而無雜證者吉。不必服藥。
一初熱時。先發驚搐。一二次而隨止者。此痘出心經也。乃爲吉兆。不必治之。若其驚不止。日發三五次。或連日不止。痘出多

而啓者乃凶兆也

一初發熱時吐瀉不甚而隨止者吉

一正發熱時或得大汗一身汗隨止而脉見稍平者吉

一初發熱時用紅紙條蘸麻油點照之如心窩或遍身有成塊紅者八九日後決死

一發熱一日即遍身齊出或稠密如蚕種摸之不礙手者決死

一發熱時腹中大痛腰如被杖及至放痘而痛猶不止者決死

一發熱時頭面上有一片紅如臙脂者八九日以後決死

一發熱時口鼻或大小便俱失血者決死

一發熱時妄見妄語昏不知人者死

一發熱時腰脹而痛大叫不止者死

一正發熱一日之內其熱忽退而反煩躁悶亂坐卧不安此外雖滿凉內却熱也若見手足冷腹脹氣喘者即死○以上諸證俱不必治

報痘三辨吉凶 十六

一見點之時頭面稀少胸前背上皆無根窠紅潤頂突礙手如珠光澤此爲上吉不必服藥

一發熱三日或四五日熱稍退乃於口鼻腮顴地閣頸項之間或四肢先放數點大小不一淡紅潤色與肉色紅白分明者吉

一痘作二三次出三日後手足心方纔出齊出齊後頭面胸背稀少尖圓堅實飲食二便如常者吉如無他證不宜妄行用藥

一痘之初出三五相連者必密單見者必稀

一痘癍上身多下身少者吉反是者險

一發熱至五六日痘隱出不出以燈照之只在皮膚中有紅點但其色脉和平別無逆證忽然眩目大汗出者毒氣從痘處一

齊從汗而出者此名昏痘再無壅遏之患乃吉兆也○痘瘡變化莫測有等身無大熱亦見報痘但不貫膿結痂或出而復沒者此名試痘不可與作輕看再過數日忽然大熱必然復出宜審治之

一發熱一日便出者凶或一齊湧出如蚕種密布者決死

一大熱未退而見紅點數粒先見於太陽額角髮際天庭或山根以上等處此陽毒乘虛上侵陽位也大非吉兆再加目紅唇裂痰鳴色紫或白者尤甚又或有二五粒聚成一塊者此名鎖綵痘皆不吉之兆急宜凉血解毒以防其危

一痘瘡初出，紫色紅片者，名紫蚊迹，作悶，四日死。

一痘瘡初出，當頂紅者，六七日死。蓋痘從淡紅，如線附於根下，不欲當頂紅也。

一痘已出一遍，又出一遍，心腹疼痛不止，且氣臭色紫黑者，決死。

一痘瘡皮薄，色白而光，根窠全無紅色，或根帶一點紅，三五日後仍如綠豆樣，此痘決不能成膿，只成一胞清水，擦破即死。

一色紅帶艷，皮內盡紅者，必不成膿，痒塌而死。

一報痘之時，全不起頂，有如湯泡及燈草火燒者，十餘日後必痒塌而死。

一報痘之時，有黑斑如痣，或肌肉有成塊黑者，即死。

一報痘時，若口鼻及耳有紫紅色，或血出不止者，決死。

一報痘之時，應出不出，或起紅斑如蚊跡者，六日後必死。

一報痘之時，腰腹痛，或狂言煩躁，大渴吐瀉不食者，俱不治。

一報痘之後，痘已齊，而身熱不退，反甚者死。

一痘齊之後，毒已外達，則內當安靜，而久見煩躁悶亂，不安不止者，此邪毒盛極，神機無主也，必死。

起發一朝辨吉凶　十七

自報痘三朝之後，不疾不徐，先出者先起，後出者後起，大小分明，不相連串，尖圓堅實，紅活光潤，面目漸腫，依期灌漿，飲食二便如常而無他證者，此表裏無病，大吉之兆，不必服藥。

一痘雖起發，而色見灰白，腫如湯餅者，看其人臟氣何如，如能食便調，無他證者吉；若不能食，或吐利，或癢痒者凶。

一痘起一分，則毒出一分，至五六日不盡起發，又色不紅活者，大抵生凶。

一起脹三日已足，痘皆滿頂紅紫者凶，面目腫甚者亦凶。

一痘當起脹之時，遍身雖起，而頭面全然不起，或痘不脹而肉脹，頭面皮肉紅腫如瓠瓜之狀，而痘反不起者，決死。

一起脹之時，滿身痘頂有眼如針孔，紫黑色者，決死。

一痘色乾燥不潤，慘黑不明，或灰白漸至倒陷，或發紫泡者，皆死。

一起脹時，肚腹大痛，或腹脹不能飲食，或氣促神昏，或悶亂不寧，或泄瀉煩渴，或併白痰鳴，或狂言妄語，啼哭呻吟，如見鬼神者，皆死。

一起脹時，吐利不止，乳食不化，或二便下血者，死。

一手足厥冷，起而復陷，起而復癢，或遍身隨脹隨潰，躁而發喘者

死。

一痘已起脹，內有六七粒細而成塊，於中有一大痘，稍潤而斜者凶。

一痘起紫色，刺出黑血如屋漏水者死。

一痘於起發時，痘頭便戴白漿者，不分何處，並非佳兆，不待移日然也。

貫膿三朝辨吉凶　十八

一痘自起發之後，小者漸大，平者漸高，陷者漸起，外帶微紅，內涵清漿，以至貫膿之時，却要個個成膿，根脚紅活，其形圓滿光澤。此時毒化成漿，由綠色而漸變蒼蠟，以手按之，其皮堅硬，膿漿厚濁，約束完固，無少破損，飲食二便如常，此上吉候也，不必服藥。

一痘密者，自起至漿，漸至壯大，未有不相串者，雖相連屬，只要根脚分明，陷者盡起，無處不透，則毒從漿化，膿成而毒自解，無伏留者矣，此亦吉候。

一痘之初出，或頂平，或中心陷下，或白色，只要其人能食，二便如常，治益氣湯以及貫膿之時，陷者微起，平者微尖，淡白者紅活，漿中血水，盡化為膿，但得如此，毒已解矣，又表無痛痒之證，但無可瀉之法，若是大便俱無病逆，如此者坐待收靨，不可妄投湯劑。

一貫膿時，紅紫黑色，外剝聲啞者死。

一貫時純是清水，皮薄而白，如水泡者，三四日必抓破而死。

一膿不能貫，而乾枯焦黑，或全無血水，癢陷者即死。

一頭面腫大，瘡盡擦破，臭不可近，而足冷者決死。

一貫膿之時，吐利不止，或二便下血，乳食不化，痘爛無膿者決死。

一貫膿之時，二便不通，腹脹肉黑，發斑痰壅，氣喘，或寒戰咬牙者決死。

一回漿之時，漸當蒼黑收斂，而反光嫩不斂者，此氣血兩虛，漿不能乾，必發痒搔破而死。

一膿漿未成，忽然乾收，或青紫焦黑者死。

一忽然作痒，正面抓破，皮脫肉乾者死。

一諸痘有漿，而天庭不起，或額上如沸湯澆破，臭連兩顴，水去而乾，似靨非靨者死。

結靨三朝辨吉凶　十九

一痘至十日之外，血化毒解，膿必漸乾，如蒼蠟色，或如葡萄色，

從口鼻兩傍而部收起以至胸腹而下然後額上與腳背一齊結靨而落別無內證飲食二便如常或從手足心手指尖或陰上先收者俱吉候也

一痘既齊顆收靨而身有微熱者乃燒漿之熱但飲食如常俱不必治

一痘當靨時遍身臭爛目無神氣者決死

一當靨之時遍身發癢抓破無膿皮捲如豆殼而乾者決死

一當靨之時無膿而氣急聲啞或手足顫搖或寒戰咬牙或腹脹滿悶或足冷過膝或小便少而大便頻者皆死

一當靨時兩臉乾硬按之如石者死

一痘至收靨飲食不進口中常如食物動而不止者死

一面部胸腹未靨而腳先靨者危陰勝陽也

一遍身俱靨內遺數粒獨不靨者尚能殺人如蛇之退皮中有一節被傷不能全退者終死其有靨至頭下或至胸住定而服藥不效者亦死

一痘瘡未成漿而卒然枯紫者死

痘當靨時淘中未見膿水而口唇上下痘先黃熟者毒氣內攻於脾也

一痘瘡有膿結靨者則為吉證若無膿收靨則立見其危

一痘未收靨而口唇腐爛及口白到舌者危

一收靨時前後有紅紫泡者不治

落痂後辨吉凶 二十

一痘瘡收後其痂先後自脫薄厚落遲離肉不粘者吉

一自食痘痂者雖有他證不死

一痘痂雖落而痘瘢蒼白暑無血色者氣血虧盡也若不急培元氣則過後必死

一痂落後身發潮熱無所依者心氣絕也危

一痂落後手足顫搐咬牙噤口目閉腹脹足冷過膝者不治

一原痘乾燥膿少不覺雖結靨落痂而瘢白者或有餘熱不退者雖過一月亦要死

痘瘡上論列方 二十一

真人解毒湯 痘五二

會稽　張介賓　會卿著
瀛海　賈　棠　青南訂

痘疹 中

總論治法　共十九條

痘瘡一證，順者不必治，逆者不能治，所當治者，惟險證耳。何爲險證？如根窠順而部位險，部位順而日期險，日期順而多寡險，多寡順而顏色險，顏色順而伏食險，伏食順而雜證險，雜證順而治療險，治療順而調攝險，然猶有最險者，則在乎元氣與邪氣耳。邪氣雖强，元氣亦强者無害，但恐元氣一弱，邪氣雖微者亦危。設或犯之，而不爲速治，則順者不順，而吉變爲凶矣。凡此數者，皆痘中之要領，所當詳審而辨也。故凡欲治痘，必須先識死生，辨虛實，審寒熱，明此六者，則盡之矣。

一治痘之要，惟扶正與祛邪二者而已。凡邪氣盛而無制者殺人，正氣虛而不支者殺人，及其危也，終歸元氣之敗耳。使元氣不虧，則本必不死。凡治此者，但知補瀉二字，而補瀉之權，則[illegible]御，必不可使[illegible]遏於

瘀疕，不可使第化爲疕。見以善用攻者，必不致伐人元氣；善用補者，必不致助人邪氣。務使正氣無損，而邪氣得解，能知中和，斯爲高手。然說中之妙，當識因人因證之辨。蓋人者本也，證者標也。證隨人見，成敗所由，故當以因人爲先，因證次之。若形氣本實，則始終皆可治標；若形氣原虛，則開手便當顧本。若謂用補太早，恐補住邪氣，此誤謬之說也。不知補能托邪外出，助其發散，尚無補住之理。并以發源之初最當者加。若不有補，衞克有終矣。此可與智者言，不可與庸人道也。

一治痘不宜遲。凡痘瘡之有不同者，無過寒熱虛實四證。夫寒則虛，熱則實，虛寒則宜溫補，實熱則宜清解。然其挽回之力，當於三五日前治之，過此則恐無及。若七日之後，痘發於外，外不足則外邪而入；若痘發不盡，則又內傷，內不足則內攻內外。故治痘有此時之不可失也，有如此，倘時不逮，則後來之禍從此伏矣。

一解毒當知表裏。所謂毒者，火毒也。所謂解毒者，求其所在而逐之也。若在痘之發，內則本於臟火，外則感於風邪，內外相觸，其毒乃發。故其發也，不甚於內，則甚於外；甚於內者以火

邪內盛而繼發於外也。其於外者，以寒邪外閉而鬱火於內也，故但察其無汗外熱，而邪在表者，即當疏之散之，但解其邪從外而去，則毒亦從外而解矣。若察其多汗內熱，而邪在裏者，即當清之利之，使毒從內而泄，則毒亦從內而解矣。其有內外俱熱，而表邪仍在者，則當表裏兼治，仍宜兼解之。以上治法，皆散毒之法。若邪不在表，則必不可妄發散，以傷其表。若毒不在裏，則必不可妄用清利，以傷其裏。表裏俱虛者，必不可兼用寒涼，以致中寒，脾虛泄瀉，必反陷其毒，即不治已。一便不利者是也。知斯五者，則解毒治實

之法，無餘蘊矣。此外有虛邪虛火等證，則當先顧元氣，次察邪氣，無使失措中危，猶本不足，則尤為切戒。（凡云痘毒者，症必自內而達外，但得出盡，則內無毒，但得化盡，則外無毒。既出既化，而不使復留，則毒盡去矣。故或宜散者，或宜從透，或宜從利，或宜引化，而治法盡之矣。）

一補虛治毒，必明陰陽。凡痘瘡血氣各有所歸，已見前氣血條中。然虛之所在，尤當分辨，不可忽也。蓋痘從形化，本乎精血，凡其見點起脹，灌漿結痂，無非精血所為。此雖目為氣之所為，而實血為之主。且痘以陽化，陽必傷陰，所以凡治痘者，但當重在陰分，宜滋潤，不宜偏燥，故補陽不若補陰，養陰所以濟陽，此秘法也。然血氣本自互根，原不可分為兩，如參、芪、白朮之類，雖云氣分之藥，若用從血藥，則何嘗不補血；歸、芎、地黃之類，雖云血分之藥，若用從氣藥，則何嘗不補氣。故凡見氣虛者，以保元湯為主；血虛者，以四物湯為主；而但以參、芪、歸、地四味不相離，但主輔有重輕，各有所宜，而用之當不明辨，自有差耳。

一治痘有要方，茲專選而出之，以便擇用。其有未盡者，當於各條求之。

凡解表諸方，乃初熱時所必用者，諸家皆以升麻葛根湯為首。稍溫則用蘇葛湯，似為更妥。余則常用柴歸飲，以兼營衛，似為尤妥。此當隨宜擇用。（一當溫表不解者，正柴胡飲。）（陽氣虛寒，表不解者，柴胡桂枝湯。）凡氣本壯而表不解者，疏邪飲，或加減參蘇飲。（實邪在表而表不解者，五積散或麻黃甘草湯。）

凡治火解毒，皆所以解實熱也。如欲解毒清火而兼養氣者，惟四味消毒飲為最。犀角地黃湯亦佳。（熱毒兩盛而不化者，化毒湯。）（重者，紫草湯。小水不利者，導赤散或六一散。）宜

熱赤斑焮燥多者犀角散○熱在氣分而失血者玄參地黃湯○內熱不清者東垣涼膈散○二便俱不利而火盛於內者通關散○熱毒內甚小水不利而煩渴者大連翹飲○煩熱多驚而睡不安者七味安神丸○熱毒內甚而狂妄者退火丹

凡表裏兼解諸方如內外俱有熱邪者宜柴葛散或柴胡麥門冬散○裡邪甚而表邪微者解毒防風湯○表裏俱有邪而元氣兼虛者實表解毒湯○表裏俱實熱者雙解散

凡托裏諸方有宜專補元氣者有宜兼解毒者如氣血俱虛

不起者六物煎或托裡散○虛寒不起兼托兼表者參芪內托散或十宣散○氣分虛寒不透者六氣煎○氣血俱虛發熱不起者紫草快斑湯

凡痘瘡補劑皆痘中元氣根本托邪托毒者之所必賴但見虛邪必當以此等方爲主○氣分不足者調元湯○氣虛宜溫者保元湯六氣煎○氣虛微熱宜兼涼解者參芪四聖散○血虛者四物湯芎歸湯○血分虛寒宜溫者五物煎○血虛血熱者養血化斑湯○血虛血熱宜兼解毒者涼血養營煎○氣血俱虛者六物煎八珍湯十全大補湯○氣血虛寒大宜溫補者無如九味異功煎六味回陽飲錢氏十一味木香散十二味異功散但虛寒而兼氣滯者宜用之欲待虛大有不及

凡攻下諸方亦痘中所不可無者但必不得已而後用之勿得視以為常也○血熱秘結大便不通者四順清涼飲○裏實多滯秘結者前胡枳殼湯○表裏俱實大便不通者柴胡飲子○血熱便結毒盛者當歸丸

一凡痘出已盡內無不虛蓋隨痘而為托送者皆元氣也使於此時不知培補化源則何以灌漿何以結痂何以收靨俗內

虛無主將恐毒氣復陷無不危矣若痘之稀疎者氣血之耗猶為有限若痘之多而甚者其氣血內斵必更甚矣此不可不預為之防也

一不藥之痘毒原不甚既出之後內本無邪此誠原不必治無奈父母愛子之切且不識病之輕重故必延醫診視既延醫至無不用藥既已用藥無非寒涼在彼之意不過但解其毒耳亦何妨不知無熱遇寒何從消受生陽一損胃氣必傷多致中寒泄瀉毒熱下陷則更令速其可畏也又如痘於初見發熱每多不察虛實止知速當解毒凡於十日之外

子069-063

多有泄瀉而致斃者皆此輩之殺之也寃哉寃哉余見者多矣故筆諸此以爲濫損者戒

一痘自肌肉陽明主之故自出齊以後最不宜吐瀉與其救治於倒陷之後孰若保脾土於未壞之先故凡生果茶水之類皆宜與脾胃寒凉之藥尤不可不愼也

一治痘須辨其氣血大都氣多則泡血熱則斑氣不足則頂陷血[illegible]不昨裏實太補則生癰毒表實太補則不結痂裏虛不補則內攻而陷表虛不補則外剝而癢但使周身氣血活潑無礙則雖險亦不難治故惟貴得中勿使偏勝則寒

熱虛實自無太過不及之患斯足云善治矣

一秘傳治痘之法首尾當以四物湯爲主隨證加減用之惟脾胃不實者須減當歸但將人參通炒微焦則用白芍且從有溫中煖脾之妙

一首尾皆忌汗下此先哲治痘之心法蓋妄汗者必傷陽氣陽氣傷則凡起發成漿收靨之力皆失所賴此表虛之爲害也妄下者必傷陰氣陰氣傷則凡滋潤化源精神飲食倉廩皆所敗此裏虛之爲害也然表虛者猶賴裏氣充足可以充之裏虛則根本內虧而氣必從而陷無藥可施矣故古人謂以汗下爲戒誠至要之旨也然此以常道爲言非所以應變者設遇外感寒邪腠理閉密非汗不出其發不足備若不用辛甘發散之劑以通達肌表則痘有難出之患矣又若有大小便秘結而毒有壅伏不達者不與苦寒利之藥以疏通臟腑則有脹滿煩燥焦紫黑陷等患矣故當察其虛實審其常變當汗則汗當下則下中病則已無過其制若無汗下之證則必不可妄用汗下以賊人之命也務得其宜然後謂之明醫而痘自有歸矣

一萬氏曰解其火毒恐鬱遏而乾枯養其血氣欲流行而舒暢

按此說誠善然所謂火毒者以實熱爲言若火有虛實真假則不得槩認爲火毒

一杜氏曰痘瘡出自六腑先動陽分而後歸陰經其本屬陽故多發熱而陰血虧耗者多也首尾當滋陰補血爲主不可一毫動氣其從權治所以白术半夏之燥升麻之提氣上衝皆不可輕用也且痘瘡多有血熱者故宜用四物加芩連之屬以養其陰而退其陽也

程氏曰痘毒根於血必用陽氣傳送而發故多服表藥則內外交攻此時若不用和中扶陽之劑使風寒散邪炎發附子之藥利

便退熱。則外邪內火何由得解。邪既不解則痘何由得盡。此
治之不容已也。然治之之法。必須察兒形色。察兒虛實。內證
用藥。庶幾兩效。世之醫者。多宗錢氏清涼解毒之論。或按陳
氏辛溫發散之方。士見不可致誤多矣。殊不知痘瘡之原。自
不起發。根窠不紅活。此皆虛寒。必宜陳氏方救之。苟非理明
於心。鮮不眩惑。故必熱則涼之。寒則溫之。虛則補之。實則瀉
之。何患乎疾之不愈耶

程氏曰。治痘之要。始出之前。宜開和解之門。既出之後。當塞走
泄之路。落痂之後。清涼漸進。毒去已盡。補益宜疎。

程氏曰。凡治痘前後。須加木通以瀉熱。熱自小便中出。不使攻
胃。令無變黑之證。七日之後。熱退者少用之。○凡痘瘡前後
總有危證。萬勿用天靈蓋腦麝之屬攻之。蓋毒出一步則內
虛一步。血氣運一日則內耗一日。豈可復用辛香耗氣之劑
雖僥倖偶中。後必有餘害也。是可見丁香之亦相去遠矣

程氏曰。凡婦人有孕而出痘者。以安胎為主。氣虛者保元湯。血
虛者四物湯。或加白术黃芩。砂仁陳皮。必使胎氣無損為上。

程氏曰。推痘鄒先生云。痘者象其形而名之也。愚謂不獨象形
而名。所治之之法。亦猶農家之種豆也。豆之為物。土實則難
出。土疏則難起。故實者鋤鬆之。疏者灌溉之。不實不疏。惟順
其性。不使物害之而已。釘此則可以治瘡矣。今人於痘初起
不察虛實寒熱。或過用木香散異功散之類。所以火濟火。致
變紫黑斑爛者。此則有之。或妄用芩連梔柏寒涼之藥
則大傷脾胃。為吐為瀉。為寒戰內陷者有之。故凡治痘之法
六日之前。不宜溫補。亦不宜妄用寒涼。師云。凡解毒之內。略
加溫補。溫補之中。略加解毒。此不傳不刻之秘訣也。若六日
已後。毒已盡出於表。當溫補而不溫補者。癢塌不得起。而癢塌
寒戰之患。必所不能免矣。

熱證論治　一十三　共十一條

古云。痘疹之病。皆由父母胎毒伏於命門相火之中。故每遇二
火之令。或主客溫熱之氣。即觸發而出。此痘疹屬陽。因無疑
矣。然陽毒陽邪。無熱不痘。亦無熱不發。所以非熱不能出現
非熱不能起發。非熱不能化漿。非熱不能乾靨。此痘瘡之終
始不能無熱。亦不可無熱也。但熱貴其微。不宜其甚。蓋熱甚
者毒必甚。而痘亦必重。熱微者毒亦微。而痘出必輕。無熱則
不成不化。此熱為痘之常也。所以凡治痘瘡。不可盡除其熱。
若必欲盡去之。則未有不成陰證而敗者矣。

一痘有二火。蓋痘疹一證，其所以為火者是矣。然所岐之火蓋有
二：曰太過，曰不及。太過者，火之有餘，是謂赫曦炎烈之氣
也，其毒甚，治宜清解；平氣之火，是謂升明，昇發之氣也，其毒
平；不及之火，是謂伏明，屈伏之氣也，其毒陰，治宜
培補。此以陰中有陽，陽中有陰之大義，而亦痘疹萬病之法，所
使不知此，貽敗云爾。

一治熱當知表裏，及有毒無毒，斯無謬誤。蓋痘疹屬陽，無不發
熱，若外雖發熱而內則不渴，或飲食二便如常，此淡痘之熱
耳。熱在表而內則無病，萬萬不可妄治。其有熱之甚者，

毒必甚，此不得不為調理。若其於發熱之初，必為之表散；若
其於見點之後，必為之清解。錢氏以熱甚而大小便閉則利
之，如果有熱毒實秘，則不得驟用補陽等劑，致令毒氣壅滯，
則熱終不退，反為害矣。

假熱非熱，似實非實，見有不熱，或治則熱，如文中湯補中
陽，于涼瀉，師若各有所，然無非因病而藥，各有所宜，是以
一藥皆不可偏廢，但利用相斯為貴耳。余見近日幼科多不
知陳氏之心法，但見痘瘡則無論是虛是實，開口且知解毒，
動手只是寒涼，自謂一家若同，殊不知治必當詳實熱，如實

熱果真，自非涼瀉不可。然必內外俱熱，方是熱證；內外俱實，
方是實證。但其中有似實非實、似熱非熱者最多，此不可不
察也。真實之所察之證也，故凡見外熱，若實熱，可察則無如
口不渴，便通利，或見微冷，或食不化，或脈見不足，或
聲色微，或微氣多嘆，或飲食不化，或腹痛喜按，或吐瀉或
怯寒，或畏寒，或作癢，或多驚悸，或筋惕肉瞤之類，皆是有熱，
此皆熱在表而不在裏，熱屬無根之火，非真熱證也，最忌寒
涼。若熱而妄用，則必致敗壞，無一免矣。

一痘瘡熱甚者毒必盛，毒盛者其痘必多；熱微者毒亦微，其痘必少。

〇痘既出而熱不減者，毒必日增；見點後內熱漸退者，痘必
疎矣。〇或有微熱而痘又密者，其內熱必甚，而或見煩躁，或
大便熱結，此毒盛熱不足也，宜兩其內而兼解其表。〇或有
表熱而痘反稀者，以外雖熱而內則不熱，此毒淺熱亦淺也。

痘瘡初熱，治法宜發表，則治法宜中。

治陽邪實熱之法：〇表裏俱熱者，柴葛解肌湯，一起熱用藥散。
〇表熱不解而理其熱者，脈浮微弱，微汗散邪散似。〇表而俱
熱，而邪實者，雙解散。〇內熱甚盛者，東垣涼膈散，或解毒防
風湯。〇熱而煩燥，痘瘡紫赤煩燥者，搜毒煎，或人退熱飲，或

犀角地黃湯。○陰虛血少者，生脉散加生地，或四物湯，或二陰煎。○
陰虛有熱，而大便不通者，以蜜煎導法。○大便不通，實熱內
壅而脹悶者，前胡枳殼湯，或三黃丸。○小便不利而
實熱內鬱者，通關散。○小水赤澀而邪熱內盛者，導赤散、六
一散。○心火盛而驚搐多痰者，萬氏牛黃清心丸，或七味安
神丸。○內熱煩渴，身熱毒盛者，當退熱解毒，宜柏子湯、柴
胡麥門冬散。

一純陽無陰之證，凡發熱煩渴，狂妄躁亂，大渴，人如見鬼祟，
大便秘結，小便赤澀，六脈滑數者，此疾皆是火毒內熾之證，當

用前法前而治之。

陳氏曰：凡痘疹壯熱，經日不除，如無他證，只用六味柴胡麥門
冬散治之。如不愈，服七味白术散。○凡身壯熱，大便黃實，或
口舌生瘡，咽喉腫痛，皆毒未盡也，用射干鼠粘子湯；如不
愈，用七味人參白术散。

程氏曰：痘瘡收靨後，凡有發熱不退，筋骨疼痛者，宜因物為
按：瘡痂不落，加麥門冬、犀角；咳嗽，加瓜蔞、知母；發渴，加天花粉；橘
紅切忌人參、白术、半夏之屬，倘誤用之，為害不小。若痘瘡屬
陽，宜多涼，不合用溫，待補血其熱自退，此即養陰退陽之義

也。

一痘後餘熱發熱證治，俱詳痘後餘毒條中。

發熱三朝治款　十四

痘疹一證，雖因於有生之初，然必因時氣相觸，內外挾邪而後
作。凡痘之將出，已兆於發熱之微甚，而吉凶於此亦可判矣。
毒輕者，易出易靨，固不必治；其甚者，險證百出，故不得不治。
凡治此者，於初熱時，急宜用輕揚之劑升以散之，但使外感
之邪盡散，則內之毒皆作微汗盡從毛竅中出，則毒氣已殺其半，
而重者可輕，危者可安，即如痘中一切變證，亦無非毒氣

欲出不能之所致。一經表散，則毒從汗去，而諸證亦必日退。
然又當察表裏之虛實，或宜解表，或宜清裏，或宜托助元氣。
熱者宜急，熱者宜緩，有不可執一也。故胡氏曰：表熱壯盛，非
微汗則熱不解；裏熱壅盛，非微利則裏不解。失此不治，則毒
氣漸盛，而逆證隨見矣。

散表之法，當知邪之淺深，毒之微甚。表邪甚者，微散之，則表
不能解；無邪者散之，表邪微者妄汗之，則表氣必虛，痘不起發，
而反為大害。故惟以得中為貴，亦以微汗為貴，不可過傷衛
氣也。其有大熱不退者，此有祕結，或風寒凝滯之所，則不得不

大為表散，散未應，或至於再，必令身熱由汗而退，則毒氣自解，可無患矣。此散之微甚有權宜也。故凡是痘疹，皆為內外之實氣，務使表裏通徹，但得毛竅中常見津津潤澤，亦猶庖人吹籠之法，但欲其鬆，則皮膚通暢，氣無不達，痘必易出易收，無不善矣。

一痘瘡發熱之候，宜作熱作涼者為常，若遍身如火，晝夜不休，為失常也。此當察其表裏，酌宜施治。

一痘瘡初見發熱，若無虛寒等證，因不得驟用溫補以助火邪，恐致鼓擊痘毒，則反為大害。若無實火大熱等證，切不可因其發熱，妄用寒涼，必致敗脾泄瀉，則為害尤甚。此時治之逆變也，大宜戒之。

既行表散之後，須謹避風寒。若使外邪再感，則皮毛閉密，熱必將復作，汗而再汗，必不能堪。又須切戒生冷水果，若誤犯之，恐寒濕傷脾，而為泄瀉不食，則無不致害。

一表散之劑，凡初見發熱，狀類傷寒，未知是痘非痘，即當先用汗散。此時欲散表邪，則當取汗者，宜以柴歸飲為第一。惟大便不實者勿用之，以其性多潤也。其次則柴葛湯，再次則升麻葛根湯，或只用加減參蘇飲亦佳。○若冬月寒勝之時，

或氣體壯實，表不易解者，須加麻黃以發表出，身以大汗為佳。但使熱退身涼，則輕矣。○若初發熱，有畏寒身痛，如瘧之狀者，陽氣虛也。宜柴歸桂枝湯加黃芪主之，痘出即愈。

一清解之劑，用治表裏，而兼清兼散也。凡熱之甚者，毒必甚。若身常有汗，而大熱不退，或兼煩躁熱渴者，此其內火薰蒸，而表裏俱熱也。須兩解之，宜連翹升麻湯，或如聖湯。○若身熱烙手，面目赤，口乾，二便熱秘，煩悶不安者，此表裏俱實也。宜柴胡飲子，甚者大連翹飲、雙解散，或調益元散以利之。

一表汗已透者，不得再汗，恐外亡陽而內傷氣也。

一發熱之時，有腹痛脹滿者，必外邪與毒氣相併，未得外達而然。宜參蘇飲加砂仁溫而散之。

一初熱時有驚搐譫語者，是為痘搐，微見而隨止者，不必治。若元氣強壯，內搐之甚者，宜羌活散調製過硃砂以表之。若痰涎壅盛，咳嗽內作聲者，宜煎生薑湯調化痰丸服之，或抱龍丸亦可。

一此時渴欲茶水，只宜少與葱白湯，既可止渴，亦可疎表。

一痘瘡首尾皆畏泄瀉，宜檢本門速為治之，否則內虛脫陷之禍不可勝言也。

徐氏曰凡解表之藥必在紅點未見之前如熱少已見者邪毒必甚宜敗毒散或參蘇飲調之

張璐之曰凡痘瘡一見紅點便不可用升麻葛根恐發洩作表虛也程鳳峯曰治痘者不可輕用升麻恐提氣上行引動肺氣也按此二家之說是皆治痘之大要然亦有宜但其中亦有宜否之辨如陽氣下陷不能透達肌表者則暫用升麻以其升提又或雖見紅點而表有熱邪未解者則仍宜解散亦不可拘此二說者雖不可堅執實不可不知也

吳東園曰初熱時只有二事惟去邪扶正而已邪熱盛則去邪

而正氣自旺正氣衰則扶正而邪熱自退正氣盛而痘自發熱為痘用則不為害矣邪氣退而正氣不受殘血脈充榮則痘自泰矣須於此時有明下手遲則無濟於事矣

報痘三朝治法　一十五

痘之形色初見吉凶使分而寒熱虛實亦已可辨凡調攝挽回之功惟在此時尤為緊要目痘出三日內毒在半表半裏之間關係最重故妄汗則成斑爛妄下則成陷伏寒涼過用必傷正氣燥熱過用則助邪氣虛寒不補則陷伏癢塌實熱不解則變黑歸腎倘有一差死生立判醫者於此不可不慎之

一痘瘡見點後身熱稍退別無內熱等證或色不甚紅頂不甚突者便有虛象雖在三五日內亦切不可用寒涼之藥恐傷脾胃為害不小須以保元湯或六物煎之類為主因證加減以培養之

一痘瘡必因熱而出因熱而起若熱甚則血燥血枯其出反難故於未見點之先必須察其寒熱預為調理若有熱證勿得過用辛熱氣分等藥恐助火邪致滋多變

一此時最畏泄瀉宜按本條急治之

一見點太早者有吉凶虛實之辨凡發熱一日或纔熱便見必血熱毒盛之所致其證多凶但得痘稀而飲食如常別無他證則亦無害○若其形氣本弱而痘現速者此皆禁衛虛不能約束於外故出現太驟須兼實表庶可免痒塌潰爛之患宜實表解毒湯主之○如發熱一日便出而密者其證最凶其毒必甚此證最忌溫補宜搜毒煎加柴胡主之或羌活散加牛蒡子紫草蟬蛻或調保嬰丹熱甚者調退火丹或雙解散急治之可保一二○其有痘雖出早而色不紅紫熱不甚者此全屬表虛之證如保元湯六物煎之類亦所當用

一痘出不快者有數證須察其有無外感內傷而辨治其所病○如冬月嚴寒或非時陰邪外閉以致痘出遲者宜五物煎加生薑麻黃細辛之類主之或五積散亦佳○如夏月火熱薰蒸以致血熱氣虛煩渴發燥而出遲者宜人參白虎湯加木通乾葛主之○有因時氣不正為風寒外邪所襲以致皮膚閉密或發熱無汗而出遲者其證必頭痛身疼四體拘急宜疏邪飲柴歸飲桂枝散之類主之○若本無寒邪而出不快者此氣血內虛不能驅毒托送而留連於內宜十宜散或托裏消毒散○若氣分大虛而出不快者宜保元湯六氣煎或五物煎加減主之○若內有所傷氣滯而出不快者宜勻氣散橘皮湯加減主之○頭面出不快當用川芎白芷羌活防風天麻之類為引使○胸腹出不快當用藁本升麻紫蘇及紫草木通為引○四肢出不快當用桂枝乾葛甘草連翹紫草蔥白各加生薑為佐連進二服出自快矣

一痘不起發者雖證有不同然率由血氣內虛不能托送者居多此中或宜兼解散或專補元氣當辨而治之○凡出齊之後或被風寒所閉而發熱或痘陷伏不起者宜羌活散參蘇飲加內托等藥治之○若紅紫黑陷出而焦昧乾燥不起發者宜四物湯加紫草紅花丁香蟬退官桂或調無價散量兒大小與之○若便實內熱隱隱肌肉間不起發者宜紫草飲子○若血分微熱而毒不能達者宜托裏消毒散○若氣虛氣陷不起者保元湯或調元湯加黃芪○若血虛不起者芎歸湯四物湯○若血分虛寒不起者五物煎○若氣分虛寒不起者保元湯六氣煎○若氣血俱虛不起者六物煎托裏散○凡以上補內托血等劑須加好酒人乳糯米更妙○凡發痘之藥用本不同有以毒攻毒而發痘者如川山甲人牙蟾酥蟬退之屬是也有解毒清毒而發痘者如紫草紅花牛蒡子犀角木通連翹金銀花之屬是也有升提氣血而發痘者如川芎白芷荊芥升麻葛根之屬是也有解散寒邪而發痘者如麻黃桂枝柴胡乾葛防風紫蘇蔥白之屬是也有行氣行滯以逐邪寒而發痘者如丁香木香陳皮厚朴山查大黃之屬是也有益火助陽健脾止瀉而發痘者如附子肉桂乾薑肉豆蔻之屬是也凡此者孰非托裏起痘之劑然但可以此為佐而必以血氣為主則在乎四君四物十全大補之類此中因乎而應無不善矣

一虛證見於報痘之時則皆有可慮者矣此不但必不能起發結痂十日後必致不救蓋痘瘡實熱毒盛可畏虛寒者內敗可畏但實熱證顯虛寒證隱人多忽之故爲害反甚且痘瘡之所賴者惟飲食血氣飲食之本在脾胃血氣之本在肝腎但使脾胃氣強則滋灌有力而無內虛陷伏之變氣血充暢則毒皆生化而無表虛癢塌之患此其在氣在血或微或甚所當早辨而治也○凡痘出灰白不紅綻或灰黑頂陷或身無大熱皮嫩色光溶溶如淫濕之狀或口不渴飲食少腹膨溏泄二便清涼皆表裏虛寒證也○若氣虛者宜調元湯

四君子湯○氣虛微滯者五味異功散○氣虛宜溫者保元湯六氣煎○脾氣虛寒者養中煎溫胃飲或理中湯○血虛者四物湯○血虛宜溫者五物煎○氣血俱虛者六物煎五福飲或八珍湯○氣血俱虛而寒者十全大補湯○脾腎血氣大虛大寒者九味異功煎六味回陽飲○脾胃虛寒氣滯者陳氏十二味異功散○凡痘瘡色灰白不起發者氣虛也候出齊以保元湯和木通川芎最妙

一火證熱毒在見點之後宜速爲清解若不早治則日甚一日必致不救○凡見點大紅根下皮色通紅此血熱氣有不能管束也後必起發太驟皮嫩易破或癢塌不可救宜急清血分之熱用涼血養營煎或鼠粘子湯或用六味消毒飲加芍藥治之或四味消毒飲益元散俱佳○凡痘瘡已現毒泄則熱當日縮若痘已出而壯熱不減此毒蘊於內其勢方張其痘必密宜解其毒用柴葛煎或鼠粘子湯○凡見點之後壯熱不退或二便閉澁色紅帶紫或根窠焦色紅紫成片或口舌熱燥煩渴喜冷舌上有胎或二便燥澁此表裏皆熱毒盛之症急須清熱解毒如表熱甚者宜柴葛煎裏熱甚者宜搜毒煎加柴胡或用六味消毒飲加酒芩木通梔子黃連

山查蟬退歸芍紅花之類或調退火丹加減用之○如熱毒內擾而發驚狂譫語者宜用紫草煎湯磨犀角汁調硃砂益元散或退火丹解之○以上凡解毒之後紅紫退二便調能食不渴此表裏皆清也切勿再爲解毒須急以保元湯四物湯六物煎之類調補氣血以助貫漿收靨否則恐變癢塌而不能善其後矣○如痘瘡內熱之甚大便艱結不通大渴煩燥腹脹譫脈見洪數而痘出不快者此熱毒壅伏於內須通利之以去其熱毒宜柴胡飲子或三黃丸甚則承氣湯或用猪膽導之然此惟熱毒有餘痘形未見不得已而微下之可

也○若斑點隱隱見於皮膚中者此已發越在表乃痘瘡正發之時切不可妄用下藥○凡痘瘡初出但見紅點稠密急用纏豆藤燒存性加製過硃砂連進二三服或用薄荷牛蒡子煎湯調退火丹服之另用吳茱萸為末以水調擦足心引下熱毒亦可解散其毒

一痘出變黑乃危證也蓋痘瘡賴血氣滋灌血足氣充則痘自紅活若熱毒薰炙則成焦黑若陽氣不充則成灰黑且黑為水色其毒在腎以陰犯陽最為惡候當辨而治之○若熱毒凝聚大便秘結或煩躁熱渴而為焦紫黑陷者須通其便先

以解毒之劑宜柴胡飲子或當歸丸微利後宜即以紫草飲或加味四聖散以化表之毒仍用胭脂汁以塗之○若大便不結別無大熱等證而痘色黯黑者總由脾虛不能制水故見黑色宜速用五物煎或保元湯加紫草紅花服之外點以四聖丹胭脂汁若漸見紅活則吉若更乾黑則凶○心鑑云凡治黑痘當用保元湯加芎桂補提其氣氣旺則毒當自散黑者轉黃屢試屢驗

一夾疹夾斑論本非痘中吉兆然亦有輕重之殊宜酌而治之外有未除仍宜參酌○凡發熱一二三日之間痘形未見忽然遍身發出紅點一層密如蚊蚤所咬者決非痘也此乃斑疹之屬多為風寒所遏不能發越而斑先見也宜疎邪飲柴葛煎或敗毒散之屬微散而解之但得身涼斑必自退再越一日痘出必輕矣○凡痘夾斑疹齊出者亦宜辨其寒熱若表裏俱熱而邪不解者宜柴葛煎加減主之○若熱邪不甚而表邪甚者宜疎邪飲或柴歸飲加羌活防風乾葛之類主之或敗毒散亦可用○若痘夾紅斑如錦紋者宜涼血化毒湯加柴胡黃芩玄參犀角之屬主之○若痘出夾斑夾疹而脣紅脣裂者表熱也煩躁大渴妄言妄見者裏熱也表裏俱熱

最為凶證若不表裏兼治何由得解宜雙解散主之○若加悶亂氣喘者必不治

一賊痘者於出齊之後其中有獨紅獨赤獨大摸之皮軟而不礙手者此賊痘也過三日之外必變成水泡甚至紫黑泡皆危證也急用保元湯或六氣煎加紫草紅花蟬退解之或用燈草木通煎湯調下益元散拔去心經之熱而紅自退○如已成水泡宜用保元湯倍加四苓散利之此秘法也不然則遍身擦破臭爛而死

一痘於未出之先倘有濕瘡膿水流注者用滑石末敷之以防

其痛氣或真正綠豆粉亦可。

起發三朝治欵 二十六

痘瘡放標之後。漸漸起脹。但肥胖一分。是胎毒發出一分。胖滿而毒出盡也。有不起者。或因元氣之弱不能送毒。或有襍證阻滯不能升發。皆痘前之失調理也。此時當速治之。否則後難為力。

一痘宜漸發者。若一齊湧出。皮肉虛腫者。此表虛不能收斂。故奔潰而出。後必痒塌。或成潰爛。急宜人參固肌湯。或芎歸湯。○若血熱者。宜涼血養營煎。○虛甚者宜六物煎。○毒盛者宜六味消毒飲。或四味消毒飲。出入用之。

一痘不起發。或起而不透者。多由元氣內虛。不能托送。故毒氣留伏不出也。毒不盡出。則變證莫測。凡見此者。速宜救裏以托其毒。然當察其氣分血分辨而治之。蓋痘之壯突由乎氣。肥澤由乎血。氣主呴之。血主濡之也。若形雖壯而色見枯者。此氣至而血不榮也。宜四物湯加人參麥門冬之類主之。○若痘色紅潤而形平陷者。此血至而氣不充也。宜保元湯。或六氣煎加川芎主之。若形色俱弱而不起發者。此氣血俱不足也。宜六物煎加減主之。或保元湯。十全大補湯。無價散。或獨聖散與之。○若冬春之間為寒氣所襲不能起發者。宜麻黃甘草湯加歸芪。或十宣散主之。○若夏令火盛不起而煩渴秘結內熱者。宜人參白虎湯。○若痘於起發宜起。不紅活者。宜保元湯。或六物煎加丁香山查糯米人乳好酒主之。或用無價散。量兒大小以好酒調服。○凡痘瘡起發。遍身皆欲其透。惟兩足稍遲者。若脾胃素強能食者勿慮。惟脾胃素弱食少者。則足多有不透。以脾主四肢。津液不能灌溉故也。宜以補脾為主。用快斑越婢湯加當歸。或黃芪建中湯加人參防風。○若因誤服涼藥而致白癩不起者。宜理中湯。以

胃受傷。

一痘雖起發。若灰白色。或頂陷者。氣虛也。切不可用寒涼之藥。須六氣煎加丁香川芎人乳好酒主之。或保元湯倍加酒炒黃芪當歸亦佳。

一痘雖起發紅活。若頂平色嫩。皮薄不能堅厚者。此氣虛也。必恐發為痒塌。宜六氣煎。或六物煎加減主之。或十全大補湯。十宣散。俱可擇用。

一地紅血散不附者。保元湯加芍藥當歸。以收斂歸附氣位。

一根窠淡紅。緣愈枯燥者。血虛也。宜保元湯加當歸川芎酒洗

紅花。再加山查以行瘀滯之滯。少加木香以行氣。而血自活
也。
一痘雖起發。而乾枯無水。或有紫黯色。不久必變黑陷。乃血虛
之甚也。宜四物湯。加人參麥門冬紫草紅花。或調服無價散。
外用水楊湯浴之。後用胭脂塗法。
一痘發甚而引飲。渴不止者。名曰燥痘。宜犀角地黃湯之屬。
一痘色紅紫乾燥。或焮腫。名曰熱毒盛也。宜涼血養營。加丹
皮木通牛蒡子之屬主之。然痘出六日以後。有此證者多死。
一痘已出齊。而熱尚不退。或煩躁發渴引飲。或二火司氣之令。
可少與冷水數口無妨。蓋水性下流。不滯上膈。亦能使毒從
小便而出。但不可用生果之類。恐傷脾氣也。

一痘發貫顆粒分明。如彼此相串。皮腫肉浮。或於本痘四旁旋
出小痘攢聚。胖長漸成一塊。此候最險。宜用快斑湯合六味
消毒飲以解其毒。
一出齊後。痘有小孔。自頂直下至脚。不凹不塌。與痘色相同者。
名蝕蟲痘。此因表虛腠理不密。而為此證。失之不治。則大泄
元氣。不起不發。速人之死也。宜保元湯。或六氣煎。大加糯米
川芎丁香。或六味丸。內補其孔。以為提托。連進一二服。必孔

滿而痘自起。若至黑色則難療矣。
一口唇為脾之外候。人以脾胃為本。不宜受傷。如初發熱即見
口唇焦裂。此毒氣攻脾。乃惡候也。宜用瀉黃散之類以速解
之。若不早治。則毒聚於唇。及痘起發。而唇痘必已先熟。內
帶黃漿。及滿痘成漿。此唇已腐爛。亦變壞惡水。
昏沉不可為矣。

灌膿三朝治法

一膿者血之變也。痘瘡初出。一點血耳。漸起漸長。則由血成漿。由
漿成膿。始成實矣。故有血則有膿。無血則無膿也。痘至貫膿

大勢已成。此時必以有膿為主。有膿則生。無膿則死。乃必然
之理也。故六日以前有熱則宜解毒。無熱則宜補養血氣。至
此自然貫膿。若痘至七日以後。頂陷不能貫膿者。必由先失
調治故也。所以治不可緩。必俟漿足。斯可回生。若頂陷灰白
漿清不行。此血氣俱虛。無生意矣。
一痘當貫膿。專以脾胃為主。脾胃強則氣血充實。膿漿成而飽
滿堅厚。不須服藥。脾胃弱則血氣衰少。所以不能周滿。故難
見漿。而漿亦不多。或有漿灰白不能作膿。此皆氣虛。仍是
初起之血氣有虧。焉能化漿。治法但宜大補之。否則不

速治必成內攻外剝之證宜急用六物煎或六氣煎加減治之或保元湯或十全大補湯加人乳好酒與服亦妙○欲辨脾胃強弱當於飲食二便察之飲食雖少而大便堅者脾胃之氣猶可也但微加調補以能食為貴若大便不實或見溏瀉則最為可畏蓋一瀉則變候瀉止則貫漿矣速宜用溫胃飲甚者用陳氏十二味異功散主之○如痘當作膿之時猶是空殼此血不附氣也血既不至則毒何由化宜五物煎或四物湯或紫草散加蟬退主之○如頂陷膿少或服內托藥而暫起復陷者血氣大虛故也宜十全大補湯倍加參芪當

歸糯米煎成和人乳好酒服之此助灌之妙法也

一貫膿三朝之內若身涼而痘色灰白或不進飲食或寒氣逆上而為嘔吐或腹脹或泄瀉而手足逆冷此皆純陰無陽之證也急宜用保元湯加二仙散連進數服甚者必須九味異功散或陳氏十二味異功散皆可擇用○若寒戰咬牙泄瀉等證俱同此治

一手足灌膿飽滿者方見脾胃之強氣血之足也若色見灰白漿水清淡或竟不起者此必脾胃之弱也或灌漿已完而四肢猶有不灌者此恐終變痒塌之證宜快斑湯或六氣煎加防風白芷以達之恐有陷伏之患若尚有未透亦恐關節之處膿後致生癰毒

一痒痛不止者雖因氣血俱虛然亦由火力不足故不作痛而作痒也宜六氣煎或五物煎加防風白芷木香蟬退主之○心經火盛則愈痒當用保元湯倍黃芪以助表少加芍藥以制血其痒自止○若將靨發痒此毒退血活肌肉和暢自然之理也不必治之

一貫膿痛楚不止者氣滯也少下保元湯加山查木香以行滯氣如膿色盛滿大下四苓散利之而痛自止

一痘瘡起發之後不作膿者有四證○有內虛而不灌者專宜托補氣血治法如前○有感風寒邪居膚腠而不灌者宜溫散之以柴葛桂枝湯加黃芪白芷○有熱毒太盛身壯熱漿液乾澀小便赤熱而不灌者宜托裏解毒利小便以紫草飲子或用辰砂六一散解之俟熱退後方可用保元湯熱甚者大連翹飲○若大便閉結致目不通而不灌者宜豬膽導之使氣得疏通則營衛相與不然恐成黑陷也○有觸穢氣而不灌者外宜薰解用胡荽酒以辟邪氣內服紫草木香湯或紫草快斑湯

程氏曰。凡頂陷無膿者爲逆。但得根窠紅潤。血猶不散。急用保元湯和芎歸白芍丁香糯米煎熟。加人乳好酒溫服。○若色白如水晶。內無膿者治亦同。但得膿痘相間者猶可治。若純是水晶色者必死。○若地紅血散有熱者。去丁香加白芍地骨皮。以斂血退熱。○若寒戰咬牙。宜以木香散異功散選用。

程氏曰。凡正壯之時。有痘雖起壯。而皮膚無力。按之水漿就出。雖肉色不暗。此乃名禦假壯。至十一二日。决不能回漿結靨。內攻而死。可急用保元湯加丁香川芎糯米提氣灌膿自愈。此即名內托也。凡內托之法。即保元湯加川芎丁香便是。不

必于金內托也。但按本方佐使用之。

一痘將灌膿之時。忽而上有乾靨者。即倒陷證也。宜速用八珍湯或六物煎加金銀花牛蒡子連翹麻黃之屬。水煎熟調獨聖散服之。○服藥後。若乾者復起作膿。未乾者即壯而飽滿。或空地處再出補空小痘者上也。○若痘不作膿。空處或發癰毒者次也。○若連進三服。而乾者不應。未乾者不起。補痘不多。則最險證也。宜以十全大補湯加金銀花調治之。

一灌膿時發白泡如彈子者。用棗針刺去其水。外以滑石末敷之。內服保元湯加石檽皮茯苓以利皮膚之水。○如發紫泡乃毒溢皮膚之上也。此證必危。

一疳爛成片。膿水不乾者。用滑石末敷之。或敗草散敷之。加珍珠尤妙。

一痘瘡有重出者。凡痘瘡破損潰爛處。但得復腫復灌不致乾枯。或於原無痘處復出一層如初出之狀。亦以漸起發灌膿者。此皆餘毒未盡。賴其氣充實。毒不得入。故猶出於表。而不成倒陷。是皆逆中之順證也。但痘瘡重出一番。必其人能食而大便堅。乃足以勝其再作之毒。自無足慮也。如食少而大便潤者。宜用十全大補湯之類補而調之。若自利者。宜陳氏

十二味異功散肉豆蔻丸主之。蓋病久氣虛。惟利溫補。不可再解毒也。

結靨三朝治效二八

痘瘡灌膿之後。肥澤堅實。以手拭之。瘡頭硬而微焦。此欲靨也。靨時乾淨無突陷崩凹。皴皺色蒼。蠟皮堅厚。外明內暗。尖利礙指者。此爲正靨。若痘雖似乾而痂薄如紙。或有內證未除。此痘之欲斂時也。尤宜調補。庶不復穿。

一痘瘡自出起至十日十一二日。當從口唇頭面。以漸收靨。但自上而下者爲順。自下而上者。務必察有他證。亟宜治之。

一將收靨時，而一向身溫，忽然發熱者，名為收漿，是亦常候也。此時不可輕用汗下。若有風寒外感，及飲食所傷，乃當隨證治之。

一痘瘡收靨太遲，或當靨不靨者，其證有數種，當詳辨治之。○大都當靨不靨之證，其脾胃弱中氣虛者居多，蓋中和氣順則自能發靨。若內使之成實，亦致潰爛也。但察其別無他證，而形色氣血俱虛者，宜內用十全大補湯，外用敗草散襯之。○若當靨不靨，發熱脉大，而別無他證者，此陰分之不足也，宜四物湯倍加芍藥、何首烏。○若血虛熱毒未清者，宜四物湯加牛蒡子、木通、山楂。○若因飲少脾胃氣虛，而不收者，宜六氣煎，或六物煎，加減主之。○若頗見泄瀉，脾胃弱，肌肉虛，或腹脹煩渴而不收者，宜陳氏十二味異功散，或木香散，外用敗草散敷之。○若當靨不靨之際，忽見頭面溫，足指冷，身不熱，或泄瀉腹脹，氣促煩渴，急與陳氏十一味異功散，或九味異功煎，遲則不救。○凡痘瘡將靨之時，而見泄瀉、煩渴、腹脹、咬牙等證者多難救。若與蜜水生冷等物，必須斟酌加減。凡○有因飲水過多，或觸於濕氣，以致脾胃虛弱，肌肉濕潤不收靨者，宜五苓散，或四苓散加山查利之。○有因熱毒未退，而

脉熱者，血不能營，當收不收者，若不速退，則身必內發為害，不急宜用消毒加芍藥、牛蒡子。○有內外俱熱，煩渴，大便秘濇，以致大便秘結，陰氣不行，當收不收者，宜內用內服清涼飲，或□黃丸以通其便，外用敗草散搽解毒法。○有天寒失於蓋覆，痘受寒氣而不收者，宜服五積散，外用乳香，或芸香於被內燻之。○有天熱過燠，痘被蒸，不收者，宜內服人參白虎湯，或五苓散、四苓散，以利濕熱，外用天水散撲之。○有為邪穢陰寒所觸，致傷元氣而不靨者，宜保元湯，或十二味異功散，外以辟邪丹薰之，猪髓膏塗之即愈。

一痘瘡內熱，毒邪未盡化，而乾靨太疾者，後必為目疾，或為癰毒及諸怪證，宜涼血養營，少清其火。若大便過於乾結者，宜微利之，以解其毒，當歸丸主之。

一痘瘡有膿結痂，則為善；無膿而靨，則為凶。此治之不可緩也。若痘已蠢成，不能結靨，而反致潰爛，或和皮脫去者，此名倒靨，乃外風入內也，急須以補中氣，以托其裏，宜六氣煎，加芍藥及紫草、防風、白芷之類。若其虛甚者，宜六氣煎加芍藥合四苓散主之。○如頭面靨後，腹中煩燥，得後□□濁，或遍身痂落，□又□□，□□□例不必過期，若其乳而飲食不減。

不爲大害。若服藥後不起不補。此毒已入深。最凶候也。

一痘瘡無論已潰未潰。於十二日之後。但得結痂。便爲佳兆。若痂皮不結。則必成倒靨。其有回之未盡。或遍身俱靨。而但有數顆不靨者。終致作痒抓破。亦難必其生也。速宜治之。

一靨時色白如梅花片者。此爲假靨。十一二日後當死。此不治之證也。如不泄瀉。可速用六氣煎或六物煎合二仙散。大進拔之。

一痘瘡成膿不靨。以致潰爛。膿汁淋漓。粘著疼痛。不可著席者。用敗草散。或蕎麥散以絹袋盛撲之。更多布席上襯臥尤佳。

或用秘傳茶葉方亦佳。○若欲面上不成瘢者。用救苦滅瘢散。以蜜水調敷之。

一痘瘡潰爛。先傷於面者。凶兆也。如飲食無阻。二便如常。更無他證者。宜內用十全大補湯。○如身熱內熱者。宜以解毒防風湯加當歸蟬退相間服之。外以救苦滅瘢散敷之。

一痘瘡於未貫之先。或曾傷犯破爛成瘡。及諸瘡收靨。此獨不靨。膿汁不乾。更多湧溢。若不急治。漸成疳蝕。損傷筋骨。以致橫夭。宜服十全大補湯。外敷救苦滅瘢散或白龍散。

一痘瘡倒陷成大疱。內得有血水者。急用六氣煎或六物煎主之。外以白龍散敷之。

一痘有臭氣。凡當收靨之時。臭而觸鼻者。此痘瘡成熟之氣。非邪氣自內而出也。爲吉。○若臭如爛肉。腥穢不可近者。此雖似結痂。未可爲真。急須清熱涼血。宜涼血養營煎。或解毒防風湯。○若於發熱之時。便見臭者。此熱火薰蒸之氣積於中而見於外也。大凶。速宜清熱。以解其毒。○若痘瘡潰爛不靨而臭不可聞者。名爲爛痘。而亦有收靨無事者。只要胃氣不衰。飲食如故。不作煩躁。則爲可治。宜用八珍湯。或四味消毒飲。外用敗草散敷之。

一痘瘡靨後。而有生瘡潰爛成坑者。須用托裏消毒散。或解毒內托散主之。如氣血俱虛而不歛者。必用十全大補湯。○如遍身瘡多潰爛。深而無氣血者必死。

靨後落痂治法　二九

痘痂結黏。自當依期脫落。其有應落不落。及延綿日久者。此亦不可不察而治之。以防他變也。

一結痂至半月一月。粘肉不落。或發痒者。此必表散太過。傷其津液。以致腠理虛澀。無力脫卸故也。宜用人參固肌湯。或以真酥油麻油潤之。○如久而不脫。宜六物煎加黃芪肉桂蟬

退去之。切不可勉强剝去，恐傷皮膚，再時難愈。

一遍身結痂雖完，若餘熱未退，黏著肌肉，或身熱，或煩渴，而痂不落者，宜涼血養營煎，或解毒防風湯，酌宜用之。○如熱甚者，宜大連翹飲加地骨皮主之。○外宜用滑石爲末，以蜂蜜調勻，雞翎掃潤痂上即落。

一痘瘢突起作痒不止者，此熱毒未盡也，宜解毒防風湯主之。

一痘瘢發痒，剝去痂皮，或血出，或復成膿如瘡疥者，此血熱氣虛也，宜四君子湯，或四物湯加紅花、紫草、牛蒡子治之。

一收靨既而痂不落，昏昏欲睡，此邪氣已退，正氣未復，脾胃虛弱也，宜五福飲，或調元湯緩緩調治之。若餘火未清者，宜酸棗仁湯。

一痘痂既落，中氣暴虛，多有不能食者，宜五味異功散，或養中煎以調之。

一收靨落痂之後，若餘熱不退，譫語昏沉者，用辰砂六一散，以小柴胡湯調服之。若大便秘結者，宜當歸丸利之。煩躁者，用大連翹飲最妙。

一原痘不甚稠密，痂如豆殼，雖痂落而痕白，或有餘熱不退者，雖過一日亦變凶，宜速用八珍、十全之類調補之。○或毒盛者，

仍須先用消毒散。

一痘痂既落之後，血氣未復，極當調護，切不宜澡浴，及令飲生冷，傷饑過飽，損傷臟氣，致生他病，將爲終身之患也，宜慎之。

痘後餘毒發熱 三十

凡痘無毒爽落，只要毒出得盡，而無所伏，其發以漸而透，其收以期而靨，豈尚有餘毒哉？若因不能盡發，不能透收，不能靨，其人自有餘毒，或渴而腹痛吐瀉，或小便赤澀，大便秘結，精神昏憒，四體倦怠，飲食減少，坐卧不安，是皆餘毒未淨之證。凡出之淨者，作三四次出，大小不一，至成漿收靨之時，於瘡窠中猶有補出者，此皆出之盡也。若只始出一層，後無補空之痘，此必尚有伏也。又發之透者，必於手足候之，蓋手足部遠，氣不易達，若能充和灌漿，氣願足，可謂發之透也。若只手斷不能成膿，此由氣由而不能旁達四肢，必有壅而伏者。又收之齊者，自面而下，痂皮漸脫，中無凹陷，謂之齊。若收之太早，或不成痂，此必有內陷之毒也。凡若此者，皆有餘毒，須察部位經絡，寒熱虛實，或補或和，或解或散，以平爲期。若治之不應，不已者，此壞證也，不必妄行攻擊。

一痘後發熱不歇者，此有虛實二證。如能食而煩渴，小便赤大

便秘者，實也，宜因順清涼飲，三黃丸之類主之。若痘後餘毒未盡，有諸熱證者，惟大連翹飲為最佳。如大便不秘，小便不赤，坐臥振搖，飲食少進者，虛也，宜調元湯或五淋散加芍藥之類主之。

心鑑云：痘後餘熱者，虛熱也。虛熱多發於午後，臉赤唇紅，或妄言譫語，切不可作實熱治，當用調元湯或保元湯加黃連，熱甚者宜大連翹飲。若妄用攻下，使胃氣一虛，則變生他患，致成壞證，不可治矣。

徐氏曰：痘後餘熱不除者，當量其輕重而治之。大熱則利小便，小熱則宜解毒。蓋利其小水，使心火有所導引，雖不用涼藥，而餘熱自無容留矣。小熱宜解毒者，蓋小熱不解恐大熱漸至矣。利水者宜導赤散，解毒者宜犀角地黃湯。若但身表發熱而別無他證者，止宜柴胡麥門冬散。

禁忌　二

一痘瘡起發之初，全要避風寒，遠人物，節飲食，守禁忌。若到養漿之時，尤宜謹慎。如天氣大熱，則撤去衣被，常令清凉。但謹門窓帷幔，勿使邪風透入。如天寒則宜厚添蓋覆，房中勿絕燈火。如或作痒，須為撫摩，勿使搔破，以致難貫，最當慎也。

一痘瘡房中，凡淫穢腥香之氣，及僧道師巫之人，或冒寒怒震聲，掀被掃地，對向搔癢，對面梳頭之類，皆不可不避。

一房中欲辟臭穢，惟燒辟邪丹，或紅棗，或黃熟香，皆佳。若蒼术之氣則大峻也。

一飲食最宜調和，無使太過不及。或好食何物，有不宜者，但少與之，以順其意。若禁閉太嚴，使之忿怒，恐反助火邪，但不可縱耳。至若助火生風，及葱蒜泄氣等物，皆所當慎。

一痘瘡前後，大忌猪肉魚酒之物，犯之者，終身瘢痕。

一痘瘡平復之後，勿與雞鴨蛋食之，則傷神。

一痘疹退後，須避風寒，戒水濕。如犯其邪，則終身為患，瘡無有休日。

東垣曰：痘瘡宜避一切穢惡之氣，及外人入房，遠行勞汗氣，腋下狐臭氣，房中淫液氣，射香臊臊氣，婦人經候諸血腥臭氣，硫黃蚊烟氣，刮缸使桶氣，燒頭髮氣，吹滅燈燭氣，雞毛魚骨氣，葱蒜韭薤氣，已上皆不可犯，須要房常燒乳香之類甘香之氣，使之漸聞，則營衛和暢，可無倒靨陷伏等患。

陳氏曰：凡痘疹熱渴，切不可與瓜柿蜜水等冷物，及清凉飲，消毒散等藥。恐損脾胃，則腹脹喘悶，寒戰咬牙而難治。一輕變

重者犯房室不忌口，先曾渴飲冷水何涼藥也。重受風寒者，避風寒，常和緩大便稠也。

薛氏曰：前證若兼吐瀉，手足指冷，屬內虛寒，而外假熱也，故忌寒涼。若大便不通，渴欲飲水，則涼水之類又當用也。但當審其熱之虛實可也。今北方出痘，多有用水餌不愈者，蓋北方多睡熱坑故也。

出不快三二

陳氏曰：凡痘瘡出不快者，多屬於虛。若誤謂實熱壅盛，妄用宣利之藥，致臟腑受冷，營衛澀滯，不能運達肌膚，則不能起發充滿，亦不能結實成痂，後必癢塌煩躁喘渴而死。

薛氏曰：前證亦有各經熱盛壅遏而出不快者，亦有毒甚於疔而不能起發者，亦有餘毒而潰爛者，當細審其因而藥之。

景岳曰：按此二子之說，皆為有理。但此出遲不起之說，總是氣血內虛，不能速達者為最多。若風寒外閉，及痘疔留毒而不出不起者，雖亦有之，但不多耳。再若各經熱盛而壅遏不出者，則尤為最少。何也？蓋熱盛者毒必盛，毒盛者勢必疾速，而或密或早，無能緩也。故凡治此者，必當察其熱之微甚，以辨虛實；再察外邪之有無，以辨表裏。如無外邪，亦無痘疔，而火

邪不甚者，則悉屬虛證，宜從溫補，不得雜用以致遲留後悔也。諸治法詳報痘三朝治款條。

陷伏三三

凡痘瘡之法，其出欲盡，出不盡者伏也；其發欲透，發不透者倒陷也；其收欲淨，收不淨者倒靨也。伏惟一說，陷有數種。凡毒之伏者，患在未出之先，其人必躁亂而熱不少減，或煩渴，或躁悶，此必有伏毒未得全出也。陷則患於既出之後，其血漸乾而變黑者，謂之黑陷；漿膿未成而為痒塌，或破損者，謂之倒陷；漿膿既成，而復濕爛皮破，不肯結靨，收不乾淨者，謂之倒靨，亦陷類也。是皆惡候。凡治此者，使非從峻之劑，安能望其回生？時醫欲以尋常之藥救此危病，其猶放雀擒鷂，驅羊敵虎耳。故其輕者宜奪命丹，重者宜神應奪命丹，則其庶幾耳。倘服藥後而反增黑色者，為必不治之證。

痘之留伏，毒不盡出者，證有不同，當辨治之。○有元氣不足而托送無力者，此必稟賦素弱，飲食素少，身無大熱，而出有不透，乃不足之證也，宜十宣散、蟬退膏之類，加獨聖散主之。○若虛而有熱者，宜人參透肌散。○有毒盛氣滯，留伏經絡而出不透者，必其人氣體厚濁，身有大熱，而汗不易出，即皆

有餘之證宜荊防敗毒散主之若表裏俱熱外有大熱內有秘結煩滿而留伏不透者宜雙解散

一乾黑不起而倒陷者當分五證○一則內虛而陽氣不能外達故致出而復沒或斑點白色或見灰黑倒陷者必其人不能乳食或腹脹內寒或手足冷或吐瀉或寒戰咬牙皆內虛也速宜溫中輕則十宜散六氣煎甚則陳氏十二味異功散或九味異功煎外用胡荽酒噴之或更用十全大補湯但得冷者暖陷者起黑者紅活便是佳兆若服藥後而反加煩躁昏亂者死○二則毒氣太盛內外薰灼不能盡達於表因而

復陷於裏乃致熱煩躁擾氣喘妄語或大小便不利渴而腹脹是皆毒氣之倒陷也輕者利小便宜大連翹飲通關散或四順清涼飲甚者通大便宜承氣湯仍外用水楊湯浴之得利後瘡出則佳更用加味四聖散調治之凡治此者但得陽氣不敗脾胃溫煖身溫欲飲水者生若加寒戰身冷汗出耳尻反熱者死○三則外感風寒肌竅閉塞血脈不行必身痛或四肢微厥斑點不長或變紫黑如癮疹者此倒伏也宜溫肌散邪用桂枝葛根湯加麻黃蟬退或紫草飲外用胡荽酒噴之仍令溫煖其寒使熱氣得行則痘自長矣○四則或因誤下毒氣入裏而黑陷者先宜六氣煎或溫胃飲以培養胃氣如表有未解者後宜柴葛桂枝湯以疏散於外甚者再加麻黃○五則以房室不潔或為穢惡所觸而黑陷者宜內服紫草飲外用胡荽酒噴之或用茵陳薰法并用辟邪丹

將起發時雖有紫水但色見黑黯者最為可畏急宜六氣煎加川芎以養血氣但氣旺則毒自散而色自活矣或以十全大補湯合無價散主之

凡倒靨之證亦須看大便何如若大便秘結而內熱者宜利之以四順清涼飲或二黃丸主之○若大便不實而內不熱

者宜補之以六氣煎或十全大補湯加防風白芷甚而泄瀉者宜陳氏十二味異功散○有雖不泄瀉而虛寒甚者宜九味異功煎仍外用敗草散

治陷伏證有三驗法凡服藥之後但得陷者復脹漸以成膿乃一驗也若原瘡已乾而別於空處另出一層起發成膿漸以收靨者二驗也亦有不腫不出只變自利下去膿血而飲食精神如故者三驗也有一驗者吉無則凶

痒塌抓破 三四

訣云虛則痒實則痛又曰諸痒為虛此固其辨矣然實邪兼熱

也。虛即兼寒也。蓋如瘡瘍之痛，必由乎熱，今不作痛而作痒，此其無熱可知。無熱由乎陽虛，陽虛便是氣虛，所以切起作痒爲火者，皆謬也。且凡痘瘡發痒，則多爲不起不灌，而癢陷繼之，最可慮也。故凡治痒之法，雖云當補，然尤不可不溫，惟溫補則營衛和，氣血行，而痘自起矣。痘毒既起而透，則多有作痛，尚何痒哉？故痘於起發之時，則宜痛不宜痒也。然痒有數證，亦當辨治如左。

一痘瘡初見點，便作痒者，此邪在半表半裏之間，而進退遲疑，總由元陽無力，欲達不能也。速當溫補陽氣，兼以疎散，但使

腠理通暢，則痘自起，而痒自止矣。宜六氣煎加川芎、白芷、防風、荊芥之屬。○若虛在血分而色白者，宜六物煎或五物煎加減主之。

一痘瘡出齊之後，但是作痒，俱宜保元湯或六氣煎，加川芎、當歸、防風、荊芥治之，或用十全大補湯，或用蟬退佗。

一血疹肥處皺裂皮肉，而作痒者，亦以氣虛而然，宜保元湯加芍藥、當歸以制血，或加丁香以治裏，官桂以治表，表裏俱實，自不作痒。

程氏曰：凡前後痒瘍，宜保元湯加何首烏、牛蒡子、白芍藥，何首烏須亦自兼用。

一痘瘡乾而作痒者，宜養血潤燥，以五物煎加防風、荊芥，外用茵陳薰法。

一痘瘡濕而作痒者，宜補氣去濕，以四君子湯加防風、荊芥、桂枝以解之，外用茵陳薰法。

一頭面爲諸陽之會，若痒而搔破，則泄氣最甚，速宜六氣煎或十全大補湯加防風、荊芥、何首烏之屬以培補之，但得復腫復灌，而飲食如常，則無害也。若痒不止，而滿面搔破者必死。

一遍身發痒，搔破膿血淋漓者，宜參芪內托散倍加當歸及白

芷、荊芥、木香，使氣和血行，其痒自止，外以敗草散敷之。

一瘡痒潰爛粘衣，連席難任者，內服十全大補湯加防風、荊芥，外用敗草散。

一痘瘡見形，而皮肉紅艷起發，而皮嫩多水者，其後多致痒痛也，急須先期調補之。

一痘瘡將收而痒者，其膿已成，其毒已回，邪散而正復，營衛和暢，故痒也。不須服藥，但謹護之，勿令搔破，以致損傷成瘢。

一將膿初化，膿未成而渾身瘙痒不寧者，此惡候也。速當溫補氣血，用六氣煎、六物煎之類，加以防風、白芷、荊芥之屬，必令

痒去方保無虞。若痒甚不休。搔壞皮膚。其毒從潰。謂之痒塌。
必不能活矣
活幼心書云。凡作痒不止。用荊芥穗以紙束之。用刺痒處。以散
鬱邪。其痒自止。此屢驗之法。內服消風化毒湯。加參芪以解
之。

作痛

痘瘡作痛。有實有虛。雖曰諸痛爲實。然此言亦不可執。若身有
大熱。而大便秘結。煩躁不寧。腹脹作渴而爲痛者。此實痛也。
若無大熱。而二便清利。脾氣不健。衛氣不充。營失所養。而作

痛者。此虛痛也。實者宜解毒清火。當用解毒湯。或四味消毒
飮之類主之。虛者宜補養血氣。當用保元湯。或六物煎之類
主之。

頭面腫 三六

經曰熱勝則腫。大抵毒盛者必腫。毒微者不腫。故亦可以腫與
不腫察毒之甚與不甚也。然痘瘡應期起發。毒必以漸盡出。
故頭面亦必以漸浮腫。此毒火聚於三陽之分。欲化膿漿。其
宜然也。然止宜微腫。而甚腫者大非所宜。○若當起發之時。
頭面全然不腫。必其痘稀毒少。氣血輕淺者然。此最吉兆也。

一痘以漸起。而以漸腫。及灌膿收靨。而腫以漸消。此常候也。如
應腫不腫者。必其元氣不足。應消不消者。必其毒氣有餘。須
急治之。
一有痘未起發。而頭面預腫。皮光色嫩。如瓠瓜之狀。此惡毒上
衝之候也。又有痘點已見。但隱隱於皮膚之中。肉目腫而痘
不起者死。○汪氏理辨曰。痘起五六日之際。有面目先腫
而光亮者。是陽乘陰分。毒不能發也。何也。血乃氣之本。氣乃
血之標。血有不足。則根本之力已虧。故致虛陽動作。其氣妄
行。而分隔陰不足之血。何能載毒而出。七日之後。傳經已足。

則氣退毒陷。陰陽各失其正。尙何可治之。有凡值此者。不可
不預調氣血。若待臨期。無能爲矣。
一痘正起發。頭面腫脹時。正面之痂切防搔痒。不可使之抓破。
少有損傷。以致真氣外泄。邪氣內蝕。則腫消毒陷。多致死矣。
但得破者復灌。消者復腫。飮食二便如常。則變凶爲吉矣。宜
十全大補湯。或合苦參丸治之。
一頭面腫脹。而眼目咽喉齒舌者。急宜解毒。服與咽喉相兼治
之。宜消毒化斑湯。大升麻。及大連翹飮主之。
一兼疫毒之氣。而頭項頸頷腫者。此必大頭瘟。及蝦蟆瘟之

攝。宜以疫氣治之。如大連翹飲及普濟消毒飲之類主之。但兼此者。亦多凶少吉也。

痘疔黑陷 三七

痘有紫黑枯硬而獨大。針撥不動。手捻有核者。是為痘疔。若不去之。則一身之痘皆不能起發。或皆變黑色。必致死矣。其有黑大而軟者。此名黑痘。俱不可作痘疔治也。

痘疔者。以熱毒留積。氣血凝聚而成也。然其類亦有數種。最為惡候。宜挑砭之。○有初出紅點。漸變黑色。其硬如石者。此肌肉已敗。氣血中虛不能化毒。反致陷伏也。○有肌肉微腫。狀

如堆粟不分顆粒者。此氣滯血凝。毒氣結聚不散也。○有中心黑陷。四畔突起戴漿者。此血隨毒走。氣不能充也。○有中心戴漿自破潰爛者。此氣血俱虛。皮肉敗壞也。○有為水泡溶溶易破者。此脾虛不能制濕。氣虛不能約束也。○有為血泡色紫易破者。此血熱妄行。而氣虛不能完固也。○有痘頭針孔漿水自出者。此衛氣已敗。其液外脫也。○以上數證雖與痘疔不同。而危險無異。但於五六日間候之。若見一證多不可治。

一凡痘疔及黑陷者。宜內服六氣煎。加川芎紫草紅花木通之類。以補血涼血。而疔自退。疔退後宜大進六氣煎。或六物煎外用四聖丹。以胭脂汁調點之。○疔若大者。用銀針挑破瘡口吸出惡血。入後藥末。即轉紅活。大抵黑陷而疔多。或餘毒不起者多死。○若痘疔挑去黑血。搽藥不變。仍是黑色者必死。

心鑑曰。痘疔見於四肢。不近臟腑者易治。若穿筋骨者亦難治。但有見於頭面腹背。漸近於內者。其勢必攻穿臟腑矣。如未穿者。急須治之。用飛過雄黃。以真蟾酥拌勻為丸。如麻子大挑疔點入立效。又或用巴豆一粒。去皮膜。合硃砂一分。研爛

點入一時。突出即愈。內服無價散。汲井水加豬尾血三五點調下

一痘瘡黑陷者。必氣不足。血不活也。急宜托裏散。或六物煎加川芎肉桂紅花蟬退。調無價散。或獨聖散。甚者宜九味異功煎。或十全大補湯。調無價散。仍外用四聖丹點之。○若見焦紫而黑。混身皆是。及身有大熱。或大便秘結。內熱煩渴者。此亦有火毒之證。宜四順清涼飲。或承氣湯。合萬氏奪命丹。以解其毒。俟火邪略退。即宜用六氣煎。調無價散。以托其內。亦可望其生也。

一痘瘡起發之時，但見乾燥，其根焦黑，乃當速治之。如火邪不甚，並無大熱者，惟五物煎或六物煎為最宜也。如有火證，火盛血熱，毒盛而焦黑者，輕則涼血養營煎，或犀栢子湯，甚則以萬氏奪命丹合而服之。

一原有瘡疥未愈，今痘出之時，其破處痘有攢聚而形色黑滯者，急以銀針挑破，吮去毒血，吐於水中，其血紅者可治，黑者難治。須內服加味四聖散，或萬氏奪命丹，外用萬氏四聖散塗之。

一臍後痘疔潰爛成坑，內見筋骨者，宜托裏消毒散，或荊防敗毒散加川山甲、蟬退、殭蠶，外用神效當歸膏，或太乙膏貼之，或以白龍散敷之。

飲食　三八

一痘瘡終始，皆以脾胃為主，但能飲食，則氣血充實，而凡起發灌漿收靨，無不賴之。故能食者，雖痘瘡稠密，亦自無害；不能食者，雖痘瘡稀少，亦為可慮。此脾胃之氣所當先也。然亦有不同，最須詳審施治。

一痘有毒氣正盛而不食者，當痘瘡正出之時，雖不欲食，但得痘出一具。小兒當也。蓋熱毒未解，於將出未出之際，多有不欲食者，待毒氣盡出，自能食矣。其有毒已盡出而仍不欲食者，當徐用四物湯加神曲、砂仁、陳皮一二劑，必能食矣。

一痘見灰白，別無大熱停滯等證，而食少或不食者，必脾胃虛也，宜五味異功散，或四君子湯。若胃中陽氣不足，不能運化而食少者，此虛而且寒也，宜溫胃飲、養中煎，或六氣煎主之。

一凡命門元陽不足，則中焦胃氣不暖，故多痞滿不食；下焦腎氣不化，故多二陰不調。此必用理陰煎加減治之，自見神效。勿謂小兒無陰虛證也。

一凡泄瀉或見惡心，或嘔吐而不食者，尤屬胃氣虛寒也。輕則理中湯、六氣煎，甚則陳氏十二味異功散，或用六氣煎合二仙散主之。

一凡脾氣不虛，但胃口寒滯，或痛或脹而不食者，宜益黃散。

一凡停食多食而不食者，宜大小和中飲以消宿滯，或五味異功散加山查、麥芽、神曲、砂仁，或合勻氣散治之。

一凡口瘡不能進食，或咽喉疼痛而不能食者，但清其咽痛，止自食矣，宜甘桔湯，或加味甘桔湯。

一凡外感風寒，邪入胃口，則不能食，須表散寒邪，邪散自能食

免宜加減參术飲或柴陳煎或五味異功散加柴胡

一痘後別無他證而飲食不進者此惟脾氣不足宜五味異功散或溫胃飲養中煎之類主之

程氏曰凡水穀不能運化而飲食不進者只用保元湯加陳皮麥芽神曲砂仁紅豆生薑嘔者加真藿香

徐氏曰痘瘡不乳食者有虛實二證或吐或利面目青白或青黑色者為虛寒宜溫之補之若大小二便乾澀面赤而紅瘡或渴或熱或目睛黃赤氣粗中滿者為實熱宜清之利之

咽喉口齒 十九

咽喉司呼吸之升降乃一身之橐籥也毒氣不能舒散則壅聚於此腫痛閉塞水漿難入則死生係之深可畏也首尾俱宜甘桔湯加麥門冬牛蒡子玄參杏仁或加味甘桔湯及拔萃甘桔湯俱可用○熱甚痛甚者宜東垣涼膈散加牛蒡子或以甘桔湯合黃連解毒湯加石膏木通牛蒡子山豆根射干錠外用玉鑰匙點之○咽痛便秘者宜四順清涼飲下之○以上證治必其能食內熱者方可用此寒涼之劑若上焦雖熱而下焦不熱或不喜飲食者只用加味甘桔湯徐徐嚥服不必用牛蒡子恐其性涼傷脾也

一咽喉腫痛凡痘疹多有是證但七日前見者為逆七日後見者無虞蓋起發灌膿之時內外之痘俱大以致氣道壅腫而然此痘也非喉痺之毒也待外痘既靨則內證自除矣不必治之

徐氏曰凡咽喉腫痛不能飲食者內服加味甘桔湯外看身上有痘之最大者此其毒氣相連宜用香油燈草燃而焠之一焠即愈或用手捻破以痘疔散塗之

陳氏曰凡身壯熱大便堅實或口舌生瘡咽喉腫痛皆瘡毒未盡宜用四味射干鼠粘子湯如不應宜七味白朮散

一痘瘡弄舌吐舌者脾之熱也輕者導赤散甚者瀉黃散

一唇口與五內相通故熱毒內發口舌必先受傷甚則口舌或紫或白或黑舌或腫大此皆實熱之證宜內服黃連解毒湯加石膏牛蒡子木通生地或東垣涼膈散若大便乾結者宜局方涼膈散外用玉鑰匙點之若口舌生瘡者以吹口丹或陰陽散敷之

一牙齦腫爛成瘡者此陽明熱毒內攻也殺人甚速宜甘露飲主之外用老茶葉韮菜根煎濃湯洗之仍用翎毛刷去腐肉洗見鮮血乃以砂灰丹或搽牙散敷之日三次或綿繭散亦

耳○若爛至喉中者，用小竹管將綿裹藥吹入喉邊。曰牙疳爛落，口唇穿破者，皆可敷藥而愈。然必有黃白膿水者方可治。若色如乾醬，其肉臭爛，日爛一分者，俱不治。

一牙疳臭爛，氣粗鼻扇，舌白至滿口臭如爛肉，大便腥臭血，肚腹脹痛，此由脾胃氣內攻，胃爛之證。若山根發紅點者，此疳毒內攻，故見於山根，亦胃爛之證，俱不治。

一痘疹退後，若有牙齦腐爛，鼻血橫流者，亦為失血之證，宜局方犀角地黃湯加山梔、木通、玄參、黃芩之類，以利小便，使熱毒下行。外用神授丹治之，不可緩也。若牙疳色白者，為胃爛，此不治之證。

痘瘡中論列方　四十

保元湯 痘一	調元湯 痘二
五味異功散 補四	四君子湯 補一
五福飲 新補六	九味異功煎 新因二二
四物湯 補八	五物煎 新因二
十二味異功散 痘三二	二陰煎 新補十
六物煎 新因二十	十一味木香散 痘三一
[illegible]散 痘二十	六氣煎

十全大補湯 補二十	十宣散 痘十四
八珍湯 補十九	六味回陽飲 新熱二
溫胃飲 新熱五	理中湯 熱一
七味白朮散 小七	養中煎 新熱四
理陰煎 新熱三	七味安神丸 小七三
金黃散 和十九	胃愛散 痘十九
黃芪建中湯 補二七	芎歸湯 痘十五
托裏散 痘四	參芪內托散 痘七
惺惺散 小二三	酸棗仁湯 補八五

人參固肌湯 痘十二	柴陳煎 新散九
柴葛煎 新因十八	人參透肌散 痘十三
柴歸飲 新因十五	蘇葛湯 痘二七
升麻葛根湯 痘二六	疏邪飲 新因十六
小柴胡湯 散十九	柴葛桂枝湯 痘三六
參蘇飲 散三四	柴胡飲子 痘四二
加減參蘇飲 痘一四	五積散 散三九
五柴胡飲 新散五	桂枝葛根湯 痘三七
雙解散 痘四	羌活散 痘一八

麻黄甘草湯 痘三五
益元散 寒百十二
拔毒煎 新因十九
柴胡麥門冬散 痘二四
天水散 寒百十二
敗毒散 痘一 又二
荆防敗毒散 痘三一
六一散 寒百十一
解毒湯 痘五一
黄連解毒湯 寒一
甘露飲 寒十
消毒散 痘四七
托裏消毒散 痘六
五苓散 和一八二
瀉黄散 寒五七
解毒內托散 痘五
四苓散 和一八七
退火丹 痘八四

實表解毒湯 痘五四
導赤散 寒一二二
苦參丸 痘九九
四味消毒飲 痘四八
當歸丸 痘九五
大和中飲 新和七
六味消毒飲 痘四九
二黄丸 攻六八
小和中飲 新和八
解毒防風湯 痘五六
承氣湯 攻一
肉豆蔻丸 小五六
消風化毒湯 痘五八
通關散 痘八五
橘皮湯 痘九二
凉血化毒湯 痘五九
獨聖散 痘七八
匀氣散 痘九三

普濟消毒飲 寒十
蟬退膏 痘四六
化毒丸 小九九
消毒化斑湯 痘五十
無價散 痘七九
三酥餅 痘八十
養血化斑湯 痘十八
敗草散 痘一六
抱龍丸 小八五
凉血養營煎 新因十七
胡荽酒 痘百十八
保嬰丹 痘百五
玄參地黄湯 痘八六
水楊湯 痘百二十
大連翹飲 寒七八
連翹升麻湯 痘二八
胭脂汁 痘一二五
犀角散 痘六二

犀角地黄湯 寒七九
猪髓膏 痘一二三
快斑湯 痘七三
快斑越婢湯 痘七四
蕎麥散 痘一二四
鼠粘子湯 痘七六
射干鼠粘子湯 痘七七
茶葉方 痘一二二
紫草飲子 痘六七
紫草木通湯 痘七十
门能惱 痘一二七
紫草飲 痘六六
紫草木香湯 痘六九
神授丹 因一五六
紫草散 痘六五
紫草快斑湯 痘六八
綿繭散 痘一四
如聖湯 痘十

加味甘桔湯 小九十　痧疔散 痘百十四
甘桔湯 因一七五　拔萃甘桔湯 因一七六
陰陽散 外一三三　四聖丹 痘百十五
參芪四聖散 痘八　吹口丹 痘一三六
玉鑰匙 因一九七　加味四聖散 痘十
搽牙散 痘二五　辟邪丹 痘百三十
萬氏四聖散 痘百十六　茵陳薰法 痘百十九
人參白虎湯 寒三　四順清涼飲 攻二五
別方涼膈散 痘十九　[illegible]涼膈散 痘八三
[illegible]紫草湯 痘九四　錢氏奪命丹 痘八二
神應奪命丹 痘八一　救苦滅瘢散 痘一二八
萬氏牛黃清心丸 小九四　神效當歸膏 外一三四
太乙膏 外三百八

景岳全書卷之四十五烈集　痘疹詮

會稽　張介賓　會卿著
瀛海　賈　棠　青南訂

痘瘡 下

總論吐瀉 四一

凡痘疹吐瀉，有不必治者，有當速治者。如初熱時即見吐瀉，但欲其不甚，而隨止者是也。蓋吐利中自有疏通之意，邪氣賴以宣泄，不必治也。其有吐利之甚者，則不得不治。又有元氣本弱而見此證者，使不速爲調補，必致脾氣困憊，則痘出之後，虛證叠見，而救無及矣。知此痘前之吐利，其當治不必治，自有輕重之分也。若見點之後，則吐瀉大非所宜，速當察其寒熱虛實而治之。

[illegible]吐瀉[illegible]多[illegible]臟腑經絡，然亦有三焦五臟之殊。蓋病在上焦，則吐而不利；病在下焦，則利而不吐；病在中焦，則上吐下利。故在上焦者，當辨心肺之胃氣；在下焦者，當察肝腎之脾氣。此五臟之氣，各有相成相制之機，設不明此，解不誤矣。

一痘瘡吐瀉，大都中氣虛寒者十居七八，然亦有邪實熱盛及

飲食過傷而爲吐瀉者此宜詳審脉證有可攻者若果有熱毒實邪則不可誤認虛寒輕用溫補恐反助邪以致餘毒癰腫或爲潰爛難收等證

嘔吐 四二

凡痘瘡嘔吐大都虛寒者多實熱者少但當以溫養脾胃爲主倘或有痰涎者亦必有實邪可據方可因病而兼治之故不得輕用寒涼及消耗等藥

一凡嘔吐之病病在上中二焦也切不可妄用下藥致犯下焦元氣則必反甚而危矣即或有大便不通者亦當調補胃氣從緩利導但得脾胃氣和則升降調而便自達此不可不知也

一痘瘡別無風寒食滯脹滿疼痛等證而爲嘔吐或乾嘔惡心者必脾胃虛寒也宜六味異功煎五君子煎參薑飲之類主之或溫胃飲理中湯皆可酌用

一脾氣微寒微嘔而中焦不寒者宜五味異功散

一胃口虛寒嘔吐而兼有痢瀉者六味異功煎送神香散或調中湯亦佳

一脾胃虛寒吐瀉並行者溫胃飲甚者陳氏十二味異功散

一脾腎虛寒命門不煖而爲吐瀉者必飲食不化水穀不分而下腹多痛非胃關煎或理陰煎不可

一凡寒氣犯胃腹脹腹痛而爲嘔吐者神香散益黃散或加炮薑若因飲水或食生冷瓜果而作嘔吐者五苓散加炮薑

一飲食過傷停滯胃口脹悶脹滿而爲嘔吐者宜和胃飲或大和中飲或神香散

一痰飲停畜胸膈而脹滿嘔吐者宜二陳湯或橘皮湯加炮薑

一三焦火盛煩熱壅滯胃口而爲嘔吐者此必陽明火證也宜橘皮湯加黃連甚者再加石膏或用竹葉石膏湯但此證甚少勿以虛火作實火也

程氏曰凡痘瘡嘔吐之證須辨冷熱熱吐者宜六君子湯加薑汁炒黃連冷吐者宜六君子湯加丁香藿香白豆蔻

一痘瘡嘔吐不已發渴而熱或乾嗽者最是痘家惡候

泄瀉 四三

凡痘瘡首尾皆忌泄瀉而後爲尤甚惟初熱時有隨瀉而隨止者爲吉若自見點之後以至收靨毒氣俱已在表俱要元氣內充大便堅實庶能托載收成苟略泄瀉則中氣虛弱變患百出矣若初出之後而見泄瀉則必難起難灌既起之後而見

泄瀉。一瀉則氣傷。瀉止則氣滯。既滯之後。而見泄瀉則倒靨。倒靨。內潰。內敗。等證。無所不至。此實性命所關。最可畏也。今多見妄藥誤治。敗人脾氣。以致莫救者。猶云欲去其毒。獨瀉無害。欺耶昧耶。庸莫甚矣。

凡治痘疹泄瀉。只在辨其寒熱。熱者必濕滯之有餘。寒者必元陽之不足。但十瀉九虛。而實熱者極少。故凡見泄瀉嘔吐腹痛。而別無實熱等證者。無論痘前痘後。俱速宜溫救脾腎。此大要也。當詳察之。若失其真。誤治則死。

一虛寒泄瀉。凡證無大熱。口不喜冷。脈不洪數。腹無熱脹。腹無煩躁。飲食減少。而忽然自利者。則皆屬虛寒。切不可妄用寒涼之劑。再傷脾氣。必致不救。宜溫胃飲、養中煎、五君子煎。或理中湯、四君子湯之類。隨宜用之。○若腹有微滯微脹而為泄瀉者。宜六味異功煎。或五味異功散加砂仁。○若泄瀉兼嘔兼痛。而氣有不順者。宜養中煎加丁香木香。或四君子湯合二陳湯。○若泄瀉而山根發白。微見青色。或口鼻微冷。手足不熱。指尖微冷。瀉色淡黃。或兼青白。或露睛。此皆脾腎虛寒之證。非速救命門。終不見效。宜胃關煎、理陰煎主之。或陳氏十二味異功散亦可。○若泄瀉多甚。用溫脾之藥不效者。則必用胃關煎。或理陰煎之類主之。○若久瀉滑脫不能止者。宜胃關煎、溫胃飲。或陳氏十二味異功散。送五德丸。或肉豆蔻丸。○若胃本不虛。但以寒涼傷脾。或飲水而為泄瀉者。宜佐關煎、抑扶煎。或益黃散加豬苓澤瀉。或五苓散俱佳。

一若熱泄瀉。本不多見。而間亦有之。然必有熱證可據。方可用清利之藥。如脈見洪數。身有大熱。口有大渴。喜冷惡熱。煩躁多汗。或中滿氣粗。或痘色紅紫。或口鼻熱赤。小水澀痛之類。皆熱證也。且熱瀉者必暴。而寒瀉者必徐而緩。皆可辨之。然治熱之法。當察火之微甚。勿使藥過於病。恐致傷脾則必反為害。○凡濕熱內蓄。小水不利。微熱不甚而為泄瀉者。宜五苓散、四苓散。或小分清飲之類。加木通主之。○若濕熱稍甚。清濁不分而泄瀉者。宜四苓散加黃芩、黃連。或合黃芩湯治之。○若食多脈盛。氣壯而泄瀉者。當從熱治。宜黃芩湯加黃連。○若熱在下焦。小水赤澀而泄瀉者。宜大分清飲。或合益元散。○若濕熱在脾。泄瀉內熱。而兼腹痛者。宜香連丸。○若煩渴身熱。頭痛咽疼。口瘡煩燥而泄瀉者。陽明火證也。宜瀉黃散。○若濕熱在腸。瀉而兼嘔者。黃芩湯加半夏生薑。或御藥大半夏湯加黃芩。○若內熱泄瀉。而兼氣虛者。四

君子湯加芍藥黃連木香

一發渴。乃泄瀉之常候。若水泄於下。則津涸於上。故凡患泄瀉者。必多口乾口渴。但乾與渴不同。渴者欲飲。乾者不欲飲。渴屬陽而乾屬陰。此其辨也。然有渴欲飲水者。此火證也。有渴欲飲湯者。此非火也。有雖欲飲水而不能多者。有口雖欲漱而胸腹畏寒者。此皆非火證也。然則病渴者。尙有陰陽之辨。而矧夫但乾而不渴者。此實以水虧而然。若作火治。鮮不爲害。故凡有久瀉津亡而作渴者。當審其非熱。而不可不壯其水也。

程氏曰。泄瀉須分寒熱。寒者小便清。宜理中湯或參苓白朮散。然白朮茯苓。非泄瀉發疱者不宜用。以其滲利故也。○按此說。可見治痘者。即滲利亦忌。顧可妄爲消伐。以殘其氣血津液乎。

陳氏曰。凡瀉頻津耗。則血氣不榮。瘡雖起發。亦難收靨。如身溫腹脹。氣促咬牙。煩燥譫妄者。皆難治。緣穀食去多。津液枯竭。故多死也。速宜與十一味木香散或十一味異功散。

萬氏曰。瘡未出而利者。邪併於內。裏實也。宜從清解。瘡已出而利者。邪達於表。裏虛也。宜治其虛。凡痘瘡所忌。惟內虛泄瀉。若溫之固之而不愈者。此不治之證。

寒戰咬牙　四四

寒戰者。陽中之氣虛也。陽氣虛則陰乘之。陽不勝陰。故寒慄而戰也。咬牙者。陰中之氣虛也。陰氣虛者。腎元憊。肝氣消索。故切齒而鳴也。總之虛在氣分。則無非陰盛陽虛之病耳。非大加溫補不可也。

心鑑云。七日前見寒戰者。表虛也。咬牙者。內虛也。七日後見寒戰者。氣虛極也。咬牙者。血虛極也。氣虛者保元湯倍加肉桂。以助陽分。血虛者保元湯加芎歸以益陰分。○余常用六氣煎。或六物煎。加桂附治之。無不應手而止。其有獨寒戰。獨咬牙者。亦一體治之。或合二仙散用之亦妙。

一有寒邪在表。身體大熱。脈緊數無汗。邪正相爭而爲戰慄者。此即似瘧之類。但散其邪而戰自止。宜柴葛桂枝湯之類主之。

一痘瘡灰白濕爛。泄瀉而寒戰咬牙者。此純陰無陽之證。宜九味異功煎。或陳氏十二味功散亦可。

一痘色乾紫黑陷。大小便不通。煩躁大渴。而寒戰咬牙者。此純陽無陰。火極似水之證也。宜雙解散。

一發斑結痂之時有紅紫微腫大小便秘煩渴喜水者乃表裏俱熱之證以致痛而振慄恐痛而咬牙也此非寒戰咬牙之屬如熱甚而便秘者宜四順清涼飲加連翹木通金銀花之類主之

一筋惕肉瞤似戰者以經絡血氣爲痘所耗不能榮養肌肉主持筋脈故惕惕然肌肉自跳瞤瞤然肌肉自動本非寒戰之證也宜十全大補湯之類主之

陳氏曰咬牙者齒槁也乃血氣不榮不可妄作熱治

一寒戰咬牙而氣喘譫妄悶亂足冷者非倒陷即倒靨也不治

煩躁四五

煩者擾擾而煩躁者煩劇而躁合言之則煩躁皆熱也分言之則煩在陽分躁在陰分煩淺而躁深也雜病集曰火入於肺煩也火入於腎躁也痘疹煩躁大非所宜若吐利厥逆腹脹喘渴譫妄狂亂悶不知人而煩躁者謂之悶亂乃不治之證痘瘡以安靜爲貴若忽然煩躁多哭切須詳審其證如痘無逆證而忽然若此是必瘡有痛而然作膿成則痛止而煩亦止矣不必治也其或飲食寒熱偶有所因而致然者但當隨證調理之則無不即安者

一痘瘡煩躁兼喘者火毒在肺也宜人參白虎湯加梔子仁

一煩躁多驚者火在心經也宜導赤散加梔子麥門冬或七味安神丸

一痘毒未透熱伏於內而煩躁者宜六味消毒飲或兼萬氏奪命丹

一熱甚於內而煩渴煩躁者宜導赤散或玄參地黃湯加木通麥門冬或萬氏牛黃清心丸或四味消毒飲

邪毒未解熱甚於表而煩躁者宜柴胡麥門冬散或羌活湯

一痘瘡紅紫乾燥壯熱口渴譫妄者退火丹或萬氏牛黃清心

丸或用良方犀角地黃湯

陰虛假熱自利煩躁者肝腎水虧也輕則五陰煎甚則九味異功煎或陳氏十二味異功散

一吐利不食而煩躁者脾氣虛也輕則保元湯溫胃飲甚則九味異功煎或陳氏十二味異功散

一痘將膿成營血虧耗心煩不得眠者宜二陰煎加麥門冬如有微火者宜酸棗仁湯

晝則煩躁夜則安靜此陽邪盛於陽分也宜人參白虎湯或加梔子如晝則安靜夜則煩躁者此陰中之陽虛也宜二陰

煎。如有火邪，亦可加梔子仁。
一大便乾結不通，而煩躁腹脹者，因腸滿實熱，當歸丸，甚則承
氣湯。若大便秘結，痘瘡將伏，而煩躁者，百祥丸、攻承氣湯。

喘急 四六

喘有氣促不同。喘者氣粗而聲壅，而急喘，爲肺邪有餘也。促者
氣促而短，上下不相接續，促爲肺腎不足也。此二者，一實一
虛，反如氷炭。若或誤治，無不死也。當詳辨之。
一寒邪在肺作喘者，此外感之證，必發欬嗽多痰，或鼻塞，或身有
發熱，或胸滿不清，治當疎散肺邪，宜六安煎，或二陳湯加蘇

葉主之。若寒邪外閉之甚者，仍宜加麻黃、北細辛之類。○若
兼氣血不足，仍風寒在肺作喘者，惟金水六君煎爲最。
一痰因火動而爲喘急者，當以清痰降火爲主。若痰涎上壅者，
先治其痰，宜抱龍丸、清肺飲之類主之。○若火上刑肺，肺熱
喘躁，大熱大渴者，宜人參石膏湯。○若微熱作渴，肺燥液衰
而喘者，宜人參麥門冬散。○若夏月熱乘，火犯肺金而喘者，
仲景竹葉石膏湯，或六味竹葉石膏湯。○若火伏三焦，肺胃
大腸俱熱，胸腹脹，大便秘結而喘者，前胡枳殼湯。
一喘以氣虛者，人多不能知之。凡下瀉而上喘者，必虛喘也。凡

小兒喘見，見在鼻尖，而氣不長者，必虛喘也。此實氣促，原非
氣喘。若見此證，急須速補脾肺，或救腎陰。輕則參薑飲、六氣
煎，甚則六味回陽飲。○若下爲泄瀉，而上爲喘促者，急用六
味回陽飲，或九味異功煎，不可疑也。○若大便不瀉，而或爲
多汗，或爲腹脹，或見痰飲狂躁，但以陰虛水虧，氣短似喘，而
脉氣無神者，急宜貞元飲，加人參、猴薑之類主之。○若治喘
促，用清痰降火等劑而愈甚者，此必虛證也，速宜改用溫補
如前諸法。稍有可挨遲，則恐無及矣。
一痘疹發喘，乃惡候也。若利止喘定者生，其有瀉利不止，或加

腹滿，或爲狂躁，或痘毒入肺，口張息肩，目閉足冷而喘甚者，
皆不治之證。

聲音 四七

痘瘡最要聲音清亮，若卒有失音，凶兆也。先哲云：痘已出而聲
不變者，形病也，其病輕；痘未出而聲先變者，氣病也，其病甚；
痘出而聲不出者，形氣俱病也。凡此失音之證，大爲痘瘡所
忌。然亦有吉有凶，須當詳辨治之。
一風寒外襲皮毛，壅閉肺竅，或致欬嗽而偶爲失音者，此惟外
感之證，宜解散之，以加減參蘇飲，或二六安煎，加薄荷、桔梗主

名或待風寒解散，其聲自出，此因無足慮也。

一火邪上炎，肺金受制，氣道壅閉而聲不出者，宜導赤散合甘桔湯，加炒牛蒡子主之；或用甘桔清金散。

一上焦陽虛而聲音低小不出者，此心肺不足之病。蓋心主血，肺主氣，痘瘡稠密，則血氣俱損，故聲不能出，宜八物湯加麥門冬，或導赤通氣散主之。

一下焦陰虛而聲不出者，其病在肝腎。蓋腎爲聲音之根，若痘由肝腎而出，痘瘡稠密，則精血俱爲耗竭，水虧則肺涸，故聲不能出。速當滋陰益水以救其本，宜大補元煎、五福飲，或十全

大補湯之類，酌宜用之。

一凡啼哭無聲，而但見淚出，啞言無聲，而但見口動者，此皆毒氣歸腎，而內敗也。或聲啞如破，如梗者，此咽喉潰爛也，皆難治之證。

一痘後餘毒久留，其證有二：一以咽痛不能言者，此毒氣不淨也，宜甘桔清金散加天花粉；一以腎氣虛不能上達而聲不出者，宜治如前，或用四物湯加麥門冬、白茯苓。

驚搐 四八

一[illegible]初忽然驚惕而手足搐搦，目眼斜視，或多忽作忽止，其證多由風熱。蓋心主火而惡熱，肝主風而善動，驚痘之火內生於心，心移熱於肝，風火相搏，故發驚搐。然未出之先發驚搐者多吉，既出之後發驚搐者多凶，何也？蓋痘毒將散，而谿谷關節，腠理疏解，因致牽引伸縮，得疏散注之氣，痘出而驚自止，則其內毒無留於此，可見故俗名驚痘，最爲吉也。若既出之後，則中之伏火亦宜散矣，倘仍見驚搐，則是外毒已出而內毒猶然未盡，此其毒盛莫測，乃可畏也。故凡發驚搐者，必審發隨止者爲吉，不必治也。若連發不已，此毒伏於心肝二臟，速宜隨證治之，不得誤以爲吉證。

一治驚搐之法，最當察其虛實，酌其微甚。如果有風熱實邪，庶可解毒清火，但得稍見清爽，便當培養心脾，以防虛敗之患。若止見微邪，則但當以調和氣血爲主。

一驚搐之證，多由風熱相搏，故治宜平肝利小便，蓋平肝則風去，利小便則熱除，風熱既平，驚自愈矣。若過用寒涼，則氣斂而毒反留伏，痘出不透，多致不救。

一心脾陽氣虛怯，則神怯而易爲驚惕者，六氣煎加棗仁、硃砂。

一心脾血虛而驚搐者，七福飲、養心湯。

一肝膽氣虛，多恐畏而驚惕者，茯神湯。

一心血虛睡中驚搐，或兼證疾者，秘旨安神丸。

心虛火盛，多熱躁而驚搐者，寧神湯、酸棗仁湯。

一痘既出，其色紅紫，而煩渴驚搐者，良方犀角地黃湯（）若煩熱之甚，而大便乾澀者，多由陽明之火，人參石膏湯加硃砂。

一心火獨盛而煩熱驚搐者，硃砂安神丸，或七味安神丸。

一心火盛，小水不利而驚搐者，導赤散加黃連硃砂，或合硃砂益元散。

一痰涎壅盛，氣急胸滿而驚搐者，抱龍丸、清膈煎，或梅花飲、琥珀散。此宜暫用，以開痰涎，但得痰氣稍清，即當酌虛實以調理血氣。

一肝膽實熱，大便秘結而煩躁驚搐者，瀉青丸，或七味龍膽瀉肝湯。

血熱見血而驚搐者，仿方犀角地黃湯（）熱甚者，良方犀角地黃湯（）若熱甚而大便結秘者，拔萃犀角地黃湯。

風寒外感，心脾陽虛，而微熱不退，或欬嗽惡寒而驚搐者，惺惺散（）若虛在陰分，汗不能出，身熱不退而驚搐者，柴歸飲（）若外有風邪，內有熱邪，表裏俱熱而驚搐者，牛蒡散。

風寒外感，身熱無汗，但有表邪，別無虛證而驚搐者，敗毒散。

或穢毒湯。若表邪閉甚者，紅綿散。然此皆表散之劑，若表虛證不得單用此類。

昏睡　四九

凡痘疹將出未出，而猝然昏睡者，其症必重，當察其脈證虛實，預為治之。若痘後喜睡，此毒氣已解，元氣將復，故邪退而神安，乃否極泰來之象，不須服藥妄治。如見寂然氣虛，但以調元湯、保元湯、六物煎之類，察其寒熱，漸以調之，自然平復。不可妄行消耗，致傷其脾，久必害矣。

腰痛　五十

經曰：腰者腎之府。又曰：太陽所至為腰痛。蓋足太陽之脈，夾脊絡腎，而痘瘡之毒，多出於腎，循足太陽膀胱經行諸經，乃邪之由裏傳表也。如初見熱而腰即痛，或日以漸甚者，此邪由膀胱血入於腎，而毒有不能往也。急宜解毒以泄少陰之邪，以通太陽之經，務令邪氣不得深入，則痘雖稠密亦可無虞也。若不速治，則邪必日陷，而表裏俱甚，營衛之脈不行，臟腑之氣皆絕，或為痒塌，或為黑陷，終莫能救矣。

一凡痘毒自陰傳陽，自裏傳外者為順，自上傳下，自外傳裏者為逆。若毒由太陽傳入少陰，則毒行而不和，伏於骨髓之中

不能外達，所以腰痛。大凡痘疹之毒，歸腎則死，故但見腰痛，
急宜治療。若毒陷不起，即宜發散解毒，令其復出太陽而達
乎陽道，斯無害也。宜人參敗毒散，或五積散主之。若腎氣虛
陷，不能傳送外達者，必用理陰煎加細辛、官桂、杜仲、獨活之
類主之。

一治發熱便見腰痛者，以熱麻油按痛處揉之可止。仍急服前
藥之類。如小水不利者，宜五苓散。如火毒內盛而小水不利
者，宜四苓散加梔子、木通。

腹痛五一

治腹痛之法，當以可按拒按及宜飽宜飢，辨其虛實。不得謂痛無
補法，而悉行消伐也。又當因脈因證，辨其寒熱，不得妄用寒
涼也。大都實滯者十居八九，熱鬱者間或有之。若虛不知補
而寒因寒用，則害莫甚矣。

一初見發熱，痘瘡未出，別無寒滯食滯而腹脹腹痛者，此必起
發不透，毒氣內攻而然。宜解表疏邪，以化毒湯加紫蘇、厚朴
之類主之，或五積散加木香亦可。○若大便不通，腹脹而作
痛者，桂枝大黃湯酌宜用之。

一寒氣犯胃，或食生冷，而惡吐瀉，腹痛脹滿，而但有寒痛者，
溫胃飲、理中湯加肉桂、木香，或小建中湯，隨宜用之。○若胃
氣虛寒作痛而喜按者，黃芪建中湯。

一寒犯中焦，氣滯作脹而腹痛，或泄瀉者，和胃飲，或抑扶煎加
丁香、木香，或陳氏十一味木香散。

一脾腎虛寒，下腹作痛，瀉利不止者，胃關煎。

一誤飲冷水涼茶，寒濕留中，小水不利而腹痛者，五苓散，或加
木香，或用小建中湯。

一飲食停滯，中滿作痛者，大小和中飲，或保和丸加木香、砂仁。
若大便不通而痛甚者，赤金豆，或承氣湯利之。

一發熱二三日後，大便不通，燥糞留滯而腹痛者，當歸丸，或用
豬膽導法。

一濕熱下利，煩熱大渴，小水熱澀而腹痛者，大小分清飲，或黃
芩湯加木香、青皮、砂仁。

一火毒內攻，譫妄狂亂，而煩熱腹痛者，退火丹，或珠砂益元散。

腹脹五二

痘瘡腹脹之證，其要有二：一以脾胃受傷，一以邪氣陷伏。蓋痘
瘡將發，毒由內生，其證無不發熱，或見微渴，此其常也。當此
之際，只宜溫平和解，或兼托散，無抑遏，無窮追，無殘及元氣。

惟貴輕揚善達。但令毒氣達肌表則皆易而實無不善矣。或不知此。而見熱即退熱。見毒即攻毒。則未有妄用寒涼而不傷胃氣者未有。但知攻毒而不傷元氣者。胃氣傷則運行無力而脾寒所以作脹。元氣傷則托送無力而毒陷所以作脹。雖作脹之由。猶不止此。然惟此最多。而人多不能察也。諸未盡者俱詳如左。

一誤服涼藥。或過食生冷而作脹者。其人必不能食。或大小便利。或腹中雷鳴。此皆脾胃中寒之證。速宜溫中以疎逐冷氣。冷氣散則脹自消矣。宜益黃散加厚朴。或人參胃愛散加乾薑。○若胃寒兼虛。痘白神倦。或氣促發厥者。惟溫胃飲及陳氏十一味木香散俱爲要藥。○若寒在脾腎下焦不化而作脹者。非理陰煎不可。

一中氣本虛。或過用消伐。以致元氣無力不能托送痘毒而陷伏作脹者。宜十宣散。或合二妙散。或神香散。

一痘毒陷伏於裏者。必有熱證相兼。如煩躁乾渴大小便秘而作脹者。此只宜溫中快氣兼托之劑。當用紫草飲子。

一寒邪外閉肌腠。身熱無汗。或氣喘鼻塞。則痘毒不能外達而陷伏腹脹者。宜五積散。或加減參蘇飲。

一飲食過傷。偶爲停滯而腹脹者。此不過一時之滯。食去則脹消。宜大和中飲。或合二妙散。神香散。

一腹脹而目閉口中如爛肉臭。或大便泄瀉。或利膿血者。皆不治。

厥逆 五三

厥逆者。四肢不溫。或甚至於冷也。四肢爲諸陽之本。故常宜和煖。若至厥逆則其陽虛可知。如指尖微寒者。亦陽氣衰也。凡忌冷者。乃陰邪勝也。其有痘頭焦黑。煩渴悶亂。大便熱結而厥逆者。此陽毒內陷。火極似水。所謂熱深厥亦深也。又有痘本灰白。大便不結而厥逆者。此元氣虛憊。陽衰而寒也。凡痘疹之候。頭常欲涼。足常欲溫。若頭溫足冷者。多不治。故厥逆爲痘家惡候。

一痘疹下指微寒者。即宜五君子煎。六氣煎。或六物煎。加薑桂溫之。以防虛寒之變。

一痘疹有和氣虛而逆者。胃關煎。或陳氏十二味異功散。

一痘瘡始出手足便冷。或其人先有吐利。致傷脾胃。脾胃氣虛。則爲厥逆。宜六氣煎。六物煎。加薑桂主之。甚者人參附子理陰煎。

一痘瘡起脹之時。手足厥逆。此陽氣欲絕之候。必其自利或嘔吐。脉見沉細微弱。或浮大而虛。速宜溫補元陽。輕則六氣煎加肉桂。甚則六味回陽飲。或九味異功煎。服藥後手足和煖者生。厥不止者死。

一熱毒內甚而厥者。必有煩熱便秘。脹滿脉滑等證。宜四順清凉飲。或承氣湯。

一痘後厥逆者。此其氣血已虛。脾胃已困。無怪其有厥也。宜保元湯。或六氣煎。六物煎。加附桂之類主之。

發渴 五四

痘疹發渴者。裏熱也。以火起於內。銷爍真陰。所以發渴。又其津液外泄。化爲膿漿。則營氣虛耗。亦以致渴。此痘瘡之常候也。若微渴不甚。不必治之。惟大渴者。乃由火盛。然亦須察其虛實。以爲調理。切不可因其作渴。即以西瓜梨柿之類。輒以與之。恐脾胃受寒。致生他患也。外有乾渴論在泄瀉條中所當參閱。

痘瘡氣血內耗。微熱微渴而喜湯者。宜七味白术散。或五福飲加麥門冬五味。

一脾肺多熱渴而喜冷者。宜人參麥門冬散。或生脉散。

一痘瘡多熱多躁。口燥咽乾。大渴引飲。喜冷能食。或大便乾結者。此熱在肺胃二經。宜人參白虎湯。甚者再加黃連。○若痘後熱渴者。此餘火未清也。其治亦然。

一痘瘡自利不止。腎陰虧損而作渴者。病作少陰。速宜陳氏十二味異功散。或九味異功煎。

一大便秘結。腹滿煩熱。內火不清而作渴者。四順清凉飲。

一痘瘡發熱時。便見大渴。唇焦舌燥。此心火太炎。腎水不升。故血液枯耗也。急宜解之。以葛根解毒湯。

程氏曰。痘瘡初發之渴。乃壬癸水也。水既流出。其源必竭。奚不作渴。由此觀之。可見治渴者。必不可不滋腎水。

薛氏曰。凡渴欲飲水者。當察其熱之虛實。若屬虛熱。雖欲水而不多飲。當用七味白术散。若係實熱。索水喜飲者。當以犀角磨水服。其後亦無餘毒之患。

失血 五五

經曰。陽絡傷則血外溢。陰絡傷則血內溢。血外溢則衄血。血內溢則便血。痘疹之火由內而發。毒不能遂。則燔灼經絡。而迫血妄行。血隨火動。從上而出則爲衄爲吐。從下而出則爲便爲溺。陰陽俱傷。則上下俱出。凡痘疹失血。若從鼻出者則有陽

則外達之意。何可望生。若從他處。則純屬陰分。而火毒內陷。
乃悉爲危證。
一痘疹發熱見血者。多屬火證。若衄血者。宜玄參地黃湯。或加
茅根汁。或加京墨汁同飲之。衄止者生。不止者不治。○溺血
者。大分清飲。或八正散。○大便秘而見血者。並宜四順清涼
飲。
一痘瘡已出未出之間。凡諸血證。俱宜用犀角地黃湯。二方酌
宜治之最佳。血止後可進調元湯加木通。
一痘瘡十日之後。忽脹血大作。大便瀉出者。此爲胃爛不治。

發疱五六

痘瘡發疱。亦與黑陷相類。雖一以外出。一以外入。形有不同。而
邪氣留結毒則一也。或發水疱。或發血疱。或赤或紫或黑。但
見此證。十無一生。然亦有似疱而實非者。不可不知。或其人
身上原有破傷。或瘡痛未斂。或雜疹而搔損傷處。一旦痘出。
則瘡癥四圍。痘必叢集。此物從其類之理也。因瘡作疱。則其
腐敗皮肉。氣色不興。宜與完膚有別。不得因認爲紫黑疱也。
至若治疱之法。先以針刺破。吮去惡血。後用胭脂汁塗之。又
用白花膏敷之。○此瘡極易作痒。起發之後。宜常用茵陳熏

法熏之。勿令抓傷。若不慎之。則反覆灌爛。淹延不愈。變爲疳
蝕壞瘡。以致不治者多矣。

潰爛五七

痘瘡膿熟。或微有潰爛者。亦常候也。惟於未成膿之先。即有潰
者。此名斑爛。有當靨不靨。而身多破爛不收者。此名潰爛。是
由未出之先。當發散而不發散。則熱毒內蘊。必潰爛而兼喘
促悶亂。或不當發散而誤發散。則表虛毒盛。亦致遍身潰爛。
此皆不善表之故也。又有陽毒內熾。火盛脈實。便結喜冷。而
失於清利。以致陽明蓄熱。肌肉潰爛者。此不善解毒之故也。

故治此之法。表熱者。仍宜清理火邪。表虛者。即宜補養營衛。
且脾主肌肉。尤宜調脾進食。務令大便得所。以生肌解毒。但
解毒不至於過冷。調養不至於太熱。必得中和。方爲良法。
一表虛不收者。必其衛氣不足。別無熱證。宜十全大補湯之類。
或去肉桂。加防風荊芥穗。多服自愈。
一火盛胃熱潰爛者。宜大連翹飲之類。若大便秘者。以豬膽導
之。
一痘瘡或發表太過。或清解過當。以致表裏俱虛。陽氣不守。則
內爲泄瀉。外爲潰爛。速當救裏。宜陳氏十二味異功散。或九

味異功煎。

一潰爛膿水淋漓者，以敗草散，或蕎麥散襯之；若斑爛作膿痛甚者，以天水散和白花膏敷之。

一痘瘡衣以厚綿，圍以厚被，或向火偎抱，或任其飲酒，未七日而靨，日期未足，其收太急，以致自面至腹潰爛平塌，不作痂者，蓋此非正靨，乃倒靨也。急宜解去衣被，勿近火，勿飲酒，因立一方，用黃芪、白芷以排膿，防風、蟬退以疎表，青皮、桔梗以和中，牛蒡子、甘草以解毒。服後潰瘡復脹，則中外毒氣俱得無留，而漸可收矣。

多汗 五八

痘疹自汗者，以陰中之火自裏及表，達於衛氣，故皮膚為之緩，腠理為之疎，津液流行，故多自汗。但得痘疹身常潮潤，實為美事。此乃陰陽氣和，血脈通暢，熱隨汗減，毒隨汗散，邪不能留，則易出易靨。雖見熱甚，而汗出之後身必清涼，此即毒之消散也，不必治之。然只宜微汗，不宜大汗。若汗出過多，則陽氣泄，而衛氣虛，恐致難救難靨，或為痒塌寒戰之患。此則速宜固表以斂其汗也。又有汗出不止，其熱久甚者，此邪熱在表，陰為陽擾之患，速宜清火解毒，陽邪退而汗自斂也。若汗出如油，或髮潤如洗，而喘不休者，此肺脫之證，不可治。

一別無邪熱，但以衛氣虛，肌表不固而多汗者，調元湯倍加黃芪，或白朮散。

一脾虛於中，衛虛於外，肌肉無主，別無他證，而汗不斂者，人參建中湯。

一心氣虛怯，多驚而汗不固者，團參散。

一或吐或瀉，氣脫於中，陽脫於外，而汗出不收，微者五福飲加炮薑、棗仁；甚至手足厥冷，或嘔惡不止，而汗不收者，速宜人參理陰煎，或六味回陽飲，遲則恐致不救。

一陰中火盛，或身有大熱，而汗多不收者，當歸六黃湯。

一睡中汗出不收者，以陽入陰中，而陰不能靜也，當歸六黃湯。

一陽明熱盛，火邪燔灼肌肉，或身熱煩渴，或二便熱澀，而汗不收者，人參白虎湯，或加黃連。

一收靨之後，自汗不止者，此邪去而氣虛也，宜十全大補湯，或調中汗散，或外以滑石粉撲之。

夾疹 五九

痘瘡正當出時，若與疹俱出者，謂之夾疹。蓋痘疹之發皆有時氣，而二者俱見，其毒必甚。心鑑曰：夾疹者，即痘之兩感證也。

大為不順之候。若痘本稀少而夾疹者，名為麻夾痘，其證則輕。若痘本稠密，而更加以疹，彼此相混，此碎莫辨，其證則凶。急宜以辛涼之劑解散為先，而托裏次之，但得疹毒漸消，痘見顆洛者，乃為可治。若痘疹相雜，毒不少減者，必危無疑。

一治夾疹之法，先當察痘之稀密，疹之微甚。若疹輕微者，但當以痘為主，痘穫吉而疹無慮也。若疹多熱甚者，即當急解疹毒，務令疹散，而後痘可保也。

一痘瘡初出，內有細密如蠶子者，即夾疹證也。若痘稀疹多者，宜但解疹毒為主○如表邪不解，外熱甚，內火不甚，而夾疹者，宜疏邪飲、升麻葛根湯、荊防敗毒散，或十味羌活散○如表裏俱熱，毒盛而夾疹者，柴葛煎、解毒防風湯，或十二味羌活散○如內熱毒盛而夾疹者，六味消毒飲，或合黃連解毒湯○如陽明火盛，多熱多渴，或煩躁而夾疹者，白虎湯、化斑湯，或葛根麥門冬散○以上諸治如法，而疹散痘出者可治。然後隨證調理之。若疹不散，毒不解者難治。

一痘疹俱多者，毒必大盛，雖治得其法，疹毒已解，亦必氣血重傷，終難為力。凡遇此者，惟當以保脾胃、調和氣血為主，庶克有濟。

一收靨後復出疹者，此餘毒解散之兆，不必治之。

夾斑六十

痘疹夾斑與夾疹不同。蓋疹則細碎有形，斑則成片無形也。凡痘瘡初出，有片片紅腫如錦紋者，有紅暈與地皮相平而全無興起之意者，是皆夾斑證也。斑以熱毒鬱於血分，而浮於肌肉之間，乃足陽明胃經所主。或以寒邪陷入陽明，鬱而成熱者，亦致發斑。俱宜涼血解毒。但使斑退而痘見者吉，否則皮膚斑爛，瘡易搔癢，而皮嫩易破也。又有赤斑成塊，其肉浮腫結硬者，乃名丹瘤，其毒尤甚。瘡未成漿，此必先潰，不可治也。

一治斑之法，大抵斑在起發之前者，多用表散；在灌膿之後者，多用解和。如遍身通紅者，其治亦同。

一痘出夾斑，輕者只以升麻葛根湯加石膏、玄參。甚者宜人參白虎湯，合六味消毒飲。

一風寒外感，表邪不解而夾斑者，宜荊防敗毒散，或加石膏、玄參。

一斑色紫赤而大便秘結者，宜四順清涼飲利之。斑既已退，即宜用四君子之類，以固其脾，庶可免其內陷。

程氏曰凡治夾斑者宜涼血解毒以羌活散加酒炒芍藥紫草紅花蟬退木通官桂糯米連進數服斑退後以保元湯加木香豆蔻煎服以解紫草之寒防其泄瀉○如痘中夾疹治亦同此如稍遲則恐變成黑斑爲難治矣

一痘瘡結痂之後而見斑者此餘毒煎熬血分必致潰爛宜黃連解毒湯加當歸芍藥黃芩石膏甚則大連翹飲○若餘毒蕃蒸於內大便膿血臭穢而見斑者此胃爛之證不可治

一發斑潰爛者以救苦滅瘢散敷之

晝夜啼哭 六一

凡小兒出痘而晝夜啼哭者當辨其虛實表裏而治之其有內未得出或外未得散而啼哭者此毒氣不解之使然也有陽邪火盛紅赤撒突而啼哭者此痘瘡疼痛之使然也有心脾本虛而熱乘陰而啼哭者此或以神志不寧或以煩熱不寧之使然也有飲食不節或停滯而啼哭者此胃氣不和脹痛腹脹之使然者知此之由而辨得其真則內未出者表之托之外未散者解之化之火之盛者清其熱神之虛者養其陰若痘毒本微而無故啼哭者多由飲食內傷或二便秘結此或去其停滯或通其秘閉務令表裏和暢營衛通行則神自安而痘無不善矣或有啼哭非痰即熱而不究其本則失之遠矣

大小便閉 六二

凡痘疹小便欲其清而長大便欲其潤而實則邪氣不侮正氣不病若小便利者大便必實雖二三日不更衣者無礙也若小便少則病必進小便秘則病必甚以火盛故也但初熱時大便不宜太實若二三日不行宜微潤之不然恐腸胃不通則營衛不行而毒出轉難惟起發之後大便却宜堅實若太實而四五日不行恐熱盛煩躁亦宜微利之

一痘疹小水不利而熱微者宜導赤散熱甚而小水不利者宜八正散

一痘疹發熱時大便秘結不行而內外俱熱有不得不通以疎其毒者輕則柴胡飲子甚則三黃丸再甚則承氣湯

自起發後以至收靨凡大便不行而火不盛或虛弱不可通利者只宜用豬膽汁法或以蜜煎　條加豬膽汁導之即出切不可輕用利藥

一大小便俱不通而內熱甚者八正散或通關散酌宜用之

一熱毒內盛而痘瘡乾黑倒陷而大便秘者宜百祥丸或承氣湯

然宜慎風毋輕易也
一痘後餘熱不盡內陷膀胱而小水不利者導赤散或五苓散
大便不通者四順清涼飲
陳氏曰凡痘瘡四五日不大便用嫩豬脂一塊以白水煮熟切
如豆粒與食之令臟腑滋潤亦使瘡痂易落切不可妄投宣
泄之藥以致元氣內虛多傷兒也
薛氏曰前證若因熱毒內蘊宜用射干鼠粘子湯解之或發熱
作渴或口舌生瘡咽喉作痛並宜用之
目證 六二

目雖肝之竅而實五臟六腑之精氣皆上注於目故其赤脈屬
心瞳子屬腎白珠屬肺黑珠屬肝眼胞屬脾又太陽為上綱
陽明為下綱少陽行外眥太陽出內眥此其部分各有所主
故可因證以察其本也然痘瘡之病目而為痛為翳者多由
火炎於內而熱以生風風熱攻於諸經因多紅赤腫痛之患
故治此者亦當察其所屬而因證以調之也
一戴眼證凡痘瘡灌膿之後或大汗大瀉之後多有目睛上吊
或露白者謂之戴眼此精氣為膿血汗液所耗乃太陽少陰
真陰虧損大虛之證蓋太陽為上綱血枯則筋急所以上吊

也速宜大補氣血以六物煎六氣煎或十全大補湯之類主
之其有以此為風熱而散之解之者是皆速其死也○若七
日以前見此者多不治或兼無魂失志不省人事者亦不治
一痘瘡目赤腫痛翳障等證無不謂之風熱故古方亦多用清
火散風等劑夫痘瘡之火由中生目為肝竅肝主風木而病
在目故云風熱豈以風生於火由內熱也所以凡治目赤目
痛者不必治風但治其火火去則風自息矣何也蓋內生之
風與外感之風不同外感之風升之散之則解散而去內生
之風而再加升散則火愈熾而熱愈高矣常見治目多難愈

而其病反以傷脾者正以升降相錯而用藥有不精耳經云
高者抑之果何謂乎今如古方之治火眼凡用洗肝散及洗
肝明目散為要清肝散之類總不如良方龍膽瀉肝湯而良
方瀉肝湯又不如加味龍膽瀉肝湯之為得宜也
一痘瘡眼中流淚赤痛或多眼眵此肝火之盛也宜清解之以
加味龍膽瀉肝湯或抽薪飲加木賊蟬退之類主之若大便
結閉不通者亦可少加大黃
一痘瘡入眼腫痛或痘後生翳膜者宜蒺藜散蟬菊散或通神
散外以秦皮散洗之

一痘瘄目病熱少風多。而昏暗澁痛。眵淚羞明翳障者。宜密蒙花散。亦以秦皮散洗之。

一痘後眼閉。淚出不敢見明者。此內火不清。而陽光爍之。故畏明也。宜洗肝明目散。

一痘後眼皮風毒赤爛。或痛或癢。燥澁羞明。多眵淚者。秦皮散洗之。

一痘瘄靨後。精血俱耗。而眼澁羞明。光短倦開。或生翳障者。宜四物湯。甚者六物煎。加木賊蟬退白蒺藜。

一痘斑入眼。在白珠上者不必治。久當自去。惟在黑珠上宜治之。當清肝火。

一凡病目熱者。皆宜忌酒及椒蒜牛羊蘿雞鴨、煎熬炒炙雞鵝鴨等。皆不可用。以防延綿不愈之患。

痘疹熱毒傷目。凡必用之藥者。如生地芍藥麥門冬山梔玄參草決明連翹黃芩黃連。肝熱者。龍膽草。陽明實熱者。石膏石斛。腎火盛者。黃柏知母。二陰俱熱者。地骨皮。火浮不降者。木通澤瀉。翳障不去者。木賊草蟬退白蒺藜。氣虛者。人參黃芪。血虛者。當歸熟地。但火炎於上者。不宜升。陰虛於下者。不宜泄。此皆治眼之大法。

一痘瘡護眼法。宜錢氏黃柏膏。爲作從耳前眼皮上下顴面間。日塗三四次。可以護眼稀痘。

一用點藥者。凡目中生翳。或食發物。或熱毒太盛。上蒸目竅。以致熱痛。或生翳者。切不可妄用一切點藥。蓋其非毒即冷。必致寒熱相激。反以爲害。惟余之金露散。乃爲相宜。可間用之。以解熱痛之急。

徐氏曰。痘之毒氣自裏達表。故有目病。治宜活血解毒而已。活血不至熱。解毒不至寒。但得血活毒散。則目疾自愈。

痘癰痘毒六四　又痘後見前怪痘形證

痘發癰毒者。亦名痘母。經曰。痘前發母者凶。痘後發母者半吉半凶。大都毒發不透。必發癰疽。故癰結於經絡之間。然其癰結也。猶無足慮。所慮者不能消散。及治之不得其法。則乃爲可慮。然散之之法。當之要領。其在虛實之辨而已。如痘癰之有大毒者。不得不爲解毒。有大熱者。不得不爲清火。伏火毒害。但當調理脾氣。其有外雖見熱。而內本不足者。則當專用托法。務令元氣完固。飲食不減。則毒無不化。何害之有。若不察根本強弱。而但知攻毒清火。則無不傷脾。多致飲食日減。營氣日虧。膿血不化。毒日以陷。而痘變百出矣。所以痘癰

始春皆當以脾氣爲主。倘不知此，則未有中氣虛敗而痘能保全者。

一痘癰初起，癰盛疼痛，元氣無損，飲食如常者，宜先用連翹歸尾煎，或仙方活命飲以解其毒。俟毒氣稍平，即當用四君黃芪之類以補托元氣。

凡用托裏之劑，如癰毒內陷，無大熱，亦無便閉煩渴等證，或素非强盛之質，或以陰毒深陷，形不拔突，不紅腫，不化膿，猶有不甚者，此其毒皆在內，俱速宜用托裏之藥，以六氣煎加金銀花、甘草節、防風、荆芥、白芷、川山甲、牛蒡子之類。如陽氣不足者，仍可加肉桂、附子，用酒水各半煎服，或全用酒煎亦可。或托裏消毒散俱可酌用。

一凡內熱肌熱而飲食少思者，多屬脾胃不足，血氣虛弱，宜六氣煎，或溫胃飲加金銀花、白芷。○若癰毒色白而作痒者，氣虛也，治同上。○若根赤而作痒者，血虛血熱也，宜四物湯加丹皮、白芷。○若腫而不潰者，正氣虛也，托裏消毒散或加肉桂。○若潰而不斂者，脾氣虛也，宜六氣煎或六物煎加肉桂。

一凡飲食如常而內外俱熱，癰毒腫痛，或煩渴，或大小便俱熱澁者，宜大連翹飲，或仙方活命飲可酌用之。○若飲食如常內熱作痛，或兼口舌生瘡者，宜間用射干鼠粘子湯。

一痘毒發癰，有結硬實熱難解者，宜拔毒散。

一痘後發癰癤者，乃痘中未盡之毒留於經絡肢節而爲癰腫也。或解表，或清火，各有所宜。凡欲表裏兼解者，宜柴胡麥門冬散；欲潤腸解毒者，宜消毒散及四順清涼飲；欲涼血解毒者，宜犀角地黃湯；欲清火利便解毒者，宜大連翹飲。

痘疳蝕瘡六五

陳氏曰：凡痘瘡已靨未愈之間，五臟未實，肌肉尚虛，血氣未復，被風邪所搏，則津液澁滯，遂成疳蝕，宜用雄黃散、綿繭散等藥治之。久而不愈，則多致不起。

薛氏曰：前方乃解毒殺蟲之劑。若毒發於外，元氣未傷者，用之多效。若元氣傷損，邪火上炎者，用大蕪荑湯、六味丸。○若赤痛者，用小柴胡湯加生地黃。○若肝脾疳蝕，必用四味肥兒丸及人參白术散，更作以九味蘆薈丸。

楊氏曰：凡痘後疳蝕瘡，毒發肌肉，內透筋骨，外連皮膚，時痛出血，日久不瘥者，此毒在脾經，甚爲惡候，乃不足之證也。內服十全大補湯，外用綿繭散貼之。○疳蝕出血者難治。

痘癩正品六六

人參　益元氣，生精血，復元神，補五臟。凡痘瘡表散起脹灌漿收靨，始終皆賴之。

黄芪　固腠理，補元氣，內托陷下，皆用之。

當歸　生血養血，活血止血。痘瘡賴以調血。凡虛者能補，滯者能和。欲其升散，當佐以川芎；欲其斂降，當佐以芍藥。

熟地黄　痘疹之病，形質之病也。形質之本在精血，熟地以至静之性，以至甘至厚之味，實精血形質中第一品純厚之藥。凡痘瘡起發灌漿收靨之用，以參芪能之，其功乃倍。且其得升散則能發散，得桂附則能回陽，得參芪則入氣分，得歸芍則入血分。今見痘家傷寒家多不用此，豈亦古人之未之及耶？抑不知四物湯為何物耶？

生地黄　凉血行血，養血活血。痘瘡血熱血燥，凡吐血衄血，痘瘡紅紫及解毒藥中，皆宜用之。

芍藥　可升可降，能補能斂，治痘瘡血散不歸，賴以收之，使附氣分，能瀉肝脾之火，故止腹之熱痛，亦能止瀉。

川芎　能升能散，能引清氣上行頭角，以起頭面之痘，能佐參芪以行陽分，而解肌表之邪。此可為引導通行之使，但性多辛散，凡火在上而氣虛者，當避之。

白术　健脾利水，燥濕止泄，能補氣，故能發痘；能固脾，故能止瀉。

甘草　味甘平，得土氣之正，故能補中和中，而兼達四臟，佐理陰陽，惟其甘和而潤，故能解制藥之毒，瀉枯涸之火。

麥門冬　生津止渴，清肺滋陰，除煩熱，解燥毒。痘疹陰虛而多火者宜之。

糯米　善滋脾胃，益中氣，助血生漿，能制痘毒不能內攻。

扁豆　健脾和中，養胃止嘔。

柴胡　發散熱邪，瀉肝膽之火，解肌開表，退往來寒熱。

升麻　升陽氣，達肌表，散風寒，善走陽明。

防風　散風熱，解表邪，鼓陷氣，佐黄芪能托裏祛毒。

乾葛　解肌清熱，疏散表邪，故能止渴。

荊芥穗　解風熱，消瘡毒，利肌表，退腫痛，清咽喉，亦散頭目之風邪。

白芷　散風邪，燥寒濕，止頭痛，除搔癢，化癰瘍膿，善走陽明，故能起頭面之痘，亦托肌肉之膿。

麻黄　陰寒沉滯之邪，非此不能散，亦痘家之要藥，而人多畏之，由不能察也。

薄荷　散風熱，清頭目，能利咽喉，亦解熱毒。

羌活　散肌表之毒風利筋骨走經絡故能止周身之痛

官桂　味甘辛能養營解衣性溫熱能發血行氣凡痘瘡營衛
不充而見寒滯者必用此以通達血氣且善行參芪熟地之
功

附子　脾腎虛寒元陽大虧凡泄瀉嘔吐不能止寒戰厥逆不
能除者非此不可以益火之源

生薑　辟惡氣散寒氣溫中氣開脾胃止嘔吐之要藥若欲理
中寒止腹痛則炮乾薑尤勝

陳皮　和脾胃達陰陽開痰行氣和胃消脹可降可升

山查　消食快胃解利宿滯開導六腑無辛香之氣故可爲參
朮之導引

木香　調諸氣和胃行滯止瀉除胸腹痛亦能溫中若氣虛煩
熱者不宜輕用

丁香　暖胃逐寒消氣止嘔且除腹痛寒滯者不可少也

肉豆蔻　固腸溫中行滯止瀉中寒洞泄者最宜之

茯苓　利水益脾去濕熱故能止瀉除煩以通津液

澤瀉　利水下行能去濕熱以消腫亦導諸藥以降火

木通　大利小水善泄心與小腸之火能使痘瘡濕熱之毒從
小便而出凡內熱少痰者宜之若熱退中虛者不可輕用

桔梗　性味輕浮能載藥上升清火解毒故治咽痛

鼠粘子　性味清涼能潤肺散風利咽退腫欲解痘疹熱毒此
不可缺

紫草　味苦性寒能涼血活血制熱邪解痘毒滑利大便○程
氏曰大抵凡下紫草必下糯米五十粒以制其冷性庶不損
胃氣而致泄瀉惟大熱便秘者不必糯米也

蟬退　散風清熱疏邪氣故能解痘瘡之毒風

殭蠶　散風消痰解毒尤利咽喉

川山甲　性腥而利善通經脈直達病所凡痘有毒盛而鬱遏
不能出者宜此達之然必藉血氣諸藥爲之主而以此爲佐
引則可

犀角　解心火及肝脾之火凡痘中血熱吐衄及焦黑驚狂煩
躁不寧等證皆可用之以解熱毒

蜂蜜　益脾生津潤燥可結痂亦可落痂

硃砂　鎮心氣除熱毒墜痰涎安驚悸定神魂凡心經痘毒及
痰火上壅有餘之證皆宜用之

琥珀　安神定志利水鎮驚

玄參　能解血中之熱。消遊火。滋肝腎。除痘疹之熱毒。
黃連　解諸熱毒。瀉心肝大腸之火。
滑石　甘涼下降。利水道。清解六腑之煩熱。
石膏　清肅大寒。善降陽明之火。凡屬陽明實熱。而為頭痛目腫。口乾。唇焦。身熱。煩渴。狂躁。便結者。非此不能解。
連翹　清一切浮游之火。治痘疹癰瘍之毒。
梔子　利小水。降肺膀胱之火。使從小便中出。
龍膽草　性寒而降。大瀉肝腎之火。上退眼目之赤痛。下清足膝之熱腫。

黃芩　性味輕清。能清肺金大腸之火。
大黃　通壅結。逐瘀血。退熱攻堅。非有大實者。則不可輕用。

痘家禁忌六七

人參黃芪。皆係補氣助陽之劑。凡痘色白陷者。宜用之。若紅紫壯實者。用之則痘色愈紅。而毒愈熾。紅紫者轉為枯黑。反甚矣。
白朮　性燥而滲。雖補氣分。亦能閉氣。多用則滯氣不和。痘難成漿。助陽生火。亦須戒之。
茯苓　猪苓　淡滲之品。能令水氣下行。多服則津液耗散。凡陰虛於下。而精血不足者。當避之。

川芎　性升氣散。凡氣虛者。不宜多用。火浮於上。而頭痛汗煩者忌之。
生地　性寒。脾胃虛寒者。慎之。
升麻　提氣上衝。凡下虛上實。氣逆煩躁者。忌之。
柴胡　清散而潤。和汗多者。不宜用。脾泄者。不宜多用。
紫草　性寒利竅。多服成泄瀉。脾氣虛者。忌之。
木通　通肌滑竅。多服恐內損中氣。外致表虛。
蟬退　能開肌竅。多服恐泄元氣。以致表虛。
麻黃　開竅大泄肌表。妄用恐表虛氣脫。

鼠粘　性涼解肌。多用恐致表虛。
枳殼　下氣寬腸。多用則損中氣。
山查　散血解結。多則傷血滯氣。
砂仁　散氣動氣。氣虛者不宜用。
烏梅　酸斂。宜散宜行者不宜用。
川山甲　性有餘而補性不足。若任用攻毒。而不以王道為之帥。則血與毒追竄而出。出而能善其終者鮮矣。
人牙　性烈。發表太過。若妄用之。則內動中氣。外致癢塌出血。
訶子　肉果　枯礬　皆能固大腸。欲通利者。宜避之。

大黃耗倒力雄，血氣中虛者，不可輕用。

黃連大苦大寒，原非周身之物，泄瀉無火者大忌之。

山梔、黃芩、黃柏、石膏、龍膽、滑石、連翹、前胡、天花粉之類，皆大寒之物，非有實火熱毒者，不得妄行濫用。

附子、乾薑、肉桂、吳茱萸之類，性皆溫熱，凡痘瘡紫黑，便實，火毒盛者，皆不可輕用。

厚朴、枳殼，開滯破氣消腸，凡虛痰虛火，及中氣不足，而為喘促脹滿，大便不實者，皆大忌之。

桑蟲，亦名桑蠶，不知始自何人，用以發痘，今俗皆以為奇品，競相傳用。余嘗遍考本草、痘疹諸書，皆所不載。及審其性味，不過為陰寒濕毒之蟲耳。惟其有毒，所以亦能發痘；惟其寒濕，所以最能敗脾。且發痘者，不從血氣，而從毒藥，痘雖起而中則敗矣。此與揠苗者何異？蠶以濕毒傷脾，弱稚何堪？故每見多服桑蟲者，痘發則全痂俱爛，脾敗則泄瀉不止，前之既誤，後可救矣？其余朦朦者，率猶長夜之不醒，何益？其但見痘之死，總不知敗在蟲毒也。余欲呼之，用敢代訴而并名，大作猶者之可恨。

痘疹下論列方 六八

保元湯 痘一　　調元湯 痘二
十全大補湯 補二十　　調中湯 小三
五福飲 新補六　　五味異功散 補四
養中煎 新熱四　　七福飲 新補七
六味異功煎 新熱七　　溫胃飲 新熱五
三陰煎 新補十一　　九味異功煎 新因二三
胃關煎 新熱九　　五陰煎 新補十三
六味回陽飲 新熱二　　佐關煎 新熱十
理中湯 熱一　　七味白朮散 小七

六氣煎 新因二一　　理陰煎 新熱三
人參白朮散 小七　　六物煎 新因二十
四君子湯 補一　　參苓白朮散 補五四
四物湯 補八　　六君子湯 補五
金水六君煎 新和一　　六味丸 補一二一
五君子煎 新熱六　　人參建中湯 補二六
貞元飲 新補十九　　小建中湯 補二二
黃芪建中湯 補二七　　生脈散 補五七
大補元煎 新補一　　人參麥門冬散 痘二三

胃愛散痘十九　酸棗仁湯補八五
硃砂安神丸寒一四二　團參散小十
大和中飲新和七　七味安神丸小七二
參薑飲新熱八　小和中飲新和八
秘旨安神丸小七一　益黃散和十九
大分清飲新寒五　加減參蘇飲
養心湯小五九　小分中飲新和十
升麻葛根湯痘二六　寧神湯小五七
小柴胡湯散十九　柴葛桂枝湯痘二六

茯神湯小六十　柴胡飲子痘四二
柴胡麥門冬散痘二四　止汗散小十一
大連翹飲寒七八　葛根麥門冬散痘一四一
抑扶煎新熱十一　紫草飲子痘六七
解肝煎　犀葛湯痘二七
大防風湯　前胡枳殼散痘九四
柴葛煎新因十八　肉豆蔻丸小五六
仙方活命飲外一　五積散散三九
透邪煎新因十六　連翹歸尾煎新因二

柴歸飲新因十五　敗毒散散三六
荊防敗毒散痘三一　雙解散痘四一
羌活散痘三八　十味羌活散痘三八
二陳湯和一　羌活湯痘四十
十三味羌活散痘二九　橘皮湯痘九二
白虎湯寒二　人參白虎湯寒三
惺惺散小二二　化斑湯寒二
人參石膏湯寒二　十宣散痘十四
化毒湯痘五七　黃連解毒湯寒

和胃飲新和五　排毒散痘九八
葛根解毒湯痘五二　六安煎新和二
消毒散痘四七　托裏消毒散痘六
清膈煎新寒九　抽薪飲新寒三
四味消毒散痘四八　黃芩湯寒百五
退火丹痘八四　六味消毒散痘四九
生犀散小二八　益元散寒百十二
玄參地黃湯痘八六　二妙散寒一百四
天水散寒百十二　當歸六黃湯寒六五

瀉黃散 寒五七　導赤散 寒一二二
導赤通氣散 痘八八　二仙散 痘二十
砌香散 新和二十　五苓散 和一八二
射干鼠粘子湯 痘七七　五福丸 新攻十八
四苓散 和一八七　御藥大半夏湯 和十一
保和丸 八二五　八正散 寒百十五
九味蘆薈丸 小百十五　抱龍丸 小八五
甘桔湯 因一七五　甘桔清金散 痘八九
百解丸 痘九六　承氣湯 攻一
四順清涼飲 攻五　萬氏奪命丹 痘八二
赤金豆 新攻二　桂枝大黃湯 痘四二
琥珀散 小八　二黃丸 攻六八
良方龍膽瀉肝湯 寒六二　梅花飲 小八三
香連丸 寒百十一　加味龍膽瀉肝湯 寒六四
瀉青丸 寒一五　當歸丸 痘九五
七味龍膽瀉肝湯 寒六二　通關散 痘八五
洗肝散 痘百七　洗肝明目散 痘百六
通神散 痘百十二　蒺藜散 痘百九

芍藥清肝散 寒六一　羅菊散 痘百十
密蒙花散 因二十　仲景竹葉石膏湯 寒五
秦皮散 因百十一　茵陳薰法 痘百十九
人參竹葉石膏湯 寒六　雄黃散 痘一二三
胭脂塗法 痘一二五　局方犀角地黃湯 寒七九
蘆薈散 痘一二四　敗草散 痘一二六
良方犀角地黃湯 寒八十　百花膏 痘一二三
黃柏膏 痘百十三　拔萃犀角地黃湯 寒八一
紅綿散 痘七二　綿繭散 痘一二四
十一味木香散 痘一二　金露散 新因四四
救苦滅瘢散 痘一二八　十二味異功散 痘一二
萬氏牛黃清心丸 痘九四

全書卷目四十五終

卷之四十六

外科上

經義一　脈候二
論證三　善惡逆順四
虛實五　淺深辨六
總論治法七　敗毒八
托裏九　論汗下十一
論灸法十　膿針辨十二
論針法十三　用針勿忌尻神十四
用藥十五　腐肉十六
合時從證十七　腸氣脫陷十八
溫補按劑十九　定痛二十
生肌收口二十一　用香散藥二十二
槐花酒二十三　忍冬酒二十四
腫瘍二十五　腫瘍不足二十六
潰瘍二十七　潰瘍有餘二十八
潰瘍作痛二十九　潰瘍發熱三十

發熱煩躁三十一　作嘔三十二
作渴三十三　瀉痢三十四
大便秘結三十五　小便淋澁不利三十六
發痙三十七　無寐三十八
瘡瘍出血三十九　戒忌調護四十
陰陽證變四十一　論列方外科上

卷之四十七

外科下

發背四十二　腦疽四十三
耳瘡四十四　鬢疽四十五
痄腮四十六　瘰癧四十七
疔瘡四十八　時毒四十九
肺癰肺痿五十　乳癰乳巖五十一
胃脘癰五十二　腹癰五十三
腸癰五十四　附骨疽五十五
臀癰五十六　流注五十七
鶴膝風五十八　多骨疽五十九
下疳瘡六十　便毒六十一

楊梅瘡六十二　囊癰六十三
懸癰六十四　肶疽六十五
腳發六十六　足跟瘡六十七
腎臟風瘡六十八　臁瘡六十九
天泡瘡七十　赤白遊風七十一
翻花瘡七十二　痔漏下血按七十三附臟毒
跌打損傷七十四　杖瘡七十五
破傷風七十六　類破傷風七十七
斑疹丹毒七十八　瘤贅七十九
疣八十　論列方外科下

外科鈐上

會稽　張介賓　會卿著
瀛海　賈　棠　青南訂

經義一

癰疽篇黃帝曰血氣已調形氣乃持余已知血氣之平與不平未知癰疽之所從生成敗之時死生之期有遠近何以度之可得聞乎岐伯曰經脈流行不止與天同度與地合紀故天宿失度日月薄蝕地經失紀水道流溢草萓不成五穀不殖徑路不通民不往來巷聚邑居則別離異處血氣猶然請言其故夫血脈營衛周流不休上應星宿下應經數寒邪客於經絡之中則血泣血泣則不通不通則衛氣歸之不得復反故癰腫寒氣化為熱熱勝則腐肉肉腐則為膿膿不瀉則爛筋筋爛則傷骨骨傷則髓消不當骨空不得泄瀉血枯空虛則筋骨肌肉不相榮經脈敗漏熏於五藏藏傷故死矣○黃帝曰願盡聞癰疽之形與忌日名岐伯曰癰發於嗌中名曰猛疽猛疽不治化為膿膿不瀉塞咽半日死其化為膿者瀉

則合豕膏冷食三日已○發於頸名曰夭疽其癰大以赤黑不急治則熱氣下入淵腋前傷任脈內熏肝肺熏肝肺十餘日而死矣○陽氣大發消腦留項名曰腦爍其色不樂項痛而如刺以針煩心者死不可治○發於肩及臑名曰疵癰其狀赤黑急治之此令人汗出至足不害五藏癰發四五日逞焫之○發於腋下赤堅者名曰米疽治之以砭石欲細而長疏砭之塗以豕膏六日已勿裹之○其癰堅而不潰者為馬刀挾纓急治之○發於胸名曰井疽其狀如大豆三四日起不早治下入腹不治七日死矣○發於膺名曰甘疽色青其

狀如穀實菰𦼮常苦寒熱急治之去其寒熱十歲死死後出膿○發於脇名曰敗疵敗疵者女子之病也灸之其病大癰膿治之其中乃有生肉大如赤小豆剉陵翹草根各一升以水一斗六升煮之竭為取三升則強飲厚衣坐於釜上令汗出至足已○發於股脛名曰股脛疽其狀不甚變而癰膿搏骨不急治三十日死矣○發於尻名曰銳疽其赤堅大急治之不治三十日死矣○發於股陰名曰赤施不急治六十日死在兩股之內不治十日而當死○發於膝名曰疵癰其狀大癰色不變寒熱如堅石勿石石之者死須其柔乃石之者

生○諸癰疽之發於節而相應者不可治也發於陽者百日死發於陰者三十日死○發於脛名曰兔齧其狀赤至骨急治之不治害人也○發於內踝名曰走緩其狀癰也色不變數石其輸而止其寒熱不死○發於足上下名曰四淫其狀大癰急治之百日死○發於足傍名曰厲癰其狀不大初如小指發急治之去其黑者不消輒益不治百日死○發於足指名脫癰其狀赤黑死不治不赤黑不死不衰急斬之不則死矣○黃帝曰夫子言癰疽何以別之岐伯曰營衛稽留於經脈之中則血泣而不行不行則衛氣從之而不通壅遏而

不得行故熱大熱不止熱勝則肉腐肉腐則為膿然不能陷骨髓不為焦枯五藏不為傷故名曰癰黃帝曰何謂疽岐伯曰熱氣淳盛下陷肌膚筋髓枯內連五藏血氣竭當其癰下筋骨良肉皆無餘故命曰疽疽者上之皮夭以堅上如牛領之皮癰者其皮上薄以澤此其候也

玉版篇黃帝曰病之生時有喜怒不測飲食不節陰氣不足陽氣有餘營氣不行乃發為癰疽陰陽不通兩熱相搏乃化為膿小鍼能取之乎岐伯曰以小治小者其功小以大治大者多害故其已成膿血者其唯砭石鈹鋒之所取也黃帝曰多

害者其不可全乎岐伯曰其在逆順焉以爲傷者其白眼青
黑眼小是一逆也內藥而嘔者是二逆也腹痛渴甚是三逆
也肩項中不便是四逆也音嘶色脫是五逆也除此五者爲
順矣
寒熱病篇曰五藏身有五部伏兎一腓二腓者腨也背三五藏
之腧四項五此五部有癰疽者死○凡刺之害中而不去則
精泄不中而去則致氣精泄則病甚而恇致氣則生爲癰疽
也
生氣通天論曰高粱之變足生大疔受如持虛○汗出見濕乃

生痤痱○勞汗當風寒薄爲皶鬱乃痤○營氣不從逆於肉
理乃生癰腫○陷脉爲瘻留連肉腠○因而飽食筋脉横解
腸澼爲痔
陰陽別論曰三陽爲病發寒熱下爲癰腫
脉度篇曰六府不和則留結爲癰
異法方宜論曰東方之域其民食魚而嗜鹹其病皆爲癰瘍其
治宜砭石故砭石者亦從東方來
氣穴論曰肉之大會爲谷肉之小會爲谿肉分之間谿谷之會
以行榮衛以會大氣邪溢氣壅脉熱肉敗榮衛不行必將爲

膿內消骨髓外破大膕留於節湊必將爲敗積寒留舍榮衛
不居卷肉縮筋肋肘不得伸內爲骨痺外爲不仁命曰不足
大寒留於谿谷也
刺節眞邪論曰虛邪之中人也洒淅動形起毫毛而發腠理其
入深內搏於骨則爲骨痺搏於筋則爲筋攣搏於脉中則爲
血閉不通則爲癰○虛邪之入於身也深寒與熱相搏久留
而內著寒勝其熱則骨疼肉枯熱勝其寒則爛肉腐肌爲膿
內傷骨內傷骨爲骨蝕○有所疾前筋筋屈不得伸邪氣
居其間而不反發爲筋瘤○有所結氣歸之衛氣留之不得

反津液久留合而爲腸瘤○久者數歲乃成以手按之柔已
有所結氣歸之津液留之邪氣中之凝結日以易甚連以聚
居爲昔瘤○以手按之堅有所結深中骨氣因於骨骨與氣
并日以益大則爲骨疽○有所結中於肉宗氣歸之邪留而
不去有熱則化爲膿無熱則爲肉疽○凡此數氣者其發無
常處而有常名也
病能論黃帝問曰人病胃脘癰者診當何如岐伯對曰診此者
當候胃脉其脉當沉細沉細者氣逆逆者人迎甚盛甚盛則
熱人迎者胃脉也逆而盛則熱聚於胃口而不行故胃脘爲

癖也○帝曰有病頸癰者或石治之或鍼灸治之而皆愈其
真安在岐伯曰此同名異等者也夫癰氣之息者宜以鍼開
除去之夫氣盛血聚者宜石而寫之此所謂同病異治也
脉要精微論帝曰諸癰腫筋攣骨痛此皆安生岐伯曰此寒氣
之腫八風之變也帝曰治之奈何岐伯曰此四時之病以其
勝治之愈也
厥論曰少陽厥逆機關不利機關不利者腰不可以行項不可
以顧發腸癰不可治驚者死
寒熱篇帝曰寒熱瘰癧在於頸腋者皆何氣使然岐伯曰此皆

鼠瘻寒熱之毒氣也留於脉而不去者也鼠瘻之本皆在於
藏其末上出於頸腋之間其浮於脉中而未內著於肌肉而
外為膿血者易去也黄帝曰去之奈何岐伯曰請從其本引
其末可使衰去而絶其寒熱審按其道以予之徐往徐來以
去之其小如麥者一刺知三刺而已黄帝曰決其死生奈何
岐伯曰反其目視之其中有赤脉上下貫瞳子見一脉一歲
死見一脉半一歲半死見二脉二歲死見二脉半二歲半死
見三脉三歲死見赤脉不下貫瞳子可治也
通評虚實論曰所謂少鍼石者非癰疽之謂也癰疽不得頃時

回
氣交變大論曰歲火太過民病身熱骨痛而為浸淫○歲金太
過民病兩脇下少腹痛目赤痛眥瘍耳無所聞○歲木不及
復則炎暑流火濕性燥病寒熱瘡瘍疿胗癰痤○歲金不及
復則寒雨暴至民病口瘡○歲水不及民病寒瘍流水
五常政大論曰委和之紀其病支廢癰腫瘡瘍○卑監之紀其
動瘍涌分潰癰腫○赫曦之紀其病笑瘧瘡瘍○堅成之紀
其動暴折瘍疰○少陽司天火氣下臨鼻窒瘡瘍太陽司天
寒氣下臨甚則胕腫身後癰少陰司天熱氣下臨甚則瘡瘍

○地有高下氣有温凉高者氣寒下者氣熱故適寒凉者脹
之温熱者瘡下之則脹已汗之則瘡已
脉候二
浮數之脉應發熱其不發熱而反惡寒者若有痛處瘡疽之謂
也
洪大之脉其主血實積熱瘡腫凡洪大者瘡疽之病進也膿未
成者宜下之膿潰之後脉見洪大則難治若自利者為凶
候
數脉主熱浮而數者為表熱沉而數者為裏熱消緊數之脉應

發熱而反惡寒者瘫疽也仲景曰數脉不時見則生惡瘡也
又曰肺脉數者生瘡也凡諸瘡脉至洪數其內必有膿也
實脉主邪盛邪氣盛則實也瘡疽得此可下之若久病虛人則
最忌之以正不勝邪也
滑脉多陽或爲熱或爲虛瘡疽得此膿未成者可內消膿已潰
者宜托裏所謂始爲熱終爲虛也
散脉爲血虛有表無裏也凡瘡毒膿潰之後脉見洪滑粗散而
煩痛不除者難治以其正氣虛邪氣實也又曰肢體沉重肺
脉大則毙謂其浮散無根也
長脉主陽氣充實傷寒得之將欲汗解也長而緩者胃脉也百
病得之皆愈故曰長則氣治也
芤脉主陰虛血虛膿潰後得之爲宜以脉病相應也
弦脉主肝邪瘡疽論曰弦洪相搏內寒外熱欲發瘡疽也
緊脉主切痛積癖凡瘡疽得此則氣血留滯邪結不散多爲痛
也
短脉主虛經曰短則氣病以其乏胃氣也瘡瘍脉短真氣虛也
諸病見之皆爲難治尤不可攻也
澁脉主血虛氣澁瘡瘍潰後得之無妨

沉脉爲陰瘡瘍得之邪氣深也
遲脉主陽氣不足瘡瘍得之潰後自愈
緩脉無邪長而緩者百病皆宜瘡瘍得此則易愈以其有胃氣
也
弱脉主氣血俱虛形精不足大抵瘡家之脉凡沉遲濡弱者皆
宜托裏
微脉主虛真氣復則生邪氣勝則死瘡瘍潰後微而和者將愈
也
細脉主陽衰瘡腫脉細而沉者裏虛而欲變證也
虛脉容而無力脉虛則血虛血虛生寒陽氣不足也瘡瘍得之
止宜托裏養血補氣也
軟脉少神元氣弱也凡瘡瘍之脉但見虛遲軟弱者悉宜補虛
排膿托裏○牢脉堅強陰之弱也凡瘰癧結腫之類診得牢
脉者皆不可內消也
結促之脉凡陰衰則促陽衰則結大抵結促之脉由氣血俱虛
而斷續者居多瘡瘍得之多宜托裏然有素禀結促者又當
以有力無力辨其虛實實者可下虛者不可不補
有離經脉二十二種大都微弱虛細遲緩短澁者必氣血皆虛

形精不足但當用補用托不可妄攻無待言也即如浮滑弦
洪結促等脈此中最有疑似亦不得以全實論治必須詳察
形證或攻或補庶無誤也

齊氏曰瘡瘍之證若不診候何以知陰陽勇怯血氣聚散又曰
脈洪大而數者實也細微而數者虛也

河間曰脈沉實者其邪在臟浮大者其邪在表

立齋曰癰疽未潰而脈先弱者何以收斂

論證 三

凡癰瘍之患所因雖多其要惟內外二字證候雖多其要惟陰

陽二字知此四者則盡之矣然內有由臟者有由腑者外有
在皮膚者有在筋骨者此又其淺深之辨也至其為病則無
非血氣壅滯營衛稽留之所致蓋凡以鬱怒憂思或淫慾丹
毒之逆者其逆在肝脾肺腎此出於臟而為內病之最甚者
也凡以飲食厚味醇酒炙煿之壅者其壅在胃此出於腑而
為內病之稍次者也又如以六氣之外襲寒暑之不調侵人
經絡傷人營衛則凡寒滯之毒其來徐來徐者其入深多犯
於筋骨之間此表病之深者也風熱之毒其來暴來暴者其
入淺多犯於皮肉之間此表病之淺者也何也蓋在臟在骨
者多陰毒陰毒其甚也在腑在膚者多陽毒陽毒其淺也所
以凡察瘡瘍者當識癰疽之辨癰者熱壅於外陽毒之氣也
其腫高其色赤其痛甚其皮膚薄而澤其膿易化其口易斂其
來速者其愈亦速此與臟腑無涉故易治而易愈也疽者結
陷於內陰毒之氣也其腫不高其痛不甚其色沉黑或如牛
領之皮其來不驟其愈最難或全不知痛癢其有瘡毒未形
而精神先困七惡疊見者此其毒將發而內先敗大危之候
也知此陰陽內外則癰瘍之槩可類見矣然此以外見者言
之但癰瘍之發原無定所或在經絡或在臟腑無不有陰陽

之辨若元氣強則正勝邪正勝邪則毒在腑在腑者便是陽
毒故易發易收而易治元氣弱則邪勝正邪勝正則毒在臟
在臟者便是陰毒故難起難收而難治此之難易全在虛實
實者易而虛者難也速者易而遲者難也所以凡察癰疽者
當先察元氣以辨吉凶故無論腫瘍潰瘍但覺元氣不足必
當先慮其何以收局而不得不預為之地萬勿見病治病且
顧目前則鮮不致害也其有元氣本虧而邪盛不能容補者
是必敗逆之證其有邪毒熾盛而脈證俱實者但當直攻其
毒則不得誤補助邪所當詳辨也

華元化曰癰疽瘡腫之作皆五臟六腑蓄毒不流非獨因營衛閉塞而發也其行也有處其主也有歸假令發於喉舌者心之毒發於皮毛者肺之毒發於肌肉者脾之毒發於骨髓者腎之毒發於筋膜者肝之毒發於下者陰中之毒發於上者陽中之毒發於外者六腑之毒發於內者五臟之毒故內曰壞外曰潰上曰從下曰逆發於上者得之速發於下者得之緩感於六腑則易治感於五臟則難瘳又近骨者多冷近膚者多熱近骨者久不愈則化成血蠱近膚者久不愈則傳氣成漏成蟲則多痒少痛或先痒後痛或漏則多痛少痒或不痒不痛內虛外實者多痛少痒血不止則多死潰膿則多生證候多端要當詳治

伍氏云癰疽之疾有二十餘證曰熛發痼發石發岩發蜂窠發蓮子發椒眼發連珠發竟體發腸癰內發腦背發眉發腮頷發肺癰瓜瓠發大小隨病淺深內外施治不可遲緩初發如傷寒脉浮而緊是其候也

又曰五臟六腑俞穴皆在背凡患瘡證有傷臟腑者多致不救腑氣浮行於表故癰腫浮高為易治臟血沉寒主裏故疽腫內陷為難治

又曰癤者節也癰者壅也疽者沮也一寸至二寸為癤三寸至五寸為癰一尺為疽一尺至二尺為竟體疽若脉洪數者難治脉微澁者易治初覺宜清熱拔毒已潰則排膿止痛膿盡則長肌敷痂當酌輕重順逆而審治之

馬益卿癰疽論曰人有四肢五臟一覺一寐呼吸吐納精氣往來流而為榮衛暢而為氣色發而為聲音陽用其形陰用其精此人之常數所同也至其失也蒸則生熱否則生寒結則為瘤贅陷則為癰疽凝則為瘡癬憤則結瘦怒則結疽又五臟不和則九竅不通六氣不和則留結為癰皆經絡澁滯氣血不流風毒乘之而致然也

薛立齋曰瘡瘍之作皆由膏粱厚味醇酒炙煿房勞過度七情鬱火陰虛陽輳精虛氣節命門火衰不能生土營衛虛弱外邪所襲氣血受傷而為患當審其經絡受證標本緩急以治之

陳良甫曰外如麻裏如瓜又曰外小如錢內可容拳

善惡逆順 四

癰疽證有五善七惡不可不辨凡飲食如常動息自寧一善也便利調勻或微見乾澁二善也膿潰腫消水漿不臭內外相

應三善也神彩精明語聲清亮肌肉好惡分明四善也體氣和平病藥相應五善也〇七惡者煩躁時嗽腹痛渴甚眼角向鼻瀉利無度小便如淋一惡也氣息綿綿脈病相反膿血既泄腫焮尤甚膿色臭敗痛不可近二惡也目視不正黑睛緊小白睛青赤瞳子上視睛明內陷三惡也喘粗短氣恍惚嗜臥面青唇黑便污未潰肉黑而陷四惡也肩背不便四肢沉重已潰青黑筋腐骨黑五惡也不能下食服藥而嘔食不知味發痰嘔吐氣噎痞塞身冷自汗耳聾驚悸語言顛倒六惡也聲嘶色敗唇鼻青赤面目四肢浮腫七惡也五善者病在腑在腑者輕七惡者病在臟在臟者危也

齊氏曰病有證合七惡皮急緊而如善者病有證合五善而皮緩虛如惡者夫如是豈淺識之所知哉然五善并至則善無加矣七惡并至則惡之極矣凡五善之中乍見一二善證瘡可治也七惡之內忽見一二惡證宜深懼之大抵瘡疽之發虛中見惡證者不可救實證無惡候者自愈又凡膿潰之後而煩疼不除診其脈洪數粗散者難痊微澀遲緩者易愈此善惡之證於診候中亦可知也若發背腦疽及諸惡瘡別有五逆之證者白睛青黑而眼小服藥而嘔傷痛渴甚膊項中不便音嘶色敗者是為五逆其餘熱渴利嘔盖毒氣入裏臟腑之傷也可隨證以治之出外科精義 宋齊德之著

陳氏曰病有甚而致生有微而致死病證難辨死生何從決乎答曰發背透膜者死未潰內陷面赤唇黑便污者死煩悶者不治潰喉者不治陰患入腹者不治入囊者不治鬓深寸許者不治顱後一寸三分名銳毒亦不治無此者生流注雖多療之必愈出外科精要 宋陳自明著

發揮曰大抵發背腦疽脫疽腫痛色赤者乃水衰火旺之色多可治若黑若紫則火極似水之象乃其腎水已竭精氣枯涸也決不治又骨髓不枯臟腑不敗者可治若老弱患此瘡頭不起或腫硬色夭堅如牛領之皮脈更濇此精氣已絕矣不可治或不待潰而死有潰後氣血不能培養者亦死

立齋曰瘡瘍之證有五善七惡善者勿藥自愈惡者乃五臟虧損之證多因元氣虛弱或因膿水出多氣血虧損或因汗下失宜榮衛消爍或因寒涼剋伐血氣不足或因峻厲之治胃氣受傷以致真氣虛而邪氣實外似有餘而內實不足法當純補胃氣多有可生不可因其證惡遂棄而不治〇若大渴發熱或泄瀉淋閉者邪火內熾一惡也竹葉黃芪湯血氣俱

虛八珍湯加黃芪麥冬五味山茱萸如不應仍以加減八味丸煎服○膿血既洩腫痛尤甚膿色敗臭者胃氣虛而火盛二惡也人參黃芪湯如不應用十全大補湯加麥冬五味○目視不正黑睛緊小白睛青赤瞳子上視者肝腎陰虛而目系急三惡也六味丸料如或陰中有火加炒山梔麥冬五味如不應用八珍湯加炒山梔麥冬五味喘粗短氣恍惚嗜臥者脾肺虛火四惡也六君加大棗生薑如不應用補中益氣湯加麥冬五味心火刑尅肺金人參平肺散陰火傷肺六味丸加五味子煎服○肩背不便四肢沉重者脾腎虧損五惡也補中益氣湯加熟地山藥山茱萸五味如不應用十全大補湯加山茱萸山藥五味○不能下食服藥而嘔食不知味者胃氣虛弱六惡也六君子湯加木香砂仁如不應急加附子○聲嘶色敗唇鼻青赤面目四肢浮腫者脾肺俱虛七惡也補中益氣湯加大棗生薑如不應用六君子湯加炮薑更不應急加附子或用十全大補湯加附子炮薑○腹痛泄瀉欬逆昏憒者陽氣虛寒氣內淫之惡證也急用托裏溫中湯後用六君子湯加附子或加薑桂溫補此七惡之治法也○此外更有潰後發熱惡寒作渴或怔忡驚悸寤寐不寧牙關

緊急或頭目赤痛自汗盜汗寒戰咬牙手撒身熱脈洪大按之如無或身熱惡衣欲投於水其脈浮大按之微細衣厚仍寒此血氣虛極傳變之惡證也○若手足逆冷肚腹疼痛泄利腸鳴飲食不入吃逆嘔吐此陽氣虛寒氣所乘之惡證也○若有汗而不惡寒或無汗而惡寒口噤足冷腰背反張頸項強勁此血氣虛極變痓之惡證也俱急用參芪歸朮熟地附桂之屬投之間有可生者宋時齊院令雖嘗纂其狀而未具其因皋明陶節菴雖各立一方亦簡而未悉予故補其缺云

又曰前證善者乃五臟未傷病微邪淺使能慎起居節飲食則勿藥自愈惡者乃五臟虧損之證前哲雖云不治若能補其脾胃固其根本多有可生者豈可以其惡而遂棄之耶

虛實

齊氏曰瘡疽之證有藏府氣血上下真邪虛實不同也不可不辨如腫起堅硬膿稠者瘡疽之實也腫下軟慢膿稀者瘡疽之虛也○大便硬小便澀飲食如故腸滿膨脹胸膈痞悶肢節疼痛口苦咽乾煩躁多渴身熱脈大精神悶塞者悉臟腑之實也瀉利腸鳴飲食不入嘔吐無聊手足厥冷脈弱皮寒

小便自利或小便短少大便滑利聲音不振精神困倦臟腑之虛也○凡瘡疽腫起色赤寒熱疼痛皮膚壯熱膿水稠粘頭目昏重者血氣之實也凡膿水清稀瘡口不合聚腫不赤不堪熱痛肌寒肉冷自汗色夭者氣血之虛也○頭痛鼻塞目赤心驚咽喉不利口舌生瘡煩渴飲冷睡語咬牙者上實也精滑不禁大便自利腰腳沉重睡臥不寧者下虛也○腫焮尤甚痛不可近寒熱往來大便秘澀小便如淋心神煩悶恍惚不寧者邪氣之實也肩項不便四肢沉重目視不正睛不了了食不知味音嘶色敗四肢浮腫多日不潰者真氣

之虛也○又曰邪氣勝則實真氣奪則虛○又曰諸痛為實諸痒為虛也○又曰診其脈洪大而數者實也細微而軟者虛也虛則補之和其氣以托裏也實則瀉之疏利而導其滯也○又曰血實則決之氣虛則掣引之○又曰形傷痛氣傷腫先腫而後痛者形傷氣也先痛而後腫者氣傷形也

精要曰凡瘡疽腫高痛甚煩渴飲冷此病氣元氣俱有餘宜用清熱消毒散仙方活命飲為主若腫高痛甚口乾飲熱此病氣有餘元氣不足宜用托裏消毒散為主若漫腫微痛食少體倦此病氣元氣俱不足宜用六君補中二湯壯其脾胃則未成者消已成者潰已潰者斂矣

心法曰凡瘡口不合膿水清稀氣血俱虛也飲食少而難化脾胃虛寒也肌體瘦弱面色痿黃脾氣不行也非參芪歸朮之類不能補非附子不能助其功今飲食進少且難消化屬脾胃虛寒蓋脾胃屬土乃命門火虛不能生土而然不宜直補脾胃當服八味丸補火以生土也

立齋曰瘡瘍之作當審其標本虛實邪正緩急而治之若病急而元氣實者先治其標病緩而元氣虛者先治其本或病急而元氣又虛者必先於治本而兼以治標大要腫高焮痛膿

水稠粘者元氣未損也治之則易漫腫微痛膿水清稀者元氣虛弱也治之則難不腫不痛或漫腫黯黑不潰者元氣虛甚治之尤難也○主治之法若腫高焮痛者先用仙方活命飲解之後用托裏消毒散○漫腫微痛者用托裏散如不應加薑桂○若膿出而反痛者氣血虛也八珍湯○不作膿不腐潰陽氣虛也四君加歸芪肉桂○不生肌不收斂脾氣虛也四君加地黃木香○惡寒憎寒陽氣虛也十全大補加薑附○晡熱內熱陰血虛也四物加參朮○欲嘔作嘔胃氣虛也六君加炮薑○自汗盜汗五臟虛也六味丸料加五味子

）食少體倦脾氣虛也補中益氣加茯苓半夏（嘗仍欬嗽脾肺虛也前湯加麥門五味○欲嘔少食脾胃虛也人參理中湯○腹痛泄瀉脾胃虛寒也附子理中湯○小腹痞足脛腫脾腎虛也十全大補湯加山茱山藥肉桂○泄瀉足冷脾腎虛寒也前藥加桂附（○熱渴淋秘腎虛陰火也加減八味丸○喘嗽淋秘肺腎虛火也補中益氣湯加減八味丸

又曰大凡虛怯之人不必分其腫潰惟當先補胃氣或疑參芪滿中間有用者又加發散敗毒所補不償所損又有泥於氣質素實或有痰不服補劑者多致有誤殊不知瘡瘍之作

緣陰陽虧損其臟既泄則氣血愈虛豈有不宜補者哉故丹溪曰但見腫痛參之脉證虛弱便與滋補氣血無虧可保終吉旨哉斯言

又曰氣無補法俗論也以其為病痞滿壅塞似難於補不知正氣虛而不能運行則邪氣滯而為病經云壯者氣行則愈怯者弱者則著而為病苟不用補氣何由而行乎

淺深辨六

齊氏精義曰瘡候多端欲辨淺深直須得法簡而論之則瘡疽槩舉有三腫高而軟者發於血脉腫下而堅者發於筋骨皮肉之色不變者發於骨髓（又曰凡察瘡疽以手按摇瘡腫根牢而大者深也根小而浮者淺也又驗其人初生瘡之時便覺壯熱惡寒拘急頭痛精神不寧煩躁飲冷者其瘡疽必深也若人雖患瘡疽而起居平和飲食如故者其瘡浮淺也惡瘡初生其頭如米粟微似有痛痒誤觸破之即微展覺有深意速服犀角升麻湯及漏蘆湯通氣等藥取通利疏暢兼用溻毒湯溻潰之類若浮淺者貼膏求差以此推之則深淺之辨始終之次也○又曰瘡寒壯熱所患必深肉色不變發於內也

竹氏曰凡癰疽其脉浮數洪緊腫焮作痛身熱煩渴飲食如常此六府不和毒發於外而為癰其勢雖急投以涼劑多保全生其脉沉細伏緊初發甚微或無瘡頭身不熱而內躁體重煩疼情緒不樂胸膈痞悶飲食無味此五臟不和毒畜於內而為疽急服五香連翹湯或神仙截法蠟礬丸製甘草湯防托毒氣免致變證內攻尤宜當頭隔蒜灸若塗毒藥迷其腠理投涼藥虛其真氣故善惡之證在乎醫之工拙耳或氣寬痛寒欬逆身冷自汗目瞪耳聾恍惚驚悸語言顛倒皆深惡證也五善見三則瘥七惡見四則危五善并至則善無以加

七惡並臻則惡之極矣

李氏曰疽初發一粒如麻豆發熱腫高熱痛色赤此爲外發勢雖熾盛治得其法可保其生若初時不發熱體倦怠患處如故數日不腫痛內臟已壞雖有盧扁之藥亦末如之何矣

立齋曰前證有因元氣虛而不能發出者有因敷貼寒藥而不發出者有因攻伐過傷氣血而不能發出者有因熱毒內蘊而失於托者審而治之多有生者

總論治法七

瘡瘍之治有宜瀉者有宜補者有宜發散者有宜調營解毒者

因證用藥各有所主經曰形氣有餘病氣有餘當瀉不當補形氣不足病氣不足當補不當瀉此其大綱也故凡察病之法若其脈見滑實洪數而焮腫痛甚煩熱痞結內外俱壅者方是大實之證此其毒在臟腑非用硝黃猛峻等劑蕩而逐之則毒終不解故不得不下然非有真實真滯者不可下此下之不可輕用也其有脈見微細血氣素弱或腫而不潰潰而不斂或飲食不加精神疲倦或嘔吐泄瀉手足常冷膿水清稀是皆大虛之候此當全用溫補固無疑矣然不獨此也即凡見脈無洪數外無煩熱內無壅滯而毒有可慮者此雖非大虛之證然察其但無實邪便當托裏養營預顧元氣何也蓋恐困苦日久或膿潰之後不待損而自虛矣及其危敗臨期能及哉故丹溪云癰疽因積毒在臟腑宜先助胃壯氣以固其本夫然則氣血凝結者自散膿瘀已成者自潰肌肉欲死者自生肌肉已死者自腐肌肉已潰者自斂若獨攻其瘡則脾胃一虛七惡蜂起其不死者幸矣卽此謂也其有脈見緊數發熱憎寒或頭痛或身痛或四肢拘急無汗是必時氣之不正外閉皮毛風熱壅盛而爲癰腫此表邪之宜散者也如無表證則不宜妄用發散以致亡陽損衛故仲景曰瘡

家不可汗此之謂也其有營衛失調氣血留滯而偶生癰腫但元氣無損飲食如常脈無凶候證無七惡此其在腑不在臟在表不在裏有熱者清其熱有毒者解其毒有滯者行其氣所當調營和衛而從平治者也大都瘡瘍一證得陽證而病氣形氣俱有餘者輕得陰證而形氣病氣俱不足者重若正氣不足而邪毒有餘補之不可攻之又不可者危若毒雖盡去而脾胃已敗血氣難復者總皆不治之證故臨證者當詳察虛實審邪正辨表裏明權衡倘舉措略乖必遺人大害斯任非輕不可忽也

王海藏云戊己曰若人氣血壅盛營衛充滿抑遏不行腐化而爲癰者當泄之以奪其盛熱之氣若人飲食少思精神衰弱營衛短澁寒搏而爲癰者當補之以接其虛怯之氣丹溪亦曰腫瘍內外皆虛宜以補接行散爲主

東垣曰瘡瘍之發其受之有內外之別治之有寒熱之異受之外者法當托裏以溫劑反用寒藥則使皮毛始受之邪引入骨髓受之內者法當疎利以寒劑反用溫藥托裏則使骨髓之病上徹皮毛表裏通潰共爲一瘡助邪爲毒苦楚百倍輕則危殆重則死矣○病機機要云內之外者其脉沉實發熱

煩躁外無焮赤痛深於內其邪氣深故宜疎通臟腑以絕其源外之內者其脉浮數焮腫在外形證外顯恐邪氣極而內行故先宜托裏也內外之中者外無焮惡之氣內亦臟腑宜通知其在經當和營衛也用此三法之後雖未即痊必無變證亦可使邪氣峻減而易愈故治瘡大要須明此托裏疎通和營衛之三法

陳良甫曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火前輩云癰疽多生於丹石房勞之人凡人年四十以上宜先用內托散次用五香連翹湯更以騎竹馬法或隔蒜并明灸足三里以發泄其毒蓄邪之所湊其氣必虛留而不去其病乃實故癰疽未潰則一毫熱藥斷不可用癰疽已潰臟腑既虧一毫冷藥亦不可用猶忌敷貼之藥閉其毫孔若熱渴便閉脉沉實洪數者宜用大黃等藥以泄其毒毒後以國老膏萬金散黃礬丸遠志酒之類選而用之

立齋曰按前證若熱毒蘊於內大便秘結元氣無虧者宜用大黃等藥泄其熱毒若陰虛陽湊精虛氣怯脾胃虛弱者宜用甘溫之劑培其本源若瘡不焮腫不作膿者雖其未潰仍須溫補若瘡已潰而腫不退痛不止者仍宜清涼之劑治之若

病急而元氣實者先治其標病緩而元氣虛者先治其本或病急而元氣更虛者必先治本而兼以治標大抵腫高焮痛膿水稠粘者元氣未損也治之則易漫腫微痛膿水清稀者元氣虛弱也治之則難不腫不痛或漫腫色黯不潰者發於陰也元氣虛甚理所不治若腫高焮痛者先用仙方活命飲後用托裏消毒散漫腫微痛者宜托裏散如不應加薑桂若膿出而反痛氣血虛也八珍湯不作膿不腐潰陽氣虛也四君加歸芪肉桂不生肌不收斂脾氣虛也十全大補加薑桂晡熱內熱陰血虛也四物加參朮欲嘔作嘔胃氣虛也六君

加炮薑有汗盜汗五臟虛也六味丸加五味子食少體倦脾氣虛也補中益氣加茯苓半夏喘促欬嗽脾肺虛也前湯加麥門五味欲嘔少食脾胃虛也人參理中湯腹痛泄瀉脾胃虛寒也附子理中湯小腹痞足脛腫脾腎虛弱也十全大補加山茱山藥肉桂泄瀉足冷脾腎虛寒也前藥加桂附熱渴淋閉腎虛陰火也加減八味丸喘嗽淋閉肺腎虛火也補中益氣湯加減八味丸凡此變證皆因元氣虧損失於預補所致（）又曰凡瘡瘍用藥當審其經絡受證標本虛實以治之不可泥於熱毒內攻專用寒凉剋伐之劑虧損脾胃氣血多

致有誤且以虛弱之人用峻利之藥則藥力未到胃氣先傷虛虛之禍有所不免故凡元氣不足者即治其初患更當內用參芪歸朮溫補脾胃外用桑枝葱熨接補陽氣使自消散又曰凡癰疽腫痛初生便覺脉沉細而煩悶臟腑弱而皮寒邪毒猛暴恍惚不寧外證深沉者亦當即用托裏散及溫熱之劑以從治之（）又曰前證若發熱煩渴大便秘結者由邪蓄於內宜內疎黃連湯以泄內毒若頭痛拘急發熱惡寒者由邪客於外宜人參敗毒散以散表邪若腫痛焮赤發熱作渴此毒氣凝於肉裏宜仙方活命飲解散其毒若食少體倦發熱惡寒此中氣虛弱宜六君子湯以補脾胃（）又曰大抵證有本末治有權宜治其主則末病自退用其權則不拘於時泥於守常必致病勢危甚况雜用攻劑動損各經乎羅謙甫云守常者衆人之見知變者智者之事知常而不知變因細事而取敗者多矣

凡癰疽實證不可溫補虛證不可涼瀉此大法也觀前條陳良甫曰凡瘡瘍未潰一毫熱藥斷不可用癰疽已潰臟腑已虧一毫冷藥亦不可用又立齋云若腫焮痛甚煩躁脉大寒熱往來大便秘結小便澁痛心神憒悶皆邪熱之證凡辛熱之

劑不但腫瘍不可用雖潰瘍亦不可用也此固然矣然一公已道其半猶未盡也余續之曰凡癰疽陰盛陽衰者但見體虛脉弱陽氣無權之證則凡苦寒之劑非惟潰瘍不可用即腫瘍亦不可用也又若陰邪凝結之毒非用溫熱何以運行而陳氏謂腫瘍不可用熱藥恐不可以槩言也

敗毒八

外科樞要曰瘡瘍之證當察經之傳受病之表裏人之虛實而攻補之假如腫痛熱渴大便秘結者邪在內也疎通之焮腫作痛寒熱頭疼者邪在表也發散之焮腫痛甚者邪在經絡

也和解之微喘微汗而不作膿者氣血虛也補托之設膿不痛或不作膿或膿成不潰者氣血虛甚也峻補之色黯而微腫微痛或膿成不出或腐肉不潰均氣血虛寒也溫補之若泥其未潰而概用敗毒復損脾胃不惟腫者不能成膿而潰者亦難收斂七惡之證蜂起多致不救薛立齋曰瘡瘍內外皆壅宜以托裏表散爲主如欲用大黃寧無孟浪之非潰瘍內外皆虛宜以托裏補接爲主如欲用香散未免虛虛之失治者審之

托裏 九

齊德之曰凡瘡疽丹腫結核瘰癧初覺有之卽用內消之法經久不除血氣漸衰肌寒肉冷膿汁清稀毒氣不出瘡口不合聚腫不赤結核無膿外證不明者並宜托裏膿未成者使膿早成膿已潰者使新肉早生血氣虛者托裏補之陰陽不和托裏調之大抵托裏之法使瘡無變壞之證凡爲瘡醫不可一日無托裏之藥然而寒熱溫涼煩渴利嘔臨證宜審其緩急耳

馬益卿曰癰疽因積毒在臟腑當先助胃壯氣使根本堅固次以行經活血藥爲佐參以經絡時令使毒氣外泄治之早

者可以內消此托裏之旨也

立齋曰大凡瘡瘍之作由胃氣不從瘡瘍之潰由胃氣腐化瘡瘍之斂由胃氣營養余嘗治初結未成膿者托而散之已成欲作膿者托而腐之膿成未潰者托而開之膿已潰者托而斂之東垣云脾爲倉廩之官胃爲水穀之海主養四旁以生血氣故胃氣乃生發之源爲人身之本然有旨哉

論汗下 十

仲景治傷寒有汗吐下三法東垣治瘡瘍有疏通托裏和營衛之三法用之得宜厥疾瘳矣假如瘡瘍腫硬木悶煩熱便秘脈沉而實其邪在內當先疏其內以下之焮腫作痛便利調和脈浮而洪其邪在表當先托其裏以汗之仲景曰瘡家雖身體疼痛不可發汗汗之則發痓苟不詳審而妄爲汗下以致血氣虧損毒反延陷少壯者難以潰斂老弱者多致不救

忌汗治按

羅謙甫云丁巳歲冬月予從軍曹州有牛經歷者病頭目赤腫耳前後尤甚疼痛不可忍發熱惡寒牙關緊急涕唾稠粘飲食難下不得安臥一瘍醫於腫上砭刺四五百餘腫亦不減其痛益甚莫知所由予往診視其脈浮緊按之洪緩此證乃

寒覆皮毛鬱遏經絡熱不得散聚而為腫經云天寒則地凍水冰人氣在身中皮膚緻密腠理閉汗不出氣血强肉堅濇當是之時善行水者不能往冰善穿地者不能鑿凍善用鍼者亦不能取四厥必待天溫凍解而後水可行地可穿人脈亦猶是也又云冬月閉藏用藥多而少鍼石也宜以苦溫之劑溫經散寒其病自已所謂寒致腠理以苦發之以辛散之也遂用托裏溫經湯依方餌之以薄衣覆其首以厚被覆其身臥於煖處使經血溫腠理開寒氣散陽氣升大汗出後腫減八九再服則去麻黃防風加連翹鼠粘子腫痛悉愈經言汗之則瘡已信哉斯言或云仲景言瘡家雖身痛不可發汗其理何也余曰此說乃營氣不從逆於肉理而生瘡腫作身疼痛非外感寒邪之病故戒之以不可發汗汗之則成痓也又問仲景言鼻衄者不可發汗復言脉浮緊者當以麻黃湯發之衄血自止所說不同其故何也予曰此正與瘡家概同夫人身血之與汗異名而同類奪汗者無血奪血者無汗今衄血妄行為熱所逼更發其汗是反助熱邪重竭津液必變凶證故不可汗若脈浮則在表脉緊則在寒寒邪鬱遏陽不得伸熱伏營中迫血妄行上出於鼻故當用麻黃湯散其寒

邪使陽氣得舒其血自止又何疑焉或者嘆曰知其要者一言而終不知其要流散無窮潔古之學可謂知其要者矣

東垣云瘡瘍有因風熱外鬱其人多怒其色赤其腫高結硬而痛其脈洪緊而弦是邪客於血脈之上皮膚之間故發其汗而通其營衛則邪氣去矣○又曰瘡瘍諸病凡面赤者雖伏大熱禁不得攻裏攻裏則下利此以陽邪怫鬱在經宜發表以去之故曰火鬱則發之雖大便數日不見宜多攻其表以發散陽氣少加潤燥之藥以潤之如見風脈風證只宜用風藥發表風邪解則大便自通也若只乾燥閉澁止宜潤之切不可下也但撿瘍鬱冒俗呼昏迷是也宜汗之則愈

初虞世云凡癰疽始作須以大黃等藥亟轉利之勿以困苦為念與其潰爛而死不若利之而死況有生道哉古人立法率用五香連翹漏蘆等藥貧乏者單煮大黃湯以利之至於膿潰乃服黃芪等藥以排膿千金外臺備矣世以瘡發於外不行轉利而死者多矣○立齋曰按前證若腫焮痛臟腑閉結屬內外俱實者當用前藥瀉之若漫腫微痛臟腑不實屬內外俱虛者當用內托補之若患處黑或與肉色不變當助胃壯氣令其內消若疼痛不止焮腫不消當用人參黃芪湯以

托裏若服藥後飲食少思肌肉不生當用參芪托裏散以補益脾胃

立齋曰王德之患發背脈浮數按之則弱大便五六日不行腹不加脹余曰邪在表不在裏但因氣血虛飲食少故大便不行非熱結也宜生氣血為主彼不信以為積毒在內仍用大黃遂連瀉不止更加發熱嘔逆飲食不進而死其子曰瀉亦能為害乎余曰服利藥而利不止者死不當瀉而强瀉令人洞瀉不禁者死下多亡陰者死曰瘡瘍乃積毒在臟若不驅逐何以得解余曰瘡瘍雖積毒在臟腑治法先當助胃氣使

根本堅固參以行經活血時宜之藥非宜妄用大黃也今其病在表而反以峻利之劑重竭其陰其可乎故曰表病裏和而反下之則中氣虛表邪乘虛而入由是變證百出雖云脈浮數者邪在表當用托裏復煎散然其間黃芩苦參亦不攻裏用以沉實者邪在裏當用內疏黃連湯然其中大黃猶倘外不攻妄用況浮數當主氣血皆虛且邪既在表而反用峻劑重傷其裏誅伐無過不死何俟

患瘡瘍之屬表邪者惟時毒丹毒斑疹及頭面頸項上焦之證多有之察其果有外邪而脈見緊數證有寒熱者方宜表散然散之之法又必辨其陰陽盛衰故或宜溫散或宜涼散或宜平散或宜兼補而散或宜解毒而散此散中自有權宜也又如裏證用下之法則毒盛勢劇者大下之滯毒稍輕者微下之營虛便結而毒不解者養血滋陰而下之中氣不足而便結壅滯者潤導而出之凡此皆通下之法但宜酌緩急輕重而用得其當耳故必察其毒果有餘及元氣壯實下之必無害者方可用下否則不但目前且尤畏將來難結之患是以表證不真者不可汗汗之則亡陽裏證不實者不可下下之則亡陰亡陰亦死亡陽亦死醫固可以孟浪乎

論灸法 十一

王海藏曰瘡瘍自外而入者不宜灸自內而出者宜灸外入者托之而不內內出者接之而令外故經曰陷者灸之灸而不痛痛而後止其灸灸而不痛者先及其潰所以不痛而後及良肉所以痛也灸而痛不痛而後止其灸灸而痛者先及其未潰所以痛而次及將潰所以不痛也

李氏云治疽之法灼艾之功勝於用藥蓋使毒氣外泄譬盜入人家當開門逐之不然則入室為害矣凡瘡初發一二日須用大顆獨蒜切片三分厚貼疽頂以艾隔蒜灸之每三壯

易蒜瘡潰則貼神異膏如此則瘡不開大肉不壞瘡口易斂
一舉三得此法之妙人所罕知若頭項見疽則不可用此法
五府極觀碑載
又曰凡患背疽漫腫無頭者用濕紙貼腫處但一點先乾處
乃是瘡頭可用大蒜十顆淡豆豉半合乳香錢許研爛置瘡
上鋪艾灸之痛否皆以前法爲度
陳氏曰腦爲諸陽之會頸項近咽喉腎俞乃致命之所皆不可
灼艾
伍氏曰凡用蒜餅灸者蓋蒜味辛溫有毒主散癰疽假火勢以

行藥力也有只用艾炷灸者此可施於頑疽痼發之類凡赤
腫紫黑毒甚者須以蒜艾同灸爲妙○又曰凡治疽癰發背
疔瘡若初灸即痛者由毒氣輕淺灸而不痛者乃毒氣深重
悉宜內服追毒排膿外傅消毒之藥大抵癰疽不可不痛又
不可大痛悶亂不知痛者難治○又曰凡隔蒜灸者不論壯
數則邪無所容而真氣不損但頭項見疽宜用騎竹馬法及
足三里灸之
千金云癰疽始作或大痛或小痛或發如米粒即便出膿宜急
斷口味利去其毒用騎竹馬灸法或就患處灼艾重者四面

中央總灸一二百壯更用敷藥其效甚速
立齋云夫瘡瘍之證有諸中必形諸外在外者引而拔之在內
者疏而下之灼艾之功甚大若毒氣鬱結瘀血凝滯輕者或
可藥散重者藥無全功矣東垣曰若不針烙則毒氣無從而
解是故善治毒者必用隔蒜灸舍是而用苦寒敗毒等劑其
壯實內熱者或可彼怯弱氣虛者未有不敗者也又有毒氣
沉伏或年高氣弱或服剋伐之劑氣益以虛膿因不潰者必
假火力以成功大凡蒸灸若未潰則拔引鬱毒已潰則接補
陽氣祛散寒邪瘡口自合其功甚大背治四肢瘡瘍氣血不

足者祗以前法灸之皆愈疔毒甚者尤宜灸蓋熱毒中隔內
外不通不發泄則不解散若處貧居僻一時無藥則用隔蒜
灸法尤便每三壯一易蒜片大概以百壯爲度用大蒜取其
辛而能散用艾炷取其火力能透如法灸之必瘡發膿潰繼
以神異膏貼之不日自愈一能使瘡不開大二內肉不壞三
瘡口易合見效甚神丹溪云惟頭爲諸陽所聚艾壯宜小而
少○曹工部發背已十八日瘡頭如粟瘡內如錐痛極時有
悶瞀飲食不思氣則愈虛以大艾隔蒜灸十餘壯尚不知而
痛不減遂明灸二十餘壯內瘡悉去毒氣大發飲食漸進更

以大補藥及桑木灸瘀肉漸潰○劉貫卿足患疔瘡已十一日氣弱亦灸五十餘壯更以托裏藥而愈○黄君腿癰膿清脉弱一婦臂結一塊已潰俱不收斂各灸以豆豉餅更飲托裏藥而愈○一男子胸腫一塊半載不消令明灸百壯方潰與大補藥不斂復灸以附子餅而愈○一男子患發背瘡頭甚多腫硬色紫不甚痛不腐潰以艾鋪患處灸之更以大補藥數日死肉脱去而愈○陳工部患發背已四五日瘡頭雖小根畔頗大以隔蒜灸三十餘壯其根内消惟瘡頭作膿數日而愈○余丙子年忽惡心大椎骨甚痒須臾臂不能舉

神思甚倦此天疽危病也急隔蒜灸之痒愈甚又明灸五十餘壯痒遂止旬日而愈精要云灸法有回生之功信矣薛按

史氏引證曰瘍醫常器之於甲戌年診太學史氏之母云内有蓄熱防其作疽至辛巳六月果背胛微痒瘡粒如黍灼艾即消隔宿復作用膏藥貼之覺開六寸許痛不可勝歸咎於艾遂過一僧自云病瘡甚危嘗灸八百餘壯方甦遂用大艾壯如銀杏者灸瘡頭及四傍各數壯痛止至三十餘壯赤腫悉退又以艾作團如梅杏大者四十壯乃食粥安寢瘡突四寸小竅百許患肉俱壞而愈○立齋曰灼艾之法必使痛者灸至不痛不痛者灸至痛則毒必隨火而散否則非徒無益而反害之

愚意癰疽爲患無非血氣壅滯留結不行之所致凡大結大滯者最不易散必欲散之非藉火力不能速也所以極宜用灸然又有孫道人神仙薰照方其法尤精尤妙若毒邪稍緩邪深經遠而氣有不達灸之爲良若毒邪熾盛其勢猛急而垂危者則宜用薰照方更勝於灸也

膿針辨十二

齊氏曰若發腫都軟而不痛者血瘤也發腫日漸增長而不大

熱時時牽痛者氣瘤也氣結微腫久而不消後亦成膿此是寒熱所爲也留積經久極陰生陽寒化爲熱以此潰者必多成瘻宜早服内塞散以排之○又凡察癰疽以手掩其上大熱者膿成自軟也若其上薄皮剥起者膿淺也其腫不甚熱者膿未成也○若患瘰癧結核寒熱發渴經久不消其人面色痿黄者被熱上蒸已成膿也○至於臟腑腸胃内瘡内疽其疾隱而深藏目既不見手不能近所爲至難但以診脉而辨之亦可知也有患胃脘癰者當候胃脉胃脉者人迎也其脉沉數氣逆則甚甚則熱聚胃口而胃脘爲癰也若其脉洪

數者膿已成也設脉遲緊雖膿未就已有瘀血也宜急治之不爾則邪氣內攻腐爛腸胃不可救也○又肺癰論曰始萌則可救膿成即死不可不愼也久之欬膿如粳米粥者不治嘔膿而止者自愈也○又腸癰論曰或遶臍生瘡膿從瘡出者有出臍中者惟大便下膿血者自愈也

伍氏曰瘡腫赤色按之色不變者此膿已成也按之隨手赤色者其亦有膿也按之白色良久方赤者此遊毒已息可就赤白盡處灸斷赤腫自消凡癰疽以手按之若牢鞕未有膿也若半軟半鞕已有膿也又按腫上不熱者爲無膿熱甚者爲

有膿宜急破之

立齋曰瘡瘍之證若毒氣已結者但可補其氣血使膿速成膿成者當驗其生熟淺深視其可否針而去之不可論內消之法小按便痛者膿淺也大按方痛者膿深也按之不復起者膿未成也按之即復起者膿已成也膿生而用鍼氣血旣泄膿反難成膿熟而不鍼則腐潰益深瘡口難斂若瘡深而針淺內膿不出外血反泄若瘡淺而針深內膿雖出良肉受傷若元氣虛弱必先補而後針勿論尻神其膿一出諸證自退若膿出而反痛或煩躁嘔逆皆由胃氣虧損也宜急補之○若背瘡熱毒熾盛中央肉黯內用托裏壯其脾胃外用烏金膏塗於黯處其赤處漸高黯處漸低至六七日間赤黯分界自有裂紋如刀劃然黯肉必漸潰矣當用鈚針利剪徐徐去之須使不知疼痛不見鮮血爲妙若雖有裂紋膿未流利及膿水雖出而仍痛者皆未通於內並用針於紋中引之○若患于背胛之間凡人背近脊處并胛皮裏有筋一層患此處者外皮雖破其筋難潰以致內膿不出令人脹痛苦楚氣血轉虛變證百出若待自潰多致不救必須開之引之兼以托裏常治此證以利刀剪之徜不能去似此堅物待其自潰不反

甚乎此亦氣血壯實者未見其能自潰也○若元氣虛弱誤服尅伐患處不痛或肉將死急須溫補脾胃亦有生者後須純補之藥庶可收斂若妄用刀針去肉出血則氣血愈虛愈傷矣何以生肌收斂乎大凡瘡瘍膿血既潰當大補血氣爲先須有他證當以末治○又曰凡瘡不起者托而起之不成膿者補而成之使不內攻膿成而及時針之不數日即愈矣常見患者皆畏針痛而不肯用又有恐傷肉而不肯用殊不知瘡雖發於肉薄之所若其膿成必腫高寸餘瘡皮又厚分許用鍼深不過一分若發於[illegible]腫高一[illegible]寸入針止於

寸許況患處肉既已壞何痛之有何傷之慮凡怯弱之人或
患附骨等疽待膿自通以致大潰不能收斂氣血瀝盡而已
者為多矣○又曰凡瘡既成膿皮膚不得疎泄昧者待其自
穿殊不知少壯而充實者或能自解若老弱之人氣血枯槁
或兼攻發大過不行針刺膿毒乘虛內攻穿腸腐膜鮮不誤
事若毒結四肢砭刺少緩則腐潰深大亦難收斂毒結於頰
項胸腹緊要之地不問壯弱急宜針刺否則難治如沈氏室
黃上舍等皆以此而殁者多矣大抵瘡瘍之證感有輕重發
有深淺淺者腫高而軟發於血脈深者腫下而堅發於筋骨

然又有發於骨髓者則皮肉不變故古人制法淺宜砭而深
宜刺使瘀血去於毒聚之始則易消若膿成之時氣血壯實
者或自出怯弱者不行針刺鮮有不誤凡瘡瘍透膜十無一
生雖以大補藥治之亦不能救此可為待膿自出之戒也故
東垣云毒氣無從而解膿瘀無從而泄過時不烙反攻於內
內既消敗欲望其生豈可得乎茲舉一二以告同道併使患
者知所慎云○又曰凡患瘡疽雖因積熱所成若初起未成
膿脈洪數乃陰虛陽亢之證若膿潰於內不得發泄於外身
必發熱故脈見洪數乃瘡疽之病進也膿既去則當脈靜身

涼腫消痛息如傷寒表證之得汗也若反發熱作渴脈洪數
者此真氣虛而邪氣實死無疑矣○又曰若治元氣不足之
證即其初患便當內用參芪歸朮溫補脾胃外用桑枝葱熨
接補陽氣使自消散若久而不能成膿者亦用前二法補助
以速之若膿既成而不潰用艾於當頭灸數壯以出之却服
十全大補湯

論鍼法十三

古有砭石之制內經有九針之別制雖不同而去病之意則
一也且瘡瘍一科用針為貴用之之際雖云量其潰之淺深

尤當隨其肉之厚薄若皮薄鍼深則反傷良肉益增其潰肉
厚針淺則膿毒不出反益其痛用針者可不慎哉至於附骨
疽氣毒流注及有經久不消內潰不痛者宜燔針開之若治
咽喉之患當用三稜針若丹瘤及癮疹四肢焮赤疼痛如灼
宜用砭石去血以泄其毒則重者減輕者消如洪氏室患腹
癰膿脹悶背以臥針刺膿出即甦一人患囊癰膿熟腫脹小
便不利幾殆急針之膿水大泄氣通而愈大抵用針之法迎
而奪之順而取之所謂不治已成治未成正此意也今之患
者或畏針而不用醫者又徇患者之意而不針遂至膿已成

而不得潰或得潰而所傷已深矣卒之夭枉者十常八九亦可悲矣見外科心法

經曰天溫日明則人血淖溢而衛氣浮故血易瀉氣易行天寒日陰則人血凝泣而衛氣沉是以因天時而調血脈也故凡遇天寒氷冰或陰氣凝滯之時欲行針刺則先當溫衣覆蓋或以艾葉炒熱或熱鹽熨衣類先熨其處務令血脈溫和而後刺之則血瀉氣行其病立已若血寒脈濇遽爾用針則邪毒不瀉徒傷良肉反以益其病也

立齋曰凡元氣虛弱者必當補助脾胃禁用刀針若妄用之而去肉去血使陽隨陰散是速其危也

薛按曰四明有屠壽卿者當門齒忽如所擊痛不可忍脈洪大而弦余曰弦洪相搏將發瘡毒也先用清胃散加白芷銀花連翹一劑痛即止至晚鼻上發一瘡面腫黯痛用前藥加犀角一劑而腫至內額口出穢氣脈益洪大惡寒內熱此毒熾血瘀藥力不能敵也乃數砭患處出紫血服犀角解毒之藥翌日腫痛尤甚又砭患處與唇上并刺口內赤脈各出毒血再服前藥至數劑而愈

用針勿忌尻神十四

立齋曰針灸之法有太乙人神周身血忌逐年尻神逐日人神而其穴有禁針禁灸之論犯者其病難瘳理固然也但瘡瘍氣血已傷肌肉已壞急宜迎而奪之順而取之非平人針灸之比何忌之有外科精義云瘡瘍之證毒氣無從而解膿瘀無從而泄反攻於內內既消敗欲望其生豈可得乎危惡之證發於致命之所禍在反掌腹癰囊癰二便不通胸腹脹悶唇疔喉痺咽喉腫塞其禍尤速患者當之

鄞人蘇子遇之內左手指患疔麻痒寒熱惡心左半體皆麻脈數不時見余曰凡瘡不宜不痛不宜大痛煩悶者不治今作麻痒尤其惡也用奪命丹二服不應又用解毒之劑麻痒始去乃作膿痛余曰勢雖危所喜作痛但毒氣無從而泄欲針之適值望日其家俱言尻神不從勢愈腫甚余強針之諸證頓退又用解毒之劑其瘡乃愈薛按

忌冷十五

內經云五臟不和則七竅不通六府不和則留結為癰又云形傷痛氣傷腫此以臟腑不和而瘡發於外也明矣若塗貼寒涼豈能調和臟腑宣通氣血耶（）若其腫痛熱渴脈滑數而有力屬純陽者宜內用消除陽外用抑陽散則熱毒自解

瘀滯自散○若似腫非腫似痛非痛似潰不潰似赤不赤脉洪數而無力屬半陰半陽者宜內用冲和湯外用陰陽散則氣血自和瘀滯自消○若微腫微痛或色黯不痛或堅硬不潰脉雖洪大按之微細軟弱屬純陰者宜內服回陽湯外敷抑陰散則脾胃自健陽氣自回也○丹溪曰敷貼之劑應酬輕小熱證耳若不辨其陰證陽證之所由分而妄敷寒涼之劑則迷塞腠理凝滯氣血毒反內攻而肉反死矣況運氣得寒則不健瘀血得寒則不散敗肉得寒則不潰新肉得寒則不生治者審焉見外科樞要

立齋曰大抵瘡之起發潰斂皆血氣使然各人元氣虛實不同有不能發出而死者有發出不能成膿而死者有成膿不能腐潰而死者有腐潰不能收斂而死者敷貼之法但可應酬輕小之證耳若血氣已竭其患必死不但敷貼不效且氣血喜溫而惡寒腠理喜通而惡塞氣血因而愈滯腫患因而愈盛邪氣因而愈深腐潰因而愈大怯弱之人取敗多矣況瘡瘍乃七情相火或食膏粱或餌金石以傷陰血陽盛陰虛受病於內而發於外若不別氣分血分陰陽虛實腐潰淺深而服藥尚有不能保生者可敷貼而已乎

施二字項右患一核用涼藥敷貼頸皆腫又敷之腫延胸腹冷應服內不悟涼藥所致尚以為毒盛形體困憊自分不起延余治之見其敷藥處黯氣如霧急令去藥良久瘡色變赤刺出膿血用托裏藥而愈○張侍御發背專用敷藥瘡黯不起胸膈悶氣不能呼吸自分不治余用辛溫托裏藥而愈○一男子臂癰腐潰肌肉不生用藥敷之肌肉四沿反硬予診之脉澀而弱此氣血俱虛不能營於患處故敷涼藥反硬乃血氣受寒凝結而非毒也用大補藥而愈○一男子患胸疽腫高作痛腫處敷藥痛雖止而色變黯腫外作痛仍敷之肉色

亦黯喉內作痛不悟此為涼藥所誤反盡頸敷之其頭皆潰而死○一男子因怒左脇腫一塊不作痛脉澀而浮余曰此肝經邪火熾盛而真氣不足為患宜培養血氣為主彼以草藥敷貼遂致不救○王安人發背正潰時欲速效敷以草藥即日而死○張宜人年踰六十患發背三日肉色不變頭如粟許肩背腫脉洪數寒熱飲冷予以人參敗毒散二劑及隔蒜灸五十餘壯毒大發背始輕再用托裏藥漸潰因血氣虛甚而作渴用參芪歸朮等藥而渴亦止彼欲速效乃自用草藥罨患處毒氣復入遂不救薛按

凡癰瘍腫痛宜用圍藥敷治者惟降癰散為第一無論陰毒陽毒皆所宜也

腐肉十六

齊德之曰夫瘡瘍生於外皆由積熱蘊於內內經謂血妄肉敗榮衛不行必將為膿留於節腠必將為敗蓋瘡疽膿潰之時頭小未破瘡口未開或毒氣未出疼痛難忍所以立追蝕腐潰之法使毒氣外泄而不內攻惡肉易去好肉易生也若紝其瘡而血出不止者則未可紝於瘡上移追蝕之藥待其熱可紝方紝若紝其瘡而痛應心根者亦不可強紝之誤觸其瘡焮痛必倍變證不無不可不慎也若瘡癤膿成未破於上薄皮剝起者即當用破頭代針之劑安其上以膏貼之膿出之後用搜膿化毒之藥取效如神矣若膿血未盡便用生肌斂瘡之劑欲其早愈殊不知惡肉未盡其瘡早合後必再發不可不慎也

立齋曰瘡瘍之證膿成者當辨其生熟淺深肉死者當驗其腐潰連脫余當治脈證虛弱者用托裏之藥則氣血壯而肉不死脈證實熱者用清熱之劑則毒氣退而肉自生凡瘡聚於筋骨之間肌肉之內皆因血氣虛弱用十全大補湯壯其脾胃則未成者自散已成者自潰又何死肉之有若不大痛或不赤或內膿不潰或外肉不腐乃血氣虛弱宜用桑枝灸及十全大補加薑桂壯其陽氣則四畔即消瘡頭即腐其毒自解又何待於針割若脾胃虛弱飲食少思用六君倍加白朮壯其營氣則肌肉受毒者自潰已死者自活已潰者自斂若初起或因尅伐或犯房事以致色黯而不痛者乃陽氣脫陷變為陰證也急用參附湯溫補回陽亦有可生○又曰夫腐肉者惡肉也大凡癰疽瘡腫潰後若有腐肉凝滯者必取之乃推陳致新之意若壯者筋骨強盛氣血充溢真能

勝邪或自去或自平不能為害若年高怯弱之人血液少肌肉澁必迎而奪之順而取之是謂定禍亂以致太平設或留而不去則有爛筋腐骨之患如劉大尹汪夫人取之及時新肉即生得以全愈金工部鄭揮使取之失期大潰而斃予常見腐肉既去雖少壯者不補其氣血尚不能收斂若怯弱者不取惡肉不補血氣未見其生也故古人曰壞肉惡於狼虎毒於蜂蠆緩去之則戕賊性命信哉○又曰瘡瘍之證若毒氣已結腫赤熾盛中央肉死黯黑者內用托裏健脾之劑外用烏金膏塗之則黯處漸低赤處漸起至六七日間赤黯

之界自有裂紋如刀劃狀其黯漸潰若用鈹針利剪徐去稍
好須使不知疼痛不見鮮血爲善若膿未流徘宜用針於紋
中引之若膿水已出仍痛侍作乃內筋間膈亦用針引之若
元氣虛弱誤服尅伐之劑患處不痛或肉死不潰者急溫補
脾胃亦有復生者後須純補脾胃庶能收斂此則不可妄用
針刀若誤用之以去肉出血使陽隨陰散是速其危也

一論外通用方

鈹頭散 外一四四 去腐肉　代鍼膏 外一四五 潰頭

透骨丹 外一四二 潰頭　豬蹄湯 外一一五 洗瘡

舍時從證 一七

立齋曰經云諸痛痒瘡皆屬於心若腫赤煩躁發熱大痛飲冷
便秘作渴脈洪數實者爲純陽雖在嚴冬之時必用大苦寒
之劑以瀉熱毒若不腫不痛脈細皮寒瀉利腸鳴飲食不入
嘔吐無時手足厥冷是爲純陰雖在盛暑之時必用大辛溫
熱之劑以助陽氣不拘嚴寒盛暑但當舍時從證若微腫微
痛似潰不潰時出清膿者爲半陰半陽宜用辛熱之劑溫補
胃氣此亦治陰陽法也若夫用寒遠寒用熱遠熱有假者反
之雖違其時必從其證者在此常法但不可不知矣〇壬午仲冬金
臺一男子患痢誤服乾薑理中丸即時口鼻出血煩躁發
狂入井而死〇辛卯冬一吏患傷寒誤服附子藥一鍾下咽
發躁奔走跌死〇夫盛暑之際附子薑桂三藥並用連進三
四劑無事嚴冬時令三藥單用一味止進一劑者即死可見
羅謙甫先生有舍時從證權宜用藥之妙余宗此法凡冬間
瘡證如脈沉實洪數大便秘瘡焮痛煩躁或飲冷不絕者即
用硝黃芩連之劑攻之雖在夏令而脈見虛弱或浮大瘡不
潰膿清稀惡寒飲者即用薑桂參芪之劑補之如脈見沉細
瘡不潰不痛作嘔逆手足冷大便不實或瀉利或腹痛更加
附子皆獲大效昧者反以爲非殺亂患人俗守常法必使冬
用溫熱夏用清涼以致殺人亦可哀也薛按

仝元壬午五月二十八日王伯祿年逾五旬有七右臂瘍腫甚
上至肩下至手指色變皮膚涼六脈沉細而微此乃脈證俱
寒余與騎孫彥和視之曰此乃附骨疽開發已遲以燔針
啟之膿清稀解次日肘下再開之加呃逆不絕彥和與丁香
柿蒂散兩劑稍緩次日呃逆尤甚自利臍腹冷痛腹滿飲食
減少時發昏憒於左乳下黑尖處灸二七壯又處托裏溫中
湯用乾薑附子木香沉香茴香羌活等藥㕮咀一兩半欲與

服或者曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火又當盛暑之時用乾薑附子可乎予應之曰理所當然不得不然內經曰脈細皮寒瀉利前後飲食不入此謂五虛況吃逆者胃中虛寒故也諸痛痒瘡瘍皆屬心火是言其定理也此證內外相反須當舍時從證非大方辛熱之劑急治之則不能愈也遂投之諸證悉去飲食倍進瘡勢溫煖色正彥和復用五香湯數服後月餘平復噫守常者衆人之見知變者知者之能知常不知變因細事而取敗者亦多矣況乎醫故見羅氏衛生寶鑑

愚意羅先生以舍時從證之法垂訓後人誠百世不磨之要道也但時之遷變本所難知而證之幽顯尤不易識何也蓋常人之所謂時者春夏秋冬之時也歲歲時常之主氣也誰不得而知之而不知五六周環則長夏有寒淫之令三冬有炎暑之權此則雖若舍時而實以從時昧者固能知此乎又如察證之法則凡脈細皮寒泄瀉厥冷之類是皆已見之寒證也又誰不得而知之不知其來有源其甚有漸即諸證未見之前而本來已具此際使難錯認使必待焦頭爛額而後曲突從薪則已晚矣此羅先生之所以明已然而余則更為慮未然蓋恐人之見之遲而無及於事也雖然余常見今人之於已然者尚不能見而復欲其見未然誠哉迂矣然余慨然之念則不能不道其詳而深望於知音者

陽氣脫陷 十八

立齋曰瘡瘍陽氣脫陷或因克伐之劑或因膿血大泄或因吐瀉之後或因誤以入房大凡潰後勞後元氣虧損或夢遺精脫或脈數便血或外邪乘虛而入以致發熱頭痛小便淋澀或口乾煩喘氣短頭暈體倦熱渴意欲飲水投水身熱增寒惡衣揚手擲足腰背反張鄭聲自汗脈浮洪大此無根虛火之假熱證也若畏寒頭痛欬逆嘔吐耳聵目矇小便自遺瀉利腸鳴裏急腹痛玉莖短縮齒牙浮痛肢體麻痺冷汗時出或厥冷身痛咬舌嚙唇舌本強硬呃逆喘促脈微沉細此陽氣脫陷之真寒證也凡此危候無論脈證但見有一二急用參附湯或用托裏消毒散去連翹白芷金銀花三味急加桂附大劑補之多有復生者

內翰楊皋湖孟夏患背疽服克伐之劑二旬餘矣漫腫堅硬重如負石隔蒜灸五十餘壯背遂輕以六君加砂仁二劑涎沫涌出飲食愈少此脾胃陽氣脫陷也剂用溫補反嘔不食仍用前藥作大劑加附子薑桂又不應遂以參芪各一觔歸朮

陳皮各半兩附子一兩煎服三日而晝夜頓止腐肉頓潰飲食頓進再用薑桂等藥托裏健脾腐脫而瘡愈矣少參史南湖之內夏患疽不起發脈大而無力發熱作渴自汗盜汗用參芪大補之劑益加手足逆冷大便不實喘促時嘔脈細微按之如無惟太衝不絕仍以參芪白朮當歸茯苓陳皮計斤許加附子五錢水煎二鍾作一服喘嘔頓止脈息頓復翌日瘡起而潰仍用前藥四劑後日用托裏藥調理兩月餘而愈薛按

一婦人於癸卯冬失物發怒缺盆內微腫甲辰春大如覆碗左肩臂亦腫肉色如故或針出鮮血三碗遂腹痛如錐泄瀉不止四肢逆冷嘔吐惡寒或時發熱絕食已七日矣其脈洪大時或微細此陽氣脫陷也用六君加炮薑三錢附子二錢早服至午不應再劑加附子五錢熟睡覺來諸證頓退六七可進稀粥再用前藥二劑諸證悉退飲食如故缺盆始痛針出清膿二碗許諸證復至此虛極也以十全大補加薑桂附各一錢三劑而安後減薑附各五分與歸脾湯兼服五十餘劑而愈薛按

溫補按則十七

留都鄭中翰仲夏患發背已半月瘡頭十餘枚皆如粟許漫腫

堅硬根如大盤背重如負石即隔蒜灸五十餘壯其背頓輕彼因輕愈不守禁忌三日後大作瘡不起發但苦作痛用活命飲因勢少退用香砂六君子湯四劑飲食少進彼恃知醫自用敗毒藥二劑飲食益少口流涎沫若不自知此脾虛之甚也每用托裏藥加參芪各三錢彼密自揀去大半後雖用大補藥加薑桂亦不應遂令其子以參芪各一斤歸朮各半斤乾薑桂附各一兩煎膏一罐三日飲盡涎頓止腐頓潰食頓進再用托裏健脾藥腐肉自脫而愈下俱薛按

京侍御患背瘡三枚皆如粟彼以為小毒服清熱化痰藥外用涼藥敷貼數日尚不起色黯不焮痛中氣不得出入勢甚可畏連用活命飲二劑氣血稍利瘡稍起欲用補劑彼泥於素有痰火不受參朮之補因其固執遂陽以敗毒之劑與視之而陰以參芪歸朮各五錢薑桂各二錢服二劑背覺熱腐肉得潰方信余言始明用大補藥乃愈

南都聶姓者時六月患發背腐肉已去瘡口尺許色赤焮腫發熱不食欲嘔不嘔服十宣散等藥自為不起請余決之其脈輕診則浮而數重診則弱而濇此潰後之正脈然瘡口開張血氣虛也欲嘔不嘔脾胃虛也色赤焮腫虛火之象也尚可

治遂與十全大補湯加酒炒黃栢知母五味麥門及飲童便飲食頗進肌肉頗生服至八劑瘡口收如粟許又惑於人言謂餘毒未盡乃服消毒藥二劑復發熱昏憒急進前藥又二十餘劑乃愈後兩月因作善事一晝夜不睡以致勞倦發熱似瘧不瘧與前湯二劑更加發熱飲食不進惟飲熱湯後以前藥加附子一錢二劑復愈

一高秋官貞甫孟秋發背色黯而硬不痛不起脉沉而細四肢逆冷急用大艾隔蒜灸三十餘壯不痛遂用艾如粟大者著肉灸七壯乃始知痛與六君子湯二劑每劑入附子二錢不應

後劑又加肉桂二錢始應而愈

一男子腦腫一塊日久不潰按之微痛脉微而澁此形證俱虛也經曰形氣不足病氣不足當補不當瀉予以人參養營湯治之彼不信乃服流氣飲虛證悉至方服前湯月餘少愈但腫處尚硬以艾葉炒熱熨患處至十餘日膿成以火針刺之更灸以豆豉餅又服十全大補湯百劑而愈

定痛

齊氏曰瘡瘍之證候不同凡寒熱虛實皆能為痛故止痛之法殊非一端也人皆謂乳沒珍貴之藥可住疼痛而不知臨病制宜自有方法蓋熱毒之痛者以寒凉之藥折其熱而痛自止也寒邪之痛以溫熱之劑熨其寒則痛自除也因風而痛者除其風因濕而痛者導其濕燥而痛者潤之塞而痛者通之虛而痛者補之實而痛者瀉之因膿鬱而閉者開之惡肉侵潰者去之陰陽不和者調之經絡秘澁者利之臨機應變方為上醫不可執方而無權也

一立齋曰瘡瘍之作由六淫七情所傷其痛也因氣血凝滯所致假如熱毒在內便秘而作痛者內疏黃連湯導之熱毒熾盛焮腫而作痛者黃連解毒湯治之不應仙方活命飲解之瘀

血凝滯而作痛者乳香定痛丸和之作膿而痛者托裏消毒散排之膿脹而痛者針之膿潰而痛者補之若因氣虛而痛四君加歸芪血虛而痛四物加參芪腎虛而痛六味地黃丸口乾作渴小便頻數者加減八味丸此皆止痛之法也慎勿概用寒凉之藥况血氣喜溫而惡寒若冷氣入裏血即凝滯反為難瘥之證矣丹溪云膿出而反痛此為虛也宜補之秽氣所觸者和解之風寒所逼者溫散之若專用[illegible]乳沒止痛者知其必無效也

凡瘡瘍焮腫赤痛之甚者雖內治之法已具如前然煎劑功緩

而痛急難當者必須外用敷藥既欲其止痛又欲其散毒則無如降癰散之神妙也

生肌收口 附痂漏證二十一

陳良甫曰癰疽之毒有淺深故收斂之功有遲速斷不可早用收口之藥恐毒氣未盡後必復發為患非輕若癰久不合其肉白而膿少者此氣血俱虛不能潮運而瘡口冷澀也每日用艾葉一把煎湯避風熱洗及燒松香烟熏之或用猪蹄湯洗之更以神異膏貼之必須守禁調理否則不效○又曰膿得寒則下陷凝滯肌肉故曰留連肉騰是為冷漏須溫補之

丹溪曰諸經惟少陽厥陰之生癰者宜須防之以其多氣少血也血少則肌肉難長故瘡久未合必成敗證苟反用驅利毒藥以伐其陰分之血禍不旋踵矣

立齋曰潰肉者脾胃之所主收斂者血氣之所使但當純補脾胃不宜泛敷生肌之劑夫瘡不生肌而色赤甚者血熱也四物加山梔連翹色白而無神者氣虛也四君加當歸黃芪晡熱內熱陰血虛也四物加參朮膿水清稀者氣血虛也十全大補湯食少體倦脾氣虛也補中益氣湯煩熱作渴飲食如常胃火也竹葉黃芪湯不應竹葉石膏湯熱渴而小便頻數

腎水虛也用加減八味丸不應服若敗肉去後新肉微赤滑白膿者此胃中生氣也但用四君子湯以培補之則不日自斂若妄用生肌之藥餘毒未盡而反益其毒殊不知瘡瘍之作由胃氣不調瘡瘍之潰由胃氣腐化瘡瘍之斂由胃氣榮養○東垣云胃乃發生之源為人生之本丹溪亦謂治瘡瘍當助胃壯氣使根本堅固誠哉是言也可不慎歟○又曰若肌肉傷而瘡口不斂用六君子湯以補脾胃若氣虛惡寒而瘡口不斂用補中益氣湯以補脾肺若血虛發熱而瘡口不斂用四物參朮以滋肝脾若膿多而瘡口不斂用八珍湯

或十全大補湯以養血氣如不應但用四君歸芪以補脾胃更不應乃屬命門火衰急用八味丸以壯火生土若脈數發渴者難治以真氣虛而邪氣實也○又曰生肌之法當先理脾胃助氣血為主若氣血俱虛不能生者當用托裏之劑若有風寒襲於瘡所不能生者宜用豆豉餅灸之若流注頑瘡內有膿管或瘀肉或癧核須用針頭散腐之錠子尤妙如背瘡杖瘡湯火瘡大潰當用神效當歸膏則能去腐生新止痛大有神效○又曰癰疽潰後若毒盡則肉自生常見世之治者往往用龍骨血竭之屬以求生肌殊不知餘毒未盡肌肉何

以得生氣血既虛能滋益能伴敷又若膿毒不盡而用生肌
則反增潰爛若輕者不過復潰或遲斂而已重者必
致內攻或潰爛不斂反致危矣○又曰凡瘡瘍成漏皆因元
氣不足營氣不從陽氣虛寒則寒氣逆於肉裏稽留血脈腐
潰既久而成是患故凡治不足之證於其初患便當內用參
芪歸朮溫補脾胃外用桑枝葱熨接補陽氣使自消散若久
而不能成膿亦用前法補助以速之若膿既成而不潰用
艾於當頭灸數壯而出之却服十全大補湯患者又當慎起
居節飲食庶凡收斂若用冷針開刺久而內出清膿外色黑

黯或誤用生肌散速其口斂反束其邪必成敗證
一治瘡患久成漏常有膿水不絕其膿不臭若無歹肉者法用炮
附子去皮尖為細末以唾津和為餅如三錢厚安瘡上以艾
炷灸之漏大艾亦大漏小艾亦小但灸令微熱不可令痛乾
則易之一次十日不論灸後貼以膏藥間一二日又如
前日灸更良人倘氣血之旺直至肉平為度或用炮附切
片三分厚灸之亦可或用江西淡豆豉為餅多灸之亦效○
若瘡久成漏外有腐肉內有膿管不化者用針頭散和
作細條紝入口內外用膏藥貼之待膿管盡去自然漸平收
口或先用灸法數日後用此紙藥亦可仍內服十全大補等
藥
郭氏灸法瘡疽久不收斂及有膿水惡物漸潰根深者用白麪
硫黃大蒜三物一處搗爛看瘡大小捻作餅子厚約三分安
於瘡上用艾炷灸二十一壯一灸一易後隔四五日用藥錠
針頭散等藥紝入瘡內反肉盡去好肉長平○後貼收斂之
藥內服應病之劑調理即瘥矣
一男子年踰二十稟弱左腿外側患毒三月方潰膿水清稀肌
肉不生以十全大補湯加牛膝二十餘劑漸愈更以豆豉餅

灸之月餘而痊○一婦人左臂結核年餘方潰膿清不斂一
男子患貼骨癰腿細短軟瘡口不合俱用十全大補湯外以
附子餅及貼補藥膏調護得宜百劑而愈大凡不足之證宜
大補之劑兼灸以補接陽氣祛散寒邪為上○京師萬賜年
踰四十胸患瘡成漏日出膿碗許喜飲食如常以十全大補
湯加貝母遠志白斂續斷灸以附子餅膿漸少謹調護歲餘
而愈薛按

用香散論二十一

竇氏曰氣血聞香則行聞臭則逆大抵瘡瘍多因營氣不從逆

於肉理故鬱聚為膿得香散藥則氣流行故當多服五香連翹湯萬金散清心內固金粉散凡瘡本腥穢又聞臭穢則愈甚若毒氣入胃則為咳逆古人用此可謂有理且如飲食調令香美則益脾土養真元保其無虞矣

立齋曰今人有瘡瘍不審元氣虛實病之表裏病者多喜內消而醫者即用十宣散及敗毒散流氣飲之類殊不知十宣散雖有參芪然防風白芷厚朴桔梗皆足以耗氣況不分經絡時令氣血多少而槩用之乎敗毒散乃發表之藥果有表證亦止宜一二服多則元氣反損其毒愈盛雖有人參莫能補

也況非表證而用之乎流氣飲乃耗血之劑果氣結膈滿亦止宜一二服多則血氣愈傷反血氣凝滯多因榮衛氣弱不能運行豈可復用流氣飲以益其虛況諸經氣血多寡不同而流氣飲通行十二經則諸經皆為所損反為敗證雖有參耆亦難倚仗若發之過度則氣虛而耗何以成膿苟不察其由而泛投克伐之劑能無危乎此三藥者其不可輕用亦明矣河間云凡瘡止於一經或兼二經者止當求責其經不可干擾餘經也

槐花酒二十二

槐花治濕退熱之功最為神速大抵腫毒非用蒜灸及槐花酒先去其勢雖用托裏諸藥其效未必甚速惟胃寒之人不可過用

洪州于侍御髀胛患毒痛甚服消毒藥其勢未減即以槐花酒一服勢隨大退再以托裏消毒之藥而愈○王通府患發背十餘日勢危脈大先以槐花酒二服殺退其勢更以敗毒散二劑再以托裏藥數劑漸潰又用桑柴燃灸患處每日灸良久仍以膏藥貼之灸至數次膿潰腐脫以托裏藥加白朮陳皮月餘而愈○劉大尹發背六七日滿背腫痛勢甚危與隔

蒜灸百壯飲槐花酒二碗即睡覺以托裏消毒藥十去五六令以桑枝灸患處而潰數日而愈○一上舍肩患疽脈數以槐花酒一服勢頓退再與金銀花黃芪甘草十餘服而平 薛按

忍冬酒二十四

忍冬酒治癰疽發背初發時便當服此不問疽發何處或婦人乳癰皆有奇效如或處鄉落貧家服此亦便且效仍兼以麥飯石膏及神異膏貼之甚效

一園丁患發背甚危令取金銀藤五六兩搗爛入熱酒一鍾絞取酒汁溫服柤罨患處四五服而平彼用此藥治瘡足以養

身成家遂棄舉業諸書皆云金銀花治癰瘍未成者即散已成者即潰有回生之功○一男子患腦癰其頭數多痛不可忍先服消毒藥不應更以忍冬酒服之即酣睡覺而勢去六七再四劑而消○又一男子所患尤甚亦令服之腫痛頓退但不能平加以黃芪當歸瓜蔞仁白芷甘草節桔梗數劑而愈○一男子被兒齧身有青痕作痛以金銀花煎湯飲之即愈本草謂此藥大治五種飛尸此其驗也

腫瘍二十五

立齋曰腫高焮痛脉浮者邪在表也宜托之○腫硬痛深脉沉者邪在裏也宜下之○外無焮腫內則便利調和者邪在經絡也當調營衛○焮腫煩躁或咽乾作渴者宜降火○焮腫發熱或拘急或頭痛者邪在表也宜散之○大痛或不痛者邪氣實也隔蒜灸之更用解毒○煩躁飲冷焮痛脉數者邪在上也宜清之○惡寒而不潰者氣虛兼寒邪也宜宣而補之○焮痛發熱汗多大渴便結譫語者結陽證也宜下之○不作膿或熱而不潰者虛也宜補之○又曰大抵癰腫之證不可專泥于火為患況稟有虛實及老弱不同豈可槩用寒涼之藥設若毒始聚勢不盛者庶可消散尤當推其病因別

其虛實若槩用涼藥必致誤事如膿將成邪盛氣實者用消毒之劑先殺其毒雖作膿不為大苦潰亦不甚若就用托裏必益其勢如膿將成不成及不潰者方用托裏膿成勢盛者針之膿一出諸證悉退矣

丹溪曰腫瘍內外皆壅宜以托裏表散為主如欲用大黃寧無孟浪之非潰瘍內外皆虛宜以補接為主如欲用香散未免虛虛之失

愚意前論腫瘍有云忌補宜下者有云禁用大黃者此其為說若異而亦以證有不同耳蓋忌補者忌邪之實也畏攻者畏氣之虛也即如腫瘍多實潰瘍多虛此其常也然腫瘍亦多不足則有宜補不宜瀉者潰瘍亦或有餘則有宜瀉不宜補者此其變也或宜補或宜瀉總在虛實二字然虛實二字最多疑似貴有定見如火盛者宜清者也氣滯者宜行者也既熱且壅宜下者也無滯無壅則不宜妄用攻下此用攻之宜禁者也至若用補之法亦但察此二者凡氣道壅滯者不宜補火邪熾盛者不宜溫若氣道無滯火邪不甚或飲食二便清利如常而患有危險可畏者此雖未見虛證或腫瘍未潰亦宜即從托補何也蓋恐困苦日久無損自虛若能預固元

氣則毒必易化膿必易潰口必易斂即大癰大潰猶可望生若必待虛證叠出或既潰不能收斂而後勉力支持則輕者必重重者必危能無晚乎此癰瘍之有不足也所係非細不可不察○向予長男生在癸丑及乙卯五月甫及二週而患背疽初起時背中忽見微腫數日後按之則根深漸闊其大如碗而皮色不變亦不甚痛至十餘日身有微熱其勢滋甚因謀之瘍醫或云背疽或云痰氣咸曰當用清補一毫不可入口乃投以解毒之藥一劑而身反大熱神氣愈困飲食不進矣予危懼之甚因思丹溪有云癰疽因積毒在臟腑當先

助胃氣爲主使根本堅固而以行經活血佐之又曰但見腫痛參之脉證虛弱便與滋補氣血無虧可保終吉是誠確論也因却前醫而專固元氣以內托其毒遂用人參二錢製附子一錢佐以當歸熟地炙甘草肉桂之屬一劑而飲食頓進再劑而神彩如舊抑何神也由是弛其口腹樂食命進十劑而膿成以其根深皮厚復用針出膿甚多調理月餘而愈向使傾信庸流絕忌溫補滋味專意解毒則胃氣日竭毒氣日陷飲食不進倘致透膈內潰則嗚呼不保矣且此兒素無虛病何敢乃爾蓋以其既病之證又無實邪見有確真故敢峻

補脾腎方保萬全嗚呼醫之關係皆是類也因錄此按用告將來以見癰瘍潰瘍凡虛證未見而但無實熱壅滯可據者便宜托補如此則其受益于不識不知有非可以言語形容者新按

腫瘍不足二十六

汪太夫人年逾八十腦疽已潰發背繼生頭如粟米脉大無力此膀胱經濕熱所致然脉大無力乃血氣衰也遂以托裏消毒散數服稍可更加參芪之劑雖瘡起而作渴此氣血虛甚以人參黃芪各一兩當歸熟地各伍錢麥冬五味各一錢數

服渴止而愈此不有臟腑能言氣血能告豈能省悟病者至死皆歸於命深可哀也○又有患者氣質素實或有痰不服補劑然不知膿血內潰氣血並虛豈不宜補余常治瘡陰用參芪入補之劑陽書敗毒之名與服之俱不中滿瘡亦隨效虛甚者仍加薑桂甚至附子未嘗有不效也薛按

潰瘍二十七

立齋曰膿熟不潰者陽氣虛也宜補之○瘀肉不腐者宜大補陽氣更以桑木灸之○膿清或不斂者氣血俱虛宜大補○膿後食少無睡或發熱者虛也宜補之○倦怠懶言食少不

睡者虛也宜補之○寒氣襲於瘡口不能收斂或陷下不斂者溫補之○脈大無力或微濇者氣血俱虛也峻補之○出血或膿多煩躁不眠者乃亡陽也急補之○凡膿潰而清或瘡口不合或聚腫不赤肌寒肉冷自汗色脫者皆氣血俱虛也非補不可○凡膿血去多瘡口雖合尤當補益務使氣血平復否則更患他證必難治療也○又曰大抵膿血大泄當大補血氣為先雖有他證以末治之凡癰疽大潰發熱惡寒皆屬氣血虛甚若左手脈不足者補血藥當多於補氣藥右手脈不足者補氣藥當多於補血藥切不可發表○大凡癰疽全藉血氣為主若患而不起或潰而不腐或不收斂及膿少或清者血氣之虛也俱宜大補之最忌攻伐之劑亦有膿反多者乃氣血虛而不能禁止也常見氣血充實之人患瘡者必腫高色赤易腐潰而膿且稠又易於收斂怯弱之人多不起發不腐潰及難於收斂若不審察而妄投攻劑虛虛之禍不免矣及患後更當調養若瘰癧流注之屬尤當補益也否則更患他證必難措治慎之○又曰潰瘍屬氣血俱虛因而作痛者患潰瘍由氣血虛弱者尤宜峻補否則難潰而不斂矣又凡大瘡潰之後瘡口未復多致再發者不可補必變

為他證而危或誤以寒藥復發反行攻伐則速其不起深可為戒也○又曰若瘡瘍腫焮痛甚煩躁脈大則辛熱之劑不但腫瘍不可用即潰瘍亦不可用也

太平聖惠方云凡癰疽膿潰之後脈微遲緩者邪氣去而真氣將復也為易愈若脈來沉細而直者裏虛而欲變證也若膿血既大則當脈靜身涼腫消痛息如傷寒表證之得汗也若反發熱作渴脈洪數者此真氣虛而邪氣實也死無疑矣

潰瘍有餘　二十八

潰瘍有餘之證其治有四蓋一以元氣本強火邪本盛雖膿潰之後而內熱猶未盡除或大便堅實而能食脈滑者此其形氣病氣俱有餘仍宜清利不宜溫補火退自愈亦善證也一以真陰內虧水不制火臟腑燥澀而熱反甚脈反躁者欲清之則正氣以虛欲補之則邪氣愈甚此正不勝邪窮敗之證不可治也一以毒深而潰淺者其肌腠之膿已潰而根盤之毒未動此乃假潰非真潰也不得遽認為潰瘍而概施托補若誤用之則反增其害當從乎此也又有一種元氣以虛似宜補然其痰實蓄聚肌肉堅厚色黑而氣道多壅者略施培補反加滯悶若此者其虛既不可補其實又不可攻最難調

理極易招怨是亦不治之證也總之潰瘍有餘者十之一二故潰瘍宜清者少腫瘍不足者十常四五故腫瘍宜補者多此亦以證治之危險有關生死者為言故貴防其未然也至若經絡浮淺之毒不過腫則必潰潰則必斂又何必卷卷以補為辨也觀者審之

一男子年逾三十腹患腫硬脈數喜冷齊氏云瘡瘍腫起堅硬膿稠者實也又云腫焮痛煩躁飲冷者邪氣在內也遂用清涼飲倍加大黃二劑稍緩又以四物湯加芩連山梔木通四劑遂潰更以十宣散去參芪肉桂加金銀花天花粉漸愈

彼欲速效自服温補藥遂致肚腹俱腫小便不利仍以清涼飲治之膿潰數碗再以托裏藥而愈○一男子年逾七旬患發疽已潰焮痛甚脈洪數大便秘澀東垣曰煩躁飲冷身熱脈大精神昏悶者皆臟腑之實也遂以清涼飲一劑腫痛悉退更以托裏消毒藥三十餘劑而平若謂老弱而概投以補藥則實實之禍不免矣薛按

潰瘍作痛　十九

立齋曰膿出而反痛者虛也宜補之○脈數虛而痛者屬虛火宜滋陰○脈數實而痛者邪氣實也宜泄之○脈實便秘而痛者邪在內也宜下之○脈滑而痛者氣血虛寒也宜補之○大抵瘡之始作也先發為腫氣血鬱積蒸肉為膿故多痛膿潰之後腫退肌寬痛必漸減若反痛者乃虛也宜補之亦有穢氣所觸者宜和解之風寒所逼者宜温散之

一男子年二十餘股內患毒日久欲求內消診其脈滑數知膿已成因氣血虛不潰遂刺之膿出作痛以八珍湯治之少可但膿水清稀更以十全大補湯加炮附子五分數劑漸愈仍服十全大補湯三十餘劑而痊○一僧股內患腫一塊不痛不潰治以托裏二十餘劑膿成刺之作痛予謂腫而不潰潰而

反痛此氣血虛甚也宜峻補之彼云氣無補法予謂正氣不足不可不補補之則氣化而痛邪自除遂以參芪歸朮熟地黃治之兩月餘而平薛按

潰瘍發熱　附惡寒　二十

凡身發熱有三法以輕手捫之則熱重按之則不熱是熱在皮毛血脈也重按之在筋骨之分則熱蒸手極甚輕手則不熱是邪在筋骨之間也不輕不重按之而熱是熱在筋骨之上皮毛血脈之下乃熱在肌肉也

仲景曰脈虛則血虛血虛生寒陽氣不足也○寸口脈微為陽

不足陰氣上入陽中則洒淅惡寒尺脈弱為陰不足陽氣下陷入陰中則發熱也

王氏曰病熱而脈數按之不鼓動乃寒盛格陽而致之非熱也形證似寒按之而脈氣鼓擊於指下盛者此為熱甚拒陰而生病非寒也

東垣曰發熱惡熱大渴不止煩躁肌熱不欲近衣或目痛鼻乾但脈洪大按之無力者非白虎湯證也此血虛發熱當以當歸補血湯主之又有火鬱而熱之證如不能食而熱自汗氣短者虛也當以甘寒之劑瀉熱補氣如能食而熱口舌乾燥

大便難者當以辛苦大寒之劑下之以瀉火保水○又曰晝則發熱夜則安靜是陽氣自旺於陽分也晝則安靜夜則發熱煩躁是陽氣下陷入陰中也名曰熱入血室晝夜發熱煩躁是重陽無陰也當亟瀉其陽峻補其陰

立齋曰脈浮或弱而熱或惡寒者陽氣虛也宜補氣○脈洪而熱者血虛也宜補血○脈浮數發熱而痛者邪在表也宜散之○脈沉數發熱而痛者邪在裏也宜下之○午前熱者補氣為主○午後熱者補血為主○左手脈小於右手而熱者用血藥多於氣藥○右手脈小於左手而熱者用氣藥多於

血藥

發熱煩躁三十一

王太僕曰大寒而甚熱之不熱是無火也當治其心大熱而甚寒之不寒是無水也熱動復止倏忽往來時動時止是無水也當補其腎故心盛則生熱腎盛則生寒腎虛則寒動於中心虛則熱收於內又熱不勝寒是無火也寒不勝熱是無水也大寒之而不寒責其無水熱之不熱責其無火熱之不久責心之虛寒之不久責腎之弱治者當深味之

立齋曰瘡瘍發熱煩躁或出血過多或膿潰大泄或汗多亡陽

或下多亡陰以致陰血耗散陽無所依浮散於肌表之間而非火也○若發熱無寐者血虛也用聖愈湯兼汗不止氣虛也急用獨參湯○發熱煩躁肉瞤筋惕血氣俱虛也用八珍湯○大渴面赤脈洪大而虛陰虛發熱也用當歸補血湯○肢體微熱煩躁面赤脈沉而微陰盛發躁也用四君加薑附

作嘔十

立齋曰發熱惡寒而嘔者宜溫養胃氣○脈細腸鳴腹痛滑瀉而嘔者宜托裏溫中○口乾惡熱而嘔者宜降火○脈實便秘而嘔者宜瀉火○若不詳究其源而妄用攻毒之藥則膿

者不能吐者不能飲食宜丹溪曰腫瘍作嘔當作毒氣攻心治之潰瘍時嘔當作陰虛補之殊不知此大槩之言耳况今之熱毒內攻而嘔者十纔一二脾胃虛寒或痰氣而嘔者十居八九故不可執以爲言也○又曰凡癰瘍脈大而熱煩躁脈實而嘔者爲有餘當下之若腫硬不潰脈弱而嘔者乃陽氣虛弱當補之若嘔吐少食者乃胃氣虛寒當溫補脾胃若痛傷胃氣或感寒邪穢氣而嘔者雖在腫瘍當助胃壯氣若妄用攻伐多致變證不治

薛氏樞要曰瘡瘍作嘔不可泥於熱毒內攻而槩用敗毒等藥○如熱甚焮痛邪氣實也仙方活命飲解之○作膿焮痛胃氣虛也托裏消毒散補之○膿熟脹痛氣血虛也先用托裏散後用針以泄之○焮痛便秘熱壅於內也內疏黃連湯導之○若因寒藥傷胃而嘔者托裏健中湯○胃寒少食而嘔者托裏益中湯○中虛寒淡而嘔者托裏溫中湯○肝木乘脾而嘔者托裏抑青湯○胃脘停痰而嘔者托裏清中湯○脾虛自病而嘔者托裏益黃湯○鬱結傷脾而嘔者托裏越鞠湯○又曰大凡諸瘡作嘔若飲冷便秘此熱毒也宜用消毒散解之○飲冷便利此是胃火也竹葉石膏湯清之○懶食

飲湯是胃虛也補中益氣湯補之○大便不實喜飲熱湯是脾胃虛寒也六君加炮薑以溫之○嘗見脾胃虛弱者用前散久心膈陰冷致嘔而吸于生痰乃腎水枯涸虛火炎上也其證甚惡急用加減八味丸亦有得生者

熱毒作嘔證如劉貫患腹癰焮痛煩躁脈實作嘔河間云瘡瘍者火之屬須分內外以治其本若脈沉實者先當疏其內以絕其源又曰嘔噦心煩脈沉而實腫硬木悶或皮肉不變邪氣在內宜用內疏黃連湯治之然作嘔脈實毒存內也遂以前湯通利二三行諸證悉去更以連翹消毒散而愈○金臺王時亨年踰四十患背毒焮痛作嘔服托裏消毒藥愈甚予用涼膈散二劑頓退更以四物湯加芩連四劑而消 薛按

胃寒作嘔證如顧給事文叔年四十患發背治以托裏藥而潰忽嘔而瘡痛胃脈弦緊彼以爲餘毒內攻東垣云嘔吐無時手足厥冷臟腑之虛也丹溪云潰後發嘔不食者濕氣侵于內也又云膿出而反痛此爲虛也今胃脈弦緊木乘土位其虛明矣予欲以六君子湯加酒炒芍藥砂仁藿香治之彼自服護心散嘔愈甚復邀治仍用前藥更以補氣血藥兩月而愈○大抵濕氣內侵或感穢氣而作嘔者必喜溫而脈弱熱

得內攻而作嘔者必異常而脉數必須辨認明白亦有大便不實或痠痛或膨脹或嘔吐或吞酸噯腐此皆腸胃虛寒也以理中湯治之如不應加熟附子二三片〇予嘗飲食少思吞酸噯腐諸藥不應惟服理中湯及附子理中丸有效蓋此證皆因中氣虛寒不能運化鬱滯所致故用溫補之劑使中氣溫和自無此證矣〇張生患瘰癧作嘔由中氣虛弱終毋役之予以六君子湯加砂仁藿香酒炒芍藥治之彼不信另服連翹消毒散嘔果甚復邀治仍以前藥外用麻油調鐵銹末塗之而愈 薛按

戴氏曰如惡心者無聲無物欲吐不吐欲嘔不嘔雖曰惡心實非心經之病皆在胃口上宜用生薑蓋能開胃豁痰也 名元禮 南元使

作渴

李氏曰人病瘡多有愈後發渴而不救者十有八九或先渴而後患瘡者尤為難治急用加減八味丸可免渴患者瘡安而渴者服此丸則渴止瘡安而不渴者預服此丸則永不生渴或未發瘡而先發渴者服此不惟渴止且瘡亦不作氣血加壯與預防也 又曰癰疽已安之後或未安之際口舌燥黃如雞內金者乃腎水枯竭心火上炎此證最惡古人云玉華池竭七朝亡若誤投以丹藥則禍在反掌急用加減八味丸桑枝煎五味子湯以滋補之〇又云一貴人病疽未安而渴作一日飲水數升予以加減八味丸治之諸醫大笑云此能止渴我輩當不復業醫皆用木瓜紫蘇烏梅人參茯苓百藥煎等劑服多而渴愈甚不得已用此藥三日渴止久服遂不服渴飲食加倍健於少壯蓋此藥非出鄙見自為兒時聞先君言有人病渴用渴藥累年不愈一名醫使服此藥降心火生腎水為最家藏此方親用皆驗患者當知所擇 詳外科精要

馬益卿曰癰疽作渴乃氣血兩虛宜用參芪以補氣當歸地黃以養血或用黃芪六一湯或用忍冬丸其方以忍冬藤入瓶內加無灰酒微火煨一宿取出晒乾少加甘草俱為末仍用餘酒打糊為丸桐子大每服百餘丸溫酒下兼治五痔諸瘻氣

立齋曰尺脉大或無力而渴者宜滋陰降火〇上部脉沉實而渴者宜瀉火 上部脉洪數而渴者宜降火 胃脉數而渴者宜清胃火〇氣虛不能生津液而渴者宜補中氣 脉大無力或微弱而渴者宜補氣血〇膿血大泄或瘡口出血而

渴者宜大補氣血如不應急用獨參湯
薛氏樞要曰瘡瘍作渴若焮腫發熱便利調和者上焦熱也用竹葉石膏湯○腫痛發熱大便秘澀者內臟熱也用四順清涼飲○焮腫痛甚者熱毒蘊結也用仙方活命飲○漫腫微痛者氣血虛壅也用補中益氣湯○若胃火消爍而津液短少者用竹葉黃芪湯○若胃氣虛弱不生津液者用補中益氣湯○若胃氣受傷內亡津液者用七味白朮散○若腎水乾涸作渴或口舌乾燥者用加減八味丸○或先口乾作渴小便頻數而後患疽或疽愈後作渴飲水或舌黃乾硬小便

數而疽生者尤其惡也苟能逆知其因預服加減八味丸補中益氣湯以滋化源可免是患○心法曰予治瘡瘍作渴不問腫潰但脈數發熱而渴以竹葉黃芪湯治之○脈不數不發熱或脈數無力而渴或口乾以補中益氣湯○若脈數而便秘以清涼飲○若尺脈洪大按之無力而渴以加減八味丸若治口燥舌黃飲水不歇此丸尤效

瀉痢　二十四

立齋曰瘡瘍大便泄瀉或因寒涼剋伐脾氣虧損或因脾氣虛弱食不能化或因脾虛下陷不能升舉或因命門火衰不能生土或因腎經虛弱不能禁止或因脾腎虛寒不能司職所主之法若寒涼傷脾六君加木香砂仁送二神丸○脾虛下陷用補中益氣送二神丸○命門火衰用八味丸料送四神丸○腎虛不禁用參附湯加吳茱萸五味○脾腎虛寒用參附湯送四神丸○病機云脈沉而細身不動作睛不瞭瞭飲食不下鼻準氣息者薑附湯主之身重四肢不舉者參附湯主之○仲景云下痢腸鳴當溫之脈遲緊痛未止當溫之大孔痛當溫之心痛當救裏可與理中附子四逆輩○精要云癰疽嘔瀉腎脈虛者不治凡此難治之證如按前法治之多

有可生者

御醫王彭峯之內年踰四十背疽不起發泄瀉作嘔食少厥逆脈息如無屬陽氣虛寒用大補劑加附子薑桂不應再加附子二劑寫愈甚更以大附子薑桂各三錢參芪歸朮各五錢作一劑腹內始熱嘔泄乃止手足漸溫脈息遂復更用大補而潰再用托裏而斂十年後仍患脾胃虛寒而歿　薛按

大便秘結　二十五

立齋曰瘡瘍大便秘結若作渴飲冷其脈洪數而有力者屬實火宜用內疏黃連湯○若口乾飲湯其脈浮大而無力者屬

氣虛宜用八珍湯○若腸胃氣虛血涸而不通者宜用十全大補湯培養之○若瘡證屬陽或因入房傷腎而不通者宜用前湯加薑附回陽多有得生者○若飲食雖多大便不通而肚腹不脹者此內火消爍切不可通之○若肚腹痞脹而直腸乾涸不通者宜用猪膽汁導之若誤行疏利復傷元氣則不能收斂○經曰腎開竅于二陰臟精於腎津液潤則大便如常若潰瘍有此因氣血虧損腸胃乾涸當大補爲善設若不審虛實而一於疏利者鮮有不誤○若老弱或潰後而便難者皆氣血虛也猪膽汁最效甚者多用之更以養血氣藥助之萬不可妄行攻伐

居賓鴻仲夏患發背腫尺餘皆有小頭如鋪粟狀四日矣此真氣虛而邪氣實也遂隔蒜灸之服活命飲二劑其邪頓退乃純補其真陰又將生脈散以代茶飲瘡邪大退余因他往日後已之飲食不入中央肉死大便秘結小便赤濁余曰中央肉死脾氣虛也大便不通脾虛而不能傳送也小便赤濁脾虛而火下陷也治亦難矣彼始以為其補藥之過也余曰然乃急用六君子加當歸柴胡升麻飲食漸進大便自通外用烏金膏塗中央三寸許四圍紅腫漸消中央黑腐漸去乃敷當歸膏用地黃丸與前藥間服將百劑而愈薛按

小便淋濇不利 二十六

立齋曰瘡瘍小便淋漓頻數或莖中澀者腎經虧損之惡證也宜用加減八味丸以補陰○足脛逆冷者宜用八味丸以補陽○若小便頻而黃者宜用四物湯加參朮麥門五味以滋肺腎○若小便短而少者宜用補中益氣加山藥麥門五味以補脾肺○若熱結膀胱而不利者宜用五淋散以清熱○若膀氣燥熱而不能化者宜用黃芩清肺飲以滋陰○若膀

胱陰虛陽無以生者宜用滋腎丸○若膀胱陽虛陰無以化者宜用六味地黃丸腎虛之患多傳此證非滋化源則不救若用黃柏知母之類復其陽是速其危也○若老人陰痿思色精氣內敗莖中痛而不利者用加減八味丸加車前子牛膝不應更加附子多有復生者○若精已竭而復耗之大小便中牽痛愈痛則愈便愈便則愈痛以前藥加附子亦有復生者○王太僕云無陰則陽無以化無陽則陰無以生當滋其化源若專用淡滲復損真陰乃速其危也

發痓 二十七

立齋曰癰瘍發痙因氣血虧損或爲外邪所搏或內虛鬱火所致其形則牙關緊急四肢勁强或腰背反張肢體抽搐其有汗而不惡寒者曰柔痙風能散氣故有汗也其無汗而惡寒者曰剛痙寒能濇血故無汗也皆因亡血過多筋無所養故傷寒汗下過多與潰瘍產後多患之乃敗證也若大補氣血多有可治者若作風治速其危矣

痙論法俱詳見雜證類十二卷痙證門所當參閱

無寐三十八

立齋曰瘡瘍潰後無寐發熱煩躁血虛也聖愈湯○自汗不止

無寐氣虛也四君加黃芪五味子○發熱煩躁肉瞤筋惕氣血虛也八珍湯○大渴面赤脈洪大而浮陰虛發熱也當歸補血湯○肢體發熱煩躁面赤脈沉微陰盛發躁也四君加薑附

瘡瘍出血三十九

立齋曰瘡瘍出血因五臟之氣虧損虛火動而錯經妄行也當求其經審其因而治之○若肝熱而血妄行者宜四物加炒山梔芩連丹皮○肝虛而不能藏血者六味地黃丸○心虛而不能主血者四物加炒黃連丹皮苓朮○脾虛熱而不能統血者四君子加炒梔子丹皮○若脾經鬱結用歸脾湯加五味子○脾肺氣虛用補中益氣湯加五味子○氣血俱虛用十全大補湯○陰火動者用六味丸加五味子○大凡失血過多見煩熱發渴等證勿論其脈急用獨參湯以補氣經云血生於氣苟非參芪歸朮甘溫等劑以生心肝之血決不能愈若發熱脈大者不治○凡患血證皆當以犀角地黃湯爲主

戒忌調護四十

李氏云病疽之人當戒酒麪炙煿醃臘生冷油膩雞鵝魚腥之

類若起居七情尤當深戒務令臥室潔淨馨香使氣血流暢一切忌僧道孝子產婦經婦及雞犬貓畜之類若背疽難於隱几宜用絲草十斤作一袋隱伏其上以解毒涼心也○又曰大凡臟腑已有瘡毒已潰氣血既虛最當調護若發熱而服涼藥熱不致腐

立齋曰凡瘡皆怯寒熱丹毒瘡疹或金石所發實熱煩渴飲食如常證屬純陽者極宜用之否則不可輕用也○又曰瘡瘍食肉乃自棄也瘡瘍之毒發於營氣今反助之與自棄何異雖用藥施治亦不能愈

東垣云胃爲五臟之根本胃氣一傷諸證皆虛七惡蜂起可不愼哉

愚按瘡瘍當忌葷腥然以愚見言之則雄雞火發及疔毒陽瘡則毫不可犯宜切愼也至若營衛大虛血毒不能化肉不能長凡宜溫宜補等證豈亦不宜滋補乎故古人號黃芪爲羊肉則既宜黃芪未有不宜羊肉者惟豬肉牛肉醇酒及傷脾助濕等物則不可不忌

陰陽證變 四十一

太監劉關患發背腫痛色紫診其脈息沉數陳良甫云脈數發熱而痛者發於陽也且瘡瘍赤甚則紫即火極似水也詢之嘗服丹石藥半載乃積溫成毒所致遂以内疏黃連湯再服稍平更用排膿消毒藥及豬蹄湯太一膏而愈經曰色與脈當相參應治之者在明亢害承制之理陰陽變化之機焉耳

一舉人潘光甫年四十患腦疽焮腫診其脈沉靜予謂此陽證陰脈斷不起已而果然蓋瘡瘍之證雖屬心火尤當分表裏虛實果元氣充實内有實火者寒劑或可責效若寒凉過度使胃寒脾弱陽證變陰或結而不潰潰而不斂陰陽乖戾水火交爭死無日矣 新按

論列方 外科上

參附湯 補三八
豬蹄湯 外三三
托裏散 外四三
四君子湯 補一
八珍湯 補十九
獨參湯 補二六
六君子湯 補五
四物湯 補八
聖愈湯 補九一
理中湯 熱一
歸脾湯 補三二
六味丸 補一二一
回陽湯 外二七
滋腎丸 寒一
八味丸 補一二二
護心散
敗毒散 散三六
二神丸 熱一五一
中和湯 外二四
清凉飲 外九十
四神丸 熱一五二
麻黃湯 散一
流氣飲 外五五
凉膈散 寒八三
五味散 寒百十七
清胃散 寒四九
五香湯 外五一
十宣散 外十四
滋陰湯 外八五
白虎湯 寒二
萬金散 外六七
消毒湯 外九五
奪命丹 外七七
蠟礬丸 外七四 七五

忍冬酒 外百　　槐花酒 外百四
遠志酒 外百六　　國老膏 外六八
桑枝煎 外百九　　製甘草湯 外六八
五味子湯 補九八　　神仙截法 外百十
十全大補湯 補二十　　仙方活命飲 外一
人參黃芪湯 外二六　　補中益氣湯 補三一
托裏消毒散 外一　　托裏溫中湯 外十二
托裏健中湯 外十一　　托裏清中湯 外十六
托裏益黃湯 外十五　　托裏益中湯 外十三

托裏益青湯 外十七　　托裏越鞠湯 外十九
托裏溫經湯 外十四　　七味白朮散 小七
丁香柿蒂散 熱六六　　黃芪六一湯 補五十
[illegible] 外四五　　加減八味丸 外一八
人參[illegible]　　人參平肺散 寒三七
人參理中湯 熱一　　人參敗毒散 散三六
附子理中湯 外二四　　竹葉黃芪湯 寒七
黃連消毒散 外六十　　黃連解毒湯 寒一
竹葉石膏湯 寒五　　連翹消毒散 外六一

內疏黃連湯 外九十　　五香連翹湯 外五一
四順清涼飲 攻二五　　黃芩清肺飲 寒二八
四圍金粉散 外七三　　犀角地黃湯 外四六
乳香定痛丸 外五七　　犀角升麻湯 外四七
香砂六君湯 補七　　神仙薰照方 外一二三
附子餅 外百十八　　豆豉餅 外百七
桑枝灸 外百二十　　蒸熨法 外一二二
隔蒜灸 外百十五　　騎竹馬法 外百十四
鐵箍散 外四四　　降癰散 新因二六

麥飯石膏 外一三九　　烏金膏 外一四二
陰陽散 外一三三　　抑陰散 外一三一
抑陽散 外一三[illegible]　　豬蹄湯 外一二五
[illegible]　　太乙膏 外三百八
當歸膏 外一一四　　神異膏 外三百十

會稽　張介賓　會卿著
瀛海　賈棠　青南訂

外科鈐 下

發背 四十二

發背屬督脈、膀胱經。凡陰虛火盛，或醇酒厚味，或鬱怒房勞，或丹石熱毒，皆能致之。若焮赤腫高，其脈洪數而有力者，為熱毒之證也，為易治；若漫腫微痛，色黯作渴，脈雖洪數而無力者，陰

虛之證也，為難治；若不腫不痛，或漫腫色黯，脈微細者，陽氣虛甚也，尤為難治。大抵發背之證，其名雖多，總惟陰陽二證為要。若發一頭或二頭，其形焮赤腫高，發熱疼痛，頭起者，為陽證易治。若初起一頭如粟，不腫不赤，悶痛煩躁，大渴便秘，睡語咬牙，四五日間，瘡頭不計其數，瘡口各含如粟，形如蓮蓬，故名蓮蓬發。積日不潰，按之流血，至數日或八九日，其頭成片，所含之物俱出，通結一衣，揭去又結，其口共爛為一瘡，其膿內攻，其色紫黯者，為陰證難治。且此證不可大痛，又不可痛，若見煩悶者多不治。總之瘡瘍雖云屬火，然未有不由陰虛而致者，故經云：督脈經虛，從腦而出；膀胱經虛，從背而出。故不可專泥于火。

陳良甫曰：背疽之源有五：一天行，二瘦弱氣滯，三怒氣，四腎氣虛，五飲冷酒食炙煿服丹藥。

立齋曰：大抵發背之證，雖發熱疼痛，形勢高大，煩渴不寧，但得脈息有力，飲食頗進，可保無虞。其膿一潰，諸證悉退。多有因膿不得外泄，以致疼痛，若用敗毒寒藥攻之，反致誤事。若有膿急針之，膿一出，苦楚即止。膿未成而熱毒作痛者，可用解毒之藥。亦有腐潰尺餘者，若無惡證，則投以大補之劑，肉最

易生，亦無所妨。惟患腫不高，色不赤，不焮痛，脈無力，不飲食，腫不潰，腐不爛，膿水清，或膿多不止，皆屬元氣虛也，為難治，宜峻補之。其或膿血既泄，腫痛尤甚，膿水臭敗，煩躁時嗽，腹痛渴甚，瀉利無度，小便如淋，乃惡證也，皆不可治。

又灸法曰[illegible]治發背，不問日期陰陽，腫痛或不痛或痛甚，但未成膿或不潰者，即與灸之，隨手取效。或麻木者，明灸之，毒氣自然隨火而散。或瘡頭如黍者，灸之不效，亦有數日色尚微赤，腫尚不起，痛不甚，膿不作者，尤宜多灸，勿拘日期，更服甘溫托裏藥，切忌寒涼之劑。其有勢未定者，或先用箍藥

圍之若用烏金膏點患處尤妙凡人初覺發背亦結腫痛焮
辨其頭者但以濕紙覆其上立候視之其紙有先乾處即是
結癰頭也取大蒜切成片如二三錢厚薄安於頭上用大艾
炷灸之三壯換一蒜片痛者灸至不痛不痛灸至痛時方止
最要早覺早灸為上一日二日十灸十活三日四日六七活
五日六日三四活過七日則難為力矣若有十數頭作一處
生者即用大蒜研成膏作薄餅鋪頭上聚艾於蒜餅上燒之
亦能活也若背上初發赤腫　一片中間有一片黃粟米頭子
便用獨蒜切去兩頭取中間半寸厚者正安于瘡上灸十四

壯多至四十九壯葢如此惡證惟隔蒜灸及塗烏金膏有效
又治法曰腫硬痛深脉實者邪在內也可下之○腫高焮痛
脉浮者邪在表也宜托之○焮痛煩躁或咽乾火在上也宜
瀉之○腫高或不作膿者邪氣凝結也宜解之○腫痛飲冷
發熱睡語者火也宜清之○不作膿或不潰不飲者陽氣虛
也宜補之○瘀肉不腐或積毒不解者陽氣虛也宜助陽氣
○膿多或清者氣血俱虛也宜峻補之○脉浮大或濇而肌
肉遲生者氣血俱虛也宜補之○右關脉弱而肌肉遲生者
宜補脾胃

又諸毒治法曰如頭痛有表證者宜先服人參敗毒散一二
劑○如焮痛發熱脉數者用金銀花散槐花酒神功托裏散
○如疼痛腫硬脉實者以清涼飲仙方活命飲苦參丸○腫
硬木悶疼痛發熱煩躁飲冷便秘脉沉實者內疎黃連湯或
清涼飲○大便已通欲其作膿宜仙方活命飲托裏散蠟礬
丸外用神異膏○如飲食少思或不甘美用六君子湯加藿
香連進一二劑更用雄黃解毒散洗患處每日用烏金膏塗
瘡口處候有瘀肉即用紙作撚蘸烏金膏紝入瘡內○若有
膿為脂膜間隔不出或作脹痛者宜用針引之腐肉堵塞者

去之若瘀肉腐動用猪蹄湯洗之○如膿稠或痛飲食如常
瘀肉自腐用消毒與托裏藥相兼服之仍用前二膏塗貼○
若腐肉已離好肉者宜速去之○如膿不稠不稀微有疼痛
飲食不甘瘀肉腐遲更用桑柴灸之亦用托裏藥○若瘀肉
不腐或膿清稀不焮痛者急服大補之劑亦用桑木灸之以
補接陽氣解散鬱毒○常觀患疽稍重未成膿者不用蒜灸
之法及膿熟不開或待腐肉自去則多致不救○大抵氣血
壯實或毒少輕者可假藥力或自腐潰若怯弱之人熱毒中
隔內外不通不行針灸藥無全功矣○此證若膿已成急宜

開之色則重者潰通臟腑腐爛筋骨若使透膈則不可治輕者延潰良肉難於收功因而不斂者多矣

又若補治法曰若腫焮作痛寒熱作渴飲食如常此形氣病氣俱有餘也先用仙方活命飲後用托裏消毒散解之○潰膿微痛或色不赤飲食少思此形氣病氣俱不足也用托裏散調補之○不作膿或膿成不潰陽氣虛也托裏散倍加肉桂參芪○膿出而反痛或膿清稀氣血俱虛也八珍湯○惡寒形寒或不收斂陽氣虛也十全大補湯○晡熱內熱或不收斂陰血虛也四物加參朮○作嘔欲嘔或不收斂胃氣虛

也六君加炮薑○食少體倦或不收斂脾氣虛也補中益氣湯加茯苓半夏○肉赤而不斂血熱也四物加山梔連翹○肉白而不斂脾虛也四君加酒炒芍藥木香○小便頻數者腎陰虧損也加減八味丸○大抵瘡瘍勢甚若妄用攻剤怯弱之人必損元氣因而變證者衆矣

又三證治法曰若初患未發出而寒熱疼痛作渴飲冷此邪氣內盛也仙方活命飲若口乾飲熱漫腫微痛此元氣內虛也托裏消毒散若飲食少思肢體倦怠此脾胃虛弱也六君子湯加芎歸其有死者乃邪氣盛真氣虛而不能發

出也在於旬餘之間見之○若已發出用托裏消毒散不腐潰用托裏消毒散如不應急宜溫補脾胃其有死者乃真氣虛而不能腐潰也在於二旬之間見之○若已腐潰用托裏散以生肌如不應急溫補脾胃其有死者乃脾氣虛而不能收斂也在於月餘見之此三證雖不見於經籍余嘗治而屢驗者

千金方灸法治發背已潰未潰者用淡豆豉以水和搗成硬泥依瘡大小作餅三四分厚如已有瘡孔勿覆瘡孔上但四布豆餅列艾其上灸之使微熱勿令破肉如熱痛急少起之日

灸二度如先有瘡孔孔出汁即瘥

一驗透膈法凡背疽大潰欲驗穿透內膜者不可用皂角散熏法但以紙封患處令病者用意呼吸如紙不動者未穿透也倘用取嚏法鼓動內膜則反致穿透遺而悞之

都憲周弘岡背患疽潰而不消脈大而浮此陽氣虛弱有邪氣壅滯也用托裏散倍加參芪反內熱作渴脈洪大鼓指此虛火也用前散急加肉桂脈證頓退仍用托裏而愈若以為熱毒而用寒藥則誤矣○上舍張克恭患此內服外敷皆寒涼敗毒遍身作痛欲嘔少食晡熱內熱惡寒畏寒余曰遍身作

痛營衛虛而不能營於肉裏也欲嘔少食脾胃虛寒而不能
消化飲食也內熱晡熱陰血內虛而陽氣陷於陰分也惡寒
畏寒陽氣虛弱而不能衛於肌肉也此皆由脾胃之氣不足
所致遂用補中益氣湯諸證漸退更以十全大補湯腐肉漸
潰又以六君子湯加芎歸肌肉頓生而愈○府痒彭碧溪患
腰疽服寒涼敗毒之藥色黯不痛瘡頭如鋪黍背重不能安
寢耳聵目白面色無神小便頻澁作渴迎困氣粗短促脈浮
數重按如無余先用滋水之藥一劑少頃便利渴止背即輕
爽乃砭出瘀血以艾半觔許明灸患處外敷烏金膏內服參

芪歸朮肉桂等藥至數劑元氣稍復自疑肉桂辛熱一日不
用手足並冷大便不禁仍用肉桂及補骨脂二錢肉豆蔻一
錢大便復常其肉漸潰更用當歸膏以生肌肉八珍湯以補
氣血而愈○上舍蔡東之患此余用托裏之藥而潰瘡口尚
未全斂時值仲冬且兼咳嗽余曰瘡口未斂脾氣虛也咳嗽
不止肺氣虛也法當補其母一日與之全宴見忌羊肉余曰
補可以去弱人參羊肉之類是也故宜食之遂每日不徹
餘而瘡斂嗽亦頓愈矣○一男子年踰五十患發背色紫腫
痛外皮將潰寢食不安神思甚疲用桑柴灸患處出黑血即

鬆腫覺而諸證如失服仙方活命飲二劑又灸一次膿血皆
出更進二劑腫痛大退又服托裏消毒散數劑而斂夫瘡勢
熾甚本宜峻劑攻之但年老血氣衰弱況又發在肌表若專
於攻毒則胃氣先損必反誤事 以薛按
予長男於二週患背疽治按在腫瘍條中 新按

一論外通用方

神仙蒜灸法 外一二三

臍癰 附十一

立齋曰臍癰屬膀胱經積熱或濕毒上壅或陰虛火熾或腎本

虛損陰精消涸所致○若腫痛未作膿者宜除濕消毒○大
痛或不痛或麻木者毒甚也隔蒜灸之更用解毒藥○腫痛
便秘者邪在內也宜泄之○不甚痛或不作膿者虛也托裏
為主○膿成脹痛者針之更以托裏○上部脈數實而痛者
宜降火○上部脈數虛而痛者宜滋陰降火為主○尺部脈
數而作渴者滋陰降火○脈數而虛細無力或膿清或不斂
或膿多者大補血氣○不作膿或不潰者托裏藥主之○煩
躁飲冷脈實而痛者宜瀉火
又治法曰初起腫赤痛甚煩渴飲冷脈洪數而有力乃濕熱

上焦當用黃連消毒散並隔蒜灸以除濕熱○若漫腫微痛渴不飲冷脈洪數而無力乃陰虛火熾當用六味丸及補中益氣湯以滋化源○若口舌乾燥小便頻數或淋瀝作痛乃腎水虧損急用加減八味丸及前湯以固根本而引火歸經○若不成膿不腐潰陽氣虛也四君加歸芪○若不生肌不收斂脾氣虛也十全大補湯○若色黯不潰或潰而不斂乃陰精消涸名曰腦爍為不治若攻補得宜亦有可愈○大抵腫焮痛甚宜活命飲隔蒜灸之以解散瘀血拔引鬱毒但艾炷宜小而少若欲其成膿腐潰生肌收斂並用托裏為主

李氏曰腦疽及頸項有疽不可用隔蒜灸恐引毒上攻宜灸足三里穴五壯氣海穴三七壯仍服涼血化毒之藥或以騎馬穴法灸之凡頭項咽喉生疽古法皆為不治若用此法多有生者如五香連翹湯漏蘆湯國老膏萬金散皆可選用見外科精要

一老人患此色赤腫痛脈數而有力與黃連消毒散二劑少退更與清心蓮子飲四劑而消○一男子腫痛脈數以荊防敗毒散一劑而痛止更以托裏消毒藥而消○一男子焮腫疼痛發熱飲冷脈洪數與涼膈散二劑而痛止以金銀花散四劑而潰更以托裏藥而愈○一老婦稟壯實潰而痛不止脈實便秘以清涼飲二劑而痛止更以托裏消毒藥而愈○一婦人冬間患此腫痛熱渴余用清熱消毒潰之而愈次年三月其舌腫大遍身發疔如葡萄不計其數手足尤多乃脾胃受毒也先各刺出黑血隨服奪命丹七粒出臭汗瘡熱益甚便秘二日與大黃芩連各三錢升麻白芷山梔薄荷連翹各二錢生甘草一錢水煎三五沸服之大小便出臭血甚多下體稍退乃磨入犀角汁再服舌本及齒縫出臭血諸毒乃消更以犀角地黃湯而愈○一婦人患前證口乾舌燥內服清

熱外敷寒涼色黯不痛胃中氣虛此內真寒而外假熱也彼疑素有痰火不欲温補余以參芪各五錢歸桂各二錢一劑頓潰又用大補藥而愈○一男子頭項俱腫雖大潰腫痛益甚兼作瀉煩躁不睡飲食少思其勢可畏診其脈則毒尚在與仙方活命飲二劑腫痛退半與二神丸及六君子湯加五味子酸棗仁四劑諸證少退飲食少進睡亦少得又與參苓白朮散數服飲食頓進再與十全大補湯加金銀花白芷月餘而瘥薛按

耳瘡 附耳內

立齋曰耳瘡屬少陽三焦經或足厥陰肝經血虛風熱或肝經燥火風熱或腎經虛火等因○若發熱焮痛屬少陽厥陰風熱用柴胡清肝散○若內熱癢痛屬二經血虛用當歸川芎散○若寒熱作痛屬肝經風熱用小柴胡湯加山梔川芎○若內熱口乾屬腎經虛火用加味地黃丸如不應用加減八味丸餘當隨證治之

愚按薛氏所治耳證凡氣虛者以補中益氣湯加山梔黃芩血虛者用八珍湯加柴胡丹皮肝火血虛者用梔子清肝散怒動肝火者用加味逍遙散肝脾受傷者朝用加味歸脾湯暮

用加味逍遙散此其治之大約也○予嘗治一儒者年近三旬素有耳病每年當發發必腫潰至乙亥二月其發則甚自耳根下連頸項上連頭角耳前耳後莫不腫痛諸醫之治無非散風降火至一月後稠膿鮮血自耳迭出每二三日必出一二鍾許然膿出而腫全不消痛全不減枕不可近食不可加氣體俱困自分其危矣余治之察其形氣已大不足察其病體則腫痛如舊仍若有餘察其脉息則或見弦緊或見緩弱此非實熱可知然脉不甚緊而或時緩弱亦猶潰瘍之體尚屬可治遂先以六味湯二三劑而元氣稍振繼以一陰煎加牛蒡子茯苓澤瀉仍倍加白蒺藜為君服五十餘劑外用降癰散晝夜敷治兩月而後愈蓋此證雖似潰瘍有餘而實以肝腎不足上實下虛一奇證也故存識之 新按

鬢疽四十五

立齋曰鬢疽屬肝膽二經怒火或風熱血虛所致○若焮痛或發熱者宜祛風清熱○焮痛發寒熱或拘急者發散表邪○作膿焮痛托裏消毒○膿已成作痛者針之○不作膿或膿成而不潰者俱宜托裏○不斂或膿清者宜峻補之

又治法曰若發熱作渴者用柴胡清肝散○腫焮痛甚者仙

方活命飲○若大勢已退餘毒未散用參芪歸术為主佐以川芎白芷金銀花以速其膿膿成仍用參芪之類托而潰之○若欲其生肌收斂腎虛者六味丸血虛者四物加參芪或血燥者四物湯或水不能生木者六味地黃丸氣虛者用補中益氣湯皆當滋其化源為善

痄腮四十六

立齋曰痄腮屬足陽明胃經或外因風熱所乘或內因積熱所致若腫痛寒熱者白芷胃風湯○內熱腫痛者升麻黃連湯○外腫作痛內熱口乾者犀角升麻湯○內傷寒涼不能消

潰者補中益氣湯〇發熱作痛大便秘結清涼飲〇表裏俱解而仍腫痛者欲作膿也托裏散〇若飲食少思胃氣虛弱者六君子湯〇肢體倦怠陽氣虛弱也補中益氣湯〇膿潰既潰腫痛不減熱毒未解也托裏消毒散〇膿出而反痛氣血虛也參芪內托散〇發熱晡熱陰血虛也八珍湯〇惡寒發熱氣血俱虛也十全大補湯〇若焮腫痛連耳下者屬手足少陽經當清肝火〇若連頸及耳後者屬足少陰經虛火當補腎水〇此證而有不治者多泥風熱輕用尅伐之劑耳

瘰癧 四十七

瘰癧之病屬三焦肝膽等經風熱血燥或肝腎二經精血虧損虛火內動或恚怒憂思氣逆于肝膽二經二經常多氣少血故怒傷肝則木火動而血燥腎陰虛則水不生木而血燥血燥則筋病肝主筋也故累累然結若貫珠其候多生於耳前後連及頤頷下至缺盆及胸腋之側又謂之馬刀其初起如豆粒漸如梅李核或一粒或三五粒按之則動而微痛不甚熱久之則日以益甚或頸項強痛或午後微熱或夜間口乾飲食少思四肢倦怠或堅而不潰或潰而不合皆由氣血不足故往往變為瘵疾外臺秘要云肝腎虛熱則生癧病機云

瘰癧不係膏粱丹毒火熱之變總因虛勞氣鬱所致止宜以益氣養營之藥調而治之其瘡自消若不待汁之下之而已也若不詳脈證虛實之異而概用追蝕攻下及流氣飲十宣散之屬則必犯經禁病禁以致血氣愈損必反為敗證矣若脈洪大以元氣虛敗為不治若面色皖白為金尅木亦不治若眼內赤脈貫瞳人見幾條則幾年死使不求本而妄用伐肝之劑則誤矣蓋伐肝則脾土先傷脾傷則損五臟之源矣可不慎哉

齊氏曰瘰癧結核初覺時宜內消之如經久不除氣血漸衰肌寒肉冷或膿汁清稀毒氣不出瘡口不合聚腫不赤結核無膿外證不明者並宜托裏膿未成者使膿早成膿已潰者使新肉早生血氣虛者托裏補之陰陽不和托裏調之大抵托裏之法使瘡無變壞之證所以宜用也

丹溪曰瘰癧必起於足少陽一經不守禁忌延及足陽明經食味之厚鬱氣之久曰毒曰風曰熱皆此二端拓引變換須分虛實實者易治虛者可慮此經主決斷有相火且氣多血少婦人見此若月水不調寒熱變生稍久轉為潮熱自非斷慾食淡神醫不能療也

立齋曰焮痛脈沉數者邪氣實也宜泄之○腫痛憎寒發熱或拘急者邪在表也宜發散○因怒結核或腫痛或發熱者宜疏肝行氣○腫痛脈浮數者祛風清熱○脈濇者補血爲主○脈弱者補氣爲主○腫硬不消者補氣血爲主○抑鬱所致者解鬱結調氣血○潰後不斂者屬氣血俱虛宜大補○虛勞所致者補之○因有核而不斂者腐而補之○脈實而不斂或不消者下之

又治法曰若寒熱焮痛者此肝火風熱而氣病也用小柴胡湯以清肝火並服加味四物湯以養肝血○若寒熱既止而核不消散者此肝經火燥而血病也用加味逍遙散以清肝火六味地黃丸以生腎水○若肥者而稍軟面色痿黃皮膚壯熱膿已成也可用針以決之及服托裏之劑○若經久不愈或愈而復發膿水淋漓肌肉羸瘦者必純補之劑庶可收斂否則變成九瘻內經曰陷脈爲瘻留連肉腠即此病也外用豆豉餅琥珀膏以驅散其邪補拔陽氣內服補中益氣湯六味丸以滋腎水培肝木健脾土亦有可愈者

又治法曰大抵此證原屬虛損若不審虛實而犯經禁病禁則鮮有不誤○常治此證先以調經解鬱更以隔蒜灸之多

自消如不消即以琥珀膏貼之○候有膿即針之否則變生他處設若兼痰兼瘀虛勞等證只宜加兼證之劑不可干擾餘經○若氣血已復而核不消却服散堅之劑至月餘不應氣血亦不虧損方進必效散或遇仙無比丸其毒一下即止二藥更服益氣養營湯以調理之○若瘡口不斂宜用豆豉餅灸之用琥珀膏貼之○若氣血俱虛或不慎飲食起居七情者俱不治○然此證以氣血爲主氣血壯實者不用追蝕之劑彼亦能自腐但取去之亦使易於收斂○若氣血虛者不先用補劑而數用追蝕之藥適足以敗之矣○若發寒熱眼內有赤脈貫瞳人者不治

灸瘰癧法取肩尖肘尖骨縫交接處各一穴即手陽明經肩髃曲池二穴也各灸七壯在左灸左在右灸右左右俱病者俱灸之余常用之甚效薛氏以曲池爲肘髎似亦未的也

又薛氏經驗方云治瘰癧已成未成已潰未潰者以手仰置肩上微舉起則肘骨尖自見即是灸處灸以三四十壯爲度更服益氣養營湯灸三次瘡自除如患三四年不愈者辰時灸至申時三灸即愈更服補劑按此法乃單灸曲池以多爲貴也然但用前法則已妙矣倘有未應者又當以此法治之

○又曰此治瘰癧之秘法凡男子婦人若因恚怒傷肝氣血壅遏而不愈者宜灸此穴以疏通經絡如取此穴當以指甲掐兩肘兩肩四所患處覺有酸麻方是其穴

又法灸瘰癧未成膿者用大蒜切片三錢厚安患處用艾壯於蒜上灸之每三五壯一換蒜再灸每日灸十數蒜片以拔鬱毒如破久不合更用江西豆豉為末以唾津和作餅如前灸之以助陽氣內服補藥外貼琥珀膏或太乙膏瘡口自合

○又或瘡口已破核不腐則瘡口不能斂或貼琥珀膏不應須用針頭散傅之以去腐肉再以如神散傅之更服益氣養

營湯若氣血虛者先服益氣養營湯待血氣稍充方用針頭散仍服前湯

男子患而腫硬久不消亦不作膿服散堅敗毒藥不應令灸肩尖肘尖二穴更服益氣養營湯月餘而愈○一婦人久潰發熱月經每過期且少用逍遙散兼前湯兩月餘氣血復而瘡亦愈但一口不收傅針頭散更灸前穴而痊常治二三年不愈者連灸三次兼用托裏藥必愈○一婦人因怒結核腫痛察其氣血俱實先以必效散下之更以益氣養營湯三十餘劑而消常治此證虛者先用益氣養營湯待其氣血稍充乃用必效散取去其毒仍進前藥無不效者○一田氏婦年逾三十瘰癧已潰不愈與八珍湯加柴胡地骨皮夏枯草香附貝母五十餘劑形氣漸轉更與必效散二服瘡口遂合惟氣血未平再與前藥三十餘劑而愈後田生談此方不問虛實槩以治人殊不知散中斑貓性毒雖治瘰癧多服則損元氣若氣血實者先用此下之而投補劑或用他若虛而用下藥或用追蝕藥蝕去肉雖去而瘡口不合反致難治 俱薛按

治瘰癧痰核方 凡瘰癧初起未甚者即宜服此或加夏枯草更佳

用忍冬花蒲公英各四五錢以水二碗同煎湯朝夕代茶飲之十餘日漸消然此藥但可治標若欲除根必須灸肩髃曲池二穴

疔瘡 四十八

齊氏曰夫疔瘡者以其瘡形如丁蓋之狀者是也古方之論凡有十種華元化之論有五色疔千金方說疔有十三種以至外臺秘要神巧萬全其論頗同然皆不若[illegible]論之詳於[illegible]務及五臟內蘊熱毒凡疔生之一頭凹內痛楚或與亦四無復是色令人煩躁悶亂或增寒頭痛或嘔吐心逆以針刺瘡不痛無

血是其候也多因肥甘過度不慎房酒以致邪毒蓄結遂生疔瘡內經曰膏粱之變足生大疔此之謂也其治之法急以艾炷灸之若不覺痛者針疔四邊皆令血出以奪命丹或回生丹從針孔紝之上用膏藥貼之仍服五香連翹湯漏蘆湯等劑疎下之為效○若或針之不痛無血者以猛火燒鐵針通紅於瘡上烙之令如焦炭取痛為效亦紝前藥用膏藥貼之經一二日膿潰根出服托裏湯散依常療之以取平復○如針之不痛其人眼黑或見火光者不可治也此邪毒之氣入于臟腑故也○養生方云人汗入肉食食之則生疔瘡不

可不慎也

立齋曰此證多由膏粱厚味之所致或因卒中飲食之毒或感四時不正之氣或感蛇蟲之毒或感死畜之穢各宜審而治之其毒多生於頭面四肢形色不一或如小瘡或如水泡或疼痛或麻木或寒熱作痛或嘔吐惡心或肢體拘急並宜隔蒜灸之痛則灸至不痛不痛灸至痛若灸而不痛則明灸之及針疔四畔去惡血以奪命丹一粒入瘡頭孔內仍以膏藥貼之並服解毒之劑或用荊防敗毒散○若針之不痛無血者宜用燒針治如前齊氏之法○若不省人事或牙關緊急者以奪命丹為末蔥酒調灌之候醒更服敗毒散或奪命丹甚效○若生兩足者多有紅絲至臍生兩手者多有紅絲至心腹生唇面口內者多有紅絲入喉皆為難治急宜用針於血絲盡處挑破使出惡血若紅絲近心腹者更挑破瘡頭去惡水以泄其毒亦以膏藥貼之多有生者○若患於偏僻下部之處灸力所難到者若專假藥力則緩不及事惟灸之則人有回生之功○疔之名狀雖有十三種之不同而治法但當審其元氣虛實邪之表裏庶不誤人於夭札也若專泥於疎利表散非為無益而反害之○凡人暴死者多是疔毒急

取燈遍照其身若有小瘡即是其毒宜急灸之并服奪命丹等藥亦有復甦者

又曰脈浮數者散之○脈沉實者下之○表裏俱實者解表攻裏○麻木或大痛及不痛者並灸之更兼攻毒

掖門張仰山左足次指患之痛不可忍急隔蒜灸三十餘壯即能舉步彼欲速愈自敷涼藥遂致血凝肉死毒氣復熾再灸百壯服活命飲出紫血其毒方解腳底通潰腐筋爛肉甚多及將愈予因考績北上又誤用生肌藥反助其毒使元氣虧損瘡口難斂予回用托裏藥補之喜其稟實且客處至三月

徐方塍〇表甥居留右手小指患之或用針出血敷以涼藥
掌指腫三四倍六脉洪大此真氣奪則虛邪氣勝則實也先
以奪命丹一服活命飲二劑勢稍緩余因他往或又遍刺出
血腫延臂腕如大瓠手指腫大數倍不能消潰乃真氣愈虛
而邪氣愈盛也余回用大劑參芪歸朮之類及頻灸遍手腫
勢漸消後大便不實時常泄氣此元氣下陷以補中益氣湯
加補骨脂肉豆蔻吳茱萸五味子又以生脉散代茶飲大便
漸實手背漸潰又用大補藥五十餘劑漸愈薛按

時毒四十九

齊氏曰時毒者為四時邪毒之氣而感之於人也其候發于鼻
面耳項咽喉赤腫無頭或結核有根令人憎寒發熱頭疼肢
體甚痛恍惚不寧咽喉閉塞人不識者將謂傷寒原夫此疾
古無方論世俗通謂丹瘤病家惡言時毒切恐傳染、入
身忽經變赤狀如塗丹謂之丹毒此風熱惡毒所為自與時
毒不同蓋時毒者感四時不正之氣初發狀如傷寒五七日
之間乃能殺人若至十日之外則不治自愈也治宜辨之先
診其脉凡滑數浮洪沉緊弦澀皆其候也但浮數者邪在表
也沉濇者邪氣深也察其毒之甚者急服化毒丹以攻之實

熱便秘者大黃湯下之其有表證者犀角升麻湯以發之或
年高氣鬱者五香連翹湯主之〇又於鼻內嗃通氣散取十
餘嚏作效若嗃藥不嚏者不可治之如嚏出膿血者治之必
愈凡左右看病之人日日用嗃藥嚏之必不傳染切須記之
其病人每日用嚏藥三五次以泄熱毒此治時毒之良法也
〇凡經三四日不解者不可太下猶宜和解之以犀角散芩
連消毒飲甚者連翹湯之類至七八日大小便通利而頭面
腫起高赤者可服托裏散托裏黃芪湯如腫甚者宜砭患處
出惡血以泄其毒氣〇此病若五日已前精神昏亂咽喉閉

塞語言不出頭面赤腫食不知味者必死之候治之無功矣然
而此疾有陰有陽有可汗者有可下者嘗見粗工但云熱毒
只用寒藥殊不知病有微甚治有逆從不可不審矣
羅謙甫云泰和二年先師監濟源稅時四月民多疫癘初覺憎
寒體重次傳頭面腫盛目不能開上喘咽喉不利舌乾口燥
俗云大頭天行親戚不相訪問染之多不救張縣丞侄亦得
此病至五六日醫以承氣加板藍根下之稍緩翌日其病如
故下之又緩終莫能愈漸至危篤或曰李明之存心於醫可
請治之遂請診視具說其由先師曰夫身半已上天之氣也

身半已下地之氣也此邪熱客於心肺之間上攻頭目而為腫盛用承氣下之以瀉胃中之實熱是誅伐無過也殊不知適其所至為故遂處一方用黃芩黃連味苦寒瀉心肺間熱以為君橘紅苦平玄參苦寒生甘草甘寒人參甘平瀉火補氣以為臣連翹鼠粘子薄荷葉苦辛平板藍根味苦寒馬勃白殭蠶味苦平行少陽陽明二經氣不得伸桔梗味辛溫為舟楫不令下行升麻柴胡苦辛以散表邪其為細末半用湯調時時服之半蜜為丸噙化之服盡良愈因嘆曰往者不可追來者猶可及凡他所有病者皆書方以貽之全活甚眾時

人皆曰此方天人所製遂刊於石以傳永久命曰普濟消毒飲

薛立齋曰此感四時不正之氣邪客心肺之間上攻頭目而為患與瘡瘍積熱之證不同硝黃之劑非大便秘實者不可用若不審其因不辨其表裏虛實而槩用攻之必致有誤○表實而不利者下之○表實而不解者散之○表裏俱實而不解者解表攻裏○表裏俱解而不消者和之○腫甚焮痛者砭去惡血更用消毒之劑○不作膿或不潰者托之○飢年普患者不宜用峻利藥當審而治之

又治法曰若脈浮者邪在表也用葛根牛蒡湯升麻湯人參敗毒散之類以發之○脈沉濇者邪在裏也用梔子仁湯五利大黃湯之類以下之○表裏俱病而陣不退者用犀角升麻湯甚者砭出惡血再用通關散嗅鼻內取嚏以泄其毒○表裏俱不解而內外俱實者防風通聖散○欲其作膿者用托裏消毒散欲其收斂者用托裏散此法最為穩當○常見饑饉之際芻蕘之人多患之乃是胃氣有損邪氣從之為患也故凡以凶荒勞役而患此者多宜安裏為主或用普濟消毒飲最善

老人冬月頭面耳項俱腫痛甚便秘脈實此表裏俱實病也與防風通聖散不應遂砭患處出黑血仍投前藥即應又以荊防敗毒散而瘳蓋前藥不應者毒血凝聚上部經絡藥力難達故也惡血既去其藥即效或拘用寒遠寒及年高畏用硝黃而用托裏與夫尋常消毒之劑或不砭泄其毒專假藥力鮮不危矣○一男子頭面腫痛服硝黃敗毒之劑愈甚診之脈浮數其邪在表尚未解散用荊防敗毒散加玄參牛蒡子二劑勢退大半以葛根牛蒡子湯四劑而痊 薛按

肺癰肺痿五十

此證初起邪結在肺者惟桔梗杏仁煎爲治此之第一方在新
因三三

齊德之曰肺者五藏之華蓋也處於胸中主於氣候於皮毛勞傷血氣腠理虛而風邪乘之內感於肺也故汗出惡風咳嗽短氣鼻塞項强胸脇脹滿久久不瘥已成肺痿也○風中於衛呼氣不入熱至於營則吸而不出所以風傷皮毛熱傷血脉風熱相搏氣血稽留蘊結於肺變成瘡疽○診其脉候寸口脉數而虛者肺痿也數而實者肺癰也若欲知其有膿但脉見微緊而數者未有膿也緊甚而數者已有膿也○肺痿

之候久嗽不已汗出過度重亡津液便如爛瓜下如豕膏小便數而不渴渴者自愈欲飲者將瘥此由肺多唾涎而無膿者肺痿也○肺癰之候口乾喘滿咽燥而渴甚則四肢微腫欬唾膿血或腥臭濁沫胸中隱隱微痛者肺癰也又聖惠曰中府隱隱微痛者肺疽也上肉微起者肺癰也中府者穴名也是以候始萌則可救膿成則多死○又內經曰血熱則肉敗營衛不行必將爲膿大凡肺瘡當咳嗽短氣胸滿時唾膿血久久如粳米粥者難治若嘔膿而不止者亦不可治其嘔膿而自止者將自愈其脉短而澀者自痊浮洪而大者難治其面色當白而反面赤者此火之剋金皆不可治○仲景曰上氣面浮腫肩息其脉浮大不治又加利尤甚

馬益卿曰肺癰治法要略先以小青龍湯一貼以解其風寒邪氣然後以葶藶大棗瀉肺湯桔梗湯葦莖湯見金匱要畧隨證用之以取膿此治腫瘍之例也終以內補黃芪湯以補裏之陰氣此治潰瘍之例也○又曰肺癰已破入風者不治或用太乙膏丸服以搜風湯吐之若吐膿血狀如肺癰口臭他方不應者宜消風散入男子髮灰淸米飲調下兩服可除

立齋曰凡勞傷血氣腠理不密外邪所乘內感於肺或入房過

度腎水虧損虛火上炎或醉酒炙煿辛辣厚味薰蒸於肺或欬唾痰涎汗下過度重亡津液皆能致之其候惡風欬嗽鼻塞項强胸脇脹滿呼吸不利咽燥作渴甚則四肢微腫欬唾膿血若吐痰臭濁膿血腥穢胸中隱隱微痛右手寸口脉數而實者爲肺疽若唾涎沫而無膿脉數而虛者爲肺痿也

又治法曰大抵勞傷血氣則腠理不密風邪乘肺風熱相搏蘊結不散必致欬嗽若誤用汗下過度則津液重亡遂成斯證○凡喘嗽氣急胸滿者表散之○欬嗽發熱者和解之○欬而胸膈隱痛唾痰腥臭者宜排膿散○喘急恍惚痰盛者

宜下肺○唾膿脈短濇者宜補之

又治法曰若欬嗽喘急者小青龍湯○欬嗽胸脹者葶藶大棗瀉肺湯○欬膿腥濁者桔梗湯○欬喘短氣或小便短少者佐以參芪補肺湯○體倦食少者佐以參朮補脾湯○欬唾痰壅者腎虛水泛也六味地黃丸○口乾咽燥者虛火上炎也加減八味丸○此證皆因脾土虧損不能生肺金肺金不能生腎水故始成則可救膿成則多死苟能補脾肺滋腎水庶有生者若專攻其瘡則脾胃益虛鮮有不誤者矣○陸司總子春間欬嗽唾痰腥穢胸滿氣促皮膚不澤項強脈數此肺疽也蓋肺系在項肺傷則系傷故牽引不能轉側肺者氣之本其華在毛其充在皮治以黃芪當歸川芎白芷貝母知母麥冬瓜蔞仁桔梗防風甘草兼以蠟礬丸及太乙膏治之膿盡脈澁而愈○一男子面白神勞欬而胸膈隱痛其脈滑數予以為肺癰欲用桔梗湯不信仍服表藥致欬嗽愈甚唾痰腥臭始悟乃服前湯四劑欬嗽少定又以四順散四劑而脈靜更以托裏藥數劑而愈○一男子欬嗽喘急發熱煩躁面赤咽痛脈洪大用黃連解毒湯二劑少退更以梔子湯四劑而安○一男子患肺痿欬嗽喘急吐痰腥臭胸滿咽乾

脈洪數用人參平肺散六劑及飲童便諸證悉退更以紫菀茸湯而愈童便雖云專治虛火常治瘡瘍焮腫疼痛發熱作渴及肺痿肺癰發熱口渴者尤效○一男子面赤吐膿發熱作渴煩躁引飲脈洪數而無倫次先用加減八味丸加麥冬大劑一服熱渴頓止即熟睡良久覺而神爽索食再劑諸證頓減仍用前藥更以人參五錢麥冬二錢五分五味二錢水煎代茶日飲一劑月餘而安此證面赤者當補腎面白者當補脾肺治者審之○一婦人素血虛發熱欬嗽或用痰火之劑後吐膿血面赤脈數其勢甚危此膿成而氣血虛也余用八珍湯以補元氣用桔梗湯以治肺證因得漸愈○一儒者患肺癰勞役痰涕欬吐膿血胸膈作脹此風邪外傷也先用消風散加乳香灰一服痛勢和又用四君加芎歸及桔梗湯而愈後因勞役欬嗽吐膿小便滴瀝面色黃白此脾土不能生肺金肺金不能生腎水也用補中益氣湯六味地黃丸而愈○一僕年踰三十嗽久不愈氣壅不利睡臥不寧咯吐膿血甚虛可畏其主已棄矣余以寧肺散一服少愈又服而止大半乃以寧肺湯數劑而痊病所謂有是病必用是藥若泥前散性澁而不用何以得愈薛按

乳癰乳巖五十一　婦人門亦有乳證當互參之

立齋曰乳房屬足陽明胃經乳頭屬足厥陰肝經男子房勞恚怒傷於肝腎婦人胎產憂鬱損于肝脾皆能致之○若因恚怒或兒口氣所吹腫痛者宜疎肝行氣○焮痛發寒熱者發散表邪○焮腫痛甚者清肝消毒并宜隔蒜灸○未成膿者疎肝行氣○不作膿或不潰者托裏爲主○潰而不斂或膿清者宜大補脾胃氣血爲主

又治法曰若膿出反痛或作寒熱氣血虛也十全大補湯○體倦口乾中氣虛也補中益氣湯○晡熱內熱陰血虛也八

珍湯加五味子○欲嘔作嘔胃氣虛也補胃爲主或用香砂六君子湯○食少作嘔胃氣虛寒也前湯加乾薑○食少泄瀉脾氣虛寒也理中湯或加人參附子○若勞碌以致腫痛氣血未復也八珍湯倍用參芪歸朮○若因怒氣以致腫痛肝火傷血也八珍湯加柴胡山梔○若肝火血虛而結核不消者四物湯加柴胡升麻○若肝脾氣血俱虛而結核者四君子加芎歸柴胡升麻○鬱結傷脾而結核者歸脾湯兼神效瓜蔞散○若爲兒所吹而發腫焮痛須吮通揉散否則成癰矣若兼餘證亦當治以前法○若婦人鬱怒傷肝脾而結

核不痒不痛一二載始潰者名曰乳巖最難治療

又治法曰若忿怒傷肝厚味積熱以致氣不行竅不通乳不出則結而爲腫爲痛此陽明之血熱甚則肉腐爲膿若膿一成即針出之以免遍潰多囊之患○亦有所乳之子膈有滯痰口氣焮熱含乳而睡熱氣所吹遂成腫痛於初起時須吮咂使通或忍痛揉散之失治必成癰患宜用青皮以疎厥陰之滯石膏以清陽明之熱甘草節以行污濁之血瓜蔞子以消腫導毒或加沒藥橘葉皂角針金銀花當歸更宜隨證消息加減而治仍用少酒佐之更用隔蒜灸之其效尤捷若有

膿宜針之否則通潰難於收斂

乳癰用蒲公英忍冬藤入少酒煎服即欲睡是其功也及覺而病安矣見外科心法

一婦人患乳癰寒熱頭痛與荊防敗毒散一劑更與蒲公英一握搗爛入酒二三盞再搗取汁熱服柤熱罨患處而消丹溪云此草散熱毒消腫核又散滯氣解金石毒之聖藥○一婦人左乳內腫如桃不痛色不變發熱漸消瘦以八珍湯加香附遠志青皮柴胡百餘劑又間服神效瓜蔞散三十餘劑膿潰而愈常見患者責效太速或不解七情及藥不分經絡虛

實者俱難治大抵此證四十以外者尤難治蓋因陰血日虧也○一婦人因怒左乳內腫痛發熱表散太過致熱益甚以益氣養營湯數劑熱止膿成欲用針彼不從遂腫脹大熱發渴始針之膿大泄仍以前湯月餘始愈○一男子左乳腫硬痛甚以仙方活命飲二劑而痛止更以十宣散加青皮四劑膿成針之而愈此證若膿成未破瘡頭有薄皮剝起者用代針之劑點起皮處以膏藥貼之膿亦自出但不若及時針之則不致大潰如膿出不利更紝入搜膿化毒之藥若膿血未盡輒用生肌之劑反助邪氣縱早合必再發不可不慎也○

一產婦因乳少服藥通之致乳房腫脹發熱作渴狀類傷寒以玉露散補之而愈夫乳汁乃氣血所化在上為乳在下為經若衝任之脈盛脾胃之氣壯則乳汁多而濃衰則少而淡所乳之子亦弱而多病此自然之理亦有屢產有乳再產却無或大便澁滯乃亡津液也三因論云產婦乳脈不行有二有血氣盛閉而不行者有血氣弱澁而不行者虛當補之盛當疎之盛者當用通草漏蘆土瓜根輩虛者當用煉成鍾乳粉豬蹄鯽魚之屬概可見矣　俱薛按

婦人久鬱乳內結一核年餘不消朝寒暮熱飲食不甘此乳巖也乃七情所傷肝經血氣枯槁之證宜補氣血解鬱結藥治之遂以益氣養營湯百餘劑血氣漸復更以木香餅灸之喜其謹疾年餘而消若用克伐之劑以復傷血氣則一無可保者○　又一放出宮人乳內結一核如栗欲用前湯彼不信乃服外科流氣飲及敗毒散三年後大如覆碗堅硬如石出水不潰而殁○大抵鬱悶則脾氣阻肝氣逆遂成隱核不痛不痒人多忽之最難治療若一有此宜戒七情遠厚味解鬱結更以養血氣之藥治之庶可保全否則不治亦有數載方潰而陷下者皆曰乳巖蓋其形似巖穴而最毒也慎之則可保十中之一　薛按

胃脘癰　五十一

立齋引聖濟總錄云胃脘癰由寒氣隔陽熱聚胃口寒熱不調故血肉腐壞以氣逆於胃故胃脈沉細以陽氣不得上升故人迎熱甚令人寒熱如瘧身皮甲錯或欬嗽或嘔膿唾血若脈見洪數膿已成也急宜排之設脈遲緊其膿未就有瘀血也急下之否則邪毒內攻腐爛腸胃矣丹溪云內疽者因飲食之毒七情之火相鬱而發用射干湯主之愚常以薏苡仁湯牡丹皮散太乙膏選用之亦效若吐膿血飲食少思宜助

胃壯氣爲主而佐以前法不可專治其瘡

腹癰五十三

立齋曰腹癰謂瘡生於肚腹或生於皮裏膜外屬膏粱厚味七情鬱火所致○若漫腫堅硬肉色不變或脈遲緊未成膿也四君加芎歸白芷枳殼或托裏散○腫軟色赤或脈洪數已成膿也托裏消毒散○膿成而不外潰者氣血虛也卧針而刺之○焮腫作痛者邪氣實也先用仙方活命飲隔蒜灸以殺其毒後用托裏以補其氣○若初起欲其內消當助胃壯氣使根本堅固而以行經活血之藥佐之若用尅伐之劑欲其消散則腫者不能潰潰者不能斂若用疎利之藥下其膿血則少壯者多爲難治老弱者立見危亡若有食積痂氣頻此者當辨而治之

進士邊雲莊腹痛惡寒脈浮數余曰浮數之脈而反惡寒瘡疽之證也不信數日後復請視之左尺洪數余曰內有膿矣仍不信至小腹痛脹連及兩臂始悟余曰膿潰臂矣氣血俱虛何以收斂急服活命飲一鍾臂潰一孔出膿斗許氣息奄奄用大補藥一劑神思方醒每去後糞從瘡出痛不可當小腹間如有物上挺即發痓不省人事煩躁脈大舉按皆實省而

細察之脈雖洪大按之如無以十全大補倍加參芪至四斤更加附子二枚煎膏服之而痓止又用十全大補湯五十餘劑而瘡斂○上舍周一元患腹癰三月不愈膿水清稀朝寒暮熱服四物黃柏知母之類食少作瀉痰涎上湧服二陳枳實之類痰涎愈甚胸膈痞悶謂余曰何也余曰朝寒暮熱血氣虛也食少作瀉脾腎虛也痰涌胸痞脾肺虛也悉因真氣虛而邪氣實也當先壯其胃氣使諸臟有所禀而邪自退矣遂用六君加黃芪當歸數劑諸證漸退又用十全大補湯肌肉漸斂更用補中益氣湯調理而愈百日

腸癰五十四

孫眞人云腸癰爲病小腹重強按之則痛小便如淋時時汗出復惡寒身皮甲錯腹皮急如腫甚者腹脹大轉側有水聲或繞臍生瘡或膿從臍出或大便下膿血脈洪數者已有膿也血下則安若妄治者必殺人

陳無擇曰腸癰爲病身甲錯腹皮急按之濡如腫狀腹無聚積身無熱脈數此爲腸內有膿久積陰冷所成也故金匱有用附子溫之其脈遲緊者膿未成可下之當有血洪數者膿已成不可下此以內結熱所成也故金匱有用大黃利之

千金方灸法屈兩肘正肘頭銳骨灸百壯下膿血而安
立齋曰此證因七情飲食所致○治法脉遲緊者未有膿也宜牡丹皮湯下之○脉洪數者已有膿也用薏苡仁湯排之○小腹疼痛小便不利膿壅滯也用牡丹皮散主之○若臍間出膿者不治經云腸癰為病不可驚驚則腸斷而死故患是者其坐臥轉側極宜徐緩時少飲薄粥及服八珍湯固其元氣靜養調理庶可保全其生
一男子里急後重下膿腫痛此脾氣下陷也用排膿散蠟礬丸而愈後因勞役寒熱體倦用補中益氣湯而安○一婦人膿成腹脹痛小便不利脉滑數此膿毒內潰也服太乙膏丸三錢膿下升許脹痛頓退更以神效瓜蔞散二劑而全退又以蠟礬丸及托裏藥十餘劑而安○一產婦小腹疼痛小便不利以薏苡仁湯一劑痛止更以四物湯加桃仁紅花下瘀血升許而愈○一婦人產後惡露不盡小腹患痛服瓜子仁湯下瘀血而痛止凡瘀血停滯宜急治之緩則腐化為膿最難治療若使流注骨節則患骨疽失治多為敗證

附骨疽 五十五

附骨疽一證近俗呼為貼骨癰凡疽毒最深而結聚於骨際者

皆可謂之附骨疽然凡惟兩股間肉厚處乃多此證蓋此證之因有勞傷筋骨而殘損其脉者有恃酒力房而困爍其陰者有憂思鬱怒而留結其氣者有風邪寒濕而襲留其經者凡人於環跳穴處無故酸痛久而不愈者便是此證之兆輒當因證調治不可遲也蓋其初起不過少陽經一點之滯逆而不散則以漸而深深則腫腫則潰至其延漫則三陰三陽無不連及而全腿俱潰然此證總由元氣大虧不能運行故致留滯不散而後至決裂誠危證也若潰後脉和雖見困弱之甚只以大補元氣為主猶可保全若潰後脉反洪芤而煩躁不寧發熱口渴則必不可治○至若治此之法凡以勞傷筋骨而致者宜大營煎兼大防風湯治之○若酒色傷陰者宜八味丸六味丸或右歸丸兼大防風湯主之○若憂思鬱怒結氣者宜木香流氣飲或五香連翹湯兼大防風湯主之○若風寒外襲者宜五積散兼大防風湯主之○大抵此證初起即宜用大營煎溫補氣血或兼仙方活命飲通行其氣有火者宜速用連翹歸尾煎以解其熱毒仍宜速用隔蒜灸或豆豉餅等類灸之以速散其勢最為捷法其有誤服寒飲等藥者亦求後法以治之庶免大害也○若環跳久痛不已

或見臂股微腫度其已成勢不能散只宜速用托補專固根本使其速起速潰則根本既實雖潰亦無大害必且易潰易斂而易愈也若脈見滑數按之軟熟膿已成也速宜針之無使久留以防深蝕之患其有不明利害苟圖目前或用尅伐消散再傷元氣或用寒涼敷藥以遏其毒氣必致日延日甚而元氣日敗則一潰不可收拾矣考諸方書俱未詳及此證故悉其所因并附治按於後

立齋曰附骨疽有因露臥風寒深襲於骨者有因形氣損傷不能起發者有因尅伐之劑虧損元氣不能發出者有因外敷寒藥血氣凝結於內者凡此皆宜灸熨患處解散毒氣補接元氣溫補脾胃為主○若飲食如常先用仙方活命飲解毒散鬱隨用六君子湯補托營氣若體倦食少但用前湯培養諸臟使邪不得勝正○若膿已成即針之使毒氣不得內侵帶生用針亦無妨如用火針亦不痛且使易斂○其隔蒜灸能解毒行氣葱熨法能助陽氣行壅滯此雖不見於方書予常用之大效其功不能盡述惟氣血虛脫者不應

又曰大抵此證雖云腫有淺深感有輕重其所受皆因真氣虛弱邪氣得以深襲若真氣壯實邪氣焉能為患也故附骨

瘀疽及鶴膝風證惟腎虛者多患之前人用附子者以溫補腎氣而又能行藥勢散寒邪也亦有體虛之人秋夏露臥為冷氣所襲寒邪伏結多成此證不能轉動乍寒乍熱而無汗按之痛應骨者是也若經久不消極陰生陽寒化為熱而潰也若被賊風所傷患處不甚熱而洒淅惡寒不時汗出熨之痛止少者須大防風湯及火龍膏治之若失治則為攣曲偏枯有堅硬如石者謂之石疽若熱緩積日不潰肉色赤紫皮內俱爛名緩疽其始末皆宜服前湯欲其驅散寒邪以補虛托裏也

又曰此證亦有產後惡血未盡臍腹刺痛或流於四肢或注於股內疼痛如錐或兩股腫痛此由冷熱不調或思慮動作氣所壅遏血蓄經絡而然宜沒藥丸治之亦有經血不行流注四肢或股內疼痛如錐或因水濕所觸經水不行而腫痛者宜當歸丸治之凡患此為患雖輕治之稍緩則流注為骨疽多致不救

婦人臁脛痛遇寒痛益甚月餘不愈諸藥不應脈弦緊此寒邪深伏於內也用大防風湯及火龍膏治之而消○一男子腿根近臀處患腫痛外皮如故脈數而沉此附骨疽

膿將成也用托裏藥六劑脈起作痛尺脈滑數其膿已成針之出碗許更加補劑月餘而瘳〇一男子患附骨疽潰後發熱骨內筋攣脈數附近用當歸拈痛湯而愈〇一男子腿內患癰漫腫作痛肉色不變惡寒發熱諸治不效乃邪鬱經絡而然也用五香連翹湯一劑諸證少退又服之大便行一次諸證悉退而愈〇一男子先腿痛後四肢皆痛遊走不定至夜益甚服除濕敗毒之劑不應其脈滑而濇此濕痰濁血爲患以二陳湯加蒼朮羌活桃仁紅花牛膝草烏治之而愈凡濕痰濕熱或死血流注關節非辛溫之劑開發腠理流

通隧道使氣行血和焉能得愈〇王時亨室產後腰間腫痛兩腿尤甚此由瘀血滯於經絡而然也不早治必作骨疽遂與桃仁湯二劑稍愈更以活絡丸數服而瘥 薛按

一魏生者年三十餘素多勞碌忽患環跳酸痛數月後大股漸腫延予視之曰此附骨疽也速當治之與以活命飲二劑未及奏效而腫益甚因病家亂投或清火或解毒遂致嘔惡發熱飲食不進其勢甚危然後懇求相救遂以參芪內托散大加炮薑數劑而嘔止食進其腫散熟而膿成遂令針之針處出膿不多復以九味異功煎與之遂得大潰自後潰出膿潰者五六處而腿肉盡去止剩皮骨矣潰後復嘔惡發熱不食遂以十全大補湯及九味異功煎相間與之然後熱漸退食漸進稍有生色然足筋短縮但可竪膝仰臥左右俱緊挺不能動動則痛極自分已成廢物此後凡用十全大補湯八十餘劑人參三斤而腿肉漸生筋舒如故復成一精壯男子此全得救本之功也〇一男子陳姓者年近三旬素不節慾忽見環跳酸痛月餘不愈予曰此最可畏恐生癰毒之患彼不信又謁之一庸醫反被其詬曰此等胡說真可笑也筋骨之痛亦常事耳不過風熱使然何言癰毒遂用散風清火等

藥至半年後果見微腫復來求治予曰速用托補以救根本尚不遲也彼又不信而謁之瘍醫曰豈有腫瘍未潰而遽可溫補耶復用清火消毒之劑及其大潰而危再延余視則脈證俱敗方信予言而痛悔前失已無及矣〇一膏粱子茅姓者年未三旬素以酒色爲事亦患此證予令服藥執拗不從及其腫而膿成令速針之亦畏痛不從而偏聽庸流敷以苦寒解毒之藥不知膿既已成尤不可解但有愈久愈深直待自潰而元氣盡去不可收拾矣 景按

臀癰 五十

馬益卿曰臀癰發背生於小腹之下此陰中之陰也道遠位僻雖
曰多血然氣運不到血亦罕來中年之後尤慮患此縱有膿
痛發之脈證但見虛弱便與滋補氣血無虧可保終吉
立齋曰凡治此者毋傷脾胃毋損脾氣但當以固根本為主○
若腫痛尺脈緊而無力者托之○腫硬痛甚者隔蒜灸之更
以解毒○不作膿者托裏為主○不作膿而痛者解毒為主
○不潰或潰而不斂者托裏為主
又治法曰若腫硬作痛者形氣虛而邪氣實也用托裏消毒
散○微腫微痛者形氣病氣俱虛也用托裏散補之○欲作

膿者用內托羌活湯○若痛甚者用仙方活命飲○大勢既
退亦用托裏消毒散○若脾虛不能消散或不潰不斂者六
君子加芎歸黃芪○若陰虛不能消散或作渴便淋者六味
丸加五味子○若腫虛不能潰或膿稀不能斂者用補中益
氣湯○氣血俱虛者十全大補湯○若腫硬不成膿者用隔
蒜灸及活命飲○潰後宜灸豉餅及補中益氣十全大補二
湯○若灸後大勢已退餘毒未消須用葱熨以補其氣以消
餘毒為善
又曰凡毒氣已退不起者但內補其氣血使膿成自針之

之不可用內消之論○若腫高而軟者發於血脈腫下而堅
者發於筋骨肉色不變者發於骨髓也○膿血大泄之後當
大補氣血為先雖有他證以末治之
鴻臚陳和卿脾胃不健常服消導之劑左腿股及臂患腫余曰
此脾氣虛而下注非毒也當用補中益氣倍加白朮彼惑
於衆人云白朮能潰膿乃專以散腫消毒為主而肺金益虛
益倦余用白朮一味煎飲而消○儒者楊啓元左臀患此敷
貼凉藥腫延內股股連腿消毒敗左臀皆痛余以為足三陰
虧損用補中益氣湯以補脾肺用六味丸加五味子以補肝

腎股內消而臀間潰又用十全大補湯而瘡口斂○一儒者
臀腫痛甚此邪氣實用活命飲隔蒜灸而消後因飲食勞
倦腫痛復作寒熱頭痛此元氣虛而未能復也與補中益氣
湯加蔓荊子川芎而愈○一男子患臀癰作膿而痛以仙
方活命飲一劑痛止更以托裏消毒散膿潰而瘥○一弱人
臀癰膿成不潰以十全大補湯數劑始托起乃針之又二十
餘劑而愈 薛按
流注 五十七
立齋曰流注之證多因勞傷鬱怒或暴怒或脾氣虛濕氣逆於肉理

或腠理不密寒邪客於經絡或濕痰或閃撲或產後瘀血流
注關節或傷寒餘邪未盡為患皆因真氣不足邪得乘之故
氣凝血聚為患也然此證或生於四肢關節或生於胸腹腰
臀或結塊或漫腫或痛或不痛悉宜用葱熨法及益氣養營
湯固其元氣則未成者自消已成者自潰可全愈也若不補
氣血及節飲食慎起居戒七情而專用寒涼剋伐者俱不治
又治法曰常治此證凡暴怒所致胸膈不利者調氣為主〇
抑鬱所致而不痛者宜調經脉補氣血〇腫硬作痛者行氣
和血〇潰而不斂者補氣血為主〇傷寒餘邪未盡者和而

解之〇脾氣虛濕熱凝滯肉理者健脾除濕為主〇閃跌瘀
血凝滯為患者和血氣調經絡〇寒邪所襲筋攣骨痛或遍
身痛宜溫經絡養血氣〇若久而不斂瘡口無陽者宜豆豉
餅或附子餅灸之以祛散寒邪接補陽氣或外用琥珀膏貼
之〇若內有膿管或生瘀肉而不斂者用針頭散腐之自愈
錠子尤效

醫林集要云附骨疽乃流注之敗證也如用涼藥則內傷其脾外
冰其血脾主肌肉脾氣受傷飲食必減肌肉不生自為脉絡
血受冰則氣血不旺而愈滯宜用理脾脾健則血自生而氣

自運行矣〇又有白虎飛尸留連周身或展轉數處冷痛朽
骨出盡自愈若附骨腐者可痊正骨腐則為終身廢疾矣〇
有痰自手足或頭面腫起或兼疼痛上至頭項骨節去處如
瘰癧貫珠此風濕流氣之證也宜以加減小續命湯及獨活
寄生湯治之〇有兩膝腫痛起或至遍身骨節疼痛者此風
濕痺又名歷節風宜附子八物湯治之〇又有結核在項腋
或兩乳傍或兩胯軟肉處名曰痰瘧屬冷證也又有小兒
宿痰失道致結核於顱項脊膊胸之處亦冷證也俱宜熱
藥敷貼〇已上諸證皆緣於腎腎主骨腎虛則骨冷而為患

也所謂骨疽皆起於腎亦以其根於此也故用大附子以補
腎氣腎實則骨有生氣而疽不附骨矣

一男子臂腫一塊微痛脉弦緊以疏肝流氣飲四劑而消〇一
婦人恚怒臂腫　塊胸膈不利時或氣走作痛用方脉流氣
飲數劑行止更以小柴胡湯對四物加香附貝母月餘而愈
〇一婦人素弱性躁臂腫痛胸膈不利服流氣敗毒藥反
發熱以四七湯數劑胸寬氣利以小柴胡湯對四物加陳皮
香附腫痛亦退大抵婦人性執着不能寬解多被七情所
傷遂至遍身作痛或肢節腫痛或氣塡胸滿或如梅核塞喉

嘔吐不出或痰涎壅盛上氣喘急或嘔逆惡心甚者觸則欲絶產婦多有此證宜服四七湯先調滯氣更以養血之藥若因憂思致小便白濁者用此湯吞青州白丸子屢效○一老人傷寒表邪未盡股內患腫發熱以人參敗毒散二劑熱止灸以香附餅又小柴胡湯加二陳羌活川芎歸朮枳殼數劑而散○一男子腿患腫而不斂用人參養營湯及附子餅更以補劑煎膏貼之兩月餘而愈○一男子腿患腫肉色不變不痛脈浮而滑以補中益氣湯加半夏茯苓枳殼木香飲之以香附餅熨之彼謂氣無補法乃服方脈流氣飲腫愈甚復求治以六君子湯加芎歸數劑飲食少進再用補劑月餘而消夫氣無補法俗論也以其為病痞塞似難於補殊不知正氣虛而不能運行則邪氣滯而為病經云壯者氣行則愈怯者弱者則著而為病苟不用補法元氣何由而行乎○一婦人腿患筋攣骨痛諸藥不應脈遲緊用大防風湯二劑頓退又二劑而安又一婦人亦然先用前湯二服更服黑丸子而痊此二患若失治必潰成敗證○一男子右腳患之微腫形勞氣弱以益氣養營湯服黑丸子及木香生地黃作餅覆患處熨之月餘膿成針之仍服前藥而愈○一男子臂腫筋攣骨痛年餘方潰不斂診其脈更虛以內塞散一料少愈以十全大補湯及附子餅灸之而愈精要云留積經久極陰生陽寒化為熱以此潰多成瘻宜早服內塞散排之○一男子臂患出腐骨三塊尚不斂發熱作渴脈浮大而澁乃氣血俱損須多服生血氣之藥庶可保全彼惑於火尚未盡仍用涼藥內服外敷幾危始求治其形甚瘁其脈愈虛先以六君子湯加芎歸月餘飲食漸進以八珍湯加肉桂三十餘劑瘡色乃赤更以十全大補湯外以附子餅灸之僅年而瘥 薛按

鶴膝風 五十八

凡肘膝腫痛臂䯒細小者名為鶴膝風以其象鶴膝之形而名之也或止以兩膝腫大䯒腿枯細不能屈伸俗又謂之鼓槌風總不過風寒濕三氣流注之為病也然腫痛者必有邪滯枯細者必因血虛凡治此者必宜以養氣滋血為主有風者兼散其風有寒濕者兼去其寒濕若果由邪鬱成熱者必宜滋陰清火自無不愈其有痢後而成者又名痢後風此以瀉痢亡陰尤宜壯腎凡寒勝者宜三氣飲五積散或大防風湯之類主之濕勝者宜五苓散理中湯之類主之熱勝者宜保陰煎大秦艽湯之類主之若以陽氣不足而敗及四肢者非

右歸丸理陰煎及八味地黄丸之類不可

立齋曰鶴膝風乃調攝失宜虧損足三陰經風邪乘虛而入以致肌肉日瘦內熱減食肢體攣痛久則膝大而腿細如鶴之膝故爾名之○若傷於脾胃者用補中益氣湯爲主若傷於肝腎者六味地黄丸爲主若欲其作膿或潰後者十全大補湯爲主皆佐以大防風湯○初起者須用葱熨法可以內消○若體倦口乾中氣不足也補中益氣湯加五味子○頭暈頭痛陽氣不升也補中益氣湯加蔓荆子○發熱晡熱陰血虛弱也用四物參芪白术○畏寒憎寒陽氣虛弱也用十全大補湯○飲食少思胸膈膨脹脾胃虛痞也用四君子湯○面色痿黄飲食少思脾胃虛弱也用六君子湯膿水清稀肌肉不生氣血俱虛也用八珍湯○熱來復去有時而動無根虛火也用十全大補湯○形瘦嗜臥寢息發熱痰盛作渴小便頻數五臟虛損也用六味丸○臍腹疼痛夜多漩溺腳膝無力頭暈吐痰腎氣冷敗也用八味丸○發熱大渴不欲近衣面目赤色脉大而虛血虛發躁用當歸補血湯○或有猶後而患者亦治以前法餘當臨證制宜

又曰大抵方之義各有所宜凡體氣虛弱邪入骨界遏絕隧

道若非用附桂辛温之藥開散關節腠理之寒邪通暢隧道經絡之氣血決不能愈且本草云附子治寒濕痿躄拘攣膝痛不能行步以白术佐之爲寒濕之聖藥又云桂通血脉消瘀血堅骨節治風痺骨攣腳軟宣導諸藥及十全大補湯以治前證不但不可去桂亦不可不加附子無此二味何以行參芪之功健芎歸之性而補助血氣使之宣通經絡扶大虛之證以收必效之功哉況前證在骨節之間關鍵之地治之不速使血氣循環至此鬱而爲膿從此而泄氣血瀝盡無可生之理矣亦有秋夏露臥爲寒所襲搏熱內作遂成附骨疽亦有賊風搏於肢節痛徹於骨遇寒尤甚以熱熨之則少減尤當以大防風湯治之更以蒜搗爛攤患處用艾鋪蒜上燒之蒜壞再易皮膚倘破無妨若經久不消則極陰生陽潰而出水必致偏枯或爲漏證宜服內塞散及附子餅灸之或脉大或發渴者俱不治以其真氣虛而邪氣實也

張上舍患而當伏枕半載流膿三月彼云初服大防風湯去附子將潰服十宣散今用十全大補湯去肉桂俱不應視其脉證甚弱予以十全大補湯每貼加熟附子一錢服三十餘劑少愈乃去附子五分又服三十餘劑將愈却全去附子更

三十餘劑而痊○一男子左膝腫大三月不潰予謂體虛之
人風邪襲於骨節使氣滯而不行故膝愈大而腿愈細名曰
鶴膝風遂以大防風湯三十餘劑而消○州守張天澤左膝
腫痛胸膈痞悶飲食少思時欲作嘔頭暈痰壅日晡益倦此
脾肺氣虛也用葱熨及六君加炮薑諸證頓退飲食少進用
補中益氣加蔓荊子頭目清爽間與大防風湯十餘劑又用
補中益氣湯三十餘劑而消 薛按

多骨疽 五十九

立齋曰多骨疽者由瘡瘍久潰氣血不能營於患處邪氣陷襲
久則爛筋腐骨而脫出屬足三陰虧損之證也用補中益氣
湯以固根本○若陰火發熱者佐以六味丸壯水之主以鎮
陽光○陽氣虛寒者佐以八味丸益火之源以消陰翳○外
以附子餅葱熨法祛散寒邪補接營氣則骨自脫瘡自斂也
○夫腎主骨若腎氣虧損其骨漸腫荏苒歲月潰而出骨亦
用前法若投以克伐之劑復傷真氣鮮有不誤者

下疳瘡 六十

下疳一證本肝腎濕熱證也若無外因內病者不過去其濕熱
或滋真陰濕熱既清其瘡自愈無足慮也惟感觸淫毒而患

者毒有淺深則病有微甚皆宜用百草煎熏洗外以標疳散
敷之則輕者自愈若濕熱甚而為腫為痛者宜用芍藥蒺藜
煎兼而治之如毒甚者必用萆薢湯方可○若或觸淫邪毒
自少陰直入精宮者不易愈即治如前法然必見便毒廣瘡
發出而後下疳始愈既見者毒即當於本證條下求法治之
○余嘗治一少年因偶觸穢毒遽患下疳始潰龜頭敷治不
效腐從馬口延入尿管以漸而深直至肛門逐節腫痛形如
魚骨每溺及則脹結馬口脹不得出潤而通之則先脹後尿
敷洗皆不能及甚為危懼余嘗遇 山叟傳得槐花蕊方因
以治之不十日而從根漸愈半月後即自內達外退至馬口
而全愈瘡愈後即見此後廣瘡復與五加皮飲十餘劑而全
愈向後傳方者皆此方並治淋瘡熱毒悉從小便泄去所以
能治此瘡但服此者可免終身瘡毒後患然猶有解毒奇驗
則在瘡發之時但見通身忽有云片紅斑數日而沒者即皆
瘡毒所發之處瘡毒已解而瘡形猶見是其驗也予初未之
信及此人瘡發之時瘡因不多而通身紅斑果見凡兩日而
沒予始知瘡之有奇一至如此 新按
立齋曰下疳屬肝經濕熱下注或陰虛火燥治法腫痛發熱者

血虛而有熱也四物湯加柴胡山梔○腫痛寒熱者肝經濕
熱也小柴胡湯加龍膽草黃連○腫痛便澀者濕熱壅滯也
龍膽瀉肝湯○腫痛腐潰者氣血虛而有火也八物湯加山
梔柴胡○日晡熱甚者陰血虛而有火也小柴胡湯加參朮
芎歸○日晡倦怠者陽氣虛而下陷也補中益氣湯○有經
久不愈而發寒熱者腎水不能生肝木也宜六味丸○若筋
縮或縱或為痒痛或出白津此筋疝也用龍膽瀉肝湯○氣
虛者補中益氣湯加炒山梔炒龍膽○陰虛火燥者用六味
丸○莖中痒出白津用補中益氣湯與清心蓮子飲間服○

蓋此證肝經陰虛為本腫痛寒熱等證為標須用六味丸以
生肝血凡脾土虛不能生金水而見一切肝證者當佐以補
中益氣湯加麥門冬以滋化源

一男子腫痛不消一男子潰而雜痛發熱小便秘澀日晡或熱
一小兒腫痛者久不愈俱以小柴胡湯吞蘆薈丸數服而愈
○一小兒十五歲患瘡潰發熱服消毒之藥腫痛益甚其年餘
矣詢之乃稟所致用蘆薈湯月餘諸證漸愈又用補陰八珍
湯補中益氣二湯而痊○府吉士劉華甫或莖中作痛或竅
出白津或小便秘澀先用小柴胡湯加山梔澤瀉黃連木通
膽草茯苓二劑以清肝火導濕熱諸證漸愈後因勞倦忽然
寒熱此元氣復傷也用補中益氣而安又用六味丸以生肝
血滋腎水而全愈○一男子玉莖腫痛小便如淋自汗甚苦
時或尿血少許尺脈洪數按之則濇先用清心蓮子飲加牛
膝山梔黃柏知母柴胡數劑少愈更以滋腎丸一劑而痊○玉
機微義曰如自汗小便少不可以藥利之既已自汗則津液
外亡小便自少若再利之則營衛枯竭無以制火而煩熱愈
甚當俟熱退汗止小便自行也兼此證乃陽明經病大忌利
小便 但降按

海藏治下疳久不愈方

橡斗子二個合盛黃丹令滿以亂髮厚纏定燒烟盡為度同
研為細末先以葱白熬漿水洗瘡臨臥蓋次上藥甚者不過三
次如神

又下疳方 下疳瘡內服藥皆須治內方愈外治者須斟酌
散或此方亦佳

人中白生用 宮粉煆黃 紅丹飛過

右等分為末先用蘗湯或濃茶洗淨然後敷藥每日二三次
或用猪油或用蜜水調敷之

便毒 八十

便毒論治如薛氏之法固已詳矣然又惟交感不潔滯遏淫毒而患者為故多每每先起下疳下疳未已便毒繼之此濕熱穢毒之為患也凡初起腫痛尚未成膿而元氣尚強者速宜先去其毒惟會膿散或牡蠣散為最善○若已成膿其或針或砭惟速去其膿隨因證調補使速收口為善○若初起一核其痛微其腫漫者此有二證一以邪輕一以元氣虛弱毒深而然若邪輕者只用會通膏加麝香貼之無有不散或降癰散亦可若元氣虛弱而毒深者既不肯散又不易潰愈久必愈甚最為可畏及其潰後多不能收輕則為瘻重則殞命此惟大補元氣方不致害○若焮腫痛甚膿已將成勢不能消宜用降癰散箍須留之頭勢可斂痛可解膿可速成而潰亦

立齋曰便癰屬足厥陰肝經內熱外寒或勞役過度或房慾不節或慾火不遂或強固其精或用牽濕熱而致大抵多患厥勞役不足精氣俱虛之人俗云一石米瘡此言百日方可愈若大補血氣不旬日可愈何用百日若瘡之潰斂在乎血氣之盛也亦有內蘊熱毒而生者須辨虛實及成膿與否不可槩投攻藥凡婦人患此者多在兩拗腫痛或腹中結塊小便澁滯而治者行法患若又能洞徹無足慮也嘗見治此證者槩用大黃之類下之以求內消或其膿成令膿從大便而出鮮有見其痊也人多欲內消者蓋恐收口之難也若知補養血氣不旬日而收矣何難之有若膿既成豈有可消之理如再用尅伐之劑必致難治

又曰便癰者血疝也俗呼為便毒言於不便處為瘡也乃足厥陰之經絡及衝任督脉亦屬肝之傍絡此氣血流通之道路今壅而腫痛是則熱毒所致宜先疏導其滯更以托裏之劑此臨證制宜之法也

又治法曰內熱外寒者牛黃解毒散○濕熱壅滯者宜用龍膽瀉肝湯疏肝導滯○慾心不遂致逆精氣者先用五苓散加大黃疏其逆滯後用地黃丸以補肝腎強固其精○房慾不節者宜六味丸料○勞役過度者補中益氣湯

一男子患便毒焮腫作痛大小便秘脉有力以玉燭散二劑頓退更以龍膽瀉肝湯四劑而消○一男子膿未成大痛服消毒托裏等藥不應診之脉洪大毒尚在以仙方活命飲一劑痛止又劑而消○一儒者腫痛便澁用八正散二劑以清肝經濕熱而腫痛愈以小柴胡加芎歸澤瀉山梔二劑以

清火補血而小便利○一男子已潰而痛不止小便秘澀此肝火未解也與小柴胡加黃柏知母芎歸痛止便利更以托裏當歸湯而瘡斂若毒未解而痛不止者須用活命飲○庠生沈尼文年二十左拗患之余以肝腎陰虛先用托裏藥潰而將愈因入房發熱作渴右邊亦作痛膿水清稀虛證悉至脈洪大而無力勢甚可畏用十全大補加附子一錢脈證頓退再劑全退後用大補湯三十劑而愈○一男子腫而不潰此因陽氣虛弱用參芪歸朮以補托元氣用白芷皂刺柴胡甘草以排膿清肝數劑而潰以八珍加柴胡補其氣血數劑

而愈○春元發待之虛而服尅伐藥幾至危殆余用托裏健脾藥而愈秀才王文遠因勞役患之服小柴胡湯而表證散後用托裏藥膿成針之而仍日熱又用知柏膿清脈弱以大補之藥而已愈因新婚復發自用連翹消毒散致瀉痢不止竟致不救○見此證屬不足者多矣非補不可大抵便毒屬肝經初起堅硬肝主筋故也五七日後當亦軟膿成故也若尚堅硬乃元氣不能腐化往往人見堅硬只欲內消久服攻散藥多致虛虛之禍前此治者即其驗也○一婦人兩拗腫痛小腹痞痛小便數白帶時下寒熱往來小水淋澀余謂肝

氣滯而血病用龍膽瀉肝湯漸愈又用加味逍遙散六味丸而全愈○一婦人小腹內如有所梗兩拗並入門俱腫小便淋澀經候不調內熱作渴飲食少思腹內初如雞卵而漸大脈洪數而虛左關尤甚屬肝膽鬱結之證也用加味歸脾湯肝火退而脾土健間以逍遙散下蘆薈丸而愈俱薛按

楊梅瘡 六十二

楊梅瘡一證以其腫突紅爛狀如楊梅故爾名之其在西北人則名為天泡瘡東南人又謂之廣東瘡凡毒輕而小者狀類茶萸故名茶萸瘡毒甚而大者色爛可畏形如綿花故名綿

花瘡大都此證必由淫毒傳染而生若此淫穢之毒由精泄之後氣從精道乘虛直透命門以灌衝脈所以外而皮毛內而骨髓凡衝脈所到之處則無處不到此其為害最深最惡證初起時夫毒不淨或治失其宜而隨至敗爛殞命者蓋不少矣或至一二十年之後猶然發為瘋毒或至爛頭或至爛鼻或四肢幽陰之處臭爛不可收拾或遺毒兒女致患終身其患如此每而思之則有見此惡道而不為寒心知避者其愚亦甚矣故凡治之之法最當知要切不可不慎也○亦有不因淫毒傳染偶中濕熱而患者此止在皮毛肌肉之間

淸去濕熱自當全愈無足慮也
一今人每遇此患或畏人知或畏毒甚而大用攻擊峻利等藥多致邪毒未除而元氣先敗或成勞瘵或即殞命或愈久愈甚以致敗壞不能收斂皆元氣先敗之故也余見之多矣故凡被此病者切不可驚慌亦不可專肆攻擊但按法漸解其毒務使元氣毫無損傷則正能勝邪雖毒無害若正不勝邪則微毒亦能殺人此其要也不可不察
一廣瘡治法凡其初起而元陽未傷毒亦未甚宜速用清利使從小便利去其毒惟換肌消毒散爲第一其次則五加皮飲

亦妙或兼火邪者宜秘仙方遺糧湯或稟氣多弱者宜茯苓膏凡此諸藥或十日或半月甚者一月無不見效○一凡生瘡毒者宜服槐花蕊至二三升則毒從小便泄去可免終身之患眞神方也有按在下疳瘡條中○一此瘡初起時多有先下疳久便毒而後瘡出是爲一套若便毒勢甚腫痛熱秘而元氣素強者即宜用會膿散或壯蠣散先去其毒之大勢而後用前方諸藥亦要着也○一此瘡或久而不愈或元氣素弱或因克伐致虛但見有正不勝邪之勢則當酌其輕重或以純補元氣爲主凡脾腎陰陽氣血皆宜隨證用方但使氣血得復則雖毒無害最忌見不眞而執兩端則終歸無益亦是要着○一飮食宜否有謂宜忌口者有謂不宜忌口者而任其發透總之亦有其要蓋瘡毒初榮毒本未甚此時只宜清利使毒漸消爲善若食發物則愈發愈多而毒愈甚矣此則宜忌之時也若瘡毒已久元氣已弱膿汁既多血氣既虧若非以藥食滋補則日見消敗何以挽此則不宜忌者也宜忌不宜忌是亦宜補不宜補之法耳使不知辨安能無誤○一瘡生頭面或遍身不便應役欲其速愈宜用點藥則二三日可以脫落亦神妙者也但此惟治標之法耳方在

新因四十二○一瘡毒久留發爲癱瘓亦名楊梅癱漏或筋攣或腐骨潰爛不收皆爲惡候近來治法惟五寶丹爲最效及徐東皐楊梅癰漏方或秘傳水銀膏宜擇用之
立齋曰天泡瘡屬元氣不足邪氣所乘亦有傳染而患受證在肝腎二經故多在下體發起有先筋骨痛而後患者有先患而後痛者有瘡凸亦作痛熱亦熾甚也瘡微作痛熱亦微也瘡色白而不結痂陽氣虛也色赤而不結痂陰血虛也搔痒脉虛浮氣不相榮也搔痒脉浮數血不相榮也臂背間或頸間作痒膀胱陰虛也陰器股內作痒肝經血虛也陰囊作痒

重墜肝經陰虛濕熱也小便頻數短少色赤肝經陰虛也小便頻數短少色白脾肺氣虛也面目搔痒或變赤外邪相搏也若閞痒或毛落肝虛血燥也飲食少思口乾飲湯胃氣虛也飲食不化大便不實脾氣虛也侵晨或夜閒泄瀉脾腎虛也

又治法曰若表實者先用荊防敗毒散解散之○裏實者先用內疏黃連湯通導之○表裏俱實者防風通聖散雙解之○邪熱在肝經者龍膽瀉肝湯清解之○後用換肌消毒散為上愈後再無筋骨疼痛之患氣虛者四君子湯血虛者四

物湯氣血俱虛者八珍湯俱加兼證之藥治之自無不愈○若治失其法有傷脾胃目昏暗卷攣肢體者但用九味蘆薈丸以清肝火六味丸以滋腎水蠲痺消毒散以養血祛邪亦有可生者○若服輕粉等藥及收毒於內以致迸發或藥服防風通聖散氣血愈虛因而不治者多矣○凡有脈砭或作瘡外用艾灸及敷沖和膏內服補藥遂斂

一男子遍身皆患脉浮而數以荊防敗毒散治之表證乃退以仙方活命飲六劑瘡漸愈兼飲萆薢湯月餘而愈○一男子下部生瘡諸藥不應延及遍身突痒狀似番花筋攣骨痛至夜尤甚此肝腎二經濕熱所致先以導水丸五服次以龍膽瀉肝湯數劑再與除濕健脾之藥外貼神異膏吸其膿隔蒜灸拔其毒而愈○一童子玉莖患之延及小腹數枚作痛發熱以小柴胡湯吞蘆薈丸更貼神異膏月餘而安○一儒者患前證先玉莖作痒出水後陰囊股內小腹脇臂發小瘟或乾或膿窠誤服祛風等藥肢體倦怠惡寒發熱飲食漸減大便不實脉見浮弦兩尺浮數此腎水虛熱肝木乘脾土也用六味地黃丸補中益氣湯為主佐以換肌消毒散而愈○一人患此服攻毒等藥患處凸而色赤作痛肢體倦怠惡寒發

熱脉浮而虛此元氣復傷而邪氣實也用補中益氣湯二劑而愈○進士劉華甫患之數月用輕粉朱砂等藥頭面背臂各結一塊二寸許潰而形氣消弱寒熱口乾舌燥唇裂小便淋漓痰涎上壅飲食少思此脾胃傷諸臟弱而虛火動也先用六君子二十餘劑又用補中益氣湯加山藥山茱萸麥門五味服之胃氣復而諸證愈惟小便未清痰涎未止用加減八味丸而愈○一男子患楊梅瘡後兩腿一臂各潰二寸許一穴膿水淋漓少食無睡久而不愈以八珍湯加茯神棗仁炒服旬日以蒜搗爛塗患處灸良久隨貼膏藥數日少可卻

用豆豉餅灸之更服十全大補湯而愈〇一婦人患之皆愈
惟兩腿兩膝各爛一塊如掌兼筋攣骨痛三載不愈諸藥不
應日晡熱甚飲食少思以萆薢湯兼逍遙散倍用茯苓白朮
數劑熱止食進貼神異膏更服八珍湯加牛膝杜仲木瓜三
十餘劑而痊〇一婦人患此焮癢粉紫於發中蔓之致遍身
皮爛膿水淋漓不能起居以滑石黃柏綠豆粉末等藥鋪席
上令可臥更服神功托裏散月餘而痊 外治法按

囊癰 六十二

立齋曰囊癰屬肝腎二經陰虛濕熱下注也〇腫痛未作膿者
疏肝導濕〇腫硬發熱者清肝降火〇已潰者滋陰托裏〇
大抵此證屬陰道虧濕熱不利所致故滋陰除濕藥不可缺
常治腫痛小便秘澀者用除濕為主滋陰佐之〇腫痛已退
便利已和者除濕滋陰藥相兼用之〇欲其成膿用托裏為
主滋陰佐之〇候膿成即針之仍用托裏滋陰〇濕毒已盡者
專用托裏〇如膿清或多或斂遲者用大補之劑及豆豉餅
灸之〇若潰後虛而不補少壯者成漏老弱者不治〇膿清
作渴脈大者亦不治
又法曰若小便澀滯者先用分利以泄其毒繼以滋陰以令其

自消〇若濕熱退而仍腫痛宜補陰托裏以速其膿〇膿成
而便秘者熱毒壅閉也先用托裏消毒散後用針以泄之〇膿
去即解〇若膿去而腫痛不減者熱毒未解也用清肝益營
湯〇口乾而小便數者腎經虛熱也六味丸〇內熱晡熱者
肝經血虛也四物加參朮〇體倦食少者脾氣虛熱也補中
益氣湯〇膿水清稀者氣血俱虛也十全大補湯〇此證雖
大潰而睪丸懸露治得其法旬日間肉可漸生而愈若專攻
其瘡陰道益虛則腫者不能潰潰者不能斂少壯者多成痼
疾老弱者多致不起〇亦有患痔久漏而串及於囊者當兼
治其痔切忌寒藥克伐虧損胃氣
馬益卿曰囊癰者濕熱下注也有作膿者此濁氣下流入滲道
因陰道或虧水道不利而然膿盡自安不藥可也惟在善於
調攝耳〇又有因腹腫漸流入囊腫甚而囊自裂開睪丸懸
掛水出以麩炭末敷之外以紫蘇包裹仰臥而養之〇囊癰
人囊者曾治數人悉以濕熱入肝經施治而用補陰佐之
雖膿潰皮脫睪丸懸掛皆不死
一男子患此未作膿而腫痛以加味龍膽瀉肝湯二劑少愈更
以四物湯加木通知母黃柏而愈〇一男子焮腫痛甚小便

澁發熱脈數以龍膽瀉肝湯倍用車前子木通茯苓四劑勢去其半仍以前湯上加黃柏金銀花四劑又減二三便利如常惟一處不消此欲成膿也用前湯加金銀花白芷皂角刺六劑微腫痛脈滑數乃膿已成令針之腫痛悉退投滋陰托裏藥及紫蘇末敷之而愈○一膏粱之客陰囊腫脹小便不利此中焦積熱乘虛下注先用龍膽瀉肝湯加黃柏牛膝四劑漸愈後用補陰八珍湯加柴胡山梔而愈後不守禁忌前證復作仍用補陰八珍湯補中益氣湯六味丸而痊又因勞倦發熱自用四物黃柏知母之類虛證悉具瘡口大開余

謂五臟氣血俱虛也朝用補中益氣夕用六君加當歸各五十餘劑瘡口始斂又用六味丸調補全愈○儒者陳時用考試不利一夕飲痛酒入房其妻不納翌日陰囊腫脹焮痛遣人求治與以清肝火除濕熱之劑赦門夜閉不及歸服翌日報云夜來陰囊悉潰玉莖下面貼囊者亦腐此肝火挾濕壅而濕熱熾盛也仍以前清火除濕之劑加參芪歸术四劑腐肉悉脫睾丸懸掛用大補氣血并塗當歸膏囊莖全復而愈○一男子醉而入房陰囊腫脹大如斗小腹脹悶小水淋○發熱口乾痰涎壅盛此肝脈陰虛濕熱所乘也用六味丸料

加車前牛膝作飲下滋腎丸諸證頓退再加五味麥冬二劑而愈再以補中益氣加麥冬五味調理而痊若全用淡滲復損真陰決致不起 [illegible]

懸癰六十四

立齋曰懸癰謂瘡生於玉莖之後穀道之前屬足三陰虧損之證輕則爲漏瀝盡氣血而亡重則內潰而即殞大抵此證原屬肝腎陰虛故不足之人多患之雖一於補猶恐不治況膿成而又克伐不死何俟即寒涼之劑亦不可過用恐傷胃氣惟製甘草一藥不損血氣不動臟腑其功甚捷最宜用之不

可忽也○欲腫或發熱者清肝解毒腫痛者解毒爲主○腫痛而小便赤澁者肝經濕熱也宜分利清肝○不作膿或不潰者氣血虛也宜補之

又治法曰凡初起濕熱腫痛或小便赤澁宜先以製甘草一二劑及隔蒜灸更飲龍膽瀉肝湯○欲腫潰其宜仙方活命飲以製甘草佐之○若發熱腫痛者以小柴胡湯加車前黃柏芎歸○若不成膿或膿成不潰者八珍湯補之○若膿已成者急針之○已潰者用八珍湯加製甘草柴胡梔炒黃柏知母○小便澁而脈有力者仍用龍膽瀉肝湯加製甘草

○小便澁而脈無力者清心蓮子飲加製甘草○膿清不斂者用大補之劑間以豆豉餅灸之久而不斂者用附子餅灸之並效○欲其生肌收斂腎虛者六味地黃丸血虛者四物加參朮氣虛者四君加芎歸脾虛者補中益氣湯氣血俱虛者八珍湯並十全大補湯若用寒涼消毒則誤矣

陳良甫曰治穀道前後生癰謂之懸癰用粉草一兩截斷以澗水浸潤炙令透內細剉用無灰酒煎服有人患此已破服兩劑瘡即合

一弱人莖根結核如大豆許勞則腫痛先以十全大補湯去桂加車前麥冬酒製黃柏知母少愈更服製甘草漸愈仍以四物車前之類而消○一男子患此焮痛發熱以龍膽瀉肝湯二劑及製甘草四劑而潰再用滋陰之劑而愈若或膿未成以葱炒熱敷上冷即易之隔蒜灸之亦可數日不消或不潰或潰而不斂以十全大補湯加柴胡梔為主間服製甘草並效若不保守必成漏矣○一儒者患懸癰服坎離丸及四物黃柏知母之類不應脈浮洪按之微細余以為足三陰之虛用托裏散及補陰八珍湯漸愈又用六味丸補中益氣湯調補化源半載而痊大凡瘡瘍等證若腎經火氣亢盛致陰水

不能生化而患陰虛發熱者宜用坎離丸取其苦寒能化水中之火令火氣衰而水自生若陽氣衰弱致陰水不能生化而患陰虛發熱者宜用六味丸取其酸溫能生火中之水使陽氣旺而陰自生況此證屬腎經精氣虧損者十有八九屬腎經陽氣亢盛者十無一二然江南之人患此者多屬脾經陰血虧損元氣下陷須用補中益氣湯升補陽氣使陽生而陰長若嗜慾過多虧損真陰者宜用六味丸補腎經元氣以生精血仍用補中益氣湯以培脾肺之生氣而滋腎水經云陰虛者脾虛也但多誤認為腎經火證用黃柏知母之類復傷脾肺絕其化源反致不起惜哉○通府黎敬之患前證久不愈日晡熱甚作渴煩而喘或用四物湯黃柏知母之類病益甚肢體倦少食大便不實小便頻數謂余曰何也余曰此脾虛之證前藥復傷而然遂用補中益氣加茯苓半夏數劑飲食漸進前證漸愈更加麥冬五味調理乃痊經曰脾屬太陰為陰土而主生血故東垣云脾虛元氣下陷發熱煩渴肢體倦怠等證用補中益氣湯以升補陽氣而生陰血若誤認為腎虛火證而用四物黃柏知母之類反傷脾胃生氣是虛其虛矣況黃柏知母乃瀉陽損陰之劑若非膀胱陽火盛而

不能生陰水以致發熱者不可用也（但陰拔）

脫疽 六十五

立齋曰：脫疽以疔患於足或足趾，重者潰脫，故名之。亦有患於手指者，名曰蛀節疔。重者腐去本節，輕者筋攣。此證因膏粱厚味，酒麪炙煿，積毒所致；或不慎房勞，腎水枯竭；或服丹石補藥致有。先渴而後患者，有先患而後渴者，皆腎水虧涸，不能制火也。此證形勢雖小，其惡甚大，不問腫痛，首須隔蒜灸之。不痛者宜明灸之，庶得少殺其毒。凡初發而色黑不潰者不治，毒延入腹者不治，色黑不痛者亦不治，色赤作痛自潰者可治。若失解其毒，以致肉死色黑者，急斬去之。亦有因修手足口咬等傷而致者。若元氣虛弱，或犯房事，或外塗寒涼，內服克伐，損傷脾胃，以致患處不潰，或黑延上足，亦多致死。重者須當用腳刀轉解周骨，輕拽去之，使筋隨骨出，而毒得洩，亦不痛。否則毒筋內斷，雖去而仍潰，且偏僻之處，氣血罕到，藥難導達，況攻毒之劑必先傷脾胃，反損元氣，不若灸法為良。重者須解去為善，故孫真人云：在肉則割，在指則截。使不如此，則必致夭殁，有害尤甚矣。況患處已壞，雖解不痛，又何憚而不為乎？患者當知之。○若女人患此，又多因扎縛血脈不通，遂成此患，當用其脾胃，行其經絡，生其血氣則愈。

又治法曰：色赤作痛者，元氣虛而濕毒壅盛也。先用隔蒜灸，更用解毒藥，如活命飲、托裏散之屬，仍速用補劑，如十全大補湯、加減八味丸，則毒氣不致上侵，元氣不致虧損，庶可保生。○作渴者宜滋陰降火，色黑者不治。

崔氏方：治手足甲疽，或因修甲傷肉，或因損足成瘡潰爛上脚，用綠礬置鐵板上煅沸，色赤如溶金色者為真，沸定取出研末，以鹽湯洗而摻之。

一男子足指患之，焮痛色赤發熱，隔蒜灸之，更以人參敗毒散去桔梗加金銀花、白芷、大黃，一劑痛止；又用十宣散去桔梗、官桂，加天花粉、金銀花，數劑而痊。○一男子足指患之，色紫不痛，隔蒜灸五十餘壯，尚不知痛，又明灸百壯，始痛，更投仙方活命飲四劑，乃以托裏藥潰脫而愈。○一膏粱之人，先作渴，足熱，後足大指赤痛，六脈洪數而無力，左尺為甚。予謂此足三陰虛，當滋化源為主。彼反服除濕敗毒等劑，元氣益虛，色黯延足。余乃朝用補中益氣湯，夕用補陰八珍湯，各三十餘劑，及桑枝灸，潰而膿清，作渴不止。遂朝以前湯送加減八味丸，夕用十全大補湯，三十餘劑而痊。是時同患此證服

敗毒之藥者俱不救○一膏粱人年踰五十亦患此色紫黑
脚焮痛喜其飲食如故動息自寧爲瘡瘍之善證尚可治遂
以連翹消毒散六劑更以金銀花甘草節瓜蔞二十餘劑患
指潰脫再以當歸川芎連翹生地金銀花白芷二十餘劑而
愈○一箬篷左足指患之一泡麻木色赤大且指黑五日其足
黑冷不知疼痛脉沉細此脾胃受毒所致以飛龍奪命丹一
服翌日令割去足上死肉割後骨始痛而可救遂以十全大
補湯治之而愈蓋死肉乃毒氣盛而拒絕營氣所致況至陰
之下氣血難達經曰風淫末疾即此是也向若攻伐之則元
氣愈虛邪氣愈盛乘虛上侵必致不救 俱薛按

脚發六十八

立齋曰脚發之證屬足三陰精血虧損或足三陽濕熱下注若
色赤腫痛而潰膿者屬濕熱下注爲可治若色微赤微腫而
潰者屬精血虧損爲難治若黑暗不腫痛不潰膿而煩熱作
渴小便淋漓者陰敗火熾也爲不治○治法濕熱下注
者先用隔蒜灸活命飲以解壅毒次服益氣湯六味丸以補
精氣若色黯不痛者着肉灸桑枝灸以行壅滯助陽氣更用
十全大補湯八味丸以壯脾土滋化源多有復生者若專治

其瘡復傷生氣吾未見其生者
閣老靳介菴脚指縫作痒出水腫焮脚面敷止痒之藥不應服
除濕之藥益甚余以爲陰虛濕熱下注用六味地黃丸補中
益氣湯而愈○大參李北溪左足赤腫作痛此足三陽經濕
熱下注先用隔蒜灸與活命飲一劑其痛頓止灸患處出水
赤腫頓消次用托裏消毒散四劑灸患處出膿而愈○一儒
者患此腫硬色白兩月餘矣此足三陰經虧損爲外寒所侵也
用大防風湯及十全大補湯兼服而消後場屋不利飲食勞
倦前證復作盜汗內熱飲食不化便滑肌瘦此脾土虛寒而

命門火不能相生用八味丸益氣湯百餘劑喜其年壯得愈
○一男子脚心發熱作渴引飲或用四物芩連知柏之類腹
痛作嘔煩熱大渴此足三陰虧損前藥復傷脾胃也先用六
君加炮薑數劑而脾胃醒再用補中益氣加茯苓半夏而脾
胃健乃以加減八味丸兼服年餘而愈○一儒者脚心發熱
作痒以滾湯浸之而痒止出水肌肉骨痛作渴此脾腎虛而
水泛爲痰也服益氣湯六味丸年餘元氣復而諸證愈 俱薛按

足跟瘡六十九

立齋曰足跟乃督脉發源之所腎經所過之地若飲食起

居失宜虧損足三陰經則成瘡矣○若漫腫寒熱○體倦少
食屬脾虛下陷也用補中益氣湯○若晡熱作痛頭目不清
屬脾虛陰火也前湯並六味丸○若痰涎上升或口舌生瘡
屬腎水乾涸也前湯並加減八味丸○凡此皆當滋其化源
若治其外則誤矣俗云鬼嚙瘡者謂人被鬼咬腳跟或瘡
久而不斂必氣血沉盡而死若人腳跟患此亦終難愈因名
鬼嚙也

一男子素不慎起居內熱引飲作渴體倦兩足發熱後足跟作
痛或用清熱除濕之劑更加發腫又服敗毒之藥徹亦痛甚

復用清熱敗毒潰裂番張狀如赤榴熱痛如錐內熱晡熱此
足三陰虧損朝用十全大補湯夕用加減八味丸外敷當
歸膏兩月餘而愈其服消毒藥而歿者不能枚舉○太守
陳廉鄉內患發熱皮赤或足跟腫或痛或癢後潰而或
如無皮或如皴裂日晡至夜脹痛焮熱用補中益氣湯加八
味丸料補其肝腎而愈○一男子患足跟瘡腫痛服消毒散
搽追蝕藥虛證悉出形體骨立自分必死余用十全大補湯
兼山藥山茱萸兩月餘而愈○一婦人兩足發熱兩跟作痛
日晡熱甚余以為肝腎血虛用加味逍遙散六味地黃丸五

十餘劑而愈○楊錦衣腳跟生瘡如豆許痛甚狀似傷寒以
還少丹內塞散治之稍可次因納寵作痛反服攻毒藥致血
氣愈弱腿膝痿弱而死蓋足跟乃二蹻發源之處腎經所由
之地若瘡口不合則蹻氣不能發生腎氣由此而泄故為終
身之疾況彼瘡先得於虛復不知戒雖大補氣血猶恐不及
安可服攻毒之藥以殘賊之乎 俱薛按

腎臟風瘡六十八

立齋曰腎臟風屬腎虛風邪乘於臁脛以致皮膚如癬或漸延
上腿久則延及遍身外證則搔癢成瘡膿水淋漓眼目昏花

內證則口燥舌乾腰腿倦怠吐痰發熱盜汗體疲治法用六
味丸為主佐以四生散若脾胃虛弱者用補中益氣湯為主
佐以六味丸四生散為善

欽天薛循齋年六十有一兩臁患之膿水淋漓發熱吐痰四年
矣此腎臟風證也與六味丸四生散而瘥年餘復作延及遍
身日晡益甚痰渴盜汗唇舌生瘡兩目昏赤皆腎經虛火而
水泛為痰也用加減八味丸而愈三年後小便淋瀝莖中澀
痛此思色精不出而內敗也用前丸及補中益氣湯加麥門
五味而愈 薛按

凡腎臟風痒搔破成瘡俗名臁上風也外治之法但以黃丹枯礬生牡蠣共為末搽擦即愈或以蛇床子同白礬煎湯洗之亦可

臁瘡 六十九

立齋曰臁瘡生於兩臁初起赤腫久而腐潰或浸淫搔痒破而膿水淋漓蓋因飲食起居虧損肝腎或因陰火下流外邪相搏而致外臁屬足三陽濕熱可治內臁屬足三陰虛熱難治○若初起惡寒壯熱焮腫作痛者屬濕熱用檳蘇散○若漫腫作痛或不腫不痛者屬陰虛用補陰八珍湯若膿水淋漓體倦食少內熱口乾者屬脾虛用補中益氣湯加茯苓酒炒白芍藥○若午後熱或作痛頭目不清者屬陰火前湯加酒炒黑黃栢及六味地黃丸○若午後發熱至子時方止是血虛而熱也○若[illegible]傷脾有甚者用歸脾湯加柴胡山梔○若怒動肝火內熱者用補中益氣湯加川芎山梔黃芩○若勞役口乾或惡寒發熱或腿下作痛或口舌生瘡屬脾腎虛弱用八味地黃丸加五味之類若患處黯黑腰體畏寒飲食少思屬脾腎虛敗用八味地黃丸若誤用攻伐復損胃氣絕其化源治亦難矣

瀉臍壅少溪兩臁生瘡漸至遍身發熱吐痰口燥咽乾盜汗心煩溺赤足熱日晡益甚形體日瘦此腎經虛火也用六味丸不一月諸證悉退三月元氣平復○陳湖陸懋誠素因陰虛過飲入房發熱腿痛似臁瘡用發表之劑兩腿腫黯熱氣如霧發熱脉洪數兩尺尤大余曰屬足三陰虛濕熱所乘元氣損而邪益甚耳用十全大補加山藥山茱萸附子一劑脉斂頓退再去附子又一劑全愈薛按

天泡瘡 七十

人泡瘡形如水泡皮薄而澤或生頭面或生遍身乃太陰陽明風熱所致故見於皮毛肌肉之間宜清血涼血熱解則愈如挾表邪而發熱脉數者宜荊防敗毒散如火盛者或加芩連連翹金銀花玄參之屬如[illegible]便結者此表裏俱實也宜防風通聖散雙解之○凡用冬瓜水以金黃散敷之無有不愈

赤白遊風 七十一

立齋曰赤白遊風屬脾肺氣虛腠理不密風熱相搏或寒閉腠理內熱拂鬱或因虛火內動外邪所乘或肝火血熱風熱所致治法若風熱用小柴胡湯加防風連翹○血熱用四物湯

加柴胡山梔丹皮〇風熱相搏用荊防敗毒散〇內熱外寒用加味羌活湯〇胃氣虛弱用補中益氣湯加羌活防風及消風散〇血虛用加味逍遙散〇陰虛逍遙散六味丸〇肝腎虛熱用六味丸則火自息風自定痒自止若用祛風辛熱之劑則肝血愈燥風火愈熾元氣愈虛腠理不閉風客內淫腎氣受傷相火翕合血燥火耗反為難治矣

一男子秋間發疙瘩此元氣虛而外邪所侵也先用九味羌活湯二劑又用補中益氣加羌防而愈後不慎起居盜汗晡熱口乾唾痰體倦懶言用補中益氣湯加減八味丸而愈〇一婦人身如丹毒搔破膿水淋漓熱渴頭暈日晡益甚用加味逍遙散而愈〇一女子赤暈如霞作痒發熱用加味小柴胡湯加生地連翹丹皮而愈 俱薛按

翻花瘡七十二

立齋曰翻花瘡者由瘡瘍潰後肝火血燥生風所致或瘡口胬肉突出如菌大小不同或出如蛇頭長短不一治法當滋肝補氣外用藜蘆膏胬肉自入須候元氣漸復膿毒將盡塗之有效不然雖入而復潰若誤用刀針蝕藥灸火其勢益甚或出血不止必致寒熱嘔吐等證須大補脾胃為善

判官張承恩內股患瘡將愈翻出一肉如菌余曰此屬肝經風熱血燥當清肝熱養肝血彼謂不然乃內用降火外用追蝕蝕而復翻翻而復蝕其肉益大元氣益虛始信余言遂內用梔子清肝散外用藜蘆膏而痊〇一上舍素膏粱善怒耳下結一核潰而瘡口翻張如菌焮連頭面或胸脅作脹或內熱寒熱或用清熱消毒之藥年餘未瘥余用補中益氣湯六味地黃丸而尋愈〇一男子背瘡斂如豆許翻出肉寸餘用消蝕割繫法屢去屢大此肝經血虛風熱余用加味逍遙散三十餘劑涂藜蘆膏而消又用八珍湯倍用參芪歸朮而斂〇一婦人素善怒臂患瘡口出肉長二寸許此肝脾鬱怒氣血虛而風內動也用加味逍遙散涂藜蘆膏而愈後因怒患處脹悶遍身汗出如雨此肝經風熱風能散氣故耳仍用前散并八珍湯而愈 俱薛按

瘡漏七十 附臁瘡、血疳

丹溪云漏瘡須先服補藥以生氣血卽參芪歸朮芎大劑為主外以附子為末唾津和為餅如三錢厚安瘡上以艾炷灸之漏大艾炷亦大漏小艾炷亦小但灸令微熱不可令痛乾則易之如困則止來日如前再灸直至肉平為效亦有用附

片灸之以補氣血藥作膏貼之
立齋曰痔屬肝脾腎三經凡陰精虧損者難治多成漏證若肺與大腸二經風熱濕熱者熱退自愈若不守禁忌者亦成漏證此因醉飽入房筋脉橫解精氣脫泄熱毒乘虛流注或淫極強固其精以致木乘火勢而侮金或炙爆厚味過多或勞傷元氣陰虛火熾皆成斯疾○若破而不愈即成漏矣有串臀者有串陰者有串腸者有穢從瘡口而出者形雖不同治頗相似○其腸頭腫成塊者濕熱也作痛者風熱也大便燥結者火也潰而爲膿者熱勝血也當各推其所因而治之

治法曰凡初起焮痛便秘小便不利者宜清熱涼血潤燥疏風○若氣血虛而爲寒涼傷損者宜調養脾胃滋補陰精○大便秘澀或作痛者潤燥除濕○肛門墜痛者瀉火導濕○下墜腫痛而痒者袪風勝濕○小便澀滯腫痛者清肝導濕○其成漏者養元氣補陰精爲主○大凡痔漏下血服涼血藥不應者必因中氣虛不能攝血非補中升陽之藥不能愈切忌寒涼之劑○亦有傷濕熱之食成腸澼而下膿血者宜苦寒之劑內疏之○脉弦絕澀者難治滑大柔和者易治○經云因而飽食筋脉橫解腸澼爲痔其屬肝脾腎也明矣若有患痔而兼疝患疝而兼下疳皆屬肝腎不足之變證但用地黃丸益氣湯以滋化源爲善若專服寒涼治火者無不致禍

一男子患痔成漏每登廁則痛以秦艽防風湯加條芩枳殼四劑而愈以四物加升麻芩連荊防不復作○一男子患痔漏每登廁則肛門下脫作痛良久方收以秦艽防風湯數劑少愈乃去大黃加黃芪川芎芍藥而痛止更以補中益氣湯二十餘劑後再不脫○一儒者膿血淋漓口乾作渴晡熱便血自汗盜汗余謂此肝腎陰虛也不信仍服四物芩連知栢之

類食少嘔噁余先用補中益氣湯加茯苓半夏炮薑與胃漸醒後用六味丸朝夕服兩月餘諸證悉愈○一男子患此服寒涼之劑侵晨去後不實食少體倦口乾作渴小腹重墜余用補中益氣湯而下墜頓止用四神丸而食進便實用地黃丸而瘡尋愈俱薛按

一男子臟毒下血服涼藥敗毒藥不惟不能止且飲食日減腹體愈倦脉數而澀先以補中益氣湯數劑少止更以六君子湯加升麻炮薑四劑而止乃去炮薑加芎歸月餘脾胃亦愈嘗治積熱成風下血者先以敗毒散散之胃寒氣弱者用四

君子湯或參苓白朮散補之並效　一男子臟毒下血脾氣素弱用六君子湯加芎歸枳殼地榆槐花治之而愈後因謀事血復下諸藥不應余意思慮傷脾所致遂投以歸脾湯四劑而痊大抵此證所致之由不一當究其因而治之丹溪云芎歸湯一劑乃調血之上品熱加茯苓槐花冷加白茯苓木香此則自根自本之論也雖然血氣出於穀氣故大腸下血以胃藥收功宜四君子湯或參苓白朮散以枳殼散小烏沈湯和之胃氣一回血自循經絡矣○凡腸風者邪氣外入隨感隨見臟毒者蘊積毒久而始見○又云人惟坐臥風濕

醉飽房勞生冷停寒酒麵積熱以致營血失道滲入大腸此腸風臟毒之所由作也挾熱下血者清而色鮮挾冷下血者濁而色黯清則為腸風濁則為臟毒先便而後血者其來遠先血而後便者其來近治法大要先當解散脾胃風邪熱則敗毒散冷則不換金正氣散加川芎當歸後隨其冷熱治之

一婦人素患痔漏每因熱則下血數滴以四物湯加黃連治之即愈後為大勞瘡發腫痛經水不止脈洪大無力此勞傷血氣火動而然也用八珍湯加黃連蒲黃一劑而止後去蒲黃黃連加地骨皮數劑而安丹溪曰婦人崩中者由臟腑傷損衝任二脈血氣俱虛故也若勞動過極臟腑俱傷以致衝任氣虛不能約制經血故忽然而下謂之崩中暴下治宜大補氣血之藥舉養脾胃微加鎮墜心火之劑以治其心補陰瀉陽經自正矣　俱薛按

一論外通用方

枯痔水澄膏 外二百十　如神千金方 外二三二

三品錠子 外二二四　羊膽膏 外二二五

熊膽膏 外二二七　水銀棗子膏 外二二六

蝸牛膏 外二二八

一方　凡痔瘡初起痛癢不止以舊布鞋底炙熱頻頻熨之冷則再烘再熨之其痛癢則止

一灸法

命門灸七壯治五種痔瘡○長強灸隨年壯治五痔便血最效

一法　治痔疾大如胡瓜貫於腸頭發則疼痛僵仆先以荊芥湯洗之次以艾灸其上三五壯若覺一道熱氣貫入腸中必大瀉鮮血穢血一時許覺痛甚後其疾乃愈

跌打損傷第十四

凡跌打損傷或從高墜下惡血流於內不分何經之傷皆肝之所主蓋肝主血也故凡敗血凝滯從其所屬而必歸於肝多在脇肋小腹者皆肝經之道也若其壅腫痛甚或發熱自汗皆當斟其虛實而以調血行經之藥治之

一脉法如內經曰肝脉搏堅而長色不青當病墜若搏因血在脇下令人喘逆○金匱云寸口脉浮微而濇然當亡血若汗出設不汗出者當身有瘡被刀斧所傷亡血故也○脉經云金瘡出血太多其脉虛細沉小者生浮數實大者死○砍刺出血不止其脉來大者七日死滑細者生○從高顛仆內有

瘀血腹脹脉堅强者生小弱者死○破傷有瘀血在內者脉堅强實則生虛小弱則死○若血亡過多者脉細小則生浮大數實則死皆為脉病不相應故也

一治法凡胸滿脇脹者宜行血○老弱者宜行血活血○腹痛者宜下血○瘀肉不潰或潰而不斂宜大補氣血○若打撲墜墮稍重別無瘀血等證而疼痛不止者惟和氣血調經脉其痛自止更以養氣血健脾胃則無有不效○亦有痛傷胃氣作嘔或不飲食者以四君子湯加當歸砂仁之類調之○若有瘀血不先消散而加補劑則成實實之禍設無瘀血而

妄行攻利則致虛虛之禍故凡治此證須察所患輕重有無瘀血及元氣虛實不可槩行攻下致成敗證蓋打撲墜墮皮肉不破肚腹作痛者必有瘀血在內宜以復元活血湯攻之老弱者四物湯加紅花桃仁川山甲補而行之○若血去多而煩躁此血虛也名曰亡血宜補其血如不應當以獨參湯補之○一凡損傷不問老弱及有無瘀血停積俱宜服熱童便以酒佐之推陳致新其功甚大若脇脹或作痛或發熱煩躁口乾喜冷惟飲熱童便一甌勝服他藥他藥雖亦可取效但有無瘀血恐不能盡識反致誤人惟童便不動臟腑不傷氣

血萬無一失嘗詢之諸營操軍嘗有墜馬傷者何以愈之俱對曰惟服熱童便即愈此其屢試之驗亦明矣然惟胃虛作嘔及中寒泄瀉者不可服○大凡脇痛或傷損者以葱搗爛炒熱罨之或用生薑葱白同搗爛和麪炒熱罨之尤妙或用生薑陳酒糟同搗爛炒熱罨之亦可○外治損傷諸方如秘傳正骨丹沒藥降聖丹當歸導滯散黑丸子本事接骨方十味沒藥丸洗損傷等十餘方俱有效用所當詳察

立齋曰予於壬申年被重車碾傷悶瞀良久復甦胸滿如築氣息不通隨飲熱童便一甌胸寬氣利惟小腹作痛吾鄉銀臺

徐東臯先生與復元活血湯一劑使血散外腫痛悉退更服養血氣藥而痊○戊辰年公事居庸見覆車被傷者七八人仆地呻吟一人未蘇予俱令以熱童便灌之皆得無事

杖瘡 七十五

杖瘡一證凡其甚者必以瘀血為患血瘀在外者淺則砭之深則刺之內潰者開之腐肉者取之血瘀在內者宜以活血流氣之藥和之甚者利之行之此治血瘀之法也然其受刑之時號叫則傷氣忿恚則傷肝悲憤則傷志血氣情志俱傷虛所必至若不培之則元氣困甚矣況脾主肌肉脾氣受傷則

飲食必減血脈損壞則肌肉俱病故凡既傷之後但察其虛多滯少者則宜以參芪歸朮熟地甘草之屬專理脾氣以托氣血壯健則元氣日復肌肉自生可保無虞矣其有傷筋骨而作痛者宜没藥降聖丹治之若牙關緊急或腰背反張者以玉真散治之而後調之此證宜先察其有瘀無瘀及形氣虛實而治之凡有瘀滯未盡者宜與前跌打損傷條互參通閱○附杖瘡用方見外科方中

又刑部用獨伏　陶誠衍延受杖瘀血已散壞肉不潰用托裏之藥稍潰而膿清此氣血虛也非大補參芪不能愈又若亦

善醫以為恐服補子強之而飲食稍思速加大補劑飲食日進肉潰膿稠而愈○又治江翰林諸公與文同事者九人皆先散其瘀血漸用排膿托裏之藥俱愈○[illegible]風北京人因杖瘡將愈通潰膿水未出瞞發昏憒此膿毒內作而然也急與開之昏憒愈甚此虛也以八珍湯一服少可數服而肉自腐頭取之令用豬蹄湯洗淨以神效當歸膏塗貼再以十全大補湯兩月而愈若更投破肉之劑則危矣

破傷風 七十六

刑杖以破傷風者有因杖或傷損風襲之入於經絡致使寒

熱更作身體反張口噤不開甚者邪氣入臟○有因諸瘡不瘥營衛俱虛肌肉不生瘡眼不合邪亦能外入於瘡為破傷風之候○有諸瘡不瘥舉世皆言著灸為上是為熱瘡而不知火熱客毒逐經諸變不可勝數微則發熱甚則生風而搐或角弓反張口噤目斜○亦有破傷不灸而病此者因瘡着白痂瘡口閉塞氣難通泄故陽熱易為鬱結熱甚則生風也

徐用誠曰此論所因有四一者因瘡口入風似屬外因一者因灸生熱似屬不內外因一者因瘡口閉塞內熱生風似屬內因也○又云破傷風證古方藥論甚少豈非以此疾與中風

同論故不另立條目也惟河間論與傷寒表裏中三法同治其為病因有因外傷於風者有因灸者有因內熱所作者然與中風相似也但中風之人尚可淹延歲月而破傷風者犯之多至不救蓋中風有在經在府在藏之異獨入藏者最難治破傷風或始而出血過多或瘡早閉合瘀血停滯俱是陰虛受病乃五藏之所主故此風所傷始雖在表卽隨必傳入藏故多死也此病或因瘡口坦露或因瘡口閉塞皆能致之若病已十分安全而忽有此大抵皆由內氣虛而有鬱熱者乃得之若內氣壯實而無鬱熱者雖害而無所害也

立齋曰大法破傷中風風熱燥甚怫鬱在表而裏氣尚平者必善伸數欠筋脈拘急時或惡寒或筋惕而搐脈浮數而弦皆表證也宜以辛熱治風之藥開散結滯是與傷寒表熱怫鬱而以升麻湯辛熱發散者同也然凡用辛熱開其風熱結滯者宜以寒藥佐之則免其藥雖中病而風熱轉甚也如治傷寒發熱用麻黃桂枝而加黃芩知母石膏之類是也若近世以甘草滑石葱豉寒藥發散甚妙○若表病不已漸傷入裏裏又未太甚而脈在肌肉者宜以退風熱開結滯之寒藥調之或微加治風辛熱亦得猶傷寒在半表半裏而以小柴胡和解之意也○若裏熱已甚而舌強口噤項背反張驚搐惕搦涎唾稠粘胸腹滿塞或便溺閉結或時汗出脈洪數而弦然出汗者由風熱甚於裏而表邪已罷腠理疏泄心火內盛故汗出也法宜除風散結以寒藥下之後用退風熱開鬱滯之寒藥調之熱退結散則風自愈矣○凡治此者亦宜用按摩導引之法及以藥斡開牙關勿令口噤使粥藥得下也

一婦人臂癰將愈忽患破傷風發熱搐搦脈浮數予以當歸地黃湯治之彼不信乃服發散敗毒藥果甚始信而服之數劑而痊○一男子背瘡未癒欲以膏藥剪孔貼之患破傷風證而殁此先失於內補外邪襲其虛耳余見此證貼膏藥剪孔欲其通氣而反患破傷風搽斂藥生肌欲其收口而反助餘毒以致殁者多矣可不慎哉 薛按

破傷風通用方

豨薟酒 外二五六　防風湯 外二五六
蜈蚣散 外二六四　大芎黃湯 外二六一
羌活湯 外二五九　白朮防風湯 外二五八
玉真散 外二六二　敷藥 外二五五
養血當歸地黃湯 外二六三

類破傷風 七十七

立齋曰大凡癰疽潰後筋糜肉爛膿血大泄陽隨陰散或筋脉拘急惡寒搐搦甚者舌強口噤項背反張痰涎壅盛便閉汗出不時發熱此氣血俱虛而變見若此雖與破傷風相類而主治之法但當大補血氣若果有風證亦須以大補氣血為主而兼以治風之藥設若不審是非而妄藥之則誤矣

司徒邊華泉肩患癰而發熱目直或瞤殊頭中熱目瞤動長脉益數此足三陰氣血虧損虛火妄動也用參芪歸术炙甘草加減炒黑黃栢五味麥冬肉桂四劑頓愈又數劑而愈○一儒者患腿癰深蓄於內肉色不變久不穿潰針出膿數五碗許惡證悉臻全類中風此脾胃虛而變證也用六君子湯加當歸炮薑及聖愈湯各四劑而安又勞心不寐用歸脾湯而愈 薛按

斑疹丹毒 七十八

斑疹一證雖已有正門專載然彼以小兒麻痘為言其有非麻痘而無論大人小兒忽患斑疹小瘡者此雖與彼相類而實有小異也是亦不可不辨而治之蓋多由風熱外感之證耳治此之法脉浮而身熱有表證者惟散風邪為主脉浮而數者祛風兼清熱脉沉滑而無表證者清火為主脉浮沉俱滑數而表裏兼見者宜表裏雙解之然惟小兒多有此證須察其表裏虛實酌而治之可也總之小兒脆弱宜安裏之藥多攻發之藥少秘則微利之結則微導之但令邪氣不壅而散之易則諸證輕而兒自安矣大抵身溫煖者順身涼者逆

王海藏曰前人云首尾俱不可下者何也曰首不可下者為斑未見於表下則邪氣不得伸越此脉證有表而無裏故禁首不可下也尾不可下者為斑毒已顯於外內無根蒂大便不秘本無一切裏證下之則斑氣陷逆故禁尾不可下也

潔古曰斑疹之病其爲證各異發焮腫於外者屬少陽三焦相火也謂之斑小紅靨行皮膚之中不出者屬少陰君火也謂之疹凡見斑證若自吐瀉者多吉慎勿亂治謂邪氣上下俱出也若斑疹並出者其邪必甚小兒難勝是以多生別證也然首尾皆不可下

立齋曰凡小兒丹毒遍身俱赤不從砭治以致毒氣入腹則不救蓋此證乃惡毒熱血蘊蓄於命門遇相火而合起也如霞片者須砭去惡血爲善如腫起赤色遊走不定者宜先以生麻油塗患處砭之以洩其毒凡從四肢起入腹者不治雖云

丹有數種治有數法無如砭之爲善常見患稍重者不用砭
法俱不救
一婦人患斑作痒脉浮以消風散四劑而愈○一婦人患斑作
痒脉浮數以人參敗毒散二劑少愈更以消風散四劑而安
○一男子患斑色赤紫焮痛發熱喜冷脉沉實以防風通聖
散一劑頓退又以荆防敗毒散加芩連四劑而愈○一老人
患疹色微亦作痒發熱以人參敗毒散二劑少愈以補中益
氣湯加黄芩山梔而愈○一小兒患疹發熱作痛煩渴欲以
清涼飲下之診其脉不實舉指不數此邪在經絡也不可下

遂以解毒防風湯二劑而愈此證小兒多患之須詳審在表
在裏及邪之微甚而治之○一兒作痒發熱以犀角散一劑
作吐瀉此邪氣上下俱出也毒必自解少頃吐瀉俱止其疹
果消此因從脉見七至此小兒和平之脉也邪已散矣不須
治果愈
男子患丹焮痛便秘脉數而實服防風通聖散不應令砭
患處去惡血仍用前藥而愈○一小兒患丹如霞遊走不
定先以麻油塗患處砭出惡血毒即漸散更以神功托裏散
一劑而安○一小兒患丹毒外勢雖輕内則大便不利此患
在臟也服大連翹飲數劑功散而痊○一小兒遍身皆赤砭
之投解毒藥而愈○嘗治小兒丹毒便秘或煩躁者服五福
化毒丹亦效俱薛按
一白虎丹方治在外科方二九二

瘤贅七十九

立齋曰内經云肝主筋而藏血心裹血而主脉脾統血而主肉
肺司腠理而主氣腎統骨而主水○若怒動肝火血涸而筋
攣者自筋腫起按之如筋久而或有赤縷名曰筋瘤若勞役
火動陰血沸騰外邪所搏而爲腫者自肌肉腫起久而有赤

縷或皮俱赤者名曰血瘤若鬱結傷脾肌肉消薄外邪所搏
而爲腫者自肌肉腫起按之實軟名曰肉瘤若勞傷肺氣腠
理不密外邪所搏而壅腫者自皮膚腫起按之浮軟名曰氣
瘤若勞傷腎水不能榮骨而爲腫者自骨腫起按之堅硬名
曰骨瘤夫瘤者留也隨氣凝滯皆因臟腑受傷氣血乖違當
求其屬而治其本○大凡屬肝膽二經結核宜八珍加山梔
膽草以養氣血清肝火六味丸以養肺金生腎水○若屬肝
火血燥須生血涼血用四物二地丹皮酒炒黑膽草山梔○
若中氣虛者補中益氣湯兼服之○若治失其法脾胃虧損

營氣虛弱不能濡於患處或寒氣凝於瘡口營氣不能滋養於患處以致久不生肌而成漏者悉宜調補脾氣則氣血壯而肌肉自生矣若不慎飲食起居及七情六淫或用寒涼蝕藥蛛絲纏芫花線等法以治其外則誤矣

按瘤贅一證如前薛論已盡其畧然此五瘤之外又惟粉瘤為最多蓋此以腠理津沫偶有所滯聚而不散則漸以成矣是亦粉刺之屬但有淺深耳深者在皮裏則漸大成瘤也余嘗聞之先輩曰瘤贅既大最畏其破非成膿者必不可開開則牽連諸經漏竭血氣最難收拾無一可活及余考薛按所載

數人凡其潰破者皆危不治誠信然也不可不知○茲紀予於二旬之外忽於臀下肛門前骨際皮裡生一小粒初如菜子許不以為意及半年後如豆矣又一年而如鴿子復如栗矣此因乘馬坐處皆有所礙而漸至痛矣然料此非敷藥可及又非煎藥可及使其日漸長大則如升如斗懸掛腿股間行動不便豈成廢物乎乃發狠謀之識者皆曰不可割割恐為瘻不小予執意數月久攻愈動然竊計此時乘小不取則日後愈大愈難矣將奈之何嘗見人臀股間受箭傷者未必即死此之利害不過如是遂決意去之一日飲酒微醺乘醉以柳葉針刺之所出者皆如豆腐白皮之屬蓋即粉瘤也刺後頓消予甚快然及兩日後則腫如熱瘡予以簪通其口一日膿潰而愈予又快然不兩日又腫起更甚更大予則大懼大悔自謂瘤贅誠不可刺也然而無奈復以簪通貼之又二日而大潰則潰出一囊如魚胞者然後收口全愈今愈後數十年此間仍有一小窩誠險證也向非予之勇決則此後不知作何狀使開之再遲則其有不可收拾矣是以瘤不早治則不知所終此亦可為治瘤者之鑒新按

一刺灸法向一人於眼皮下斑生一小瘤初如米粒漸大如豆

其人疑畏求治於外科彼用攢針三四枚翻轉眼皮刺其內膜少少出血如此二三次其瘤日縮竟得盡消○又一人於手臂上生一瘤漸大如龍眼其人用小艾於瘤上灸七壯竟爾漸消不長亦善法也或用隔蒜灸之亦無不可○凡於不便處有生此物者皆以此二法酌宜用之大都筋瘤宜灸血瘤宜刺或有以線結之而根小如蒂之類敢而治者亦可暫消若欲拔根無如前法

蛛絲纏法可治瘤贅未甚大者其法最妙予嘗見一人於腹上生一瘤其大如胡桃一治者取蛛絲撚成粗線繫扎其根

數日其絲漸緊瘤根漸細屢易屢細不十日竟爾脫落誠奇法也可見諸線日鬆惟蛛絲日緊物理之妙有當格致者如此然亦纔治宜早若形勞既大恐不宜也

薛氏按曰一男子左腿外側近臀腫一塊上有赤縷三年矣飲食起居如常觸破湧出膿血發熱惡寒此膽經受證故發於腿外側診其脉左尺洪數左關弦洪此腎水不能生肝木用補中益氣湯六味地黃丸而痊〇一男子小腹患之膿水淋漓此足三陰之證用補中益氣加麥門五味以培脾土用六味地黃丸以生腎水更用蘆薈丸以清肝火而斂〇一老儒

臂間患之三年其狀如紫桃下墜盡日按之如水囊此肝脾之證膿瘀內潰而然耳遂刺出血膿目即開以炒黑蘆薈山梔芎歸芍藥柴胡白朮茯苓等藥而愈

疣八十

立齋曰疣屬肝膽經風熱血燥或怒動肝火或肝客淫氣所致蓋肝熱水涸腎氣不榮故精亡而筋攣也宜以地黃丸滋腎水以生肝血為善若用蛛絲纏螳螂蝕着艾灸必致多誤大抵此證與血燥結核相同故外用腐蝕等法內服燥血消毒則精血愈虛肝筋受傷瘡口翻突開張卒成敗證

府庠朱宏仁年二十右手背近中指患五疣中一大者如黃豆餘皆如聚黍拔之如絲長三四寸許此血燥筋縮也用清肝益榮湯五十餘劑而愈〇府庠沈姬文幼嚙指甲及長不能自禁余曰此肝火血燥也又頸側常生小疣子屢散屢發又倩生一塊如綠豆大若觸碎則如斷束縷扯之則長縱之則縮後兩鬢發白點求治余曰子素肝病此部亦屬肝膽經也夫爪[illegible]肝之[illegible]膽行人身之側正與嚙爪生疣等證相應須滋補腎水以生肝膽則諸病自愈矣乃與六味地黃丸服之二年白點自退疣亦不生〇一男子小腹中一塊不時攻痛

或用行氣化痰等藥不應或以為血鬱服行氣逐血之劑後手背結一痳子漸長寸許形如蒜狀肢體間如豆大者甚多彼疑鬱生子今發於外亦用行血虛證悉至左尺洪數關脉洪數而弦余以為腎水不能生肝木以致肝火血燥而筋攣用六味地黃丸生腎水滋肝血三月餘諸證悉愈〇一婦人左手背並次指患五六枚如熟椹內熱晡熱月經素不及期余曰此因肝脾血虛而有熱也當調補二經使陰血生而諸證自愈不信乃用艾灸手即腫脹發熱手指皆攣兩脇項及胸乳間皆患疣經行無期余用加味逍遙散少加炒黑黃連

數劑漸愈乃去黃連更佐以歸脾湯各患漸愈又百餘劑經
行如期再用地黄丸三料而痊 俱錄按

淪列方 外科下

四物湯 補八
八珍湯 補十九
一陰煎 新補八
四順散 外一五四
八正散 寒百十五
五積散 散三九
五苓散 和一八二
四生散 外一八七
二氣飲 新熱十七
十宣散 痘十四
四七湯 和一七
五寶丹 外二百五

六味丸 補一
四神丸 熱一五二
二神丸 熱一五一
八味丸 補一二二
理中湯 熱一
歸脾湯 補三二
生脈散 補五七
大營煎 新補十四
還少丹 補一二七
右歸丸 新補五
芎歸湯 婦五
坎離丸 寒一六五
内消散 外一一二
保陰煎 新寒一
聖愈湯 補九一
托裏黃芪湯 外八
玉露散 婦八九
托裏散 外

排膿散 外一六二 又一六二
寧肺散 因六
寧肺湯 補十三
連翹湯 外五十
桔梗湯 外一五一
犀角散 痘六三
射干湯 外一六八
消風散 散四七
消毒湯 外九五
化毒丹 外七十
消蘇散 外一八八
搜風湯 外
涼膈散 攻十九
回生丹 外七九
通關散 因七八
奪命丹 外七七
通氣散 外八十
大黃湯 外一六七

必效散 外一七一
枳殼散 寒百一
承氣湯 攻一
清涼飲 外九十
會膿散 外二百七
桃仁湯 外九四
槐花蕊 寒四十
牡礪散 外一百八
英蘭湯 外一百一
槐花酒 外百四
苦參丸 外八七
滋腎丸 寒一六三
導水丸 攻七一
蠟礬丸 外七四
當歸丸 外百
黑丸子 外一七
茯苓膏 外二百四
四君子湯 補一

六君子湯 補五　仙遺粮湯 外九八
小柴胡湯 散十九　小青龍湯 散八
大防風湯 補九九　小烏沉湯 和二一八
大秦艽湯 和四五　大蘆薈丸 小百廿五
牡丹皮湯 外一六七　牡丹皮散 外一六五
瓜子仁湯 外一六四　薏苡仁湯 外一六四
紫苑茸湯 外一五六　梔子仁湯 寒十九 外二八
五加皮飲 外二百　製甘草湯 外六八
金銀花散 外四　仙方活命飲 外一
人參敗毒散 散三六　神功托裏散 外四
補中益氣湯 補三一　十全大補湯 補二十
荊防敗毒散 痘三一　參芪補肺湯 外三十
內補黃芪湯 外九　參苓白朮散 補五五
參朮補脾湯 外九　人參養營湯 補二一
人參平肺散 寒七　參芪內托散 痘七
九味異功煎 新因　加味歸脾湯 補三四
當歸補血湯 補四五　加味四物湯 補九
加味地黃丸 外九　當歸川芎湯 外四十

加味逍遙散 補九四　附子八物湯 外三六
加減八味丸 外三八　益氣養營湯 外三一
托裏當歸湯 外十　托裏消毒散 外二
內托羌活湯 外二二　補陰八珍湯 外二二
加味羌活湯 外四三　九味羌活湯 散四四
清肝益營湯 外八三　復元活血湯 外二百四十
當歸拈痛湯 寒百二十　芍藥蒺藜煎 新因二五
龍膽瀉肝湯 寒六二　加味龍膽瀉肝湯 寒六四
黃連解毒湯 寒一　普濟消毒飲 寒十三
升麻黃連湯 外四九　連翹歸尾煎 新因三一
連翹消毒散 外六一　蠲痺消毒散 外二百二
梔子清肝湯 寒六十　芩連消毒飲 寒十四
五香連翹湯 外五一　換肌消毒散 外二百二
柴胡清肝散 寒五九　清心蓮子飲 寒三二
黃連消毒散 外六十　葛根牛蒡湯 外四五
白芷胃風湯 外四四　內疎黃連湯 外九二
犀角地黃湯 外四　犀角升麻湯 外四七
解毒防風湯 外六三　秦艽防風湯 外二二一

神效瓜蔞散 外一八一　獨活寄生湯 和二百七十
防風通聖散 攻十六　當歸導滯散 外二三九
五利大黃湯 外八九　五福化毒丹 外七六
飛龍奪命丹 外七六　方脉流氣飲 外五四
牛黃雙解散 外二百九　遇仙無比丸 外一七五
疏肝流氣飲 外五五　加減小續命湯 散五二
青州白丸子 和百十一　沒藥降聖丹 外二三四
不換金正氣散 和一一　十味沒藥丸 外二三五
本事接骨方 外二三二　葶藶大棗瀉肺湯 和百四十

秘傳正骨丹 外二三二　楊梅瘡漏方 外二百六
雄黃解毒散 外一二四　廣瘡點藥 新因四二
洗損傷方 外一四九　杖瘡四方 外二五三
附子餅 外百六　豆豉餅 外百十七
木香餅 外百十八　桑枝灸 外百二十
猪蹄湯 外一二九　騎竹馬法 外百十四
百草煎 新因二七　葱熨法 外一二二
鍼頭散 外一四四　降癰散 新因二六
神功散 外一二四　金黃散 外一九五

如神散 外一七四　螵蛸散 新因三八
冲和膏 外一二八　太乙膏 外二百八
當歸膏 外一一四　火龍膏 外三百二十
琥珀膏 外一一七　神異膏 外三百十
會通膏 外三百九　烏金膏 外一四二
鯽魚膏 外一四八　芫花線 外一一九
秘傳木鱉膏 新因五七

景岳全書四十七卷終

景岳全書本草正目錄上大集

卷四十八

山草部

人參一　黃芪二　白朮三　蒼朮四
甘草五　黃精六　肉蓯蓉七　丹參八
遠志九　巴戟天十　仙茅十一　天麻十二
沙參十三　玄參十四　茅根十五　淫羊藿十六
苦參十七　貝母十八　土貝母十九　山慈菇二十
柴胡二一　桔梗二二　防風二三　細辛二四

羌活二五　獨活二六　升麻二七　前胡二八
延胡索二九　紫草三十　白芨三一　三七三二
白鮮皮三三　秦艽三四　地榆三五　黃芩三六
黃連三七　胡黃連三八　知母三九　龍膽草四十

隰草部

地黃四一　牛膝四二　麥門冬四三　續斷四四
蜀葵子四五　車前子四六　白蒺藜四七　紅花四八
紫菀四九　甘菊花五十　野菊花五一　豨薟五二
益母草五三　瞿麥五四　茵陳五五　青蒿五六
款冬花五七　麻黃五八　萱草五九　連翹六十
旋覆花六一　鼠粘子六二　決明六三　葶藶六四
夏枯草六五　蒼耳子六六　漏蘆六七　劉寄奴六八
萹蓄六九　青箱子七十　艾七一　佛耳草七二
藍靛七三 附青黛　木賊七四　王不留行七五　海金沙七六
燈心草七七　烟又七七

芳草部

當歸七八　川芎七九　芍藥八十　丹皮八一
白荳蔻八二　肉荳蔻八三　草菓八四　破故紙八五

木香八六　藿香八七　香附八八　砂仁八九
紫蘇九十　薄荷九一　荊芥九二　白芷九三
香薷九四　益智九五　鬱金九六　薑黃九七
茴香九八　藁本九九　蓽茇一百　良薑百一
三稜百二　莪朮百三　蛇床子百四

蔓草部

天門冬百五　兔絲子百六　五味子百七　何首烏百八
瓜蔞仁百九　天花粉百十　金銀花百十一　葛根百十二
茜草百十三　土茯苓百十四　使君子百十五　牽牛百十六

防巳百十七　萆薢百十八　釣藤百十九　山豆根百二十
威靈仙一二一　馬兜鈴一二二　青木香一二三　白薇一二四
木通一二五

毒草部

附子一二六　白附子一二七　大黃一二八　常山一二九
半夏百三十　南星一三一　胆星一三二　射干一三三
大戟一三四　甘遂一三五　芫花一三六　玉簪一三七
羊躑躅花一三八　蓖麻子一三九　續隨子百四十　木鼈子百四十

卷四十九

水石草部

石斛一四一　菖蒲一四二　蒲黃一四三　浮萍一四四
海藻一四五　骨碎補一四六

竹木部

竹瀝一四七　淡竹葉一四八　淡竹茹一四九　天竺黃百五十
官桂一五一　丁香一五二　白檀香一五三　沉香一五四
烏藥一五五　枸杞一五六　地骨皮一五七　厚朴一五八
棗仁一五九　杜仲百六十　山茱萸一六一　蘇木一六二
川椒一六三　胡椒一六四　金櫻子一六五　槐蕊一六六

栢子仁一六七　枳殼一六八　枳實一六九　蔓荊子百七十
五加皮一七一　川楝子一七二　女貞子一七三　桑白皮一七四
黃蘗一七五　梔子一七六　郁李仁一七七　訶子一七八
側柏一七九　辛夷百八十　皂角一八一　巴豆一八二
密蒙花一八三　雷丸一八四　大楓子一八五　蕪荑一八六
茯苓一八七　茯神一八八　猪苓一八九　桑寄生百九十
琥珀一九一　松香一九二　乳香一九三　沒藥一九四
阿魏一九五　樟腦一九六　龍腦一九七　血竭一九八
蘆薈一九九　乾漆二百　蘇合油二百一　孩兒茶二百二

穀部

麥芽二百三　神麯二百四　白扁豆二百五　薏仁二百六
綠豆二百七　粟殼二百八　麻仁二百九

果部

芡實二百十　杏仁二一一　桃仁二一二　木瓜二一三
陳皮二一四　青皮二一五　檳榔二一六　烏梅二一七
山查二一八　甜瓜蒂二一九　大腹皮二百二十　吳茱萸二二一

菜部

山藥二二二　乾薑二二三　大茴香二二四　小茴香二二五

白芥子二一六　蔓荊子二一七　葱二一八　蒜二一九
韭菜二百二十　韭子二二一　百合二二二　蒲公英二二三

金石部
金箔二三四　水銀二三五　輕粉二三六　銅青二三七
朱砂二三八　銀朱二三九　靈砂二百四十　硫黄二四一
雄黄二四二　自然銅二四三　黄丹二四四　白礬二四五
石脂二四六　爐甘石二四七　蓬砂二四八　水粉二四九
密陀僧二百五十　石膏二五一　滑石二五二　青礞石二五三
朴硝二五四　玄明粉二五五　海石二五六　花蕊石二五七

代赭石二五八　硇砂二五九　青鹽二百六十　石灰二六一

禽獸部
雞血二六二　鴨血二六三　虎骨二六四　象牙二六五
鹿角膠二六六　鹿茸二六七　犀角二六八　羚羊角二六九
牛黄二百七十　阿膠二七一　熊膽二七二　麝香二七三

蟲魚部
龍骨二七四　海螵蛸二七五　牡蠣二七六　穿山甲二七七
青魚膽二七八　白花蛇二七九　真珠二百八十　龜板二八一
殭蠶二八二　蜈蚣二八三　水蛭二八四　鱉甲二八五
蚯蚓二八六　蟬脫二八七　斑蝥二八八　蜂房二八九
五靈脂二百九十　全蝎二九一　文蛤二九二　百藥煎二九三
蝸牛二九四　蜒蚰二九五　桑螵蛸二九六

人部
童便二九七　紫河車二九八　血餘二九九　人中白三百

全書本草正目錄終

會稽　張介賓　會卿著
瀛海　賈　棠　青南訂

山草部

人參　一　反藜蘆

味甘微苦微溫氣味頗厚陽中微陰氣虛血虛俱能補陽氣虛竭者此能回之於無何有之鄉陰血崩潰者此能障之於已決裂之後惟其氣壯而不辛所以能固氣惟其味甘而純正所以能補血故凡虛而發熱虛而自汗虛而眩運虛而困倦虛而驚懼虛而短氣虛而遺泄虛而瀉利虛而頭疼虛而腹痛虛而飲食不運虛而痰涎壅滯虛而嗽血吐血虛而淋瀝便閉虛而嘔逆躁煩虛而下血失氣等證是皆必不可缺者第欲以氣血相較則人參氣味頗輕而屬陽者多所以得氣分者六得血分者四總之不失為氣分之藥而血分之所不可缺者為未有氣不至而血能自至者也故扁鵲曰損其肺者益其氣須用人參以益之肺氣既王餘臟之氣皆王矣所以人參之性多主於氣而凡臟腑之有氣者皆能補之然

其性溫故積溫亦能成熱若云人參不熱則可云人參之性涼恐未必然雖東垣云人參黃芪為退火之聖藥丹溪云虛火可補參朮之類是也此亦皆言虛火也而虛火二字最有關係若內真寒而外假熱者是為真正虛火非放膽用之必不可也然有一等元陰虧乏而邪火燥於表裏神魂躁動內外枯熱真正陰虛一證誰謂其非虛火若過用人參果能助熱若王節齋云陽旺則陰愈消及節要云陰虛火動者勿用又曰肺熱還傷肺等說固有此理亦不可謂其盡非而近之明哲如李月池輩皆極不然之恐亦未必然也夫虛火二字最當分其實中有虛虛中有實陽中有陰陰中有陽惟勿以成心而執己見斯可矣如必欲彼此是非是所謂面東者不見西牆皆未得其中也予請剖之曰如龍雷之火原屬虛火得水則燔得日則散是即假熱之火故補陽即消矣至若亢旱炎赤地千里得非陽亢炎盛而亦可以補陽生陰乎或必曰此正實火也得寒則已予曰不然夫炎暑酷烈熱令大行此為實火非寒莫解而乾枯燥旱泉源斷流是謂陰虛非水莫濟此實火之與陰虛亦自判然可別是以陰虛而火不盛者自當用參為君若陰虛而火稍盛者但可用參為佐若

陰虛而火大盛者則誠有暫忌人參而惟用純甘壯水之劑庶可收功一證不可不知也予非不善用人參者亦非畏用而不知人參之能補陰者蓋以天下之理原有對待謂之曰陰虛必當忌參固不可謂之曰陰虛必當用參亦不可要亦得其中和用其當而已矣觀者詳之

黃芪 二

味甘氣平氣味俱輕升多降少陽中微陰生者微凉可治癰疽蜜炙性溫能補虛損因其味輕故專於氣分而達表所以能補元陽充腠理治勞傷長肌肉氣虛而難汗者可發表疏

而多汗者可止其所以止血崩血淋者以氣固而血自止也故曰血脫益氣其所以除瀉痢帶濁者以氣固而陷自除也故曰陷者舉之然其性味俱浮純於氣分故中滿氣滯者當酌用之

白朮 三

味甘辛氣溫氣味俱厚可升可降陽中有陰氣中有血其性溫燥故能益氣和中補陽生血暖胃消穀益津液長肌肉助精神實脾胃止嘔逆補勞倦進飲食利小水除濕運痰消浮去脹治心腹冷痛胃虛下痢痃癖癥瘕制以人乳欲潤其燥炒以壁土欲助其固佐以黃芩清熱安胎以其性澀壯氣故能止汗實表而癰疽得之必反多膿奔豚遇之恐反增氣及上焦燥熱而氣多壅滯者皆宜酌用之然冬朮甘而柔潤夏朮苦而燥烈此其功用大有不同不可不為深辨也若於飢時擇肥而甘者嚼而服之服之久久誠為延壽之物是實人所未知

蒼朮 四

味苦甘辛性溫而燥氣味俱厚可升可降陽也用此者用其溫散燥濕其性溫散故能發汗寬中調胃進食去心腹脹疼

霍亂嘔吐解諸鬱結逐山嵐寒疫散風眩頭疼消痰癖氣塊水腫脹滿其性燥濕故治冷痢冷泄滑瀉腸風寒濕諸瘡與黃柏同煎最逐下焦濕熱痿痺若內熱陰虛表疏汗出者忌服然惟茅山者其質堅小其味甘醇補益功多大勝他朮

甘草 五

味甘氣平生凉炙溫可升可降善於解毒反甘遂海藻大戟芫花其味至甘得中和之性有調補之功故毒藥得之解其毒剛藥得之和其性表藥得之助其升下藥得之緩其速助參芪成氣虛之功人所知也助熟地療陰虛之危誰其曉焉

秘邪熱暖筋骨健脾胃長肌肉隨氣藥入氣隨血藥入血無往不可故稱國老惟中滿者勿加恐其作脹速下者勿入恐其緩功不可不知也

黃精 六　一名救窮草

味甘微苦性溫能補中益氣安五臟療五勞七傷助筋骨益脾胃潤心肺填精髓耐寒暑下三蟲久服延年不饑髮白更黑齒落更生張華博物志言天老曰太陽之草名黃精食之可以長生太陰之草名鉤吻不可食之入口立死此但以黃精鉤吻對言善惡原非謂其相似也而陶弘景謂黃精之葉與鉤吻相似誤服之害人蘇恭曰黃精葉似柳鉤吻蔓生葉如柿葉殊非比類陳藏器曰鉤吻乃野葛之別名二物全不相似不知陶公憑何說此是可見黃精之內本無鉤吻不必疑也

肉蓯蓉 七

味甘鹹微辛酸氣微溫味重陰也降也其性滑以其味重而甘溫故助相火補精興陽益子嗣治女人血虛不孕暖腰膝堅筋骨除下焦寒痛以其補陰助陽故禁虛寒遺瀝洩精止血崩尿血以其性滑故可除莖中寒熱澀痛但驟服反動大便若虛不可攻而大便閉結不通者洗淡暫用三四錢一劑即通神效

丹參 八

味微苦微甘微澁性微涼無毒反藜蘆能養血活血生新血行宿血故能安生胎落死胎血崩帶下可止經脈不勻可調此心脾肝腎血分之藥所以亦能養陰定志益氣解煩療眼疼脚痺通利關節及惡瘡疥癬赤眼丹毒排膿止痛長肉生肌

遠志 九

味微苦微辛氣溫陽也升也製以甘草湯浸一宿晒乾炒用功專心腎故可鎮心止驚辟邪安夢壯陽益精強志助力以其氣升故同人參甘草棗仁極能舉陷攝精交接水火但可為佐用不宜多神氣上虛者所宜痰火上實者當避

巴戟天 十

味甘微溫陰中陽也雖曰足少陰腎經之藥然亦能養心神安五臟補五勞益志氣助精強陰治陰痿不起腰膝疼痛及夜夢鬼交遺精溺濁小腹陰中相引疼痛等證制宜酒浸去心微炒或滾水浸剝亦可

仙茅十一

味辛溫有小毒陽也能助神明强筋骨益肌膚培精血明耳目塡骨髓開胃消食助益房事溫利五臟補暖腰脚此西域婆羅門僧獻方於唐明皇服之有效久秘而後得傳按許眞君書云仙茅久服可以長生其味甘能養肉辛能養節苦能養氣鹹能養骨滑能養膚酸能養筋宜和苦酒服之必效也然仙茅性熱惟陽弱精寒禀賦素怯者宜之若體壯相火熾盛者服之大能動火不可不察凡制用之法於八九月采得用竹刀刮去黑皮切如豆粒糯米泔浸兩宿去赤汁用酒拌蒸之從巳至亥制之極熟自無毒矣然後曬乾擣篩熟蜜丸桐子大每空心酒飲任下二三十丸忌食牛乳及黑牛肉恐減藥力也若隨羣補藥中爲丸服之無所不可

天麻十二　一名赤箭　一名定風草

味辛平陰中有陽治風虛眩暈頭旋眼黑頭痛諸風濕痺四肢拘攣利腰膝强筋骨安神志通血脈止驚恐恍惚殺鬼精蠱毒及小兒風癇驚氣然性懦力緩用須加倍或以別藥相佐然後見功

沙參十三　反藜蘆　一名鈴兒草

味微甘苦氣味俱輕性微寒能養肝氣治多眠除邪熱益五臟陰氣清肺涼肝滋養血脈散風熱瘙痒頭面腫痛排膿消腫長肌肉止驚煩除疝痛然性緩力微非堪大用易老云人參補五臟之陽沙參補五臟之陰特以其甘涼而和補中清火反面言之故有是論若云對待人參則相去遠矣

玄參十四　反藜蘆

味苦甘微鹹氣寒此物味苦而甘苦能清火甘能滋陰以其味甘故降性亦緩本草言其惟入腎經而不知其尤走肺臟故能退無根浮游之火散周身痰結熱癰逐頸項咽喉痺毒瘰癧結核驅男女傳尸煩躁骨蒸解溫瘧寒熱往來治傷寒熱斑支滿亦療女人產乳餘疾或腸中血瘕熱癥并療勞傷痰嗽熱煩補腎滋陰明目解渴

茅根十五　即白茅

味甘涼性純美能補中益氣此良藥也善理血病凡吐血衄血瘀血血閉及婦人經水不調崩中漏下且通五淋除客熱止煩渴堅筋骨療肺熱噦逆喘急解酒毒及黃疸水腫久服大是益人若治癰疽疔毒及諸毒諸瘡諸血或用根搗傅或用此煮汁調傅毒等藥或以酒煮服無不可也茅有數種處

處有之惟白者爲勝春生芽布地如鍼故曰芽鍼可以生啖
甚益小兒功用亦同

淫羊藿十六

味甘氣辛性溫乃手足陽明少陰三焦命門藥也主陽虛陽痿莖中作痛化小水益精氣强志意堅筋骨暖下部一切冷風勞氣筋骨拘攣補腰膝壯真陰及年老昏耄中年健忘凡男子陽衰女子陰衰艱於子嗣者皆宜服之服此之法或單用浸酒或兼佐丸散無不可者制法須擇淨一斤以羊脂四兩同炒油盡用之

苦參十七

味苦性寒反藜蘆沉也陰也乃足少陰腎經之藥能祛積熱黃疸止夢遺帶濁清小便利水除癰腫明目止淚平胃氣能令人嗜食利九竅除伏熱狂邪止渴醒酒療惡瘡斑疹疥癩殺疳虫及毒風煩躁脫眉炒黃爲末米飲調服治腸風下血熱痢

貝母十八 反烏頭

味苦氣平微寒氣味俱輕功力頗緩用須加倍善解肝經鬱愁亦散心中逆氣祛肺痿肺癰痰嗽喘嗽研末沙糖爲丸含嚥最佳降胸中因熱結胸及乳癰流痰結核若足生人面瘡瘡燒灰油調頻敷産難胞衣不出研末用酒和吞亦除瘕疝喉痺金瘡并止消渴煩熱赤眼翳膜堪點時疾黃疸能驗○又如半夏貝母俱治痰嗽但半夏兼治脾肺貝母獨善清金半夏用其辛貝母用其苦半夏用其溫貝母用其涼半夏性速貝母性緩半夏散寒貝母清熱性味陰陽大有不同俗有代用者其謬孰甚

土貝母十九 反烏頭

味大苦性寒陰也降也乃手太陰少陽足陽明厥陰之藥大

治肺癰肺痿欬喘吐血衄血最降痰氣善開鬱結止疼痛消脹滿清肝火明耳目除時氣煩熱黃疸淋閉便血溺血解熱毒殺諸虫及療喉痺瘰癧乳癰發背一切癰瘍腫毒濕熱惡瘡痔漏金瘡出血火瘡疼痛爲末可敷煎湯可服性味俱厚較之川貝母清降之功不啻數倍

山慈姑二十 一名金燈籠

味甘微辛有小毒治癰瘍疔腫瘡瘻瘰癧結核破皮攻毒俱宜醋磨傅之除䵟斑剝人面皮宜搗汁塗之并治諸毒蠱毒蛇虫狂犬等傷或用酒調服或乾摻之亦治風痰癇疾以茶

清研服取此可愈

柴胡二一

味苦微辛氣平微寒氣味俱輕升也陽中之陰用此者用其涼散平肝之熱入肝胆三焦心胞四經其性涼故解寒熱往來肌表潮熱肝胆火炎胸脇痛結兼治瘡瘍血室受熱其性散故主傷寒邪熱未解溫瘧熱盛少陽頭痛肝經鬱證總之邪實者可用真虛者當酌其宜雖引清氣上升然升中有散中虛者不可散虛熱者不可寒豈容誤哉兼之性滑善通大便凡溏泄脾薄者當慎用之熱結不通者用佐當歸黃芩正所宜也○愚謂柴胡之性善泄善散所以大能走汗大能泄氣斷非滋補之物凡病陰虛水虧而孤陽勞熱者不可再損營氣蓋未有用散而不泄營氣者未有動汗而不傷營血者營即陰也陰既虛矣尚堪再損其陰否然則用柴胡以治虛勞之熱者果亦何所取義耶觀寇宗奭衍義曰柴胡本經並無一字治勞今人治勞方中鮮有不用者嗚呼凡此誤世甚多嘗原病勞之人有一種臟本虛損復受邪熱者當須斟酌用之如經驗方中治勞熱青蒿煎之用柴胡正合宜耳若或無邪得此愈甚雖至死人亦不怨目擊甚多日華子又謂補五

勞七傷藥性論亦謂治勞乏羸瘦若此等病苟無實熱醫者執而用之不死何待注釋本草一字不可忽蓋萬世之後所誤無窮可不謹哉觀此寇氏之說其意專在邪熱二字謂但察有邪無邪以決可用不可用此誠得理之見而復有非之者抑又何也即在王海藏亦曰苟無實熱而用柴胡不死何待凡此所見畧同用者不可不察

桔梗二二 一名薺苨

味苦微辛氣微涼氣輕於味陽中有陰有小毒其性浮用此者用其載藥上升故有舟楫之號入肺胆胸膈上焦載散藥表散寒邪載涼藥清咽疼喉痹亦治赤目腫痛載肺藥解肺熱肺癰鼻塞唾膿咳嗽載痰藥能消痰止嘔亦可寬胸下氣引大黃可使上升引青皮平肝止痛能解中惡蠱毒亦治驚癇怔忡若欲專用降劑此物不宜同用

防風二三

味甘辛氣溫升也陽也用此者用其氣平散風雖膀胱脾胃經藥然隨諸經之藥各經皆至氣味俱輕故散風邪治一身之痛療風眼止冷淚風能勝濕故亦去濕除遍體濕瘡若隨實表補氣諸藥亦能收汗升舉陽氣止腸風下血崩漏然此

風藥中之潤劑亦能走散上焦元氣誤服久服反能耗人

細辛 二四　反藜蘆 忌生菜

味大辛氣溫氣味俱厚升也陽也有小毒用此者用其溫散善族陰分之寒邪除陰經之頭痛益肝溫膽利竅逐諸風濕痺風癇疼痛鼻齆不聞香臭開關通竅散風淚目疼口臭牙虫煎湯含漱過服亦散真氣不可不知此味辛甚故能逐陰分之邪陰分且然陽分可知獨活少陰厥陰之藥然燥烈者甚而不入陽分者但陽證忌熱用當審之

羌活 二五

味微苦氣辛微溫升也陽也用此者用其散表定痛能入諸經太陽為最散肌表之寒邪利周身項脊之疼痛排太陽之癰疽除新舊之風濕緣非柔懦之物故能撥亂反正惟其氣雄大能散逐若正氣虛者忌用之

獨活 二六

味苦氣香性微涼升中有降善行滯氣故入腎與膀胱兩經專理下焦風濕兩足痛痹濕癢拘攣或因風濕而齒痛頭眩喘逆奔豚疝瘕腰腹疼痛等證皆宜用之

升麻 二七

味微苦氣平氣味俱輕浮而升陽也用此者用其升散提氣乃脾胃肺與大腸四經之藥善散陽明經風寒肌表邪熱提元氣之下陷舉大腸之脫泄除陽明溫疫表邪解膚腠風熱斑疹引石膏除齒牙臭爛腫痛引葱頭去陽明表諸頭痛佐當歸肉蓯蓉可通大便結燥凡癰疽痘疹陽虛不能起發及瀉痢崩淋夢遺脫肛陽虛下陷之類用佐補劑皆所宜也若上實氣壅諸火炎上及太陽表證皆不宜用且其味苦氣若血氣太虛及冰火無根者並不可用

前胡 二八

味苦氣寒降也陰中微陽去火痰實熱開氣逆結滯轉筋霍亂除胸中痞滿氣喘咳逆欬嗽痰因治傷寒寒熱風熱頭痛解嬰兒疳熱

延胡索 二九

味苦微辛氣微溫入肝脾二經善行滯氣破滯血血中氣藥故能止腹痛通經調月水淋滯心氣疼痛破癥瘕跌撲凝瘀亦善落胎利小便及產後逆血上衝俱宜以酒煮服或用酒磨服亦可然性惟破氣逆血必真有血逆氣滯者方可用若產後血虛或經血枯少不利氣虛作痛者皆大非所宜

紫草 一十

味苦性寒此手厥陰足厥陰血分之藥性寒而利能凉血滑血通利二便故痘疹家宜用之凡治痘疹無論未出已出但血熱毒盛或紫或黑而大便秘結者宜用之若已出紅活本紫不黑而大便如常通利者即不可用故曾世榮活幼心書云紫草性寒小兒脾氣實者猶可用脾氣虛者反能作瀉又若古方惟用其茸亦取其氣輕味薄而有清凉升發之功也此外可用以解黃疸消癰腫及一切斑疹惡瘡亦以其能利九竅通水道去濕凉血而然也

白芨 二

味苦澀性收斂微寒反烏頭能入肺止血療肺癰肺痿治癰疽敗爛惡瘡刀箭湯火損傷生肌止痛但可爲末傅之凡吐血不能止者用白芨爲末米飲調服即效

三七 一二

味甘氣溫及陽明厥陰血分之藥故善止血散血定痛凡金刃刀箭所傷及跌撲杖瘡血出不止嚼爛罨之或爲末摻之其血即止亦治吐血衄血下血血痢崩漏經水不止產後惡血不下俱宜自嚼或爲末米飲送下一二錢若治虎咬蛇傷等證俱可服可傅

葉之性用與根大同凡折傷跌撲出血傅之即止青腫亦散

白鮮皮 二一

味苦寒性燥而降乃手足太陰陽明之藥解熱黃酒黃穀黃勞黃通關節九竅利血脉小水治時行大熱飲水狂躁叫呼及婦人陰中腫痛小兒風熱驚癎尤治一切毒風風瘡疥癬赤爛楊梅瘡毒眉髮脫落此雖苦寒而實爲諸黃風痺要藥

秦艽 四

味苦性沉寒沉中有浮手足陽明清火藥也治風寒濕痺利小水療通身風濕拘攣手足不遂清黃疸解溫疫熱毒除口臭牙疼口瘡腸風下血及虛勞骨蒸發熱潮熱煩渴及婦人胎熱小兒疳熱瘦弱等證

地榆 五

味苦微澀性寒而降既清且澀故能止吐血衄血清火明目治腸風血痢及婦人崩漏下血月經不止帶濁痔漏產後陰氣散失亦斂盜汗療熱痞除惡肉止瘡毒疼痛凡血熱者當用虛寒者不相宜也作膏可貼金瘡搗汁可塗虎犬蛇虫傷

毒飲之亦可

黃芩 一六

味苦氣寒氣輕於味可升可降陰中微陽枯者善於入肺實者善入大腸欲其上者酒炒欲其下者生用枯者清上焦之火消痰利氣定喘嗽止失血退往來寒熱風熱濕熱頭痛解瘟疫清咽療肺痿肺癰乳癰發背尤祛肌表之熱故治斑疹鼠瘻瘡瘍赤眼實者涼下焦之熱能除赤痢熱蓄膀胱五淋澀痛大腸閉結便血漏血胎因火盛不安酌佐砂仁白朮腹因火滯為痛可加黃連厚朴大腸無火滑泄者最當慎用

黃連 一七

味大苦氣大寒味厚氣薄沉也降也降中微升陰中微陽專治諸火火在上炒以酒火在下炒以童便火而嘔者炒以薑汁火而伏者炒以鹽湯同吳茱萸炒可以止火痛同陳壁土炒可止熱瀉同枳實用可消火脹同天花粉用能解煩渴同木香丸和火滯下痢腹痛同吳茱萸丸治胃熱吞酸水總之其性大寒故惟平肝涼血肅胃清腸涼膽止驚癇瀉心除痞滿上可治吐血衄血下可治腸澼便紅療婦人陰戶腫痛除小兒食積熱疳殺蚘蟲消惡瘡燥脹除蠱蛇解熱毒善治火眼赤消痔漏解附子之熱殺巴豆之毒然其苦洩之脾實火虛熱妄用必致格陽故寇宗奭曰虛而冷者慎勿輕用王海藏曰夏月久血痢不用黃連陰在內也〇景岳曰人之脾胃所以盛載萬物發生萬物本象地而屬土土煖則氣行而燥土寒則氣凝而濕土燥則實土濕則浮此天地間不易之至理黃連之苦寒若此所以過服黃連者無不敗脾此其濕滑亦自明顯易見獨因陶弘景別錄中有謂厚腸之一言而劉河間復證之曰諸苦寒藥多泄惟黃連黃蘗性冷而燥因致後世視為奇見無不謂黃連性燥而厚腸胃凡治瀉痢者

開手便是黃連不知黃連黃柏之燥於何見之嗚呼一言之謬流禁若此難洗若此淆理惑人莫此為甚雖曰黃連治痢亦有效者然必其人素稟陽臟或多縱口腹濕熱為痢者乃其所宜且凡以縱肆不節而血氣正強者即或誤用未必殺人久之邪去亦必漸愈而歸功黃連何不可也此外則凡以元氣素弱傷脾患痢或本無火邪而寒濕動脾者其病極多若妄用黃連則脾腎日敗百無一生凡患痢而死者率由此類可不寒心余為此言而人有不必信者多以舌燥之一行不明耳故今於泄瀉痢門條中復評其苦味之理以俟稽

生仁者再為贊正庶是非得明而民生有攸賴矣○道者言服黃連犯猪肉令人泄瀉

胡黃連 三八

味大苦大寒其性味功用大似黃連能凉肝明目治骨蒸勞熱三消吐血衄血五心煩熱疳積婦人胎熱虛驚熱痢及小兒疳熱驚癇漬人乳點目甚良

知母 三九

味苦寒陰也其性沉中有浮浮則入手太陰手少陰沉則入足陽明足厥陰足少陰也故其在上則能清肺止渴却頭痛潤心肺解虛煩喘嗽吐血衄血去喉中腥臭在中則能退胃火平消癉在下則能利小水潤大便去膀胱肝腎濕熱腰脚腫痛并治勞瘵內熱退陰火解熱淋崩濁古書言知母佐黃栢滋陰降火有金水相生之義蓋謂黃栢能制膀胱命門陰中之火知母能消肺金制腎水化源之火去火可以保陰是即所謂滋陰也故潔古東垣皆以為滋陰降火之要藥繼自丹溪而後則皆用以為補陰誠大謬矣夫知母以沉寒之性本無生氣用以清火則可用以補陰則何補之有第其陰柔巽順似乎有德倘元氣既虧猶欲藉此以望補益是亦猶小

人在朝而國家元氣日受其削有陰移焉而莫之覺者是不可不見之真而辨之早也

龍膽草 四十

味大苦大寒陰也沉也乃足厥陰少陽之正藥大能瀉火但引以佐使則諸火皆治故能退骨蒸疳熱除心火驚癇狂躁胃火煩熱黃疸咽喉腫痛肝腎膀胱伏火小水淋閉血熱瀉痢下焦濕熱癰腫瘡瘍疼痛婦人血熱崩淋小兒熱疳客忤去目黃睛赤腫痛殺蠱毒腸胃諸虫及風熱盜汗凡肝腎有餘之火皆其所宜

隰草部

地黃 四一

生地黃味苦甘氣凉氣薄味厚沉也陰也鮮者更凉乾者微凉能生血補血凉心火退血熱去煩躁骨蒸熱痢下血止嘔血衄血脾中濕熱或婦人血熱而經枯或上下三消而熱渴總之其性頗凉若脾胃有寒者用宜斟酌

熟地黃味甘微苦味厚氣薄沉也陰中有陽本草言其入手足厥少陰經大補血衰滋培腎水填骨髓益真陰專補腎中

元氣兼療藏血之經此雖泛得其概亦豈足以盡地之妙夫地黃產於中州沃土之鄉得土氣之最厚者也其色黃土之色也其味甘土之味也得土之氣而曰非太陰陽明之藥吾弗信也惟是生者性涼脾胃喜暖故脾陽不足者所當慎用至若熟則性平禀至陰之德氣味純靜故能補五藏之真陰而又於多血之藏為最要得非脾胃經藥耶且夫人之所以有生者氣與血耳氣主陽而動血主陰而靜補氣以人參為主而芪朮但可為之佐補血以熟地為主而芎歸但可為之佐然在芪朮芎歸則又有所當避而人參熟地則氣血之必

不可無故凡諸經之陽氣虛者非人參不可諸經之陰血虛者非熟地不可人參有健運之功熟地禀靜順之德此熟地之與人參一陰一陽相為表裏一形一氣互主生成性味中正無踰於此誠有不可假借而更代者矣凡諸真陰虧損者有為發熱為頭疼為焦渴為喉痺為嗽痰為喘氣或脾腎寒逆為嘔吐或虛火載血於口鼻或水泛於皮膚或陰虛而泄利或陽浮而狂躁或陰脫而仆地陰虛而神散者非熟地之守不足以聚之陰虛而火升者非熟地之重不足以降之陰虛而躁動者非熟地之靜不足以鎮之陰虛而剛急者非熟

地之甘不足以緩之陰虛而水邪泛濫者舍熟地何以自制陰虛而真氣散失者舍熟地何以歸源陰虛而精血俱損脂膏殘薄者舍熟地何以厚腸胃且猶有最玄最妙者則熟地兼散劑方能發汗何也以汗化於血而無陰不作汗也熟地兼溫劑始能回陽何也以陽生於下而無復不成乾也然而陽性速故人參少用亦可成功陰性緩熟地非多難以奏效而今人有畏其滯膩者則崔氏何以用腎氣丸而治痰浮有畏其滑澤者則仲景何以用八味丸而醫腎泄有謂陽能生陰陰不能生陽者則陰陽之理原自互根彼此相須缺一不

可無陽則陰無以生無陰則陽無以化故內經曰精化為氣得非陰亦生陽乎孰謂陽之能生而陰之不能長也又若制用之法有用薑汁拌炒者則必有中寒兼嘔而後可有用砂仁制者則必有脹滿不行而後可有用酒拌炒者則必有經絡壅滯而後可使無此數者而必欲強用制法是不知用熟地者正欲用其靜重之妙而反為散動以亂其性何異畫蛇而添足今之人即欲用之補陰而必兼以滲利則焉知補陰不利水利水不補陰而補陰之法不宜滲即有用之補血而復疑其滯膩則焉知血虛如燥土旱極望雲霓而枯竭之腸

極苦澀設不明此則少用之尚欲兼之以利又孰敢單用之而任之以多單用而多且不敢又孰敢再助以甘而盡其所長是又何異因咽而廢食也嗟嗟熟地之功其不申於時用者久矣其有不可以筆楮盡者尚多也予今特表而出之尚祈明者之自悟焉

牛膝 四二

味苦甘氣微凉性降而滑陰也忌牛肉酒漬用走十二經絡助一身元氣主手足血熱痿痺血燥拘攣通膀胱澀秘大腸乾結補髓填精益陰活血治腰膝痠疼滋須髮枯白其性

下走如奔故能通經閉破血癥引諸藥下降同麝香用墮胎尤速凡藏寒便滑下元不固者當忌用之

麥門冬 四三

味甘微苦性微寒降也陽中陰也去心用恐令人煩其味甘多苦少故上行心肺補上焦之津液清胸膈之渴煩解火炎之嘔吐退血燥之虛熱益精滋陰澤肌潤結肺痿肺癰咳唾衄血經枯乳汁不行肺乾咳嗽不絕降火清心消痰補怯復脉須仗人參便滑中寒者勿設

續斷 四四

川者色灰黑尖瘦多蘆形如雞腳皮斷而皺者是味苦而澀苦重澀輕氣微凉他產者味甘微苦澀少用川者良凡用此者用其苦澀其味苦而重故能入血分調血脈消腫毒乳癰瘰癧痔瘻治金瘡跌傷續筋骨血脈其味澀故能止吐血衄血崩淋胎漏便血尿血調血痢縮小便止遺精帶濁佐之以甘如甘草地黃人參山藥之類其效尤捷

蜀葵子 四五

味甘性寒能利小水通淋閉消水腫潤大腸催生落胎通乳汁亦治一切瘡疥并瘢疵赤靨苗葉可作菜茹古以葵為五

菜之主今不復用之矣

黃葵花 性滑利與前葵大同若治諸惡瘡膿水久不瘥者用花為末傅之即愈為瘡家要藥浸油可塗湯火瘡

車前子 四六 即芣苡

味甘微鹹氣寒入膀胱肝經通尿管熱淋澀痛驅風熱目赤翳膜利小便除濕痺性滑極善催生兼治濕熱泻痢亦去心胸煩熱

根葉 生搗汁飲治一切尿血衄血熱痢尤逐氣癃利水

白蒺藜 四七

味苦微寒一云甘微涼能破瘀血止咳止遺溺泄精疥癬肺癰腸癰目赤腫痛痔瘻瘡瘍風疹遍身風癢瘰癧乳癰帶下俱宜倍生止煩亦用涼血養血亦宜補陰用倍宜少熟大刺用涼宜連刺生搗去風解毒白者最良

沙苑蒺藜性亦大同若用固精補腎止遺瀝尿血縮小便止煩渴去燥熱則亦可用此

紅花 四八

味甘微苦微辛氣微涼陰中微陽惟入血脈多用女科少用可活血引經多用能破血通瘀可下死胎亦療血暈達痘瘡血熱難出散斑疹血滯不消潤燥活血止痛通經亦消腫毒

紫葳 四九

味苦微辛辛能入肺苦能降氣故治咳嗽上氣痰喘惟肺實氣壅咳嗽火邪用金而致咳嗽喘急者乃可用之若以扶陰助腎水肝金虛而咳嗽失血者則非所宜觀陶氏別錄謂其補不足治五勞體虛其亦言之過也

白菊花 五十　白菊花根葉利水搗汁和酒服之大治癃閉

味甘色黃者能養血散風去頭目風熱眩暈疼痛目中翳膜及遍身遊風風疹作花明目葉亦可用

味苦者性涼能解血中鬱熱清頭目去風熱眼目腫痛流淚

根葉辛香能消癰毒止泄痢

野菊花 五一　一名苦薏

根葉莖花皆可同用味苦辛大能散火散氣消癰毒疔瘡瘰癧眼目熱痛亦破婦人瘀血孫氏治癰毒方用野菊連根葉搗爛酒煎熱服取汗以渣敷之或同蒼耳搗汁以熱酒衝服冬月用乾者煎服或為末酒服亦可

豨薟 五二

味苦氣微寒有小毒此物氣味頗峻善逐風濕諸毒用蜜酒層層和灑九蒸九曬蜜丸空心酒吞多寡隨宜善治中風口眼歪斜除濕痺腰腳痠痛麻木生者酒煎逐破傷風危急如神散撒麻疔惡毒腫痛虎傷狗咬蜘蛛蟲毒或搗爛封之或煎湯或散敷俱良其補益功力若此似於元氣虛者非利

益母草 五三　子名茺蔚

味微苦微辛微寒性滑而利善調女人胎產諸證故有益母之號能去死胎滑生胎活血涼血行血故能治產難胞衣不下子死腹中及經脈不調崩中漏下尿血瀉血瘀血等證然

併血熱血滯及胎產艱澁者宜之若血氣素虛兼寒及滑陷不固者皆非所宜不得以其益母之名謂婦人所必用也蓋用其滑利之性則可求其補益之功則未也本草言其久服益精輕身誠不足信此外如退浮腫下水氣及打撲瘀血通大小便之類皆以其能利也若治疔腫乳癰丹毒惡毒則可搗汁飲之其渣亦可敷貼

子名茺蔚功用略同但子味微甘稍溫故能涼血補血亦益陰氣明目

瞿麥 五四

味苦性寒降也性滑利能通小便降陰火除五淋利血脈兼涼藥亦消眼目腫痛兼血藥則能通經破血下胎凡下焦濕熱疼痛諸病皆可用之

茵陳 五五

味苦微寒陰中微陽入足太陽經用此者用其利濕逐熱故能通關節解熱滯療天行時疾熱狂頭痛利小水專治黃疸宜佐梔子黃而濕者多腫再加滲利黃而燥者乾澀再加涼潤只有陰黃一證因以中寒不運此非所宜又解傷寒瘴瘧火熱散熱痰風熱疼痛濕熱為痢尤其所宜

青蒿 五六

味苦微辛性寒陰中有陽降中有散主肝腎三焦血分之病療陰火伏留骨節故善治骨蒸勞熱尸疰鬼氣降火滋陰潤顏色長毛髮治瘡疥寒熱殺虫毒及惡瘡濕疥生搗可傅金瘡止血止痛

款冬花 五七

味微甘微辛而溫其氣浮陽也入手太陰經能溫肺氣故療欬嗽及肺癰肺痿欬唾膿血寇宗奭曰有人病嗽多日或教以然款冬花三兩於無風處以筆管吸其煙滿口則嚥之數日果效

麻黃 五八

味微苦微澀氣溫而辛升也陽也此以輕揚之味而兼辛溫之性故善達肌表走經絡大能表散風邪祛除寒毒一應瘟疫瘧疾瘴氣山嵐凡足三陽表實之證必宜用之若寒邪深入少陰厥陰筋骨之間非用麻黃官桂不能逐也但用此之法自有微妙則在佐使之間或兼氣藥以助力可得衛中之汗或兼血藥以助液可得營中之汗或兼溫藥以助陽可逐陰凝之寒毒或兼寒藥以助陰可解炎熱之瘟邪此實傷寒

陰寒家第一要藥，故仲景諸方以此為首，實千古之獨得者
也。今見後人多有畏之為毒藥而不敢用，又有謂夏月不宜
用麻黃者，皆不達可哂也。雖在李氏有云若過發則汗多亾
陽，若自汗表虛之人用之則脫人元氣，是皆過用及誤用而
然。若陰邪深入，則無論冬夏，皆所最宜，又何過之有？此外如
手太陰之風寒咳嗽，手少陰之風熱斑疹，足少陰之風水腫
脹，足厥陰之風痛目痛，凡宜用散者，惟斯為最。然柴胡、麻黃
俱為散邪要藥，但陽邪宜柴胡，陰邪宜麻黃，不可不察也。○
制用之法，須折去粗根，入滾湯中煮三五沸，以竹片掠去浮
沫，晒乾用之，不爾令人動煩。

麻黃根　味甘平，收斂，故可以止汗，同牡
蠣粉、米粉或用舊蒲扇杵末等分，以生絹袋盛貯，用撲諸汗，
或夏月多汗用之俱佳。

萱草根 五九　一名忘憂　一名宜男　一名鹿葱

萱草者，詩作諼草，凡樹此玩此者可解憂思，故名忘憂；亦食
其苗，氣味如葱而鹿喜食之，故名鹿葱；婦人佩其花則生男，
故名宜男。花葉氣味甘而微涼，故能去濕熱，利小便，亦能除
煩渴，消濕熱黃疸，安五臟，利胸膈，令人和悅，亦能明目。

根：治沙淋帶濁，利水下氣，解酒毒，亦宜搗汁服之，治吐血衄血，研
汁一大盞和生薑汁細細呷之，治吹乳乳癰腫痛，須擂酒服，以
渣封之。

連翹 六十

味苦微辛，氣微寒，氣味俱薄，輕清而浮，升也，陽中有陰。入手
少陰手足少陽陽明氣分，能瀉心經客熱，降脾胃濕熱，去寸白蛔蟲，
通月水五淋。以其味苦而輕，故善達肌表，散鼠瘻瘰癧癭瘤
結熱，蠱毒癰毒斑疹，治瘡癤止痛，消腫排膿，瘡家號為聖丹。
以其辛而能散，故又走經絡，通血凝氣滯結聚，所不可無。

旋覆花 六一

味苦甘微辛，陰也，降也，乃手太陰肺、手陽明大腸經藥。開
結氣，降痰涎，通水道，消腫滿。凡氣壅濕熱者宜之，但其性在
走散，故凡見大腸不實及氣虛陽衰之人，皆所忌用。

鼠粘子 六二　一名牛蒡子　一名大力子

味苦辛，降中有升。治風毒斑疹諸瘻，散瘡瘍腫毒喉痺，及腰
膝凝寒痺滯之氣，以其善走十二經而解中有散也。

決明 六三

味微苦微甘，性平微涼，力薄。治肝熱風眼赤而多淚，及肝火

目昏可爲佐使惟多服久服方可得效或作枕用治頭風明
目其功勝于黑豆

葶藶 六四

味苦大寒沉也陰也氣味俱厚有毒善逐水氣不減大黃但
大黃能泄血閉葶藶能泄氣閉氣行而水自行也若肺中水
氣䐜滿脹急者非此不能除然性急利甚凡涉氣虛者不可
輕用淮南子曰大戟去水葶藶愈脹用之不節乃反成病即
此謂也第此有甜苦二種雖曰爲甜然亦非眞甜但稍淡耳
稍淡者其性亦稍緩

夏枯草 六五

味微苦微辛氣浮而升陰中陽也善解肝氣養肝血故能散
結開鬱大治瘰癧鼠瘻乳癰癭氣并治頭瘡目疾樓全善云
夏枯草治目珠痛至夜則甚者神效或用苦藥點眼反甚者
亦神效一男子目珠痛至夜則重用黃連點之更甚諸藥不
效乃用夏枯草二兩香附二兩甘草四錢爲末每服一錢半
清茶調服下咽則疼減至四五服良愈也

蒼耳子 六六 一名羊負來

味苦微甘治頭風寒痛風濕周痺四肢拘攣去風明目養血
煖腰膝及瘰癧瘡疥亦治鼻淵宜炒熟爲末白湯點服一二
錢久之乃效忌豬肉馬肉

漏蘆 六七

味微鹹性寒有小毒主蠱毒惡瘡瘰癧乳癰痔瘻蝕瘡長肉
止金瘡血閉亦下乳汁通經脈消赤眼利小便止尿血腸風
淋瀝遺溺及小兒壯熱瘀跌撲損傷可續筋骨

劉寄奴 六八

味苦性溫能破瘀血活新血通婦人經脈產後餘血損傷瘀
血下氣止心腹痛及小便去血俱可爲散或茶或酒調服爲
敷金瘡出血不止其效尤捷用治湯火傷大效但爲末摻之

萹蓄 六九

味苦濇利小便除黃疸殺三蟲去下部濕熱浸淫陰蝕瘡疥
痔漏煮汁飲之療小兒蛔蟲上攻心腹作痛大效有海上歌
云心頭急痛不能當我有仙人海上方萹蓄醋煎通口嚥管
教時刻即安康

青葙子 七十 野雞冠子也

味微苦微寒能清肝火血熱故治赤眼退赤障消翳膜鎮肝
明耳目亦去風濕惡瘡疥癩

艾 七一

味微苦氣辛生用微溫熟用微熱能通十二經而尤為肝脾腎之藥善於溫中逐冷除濕行血中之氣氣中之滯凡婦人血氣寒滯者最宜用之故能安胎止心腹痛治帶下血崩煖腰膝止吐血下痢辟風寒寒濕瘴瘧霍亂轉筋及一切冷氣鬼氣殺蛔虫并下部䘌瘡或生用搗汁或熟用煎湯或用灸百病或炒熱敷熨可通經絡或裝盛包裹可溫臍膝表裏生熟俱有所宜

佛耳草七二　一名鼠麴草

味微酸性溫大溫肺氣止寒嗽散痰氣解風寒寒熱亦止泄瀉鋪艾搭作烟筒用薰久嗽尤效

藍靛七三

藍葉氣味苦寒微甘善解百虫百藥毒及治天行瘟疫熱毒發狂風熱斑疹癰瘍腫痛除煩渴止鼻衄吐血殺疳蝕金瘡箭毒凡以殺熱毒者皆宜搗汁用之

()靛青乃藍與石灰所成性與藍葉稍異其殺虫止血傅諸熱毒熱瘡之功似有勝於藍葉者

()青黛味微鹹而寒性與靛青同大可除諸熱毒虫毒金瘡熱瘡或乾摻或以水調敷若治諸熱瘡毒或用馬齒莧加青黛同搗傅之若治天行頭痛瘟疫熱毒及小兒諸熱驚癇發熱並宜水研服之

木賊七四

味微苦微甘性溫而升陽也性亞麻黃故能發汗解肌治傷寒瘧疾去風濕散火邪療目疾退翳障止腸風下血下痢及婦人崩中帶漏月水不調亦治風濕疝痛大腸脫肛

王不留行七五　一名金盞銀臺

味苦平性滑利乃陽明衝任血海藥也治風毒通血脉療婦人難產及經滯不調下乳汁利小便除風濕痺痛止心頭鼻衄發背癰疽瘡瘻遊風風疹出竹木刺及金瘡止血亦能定痛

海金沙七六

此草出深山中七月收其全科曬乾以杖擊之則細沙自落藥中各此甘性寒乃小腸膀胱血分藥也善通利水道解鬱熱濕熱及傷寒熱狂小便癃閉膏淋血淋石淋莖中疼痛解諸熱毒或丸或散皆可用

燈心草七七

味淡性平能通水道濇結治五淋瀉肺熱降心火除水
腫止血通陰氣散腫止渴但用煎煮服更良若治喉痺宜
燒燈草灰吹之若治下疳瘡亦用燒灰加輕粉麝香爲末摻
之

烟 又七十七

味辛氣溫性微熱升也陽也燒烟吸之大能醉人用時惟吸
一口或二口若多吸之令人醉倒久而後甦甚者以冷水一
口解之即醒若見煩悶但用白糖解之即安亦奇物也吸時
須開喉長吸嚥下令其直達下焦其氣上行則能溫心肺下

行則能溫肝脾腎服後能使通身溫煖微汗元陽陡壯用以
治表善逐一切陰邪寒毒山嵐瘴氣風濕邪閉腠理筋骨疼
痛誠頃刻取效之神劑也用以治裏善壯胃氣進飲食祛陰
濁寒滯消膨脹宿食止嘔噦霍亂除積聚諸蟲解鬱結止疼
痛行氣停血瘀舉下陷後墜通達三焦立刻見效此物自古
未聞也近自我明萬曆時始出於閩廣之間自後吳楚間皆
種植之矣然總不若閩中者色微黃質細名爲金絲烟者力
強氣勝爲優也求其習服之始則向以征滇之役師旅深入
瘴地無不染病獨一營安然無恙問其所以則衆皆服烟由
是衍傳而今則西南一方無分老幼朝夕不能間矣予初得
此物亦甚疑貳及習服數次乃悉其功用之捷有如是者因
著性於此然此物性屬純陽善行善散惟陰滯者用之如神
若陽盛氣越而多躁多火及氣虛氣短而多汗者皆不宜用
或疑其能頃刻醉人性必有毒今彼處習服既久初未聞其
妨人者抑又何也蓋其陽氣強猛人不能勝故下咽即醉既
能散邪亦必耗氣理固然也然烟易散而人氣隨復陽性
留中旋亦生氣此其耗中有補故人多喜服而未見其損者
以此也後讀據係此存說當與究參酌

芳草部

當歸 七八

味甘辛氣溫氣輕味重可升可降陰中有陽其味甘而重故
專能補血其氣輕而辛故又能行血補中有動行中有補誠
血中之氣藥亦血中之聖藥也頭止血上行身養血中守尾
破血下流全活血不走大約佐之以補則補故能養營養血
補氣生精安五臟強形體益神志凡有形虛損之病無所不
宜佐之以攻則通故能祛痰逐瘀利筋骨治拘攣癱瘓燥澀

等營虛而表不解者佐以柴葛麻桂等劑大能散表衛熱而表不斂者佐以六黃之類又能固表惟其氣辛而動故欲其靜者當避之性滑善行大便不固者當避之凡陰中火盛者當歸能動血亦非所宜陰中陽虛者當歸能養血乃不可少若血滯而為痢者正所當用其要在動滑兩字若婦人經期血滯臨產催生及產後兒枕作痛俱當以此為君小兒痘疹驚癇凡屬營虛者必不可少

川芎 七九

味辛微甘氣溫升也陽也其性善散又走肝經氣中之血藥也反藜蘆畏硝石滑石黃連者以其沉寒而制其升散之性也芎歸俱屬血藥而芎之散動尤甚於歸故能散風寒治頭痛破瘀蓄通血脈解結氣逐疼痛排膿消腫逐血通經同細辛煎服治金瘡作痛同陳艾煎服驗胎孕有無三四月後服此微動者胎也以其氣升故兼理崩漏眩運以其甘少故散則有餘補則不足惟風寒之頭痛極宜用之若三陽火壅於上而痛者得升反甚今人不明升降而但知川芎治頭痛謬亦甚矣多服久服令人走散真氣能致暴亡用者識之

芍藥 八十 反藜蘆

味微苦微甘略酸性頗寒氣薄於味斂降多而升散少陰也有小毒白者味甘補性多赤者味苦瀉性多生者更涼酒炒微平其性沉陰故入血分補血熱之虛瀉肝火之實固腠理止熱瀉消癰腫利小便除眼疼退虛熱緩三消諸證於因熱而致者為宜若脾氣寒而痞滿難化者忌用止血虛之腹痛斂血虛之發熱白者安胎熱不寧赤者能通經破血此物乃補藥中之稍寒者非若極苦大寒之比若謂其白色屬金恐傷肝木寒伐生氣產後非宜則凡白過芍藥寒過芍藥者又將何如如仲景黑神散芍藥湯之類非皆產後要藥耶用者還當詳審若產後血熱而陰氣散失者正當用之不必疑也

丹皮 八一

味辛苦氣微涼氣味俱輕陰中陽也赤者行性多白者行性緩入足少陰及手厥陰經忌葫蒜涼骨蒸無汗散吐衄瘀血除產後血滯寒熱祛腸胃蓄血癥堅仍定神志通月水治驚搐風癇療癰腫住痛總之性味和緩原無補性但其微涼而辛能和血涼血生血除煩熱善行血滯滯去而鬱熱自解故亦退熱用此者用其行血滯而不峻

白豆蔻 八二

味辛氣溫味薄氣厚陽也入脾肺兩經別有清爽之氣散胸中冷滯溫胃口止疼除嘔逆翻胃消宿食膨脹治噎膈除瘴疾解酒毒祛穢惡能退翳膜亦消痰氣欲其速效嚼[illegible]丸[illegible]或為散亦妙

肉豆蔻 八三

味苦辛而澀性溫理脾胃虛冷穀食不消治大腸虛冷滑泄不止以其氣香而辛故能行滯止痛和腹脹治霍亂調中下氣開胃進食解酒毒化痰飲溫胃逐蟲殺諸惡氣療小兒胃寒傷乳吐瀉以其能固大腸腸既固則元氣不走脾氣自健

故曰理脾胃虛冷而實非能補虛也麵包煨熟用或剉如豆大以乾麵拌炒熟去麵用之尤妙蓋但欲去其油而用其燥耳

草果 八四 亦名草豆蔻

味辛性溫熱陽也浮也入足太陰陽明能破滯氣除寒氣消食療心腹疼痛解酒毒治瘴瘧寒熱伏暑嘔吐瀉痢膨脹反胃吐酸開痰飲積聚噎膈殺魚肉毒除口臭及婦人惡阻氣逆帶濁此有二種[illegible]所產辛香氣和者佳宜以麵裹微火煨熟用之或[illegible]滇廣所產氣辛而臭大能損人元氣

破故紙 八五

味苦辛氣大溫性燥而降能固下元暖水臟治下焦無火精滑帶濁[illegible]冷頑痹腰腎虛寒而為溏泄下痢以其暖腎固精所以能療腰膝酸疼陰冷囊濕縮小便暖命門小腹止腹中疼痛腎泄以其性降所以能納氣定喘惟其氣辛而降所以氣虛氣短及有燥渴妊娠者當少避之即不得已用於丸中可也忌羊肉芸薹

木香 八六

味苦辛性溫氣味俱厚能升能降陽中有陰行肝脾肺氣滯如積止心腹脇氣痛甚捷和胃氣止吐瀉霍亂散冷氣除脹疼嘔逆治熱痢可佐芩連固大腸火煨方用順其氣癥積惡逆自除調其氣安胎月經亦用亦治疫癘溫瘧亦殺[illegible]鬼精若下焦氣逆諸病亦可縮小便亦能通秘結亦能止氣逆之動血亦能消氣逆之癰腫

藿香 八七

味辛微甘氣溫氣味俱薄陽也可升可降此物香甜不峻善快脾順氣開胃口寬胸膈進飲食止霍亂[illegible]化滯加

烏藥等劑亦能健脾入四君同煎能除口臭亦療水腫亦解
酒積
香附 八八
味苦辛微甘氣溫氣味俱厚陽中有陰血中氣藥也專入肝
膽二經兼行諸經之氣用此者用其行氣血之滯童便炒欲
其下行醋炒則理氣痛鹽水炒散寒邪利三焦行結滯消飲
食痰涎痞滿腹脹胕腫脚氣止心腹肢體頭目齒耳諸痛瘡
霍亂吐逆氣滯泄瀉及吐血下血尿血婦人崩中帶下經脈
不調胎前產後氣逆諸病因能解鬱故曰婦人之要藥然其

味辛而動若陰虛燥熱而汗出血失者槩謂其要則大誤矣
此外凡癰疽瘰癧瘡瘍但氣滯不行者皆宜用之爲要藥
砂仁 八九
味辛氣溫香氣和脾行氣消食逐寒除霍亂止惡心消脹滿
安胎滯之腹痛及胎前氣突之痛止小便泄瀉咳嗽因咳
下氣之效也一切行熱止女子崩中鬼氣奔豚欲其治崩須
用炒黑入肺脾腎膀胱各隨使引亦皆消化不氣宜用
紫蘇 九十
味辛氣溫氣味香竄者佳用此者用其溫散解肌發汗祛風
寒脹進開胃下食治脹滿亦佳順氣宜用口臭亦辟除霍亂
轉筋袪脚氣通大小腸消痰利膈止痛溫中安胎定喘解魚
蟹毒治蛇犬傷或作羹或生食俱可
梗 能順氣其性稍緩體虛者可用
子 性潤而降能潤大便消痰潤肺除五膈定霍亂順氣滯
薄荷 九一
味辛微苦氣微涼氣味俱輕升也陽也其性涼散通關節利
九竅乃手厥陰太陰經要藥凡病新發者宜一切風熱傷寒
頭痛寒熱發毒治頭風頭痛治頭目咽喉口齒風熱諸病

除心腹惡氣脹滿下氣消食消痰辟邪氣穢惡引諸藥
入營衛開小兒之風涎亦治瘰癧瘡疥風瘙癮疹作菜
食之除口氣搗汁含漱去舌胎語澀揉葉塞鼻止衄血亦治
蜂螫蛇傷病新瘥者忌用恐其泄汗亡陽
荊芥 九二
味辛苦氣溫氣厚味薄浮而升陽也用此者用其辛散調血
能解肌發表退寒熱清頭目利咽喉消瘡毒治吐血衄血下
行於血助脾胃辟諸邪毒氣通血脈逐瘀血破結氣消瘀
痛手足筋急瘰癧疥瘡頭風眩暈血風產後血運下血血痢崩

淋帶崩漏若產後中風頭痛宜研末酒服甚妙搗爛醋調傅疔
瘡腫毒最佳亦鼠瘻瘰癧血風瘡疥必用之要藥

白芷 九三

味辛氣溫氣厚味輕升也陽也其性溫散敗毒逐陽明經風
寒邪熱止頭痛頭風頭眩目痛目癢淚出散肺經風寒皮膚
斑疹燥癢治鼻鼽鼻淵齒痛眉稜骨痛大腸風秘腸風尿血
其氣辛香達表故治瘡瘍排膿止痒定痛托癰疽肺癰瘰癧
痔瘻長肉生肌炒黑用之提女人血崩漏下赤白血閉陰腫
欲去鼾斑宜以生用可作面脂亦治蛇傷砒毒金瘡傷損

香薷 九四

味苦辛氣寒氣輕能升能降散暑熱霍亂中脘絞痛小便澀
難清肺熱降胃火除躁煩解鬱滯為末水服可止鼻衄煮汁
頓飲可除風熱轉筋去口臭濕熱水腫者可消中寒陰臟者
須避之

益智 九五

氣味辛溫能調諸氣辟寒氣治客寒犯胃煖胃和中去心腹
氣滯疼痛理下焦虛寒溫腎氣治遺精餘瀝夢泄赤白帶濁
及夜多小便者以二十餘枚研碎入鹽少許同煎服之有奇
驗此行陽退陰之藥凡脾寒不能進食及三焦命門陽氣衰
弱者皆宜之然其行性多補性少必兼補劑用之斯善若單
服多服未免過於散氣

鬱金 九六

味苦辛氣溫善下氣破惡血去血積止吐血衄血血淋尿血
及失心顛狂蠱毒單用治婦人冷氣血積結聚氣滯心腹疼
痛及產後敗血衝心欲死或散或丸或以韭汁薑汁童便井
花水俱可隨宜調服若治痔漏腫痛宜水調敷之耳內腫痛
宜水調灌入少頃傾出即可愈

蓬朮 九七

味苦辛性溫善下氣破血除心腹氣結氣脹冷氣食積疼痛
亦治腹痛血塊通月經產後敗血攻心及撲損瘀血祛邪辟
惡散風熱消腫脹功與京三稜同而氣味則尤烈

澤蘭 九八

味微苦微辛善行血和血治吐血衄血行而不峻婦人產後諸
血不調破宿血除腹痛消新血利關節通九竅除水腫撲
損瘀血并治金瘡癰腫排膿鼓脹用此甚效為婦人要藥

藁本 九九

味甘辛性溫氣厚味薄升也陽也療諸惡風鬼注除太陽頂巔頭痛大寒犯腦痛連齒頰及鼻面皮膚酒齄粉刺風濕泄瀉冷氣腰疼婦人陰中風邪腫痛此足太陽經風藥疥癬瘡瘍之要藥

蓽茇 一百

味辛大熱陽也浮也入手足陽明亦入肝腎善溫中下氣除胃冷辟陰寒療霍亂心腹疼痛冷痰嘔逆吞酸及虛寒瀉痢腸鳴其味大辛須同參朮歸地諸甘溫補劑用之尤效為末搐鼻可解偏風頭痛揩齒可殺牙痛牙虫又牛乳煎治唐太宗氣痢方詳列痢疾門

良薑 百一　子名紅豆蔻

味辛熱純陽浮也入足太陰陽明治胃中逆冷嘔吐清水惡心霍亂氣寒腹痛解酒毒消宿食健脾胃寬噎膈除反胃破冷癖解瘴瘧轉筋瀉痢同草豆蔻煎飲亦治口臭子名紅豆蔻治用略同

三稜 百二

氣味苦平能行血中之氣善破積氣逐瘀血消飲食脹滿氣滯腹痛除痃癖癥瘕積聚結塊通月水亦墮胎及產後惡血撲損瘀血并治瘡腫堅硬然宜醋浸炒熟入藥此與蓬朮稍同但蓬朮峻而此則差緩耳

蓬朮 百三　一名蓬莪茂

味苦辛氣溫有小毒走肝經善破氣中之血通月經消瘀血療跌撲損傷血滯作痛在中焦攻飲食氣滯不消胃寒吐酸膨脹在下焦攻奔豚痃癖冷氣積聚氣腫水腫制宜或酒或醋炒用或入灰火中煨熟搗切亦可但其性剛氣峻非有堅頑之積不宜用

蛇床子 百四

味微苦氣辛性溫乃少陽三焦命門之藥若能去風燥能溫胃故可溫中下氣和關節除疼痛開鬱滯療陰濕惡瘡疥癬縮小便去陰汗止帶濁逐寒疝散濕痛治男子陽痿腰疼大益陽事女人陰中腫痛善煖子宮男婦陽衰無子小兒驚癇撲傷俱可服去皮殼微炒用之凡治外證癬瘡膿痛風瘡俱宜煎湯熏洗亦可為末摻敷俱宜生用

蔓草部

天門冬 百五

味苦微甘氣大寒味厚氣薄沉也陰也入肺腎兩經除虛勞內熱其味苦寒故上定熱喘下去熱淋苦殺三蟲潤滋骨髓解渴除煩消痰止嗽降火保肺退熱滋陰大潤血熱燥結虛寒假熱脾腎溏泄最忌使宜貝母地黃去皮去心方用

菟絲子 百六

味甘辛氣微溫其性能固入肝脾腎三經先用甜水淘洗淨浸脹次用酒漬煮熟曬乾炒之更妙補髓添精助陽固泄續絕傷滋消渴縮小便止夢遺帶濁餘瀝煖腰膝寒疼壯氣力筋骨明目開胃進食肥肌禁止鬼交尤安夢寐湯液丸散任意可用古人不入煎劑亦一失也欲止消渴煎湯任意飲之

五味子 百七

皮甘肉酸性平而斂核仁味辛苦性溫而煖俱兼鹹味故名五味入肺腎二經南者治風寒欬嗽北者療虛損勞傷整用者用其酸生津解渴止瀉除煩療耗散之肺金滋不足之腎水能收斂虛火亦解除酒毒敲碎者用其辛溫補元陽壯筋骨助命門但感寒初嗽當忌恐其斂束不散肝旺吞酸當忌恐其助木傷土

何首烏 百八

味甘澀微苦陰中有陽性溫此其甘能補澀能固溫能養陽雖曰肝腎之藥然白者入氣分赤者入血分凡血氣所在則五陰之臟何所不至故能養血養神助氣壯筋骨強精髓黑鬚髮亦治婦人帶濁失血產後諸虛等疾第其性效稍緩暫服若不甚顯必久服之乃延年益壽滋生助嗣之良劑至如斷瘧疾安久痢活血治風療癰腫瘰癧風濕瘡瘍及一切冷氣腸風宿疾總由其溫固收斂之功血氣固則真元復真元復則邪自散也故唐之李翱著有何首烏傳即李時珍亦曰此物不寒不燥功在地黃門冬之上誠非誣也若其製用之法則有用黑豆層鋪九蒸九曬者有單用米泔浸三宿切焙為末而用者有用壯健人乳拌曬三次生杵為末而用者總之生不如熟即單用米泔浸透蒸之極熟則善矣或不必人乳與豆也服此之後須忌生蘿蔔并諸血敗血等物

瓜蔞仁 百九

味甘氣寒氣味俱厚性降而潤能降實熱痰涎開鬱結氣閉解消渴定脹喘潤肺止嗽但其氣味悍劣善動惡心嘔吐中氣虛者不宜用本草言其補虛勞殊為大謬

天花粉 百十 即瓜蔞根

味苦性寒氣味頗輕有升有降陰中有陽故凉心肺善解熱渴大降膈上熱痰消乳癰腫毒痔瘻瘡瘍排膿生肌長肉除跌撲瘀血通月水除往熱去黃疸潤枯燥善解酒毒亦通小腸治肝火疝痛

金銀花 百十一 一名忍冬

味甘氣平其性微寒善於化毒故治癰疽腫毒瘡癬楊梅風濕諸毒誠為要藥毒未成者能散毒已成者能潰但其性緩用須倍加或用酒煮服或搗汁攙酒頓飲或研爛拌酒厚敷若治瘰癧上部氣分諸毒用一兩許時常煎服極效

葛根 百十二

味甘氣平寒氣輕於味浮而微降陽中微陰用此者用其凉散雖善達諸陽經而陽明為最以其氣輕故善解表發汗凡解散之藥多辛熱此獨凉而甘故解溫熱時行疫疾凡熱而兼渴者此為最良當以為君而佐以柴防甘桔極妙尤散鬱火療頭痛治溫瘧往來瘡疹未透解酒除煩生津止渴除胃中熱狂殺野葛巴豆毒箭金瘡等傷但其性凉易於動嘔胃寒者所當慎用

茜草 百十三 亦名過山龍

味苦甘氣微寒陰中微陽血中要藥其味苦故能行滯血其性凉故能止動血治勞傷吐衄時來除虛熱漏崩不止亦通經滯又療乳癰散跌撲血凝瘀聚解蠱毒敗血爛肝凡諸血熱血瘀並建奇功若女人經血不通以一兩酒煎服之一日即通甚效若氣虛不攝血及脾寒者勿用

土茯苓 百十四 一名仙遺糧

味甘淡性平能健脾胃強筋骨去風濕利關節分水道止瀉痢治拘攣骨痛瘰癧癰腫喉痹除周身寒濕惡瘡尤解楊梅瘡毒及輕粉留毒潰爛疼痛諸證凡治此者須忌茶酒牛羊雞鵝及一應發風動氣等物

使君子 百十五

味甘氣溫有小毒性善殺蟲治小兒疳積小便白濁凡大人小兒有蟲病者但於每月上旬侵晨空腹食數枚或即以殼煎湯嚥下次日蟲皆死而出也或云七生七煨食亦良或云一歲食一枚食後忌飲熱茶犯之即作瀉凡小兒食此亦不宜頻而多大約性滑多則能傷脾也李時珍曰凡殺蟲藥多是苦辛惟使君子榧子甘而殺蟲亦異也但使君子專殺蛔蟲榧子專殺寸白蟲耳

牽牛 百十六 一名黑丑

味苦辛熱氣雄烈性急疾有毒下氣逐水通大小便善走氣分通水道消氣實氣滿水腫及癥積落胎殺蟲瀉蟲毒去濕熱痰飲開氣秘氣結古方多為散丸若用救急亦可佐群藥煎服然大泄元氣凡虛弱之人須忌之

防巳 百十七

味苦性寒陰也降也去濕熱水腫利大小便解諸經熱壅腫痛濕熱脚氣通九竅熱閉逐膀胱肝腎濕熱及熱毒諸瘡濕熱生蟲等證

萆薢 百十八

味微甘而淡氣溫能溫腎去濕理陰痿陰寒失溺白濁莖中作痛及四肢癱瘓不遂周身風濕惡瘡性味純緩用宜大劑

鉤藤 百十九

味微甘微苦性微寒能清手厥陰之火足厥陰足少陽之風熱故專理肝風相火之病凡大人小兒驚癇眩運斑疹天釣頭旋頸氣等證用之但風靜火息則諸證自除矣

山豆根 百二十

味大苦大寒解諸藥熱毒消癰腫瘡毒殺寸白諸蟲含而嚥汁解咽喉腫痛研水湯服五七分解內熱喘滿腹脹磨汁服解熱厥心痛研汁塗諸熱毒瘡腫痛及諸蟲熱毒所傷

威靈仙 百二十一

味微辛微鹹性溫可升可降陰中陽也善逐諸風行氣血走經絡宣通五臟去腹內冷滯心膈痰水癥瘕痃癖氣塊積聚膀胱宿水腰膝肢體冷痛亦療折傷此藥性利善走乃治痛風之要藥故崔元亮言其去衆風通十二經脈朝服暮效其法采得根陰乾月餘搗末溫酒調服一錢匕空腹服之如人本性殺藥可加及六錢微利兩行則減之病除乃停藥其性

甚善不觸諸藥但惡茶及麪湯李時珍曰威靈仙辛能泄氣鹹能泄水故於風濕痰飲之病氣壯者服之有捷效其性大抵疎利久服恐損真氣氣弱者亦不可服之

馬兜鈴 百二十二

味微苦微辛性寒氣輕陰中微陽入手太陰肺經降肺火清肺氣除熱痰欬嗽喘急不得臥多用則作吐凡蠱毒亦令吐於飲食中得之咽中如有物嚥不下吐不出者以此一兩煎湯服之即吐毒從吐出若治痔瘻腫痛用馬兜鈴於瓶中燒烟熏病處良

青木香 百二十三 即馬兜鈴根亦名土木香
味苦微辛性寒有毒能吐能利不可多服煮汁服可吐蠱毒
鬼疰諸毒搗末水調塗疔腫熱毒蛇毒日三四次立瘥亦可
傅瘰癧禿瘡

白斂 百二十四
味苦微寒性斂取根搗傅癰毒及面上瘡疱刀箭傷湯火毒
諸瘡不斂生肌止痛俱宜為末傅之若為丸散亦治眼目赤
痛小兒驚癇婦人陰中腫痛赤白帶下

木通 百二十五 亦名通草
味苦氣寒沉也降也能利九竅通關節消浮腫清火退熱除
煩渴黃疸治耳聾目痛天行時疾頭痛鼻塞目眩瀉小腸火
鬱利膀胱熱淋導痰濕嘔噦消癰腫壅滯熱毒惡瘡排膿止
痛通婦人血熱經閉下乳汁消乳癰血塊催生下胎若治小
水急熱疼痛小腹虛滿宜加葱煎飲若治喉痺咽痛宜濃煎
含嚥

毒草部

附子 百二十六
氣味辛甘腌者大鹹性大熱陽中之陽也有毒畏人參黃芪
甘草黑豆綠豆犀角童便烏韭防風其性浮中有沉走而不
守因其善走諸經故曰與酒同功能除表裏沉寒厥逆寒噤
溫中強陰煖五藏回陽氣除嘔噦霍亂反胃噎膈心腹疼痛
脹滿瀉痢肢體拘攣寒邪濕氣胃寒蚘蟲寒痰寒疝風濕麻
痺陰疽癰毒久漏冷瘡格陽喉痺陽虛二便不通及婦人經
寒不調小兒慢驚等證大能引火歸源制伏虛熱善助參芪
成功尤贊术地建效無論表證裏證但脈細無神氣虛無熱
者所當急用故虞摶曰附子稟雄壯之質有斬關奪將之氣

能引補氣藥行十二經以追復散失之元陽引補血藥入血
分以滋養不足之真陰引發散藥開腠理以驅逐在表之風
寒引溫煖藥達下焦以祛除在裏之冷濕吳綬曰附子乃陰
證要藥凡傷寒傳變三陰及中寒夾陰雖身大熱而脈沉者
必用之或厥冷脈沉細者尤急須用之有退陰回陽之力起
死回生之功近世陰證傷寒往往疑似而不敢用直待陰極
陽竭而用已遲矣且夾陰傷寒內外皆陰舍此不用將何以
救之此二公之言皆至言也不可不察惟孕婦忌服下胎甚
速合葱涎塞耳亦可治聾

辨製法　附子製法稽之古者則有單用童便煮者有用薑汁鹽水者有用甘草黃連者有數味皆兼而用者其中宜否最當詳辨夫附子之性熱而剛急走而不守土人腌以重鹽故其味鹹而性則降今之所以用之者正欲用其熱性以回元陽以補脾腎以行參芪熟地等功若制以黃連則何以藉其回陽若制以鹽水則反以助其降性若制以童便則必不免於尿氣非惟更助其降而凡脾氣大虛者極易嘔噦一聞其臭便動惡心是藥未入口而先受其害且其沉降尤速何以達脾惟是薑汁一制頗通第其以辛助辛似欠和平若果

直中陰寒等證欲用其熱此法爲良至若當用而欲得其補性者不必用此又若煮法若不浸脹而煮則其心必不能熟即浸脹而煮及其心熟則邊皮已太熟而失其性矣雖破而爲四片煮亦不能匀且煮者必有汁而汁中所去之性亦已多矣皆非制之得法者

製法　用甘草不拘大約酌附子之多寡而用甘草煎極濃甜湯先浸數日剝去皮臍切爲四塊又添濃甘草湯再浸二三日捻之軟透乃咀爲片入鍋文火炒至將乾庶得生熟匀等口嚼尚有辣味是其度也若炒太乾則太熟而全無辣味并其熱性全失矣故制之太過則但用附子之名耳效與不效無從驗也其所以必用甘草者蓋以附子之性急得甘草而後緩附子之性毒得甘草而後解附子之性走得甘草而後益心脾附子之性散得甘草而後調營衛此無他亦不過濟之以仁而後成其勇耳若欲急用以厚紙包裹沃甘草湯或煨或炙待其柔軟切開再用紙包頻沃又炙以熟爲度亦有用麵裹而煨者亦通若果真中陰寒厥逆將危者緩不及制則單用炮附不必更用他製也

辨毒　附子之性剛急而熱制用失宜難云無毒故欲制之

得法夫天下之制毒者無妙於火火之所以能制毒者以能革物之性故以氣而遇火則失其氣味而遇火則失其味剛者革其剛柔者失其柔故制毒之法但用白水煮之極熟則亦全失辣味并其熱性俱失彼即嘗之可食矣尚何毒之足慮哉今人制之但用甘草者蓋欲存留其性而柔和其毒也今人但知附子之可畏而不知太熟之無用也故凡食物之有毒者但制造極熟便當無害即河豚生蟹之屬有毒於人者皆其欠熟而生性之未盡也故凡食物之有毒者皆可因此以類推矣至若藥餌之中有當煨炙而用者又何以然大

物之經火煅者其味皆鹹澁而所以用煅者非欲去其生剛
之性則欲用其鹹澁之味而留性與不留性則其中各有宜
否故凡當煅煉而用者皆可因此以類推矣又如藥之性毒
者何可不避即如本草所云某有毒某無毒余則甚不然之
而不知無藥無毒也故熱者有熱毒寒者有寒毒若用之不
當凡能病人者無非毒也即如家常茶飯本皆養人之正味
其或過用誤用亦能毒人而況以偏味偏性之藥乎但毒有
大小用有權宜此不可不察耳矧附子之性雖云有毒而實
無大毒但製得其法用得其宜何毒之有今之人不知其妙

且并人參熟地而俱畏之夫人參熟地附子大黃實乃藥中
之四維病而至於可畏勢非庸庸所濟者非此四物不可設
若逡巡必誤乃事今人直至必不得已而後用附子事已無
濟矣事無濟則反罪之將咎于誠廢物乎噫夫人之所以生
者陽氣耳正氣耳人之所以死者陰氣耳邪氣耳人參熟地
者治世之良相也附子大黃者亂世之良將也兵不可久用
故良將用於暫亂不可忘治故良相不可缺矧夫附子雖烈
而其性扶陽有非硝黃之比硝黃似緩而其性陰泄又非桂
附可例華元化曰得其陽者生得其陰者死內經曰門戶不
要是倉廩不藏也得守者生失守者死今之人履芒硝大黃
若坦途視參附熟地為蛇蠍愚耶知耶

白附子 百二七

味甘辛大溫有小毒其性升能引藥勢上行治頭風諸風冷
氣心疼風痰眩暈帶濁疥癬小兒驚風痰搐及面鼻遊風䵟斑
風刺去面痕可作面脂亦治疥癬風瘡陰下濕癢風濕諸病
凡欲入藥炮而用之

大黃 百二八

味苦氣大寒氣味俱厚陰中之陰降也有毒其性推陳致新

直走不守奪土鬱壅滯破積聚堅癥療瘟疫陽狂除斑黃譫
語滌實痰導瘀血通水道退濕熱開燥結消癰腫因有峻烈
威風積垢蕩之頃刻欲速者生用湯泡便吞欲緩者熟用和
藥煎服氣虛同以人參名黃龍湯血虛同以當歸名玉燭散
佐以甘草桔梗可緩其行佐以芒硝厚朴益助其銳用之多
寡酌人實虛假實誤用與鴆相類

常山 百二九

味大苦性寒有毒攻瘟瘧痰瘧及傷寒寒熱痰結氣逆狂癇
癲厥癥瘕腹多滯邪實氣壯而病瘧者宜之若老人弱人俱

當忌用蓋此物性悍專逐痰飲得甘草則上行發汗得大黃
則下行發瀉也亦治鬼毒蠱毒及頭項瘰癧風瘙

半夏 百二十

味大辛微苦氣溫可升可降陽中陰也有毒其質滑潤其性
燥濕降痰入脾胃膽經生嚼戟喉制用生薑下肺氣開胃健
脾消痰飲痞滿止咳嗽上氣心痛脇痛除嘔吐反胃霍亂轉
筋頭眩腹脹不眠氣結痰核腫突去痰厥頭痛散風閉喉瘖
治脾濕泄瀉遺精帶濁消癰腫疥毒殺蜈蚣蜂蠆虫毒性能
墮胎孕婦雖忌然胃不和而嘔吐不止加薑汁微炒但用無

妨若消渴渴及陰虛血證最忌勿加○李時珍曰半夏能主
痰飲及腹脹者爲其體滑而味辛性溫也滑則能潤辛溫能散
亦能潤故行濕而通大便利竅而泄小便所謂辛走氣能化液
辛以潤之是矣丹溪曰二陳湯能使大便潤而小便長成聊攝
云半夏辛而散行水而潤腎燥又局方用半硫丸治老人虛秘
皆取其滑潤也世俗皆以半夏南星爲性燥誤矣濕去則土燥
痰涎不生非二物之性燥也古方治咽痛喉痺吐血下血多用
二物非禁劑也二物亦能散血故破傷打撲皆主之

南星 百

味苦辛氣溫可升可降陽中陰也性烈有毒薑汁制用善行
脾肺墜中風實痰利胸膈下氣攻堅積治驚癇散血墮胎水
腫搖蛇虫咬毒醋調散腫破傷風金瘡折傷瘀血宜搗傳之
功同半夏耐用可也

膽星 百二十二

七製九製者方佳降痰因火動如神治小兒急驚必用總之
實痰實火壅閉上焦而氣喘煩躁焦渴脹滿者所當必用較
之南星味苦性涼故善解風痰熱滯

射干 百二十三

味苦性寒有毒陰也降也苦能泄逆上火除喉痺咽痛散結氣不
得息除胸腹邪熱脹滿消瘀明目消積痰結核瘰癧熱疝降
實火利大腸消瘀血通女人月閉若酒磨塗可消腫毒

大戟 百二十四

味苦大寒有毒反甘草性峻利善逐水邪痰涎瀉濕熱脹滿
消急痛破癥結下惡血攻積聚通二便殺蠱毒藥毒療天行
瘟疫黃病及頸腋癰腫然大能瀉肺損真氣非有大實堅者不
宜輕用若中其毒惟菖蒲可以解之

甘遂 百

味苦性寒有毒反甘草專於行水能直達水結之處如水結胸者非此不除若留痰留飲宿食癥堅積聚無不能逐故善治腫脹腳氣陰囊腫脹大面目浮腫通二便瀉膀胱濕熱及痰逆癲癇噎膈痞塞然性烈傷陰不宜妄用

芫花 百三十六 反甘草

味苦微溫有毒專逐五臟之水去水飲寒痰痰癖脅下痛欬逆上氣心腹脹滿疥瘡鬼疰濕毒寒毒蠱毒肉毒蟲魚毒除蛔瘕癰腫逐惡血消咽腫根療疥瘡亦可毒魚若搗汁浸線亦能繫落痔瘡但其多毒殆者不可輕用

玉簪 百三七

味甘辛性寒有小毒用根搗汁解一切諸毒下一切骨哽塗癰腫治婦人乳癰初起但取根搗酒服之仍以渣傅腫處即消然性能損齒故亦可落齒取牙

鳳仙花 百三八

味微苦性微溫有小毒子名急性子治難產下胎消積塊開噎膈下骨哽亦善透骨通竅故又名透骨草若欲取牙但用子研末入砒少許點疼牙根即可取之然此不生蟲蟻即蜂蝶亦不近似非無毒者也

蓖麻子 百三九

味甘辛性熱有毒能逐風散毒療口眼喎斜失音口噤癰毒丹瘤鍼刺入肉止痛消腫追膿拔毒俱可研貼若治舌腫喉痺宜研爛紙捲燒烟薰吸立通催生下胎可同麝香巴豆研貼臍中李時珍曰一人病偏風手足不舉用此油同羊脂麝香穿山甲煎膏日摩數次兼服搜風養血之藥而愈一人病手臂一塊腫痛用此搗膏貼之一夜而愈一人病氣鬱偏頭痛用此同乳香食鹽搗貼太陽一夜痛止一婦產後子腸不收搗仁貼其丹田一夜而上此藥外用屢奏奇效但內服不

可輕率爾或言搗膏以筯點於鵝鴨六畜舌根下即不能食點於肛門內即下血死其毒可知凡服蓖麻者一生不得食炒豆犯之必脹死

續隨子 百四十 一名千金子

味辛性溫有毒能逐瘀血消痰飲食積癥瘕痃癖除蠱毒鬼疰水氣冷氣心腹脹滿疼痛腹內諸疾利大小腸袪惡滯及婦人血結血閉瘀血等證研碎酒服不過三顆當下惡物甚者十粒若瀉多以酸漿水或薄醋粥食之即止亦可研塗疥癬惡瘡此物之功長於逐水殺蟲是亦甘遂大戟之流也

木鱉子 又百四十

味苦微甘微辛氣雄劣性大寒有大毒本草言其甘溫無毒謬也今見毒狗者能斃之於頃刻使非大毒而有如是乎人若食之則中寒發噤不可解救按劉績霏雪錄云木鱉子有毒不可食昔一薊門人有兩子患痞食之相繼皆死此不可不慎也若其功用則惟以醋磨用敷腫毒乳癰痔漏腫痛及喉痺腫痛用此醋漱於喉間引痰吐出以解熱毒不可嚥下或同硃砂艾葉捲筒薰疥殺蟲最效或用熬麻油搽癬亦佳

番木鱉 味極苦性大寒大毒功用與木鱉大同而寒烈之性尤甚

全書卷四十八終

會稽 張介賓 會卿著
瀛海 賈 棠 青南訂

水石草部

石斛 百四一

此藥有二種力皆微薄圓細而肉實者味微甘而淡其力尤薄本草云圓細者為上且謂其益精強陰壯筋補虛健脚膝驅冷痺卻驚悸定心志但此物性味最薄焉能滋補如此惟是扁大而鬆形如釵股者頗有苦味用除脾胃之火去嘈雜善飢及營中蘊熱其性輕清和緩有從容分解之妙故能退火養陰除煩清肺下氣亦止消渴熱汗而諸家謂其厚腸胃健陽道暖水臟豈苦涼之性味所能也不可不辨

菖蒲 百四二

味辛微苦性溫散風寒濕痺除煩悶欬逆上氣止心腹痛霍亂轉筋癲癇客忤開心氣胃氣行滯氣通九竅益心智明耳目去頭風淚下出聲音溫腸胃暖丈夫水臟婦人血海禁止小便辟邪逐鬼及中惡卒死殺蟲療惡瘡疥癬及欲毒宜

清石服用塗貼之若治耳痢宜作末炒熱綿裹塞之亦解巴
豆大戟等毒

蒲黃　百四三

味微甘性微寒解心腹膀胱寒熱疼痛利小便善止血凉血活血消瘀血治吐血衂血崩血尿血通婦人經脉止崩中帶下月經不調妊娠胎漏墜胎血運血癥兒枕氣痛及跌撲血悶瘡瘍癰腫遊風腫毒亦下乳汁亦止洩精凡欲利者宜生用欲固者宜炒熟用

澤瀉　百四四

味甘淡微鹹氣寒氣味頗厚沉而降陰也陰中微陽入足太陽少陽其功長於滲水去濕故能行痰飲止嘔吐瀉痢通淋瀝白濁大利小便瀉伏火收陰汗止尿血瘀難產疝痛脚氣腫脹引藥下行經云除濕止渴聖藥通淋利水仙丹第其性降而利善耗真陰久服能損目瘻陽若濕熱壅閉而目不明者此以去濕故亦能明目

海藻　百四五　海帶　昆布　性用略同

味苦鹹性微寒陰也降也善降氣清熱消胸中痰壅故善消頸項瘿瘤結核及癰腫瘰癧利小便逐水氣治濕熱氣急腹

中上下雷鳴疼痛療痰氣疼痛消奔豚水氣浮腫及百邪鬼魅熱毒

骨碎補　百四六

味微苦性溫平乃足少陰厥陰肝腎藥也能活血止血補折傷療骨中邪毒風熱疼痛及痢後下虛或遠行或房勞或外感風濕以致兩足痿弱疼痛俱宜以四斤丸補陰藥之類佐而用之或炒熟研末用豬腰夾煨空心食之能治耳鳴及腎虛久痢牙疼

竹木部

竹瀝　百四七

味甘性微凉陰也降也治暴中風痰失音不語胸中煩熱止煩悶消渴勞復凡風痰虛痰在胸膈使人癲狂及痰在經絡四肢皮裏膜外者非此不達不行

天竹黃　百四八

味甘淡氣平微凉陰中微陽氣味俱輕清上氣咳逆喘促消痰涎解熱狂退虛熱煩躁不眠壯熱驚癇止吐血專凉心經

亦清脾氣卻風熱止煩渴生津液利小水解喉痺并小兒風熱驚癇

淡竹茹 百四九

味甘微凉治肺痿唾痰唾血吐血衄血尿血胃熱嘔噦噎膈婦人血熱崩淋胎動及小兒風熱癲癇痰氣喘欬小水熱澀

天竹黃 百五十

味甘辛性凉降也陰中有陽善開風痰降熱痰治中風失音痰滯胸膈煩悶癲癇清心火鎮心氣醒脾疏肝明眼目安驚悸療小兒風痰急驚客忤其性和緩最所宜用亦治金瘡并內熱藥毒

官桂 百五一

味辛甘氣大熱陽中之陽也有小毒必取其味甘者乃可用桂性熱善於助陽而尤入血分四肢有寒疾者非此不能達桂枝氣輕故能走表以其善調營衛故能治傷寒發邪汗療傷風止陰汗肉桂味重故能溫補命門堅筋骨通血脈治心腹寒氣頭疼欬嗽鼻齆霍亂轉筋腰足臍腹疼痛一切沉寒痼冷之病且桂為木中之王故善平肝木之陰邪而不知善助肝膽之陽氣惟其味甘故最補脾土凡肝邪尅土而無火者用此極妙與參附地黃同用最降虛火及治下焦元陽虧乏與當歸川芎同用最治婦人產後血瘀兒枕腹痛及小兒痘疹虛寒作癢不起雖善墮胎動血用須防此二證若下焦虛寒法當引火歸元者則此為要藥不可誤執

丁香 百五二

味大辛氣溫純陽入腎胃肺藏能發諸香辟惡去邪溫中快氣治上焦呃逆翻胃霍亂嘔吐解酒毒消痃癖奔豚陰寒心腹脹滿冷痛煖下焦腰膝壯陽道抑陰邪除胃寒瀉痢殺鬼疰蠱毒殺疳蝕消騷臭口氣齲牙及婦人七情五鬱小兒吐瀉痘瘡胃寒灰白不發

白檀香 百五三

味辛氣溫能散風熱辟穢惡邪氣消癰毒逐鬼魅煎服之可散冷氣止心腹疼痛定霍亂和胃氣開噎膈止嘔吐進飲食又治面生黑子每夜以漿水洗拭磨汁塗之甚良

沉香 百五四

味辛氣微溫陽也可升可降其性緩故能抑陰助陽扶補相火其氣辛故能通天徹地條達諸氣除轉筋霍亂和噤口瀉痢調嘔逆胃翻噎膈止心腹脹滿疼痛破癥瘕療寒痰和脾

胃逐鬼疰蠱氣及風濕骨節癱瘓皮膚瘙癢結氣

烏藥 百五五

氣味辛溫善行諸氣入脾胃肝腎三焦膀胱諸經療中惡鬼氣蠱毒開胸膈除一切冷氣止心腹疼痛喘急霍亂及胃腹滿溫腸胃行宿食止瀉痢除天行疫瘴氣厥頭痛膀胱腎氣攻衝心腹疝氣腳氣癰疽疥癩及婦人血氣小兒蟲積亦由小便頻數氣淋帶濁并猫犬百病俱可磨汁灌治之

枸杞 百五六

味甘微辛氣溫可升可降味重而純故能補陰陰中有陽故能補氣所以滋陰而不致陰衰助陽而能使陽旺雖諺云離家千里勿食枸杞不過謂其助陽耳似亦未必然也此物微助陽而無動性故用之以助熟地最妙其功則明耳目壯神魂添精固髓健骨強筋善補勞傷尤止消渴真陰虛而臍腹疼痛不止者多用神效

地骨皮 百五七

枸杞根也南者苦味輕微有甘辛北者大苦性劣入藥惟南者為佳其性辛寒善入血分肝腎三焦膽經退陰虛血熱骨蒸有汗止吐血衄血解消渴療肌膚骨髓中陰虛伏火煎湯漱

口止齒血凡不因風寒而熱在精髓陰分者最宜此物涼而不峻可理虛勞氣輕而辛故亦清肺假熱者勿用

厚朴 百五八

味苦辛氣大溫氣味俱厚陽中之陰可升可降有小毒用此者用其溫降散滯制用薑汁炒治霍亂轉筋消痰下氣止咳嗽嘔逆吐酸殺腸臟諸蟲宿食不消去結水破宿血除寒濕瀉痢能緩脾胃善走冷氣總之逐實邪瀉膨脹散結聚治胸腹疼痛之要藥倘本元虛弱誤服脫人真氣孕婦忌用墮胎須知

棗仁 百五九

味微甘氣平其色赤其肉味酸故名酸棗其仁居中故性主收斂而入心多眠者生用不眠者炒用寧心志止虛汗解渴去煩安神養血益肝補中收斂魂魄

杜仲 百六十

味甘辛淡氣溫平氣味俱薄陽中有陰其功入腎用薑汁或鹽水潤透炒去絲補中強志壯腎添精腰痛殊功足疼立效除陰囊寒濕止小水夢遺因其氣溫故暖子宮因其性固故安胎氣內熱火盛者亦當緩用

山茱萸 百六一

味酸澁主收斂氣平微溫陰中陽也入肝腎二藏能固陰補精煖腰膝壯陰氣止帶濁節小便益髓興陽調經收血若脾氣大弱而畏酸者姑暫止之或和以甘草煨薑亦可

蘇木 百六二

味微甘微辛性溫平可升可降乃三陰經血分藥也少用則和血活血多用則行血破血主婦人月經不調心腹作痛血瘀氣壅凡產後血瘀脹悶勢危者宜用五兩水煮濃汁服之亦消癰腫死血排膿止痛及打撲瘀血可敷若治破傷風宜為末酒服立效

川椒 百六三

味辛性熱有小毒本純陽之物其性下行陽中有陰也主溫中下氣開通腠理散肌表寒邪除藏府冷痛去胸腹留飲停痰宿食解鬱結溫脾胃止欬逆嘔吐逐寒濕風痛療傷寒溫瘧水腫濕疸除齒痛煖腰膝收陰汗縮小便溫命門止泄瀉下痢遺精脫肛殺蛔蟲鬼疰蟲毒蛇虫諸毒久服之能通神明實腠理和血脉堅齒牙生鬚髮明耳目調關節耐寒暑若中其毒惟冷水麻仁漿可以解之

胡椒 百六四

味辛性大熱純陽也善走氣分溫中下氣煖腸胃消宿食辟臭惡除寒濕寒痰寒飲吐水止反胃嘔吐霍亂虛寒脹滿心腹疼痛去冷積陰毒壯腎氣治大腸寒滑冷痢殺一切魚肉鼈蕈諸藥食陰凝之毒若治風虫牙痛須同華茇為末熔蠟為細丸塞孔中即愈

金櫻子 百六五

味澁性平生者色青酸澁熟者色黃甘澁當用其將熟微酸而甘澁者為妙其性固澁可固陰治脫甘可補中益氣故善理夢遺精滑及崩淋帶漏止吐血衄血生津液安魂魄收虛汗斂虛火益精髓壯筋骨補五藏養血氣平欬嗽定喘急療怔忡驚悸止脾泄血痢及小水不禁此固陰養陰之佳品而人之忽之亦久矣此後咸宜珍之

槐蕊 百六六

味苦性寒清心肺脾肝大腸之火除五內煩熱心腹熱痰疥眼目赤痛熱淚炒香嚼咽治失音喉痺止吐血衄血腸風下血婦人崩中漏下及皮膚風熱涼大腸殺疳虫治癰疽瘡毒陰瘡濕癢痔漏解楊梅惡瘡下疳伏毒大有神效

柏子仁 百六七

味甘平性微凉能潤心肺養肝脾滋腎燥安神魂益志意故可定驚悸怔忡益陰氣美顏色療虛損益血止汗潤大腸利虛秘亦去百邪鬼魅小兒驚癇總之氣味清香性多潤滑雖滋陰養血之佳劑若欲培補根本乃非清品所長

枳殼 百六八

即枳實之遲收而大者較之枳實其氣畧散性亦稍緩功與枳實大類但枳實性重多主下行削堅而此之氣輕故多主上行破氣通利關節健脾開胃平肺氣止嘔逆反胃霍亂瀉

痢消痰消食破心腹結氣癥瘕痃癖胸脇脹滿痰滯逐水腫水濕瀉痢腸風痔漏肛門腫痛因此稍緩故可用之束胎安胎炙熱可熨痔腫虛者少用恐傷元氣

枳實 百六九

味苦微酸微寒氣味俱厚陰中微陽其性沉急於枳殼除脹滿消宿食削堅積化稠痰破滯氣平欬喘逐瘀血停水解傷寒結胸去胃中濕熱佐白朮亦可健脾佐大黃大能推蕩能損真元虛者勿用

蔓荊子 百七十

味苦辛氣清性溫升也陽也入足太陽陽明厥陰經主散風邪利七竅通關節去諸風頭痛腦鳴頭沉昏悶搜肝風止目睛內痛淚出明目堅齒療筋骨間寒熱濕痺拘攣亦去寸白虫

五加皮 百七一

味辛性溫除風濕行血脈壯筋骨明目下氣治骨節四肢拘攣兩腳痺痛風弱五緩陰痿囊濕疝氣腹痛小便遺瀝女人陰癢凡釀浸酒藥惟五加皮與酒相合大能益人且味美也仙家重此謂久服可以長生故曰寧得一把五加不用金銀滿車雖未必然然亦必有可貴者

川楝子 百七二

味苦性寒有小毒陰也能治傷寒瘟疫煩熱狂躁利小水瀉肝火小腸膀胱濕熱諸疝氣疼痛殺三蟲疥癩亦治陰痔丸散湯藥任意可用甄權言其不入湯使則失之矣

苦楝根 味大苦殺諸蟲尤善逐蛔利大腸治遊風熱毒惡瘡苦酒和塗疥癬甚良

女貞子 一七三

味苦性涼陰也降也能養陰氣平陰火解煩熱骨蒸止虛汗

消渴及淋濁崩漏便血尿血陰瘡痔漏痠痛亦清肝火可以明目止淚

桑白皮 百七四

味甘微辛微苦氣寒氣味俱薄升中有降陽中有陰入手太陰肺藏氣寒味辛故瀉肺火以其味甘故緩而不峻止喘嗽唾血亦解渴消痰除虛勞客熱頭痛水出高原故清肺亦能利水去寸白殺腹藏諸虫研汁治小兒天吊驚癇客忤及傅鵝口瘡大效作線可縫金瘡既瀉肺實又云補氣則未必然

黃蘗 百七五

味苦微辛氣寒陰中微陽降也昔降三焦之火制各以類但其性多沉尤專肝腎故曰足少陰本經足太陽厥陰之引經也清胃火嘔噦蛔虫除伏火骨蒸煩熱去腸風熱痢下血痔二便邪火結淋上可解熱渴口瘡喉痺癰瘍下可去足膝濕熱疼痛痿躄此其性寒潤降去火最速丹溪言其制伏龍火補腎強陰然龍火豈沉寒可除水枯豈苦劣可補陰虛水竭得降愈亡脾弱火僭者得寒愈熾此非水未涸而火盛者用以抽薪則可水既竭而枯熱者用以補陰實難當局者慎勿認為補劑〇亦嘗閱之丹溪曰火有二君火者人火也心火也可以濕伏可以水滅可以直折黃連之屬可以制之相火者天火也龍雷之火也陰火也不可以水濕折之當從其性而伏之惟黃蘗之屬可以降之按此議論若有高見而實矯強之甚大是誤人大所謂從其性者即內經從治之說也經曰正者正治從者反治正治者謂以水制火以寒治熱也從治者謂以火濟火以熱治熱也亦所謂甘溫除大熱也豈以黃連便是正治黃蘗便是從治乎即曰黃連主心火黃蘗主腎火然以便血溺血者俱宜黃連又豈非膀胱大腸下部藥乎治舌瘡口瘡者俱宜黃蘗又豈非心脾上部藥乎總之黃連黃蘗均以大苦大寒之性而曰黃連為水黃蘗非水黃連為瀉黃蘗為補豈理也哉若執此說誤人多矣誤人多矣

梔子 百七六

味苦氣寒味厚氣薄氣浮味降陰中有陽因其氣浮故能清心肺之火解消渴除熱鬱療時疾躁煩心中懊憹熱悶不得眠熱厥頭疼耳目風熱赤腫疼痛霍亂轉筋因其味降故能瀉肝腎膀胱之火通五淋治大小腸熱秘熱結五種黃疸三焦鬱火臍下熱鬱疝氣吐血衄血血痢血淋小腹損傷瘀血若用佐使治有不同加茵陳除濕熱疸黃加豆豉除心火煩

躁加厚朴枳實可除煩滿加生薑陳皮可除嘔噦同玄胡索
破熱潛瘀血腹痛此外如角赤酒破熱合蕩火瘡瘍腫痛皆
所宜用仲景因其氣浮而升極易動可故用爲吐藥以去上
焦痰滯丹溪謂其解鬱熱行結氣其性屈曲下行大能降火
從小便泄去人所不知

郁李仁　百七七

味苦辛陰中有陽性潤而降故能下氣消食利水道消面目
四肢大腹水氣浮腫開腸中結氣滯氣關膈燥澀大便不通
破血積食癖凡婦人小兒實熱結燥者皆可用

訶子　百七八

味苦酸澀氣溫苦重酸輕性沉而降陰也能消宿食膨脹止
嘔吐霍亂定喘止嗽破結氣安久痢止腸風便血降痰下氣
開滯澀腸通津液療女人崩中胎漏帶濁霍亂不常若久
痢肛門急痛或產婦陰痛者宜和蠟燒煙熏之或煎湯熏洗
亦可若嗽咳久不利宜含數枚咽津殊效其有上焦元氣
虛陷者當避其苦降之性

側柏　百七九

味苦氣辛性寒善清血涼血止吐血衄血痢血尿血崩中亦

白去濕熱濕痺骨節疼痛搗爛可傅火丹散瘡腮腫痛熱毒
及湯火傷止痛滅瘢灸搗可署凍瘡燒汁塗髮可潤而使黑

辛夷　百八十　一名木筆　一名迎春

氣味辛溫乃手太陰足陽明之藥能解寒熱憎寒體噤散風
熱利九竅除頭風腦痛眩冒瘙癢疹面腫引齒疼痛若治鼻
塞涕出鼻淵鼻衄鼻瘡及痘後鼻瘡並宜爲末入麝香少許
以葱白蘸藥點入數次甚良

皂角　百八一

氣味辛鹹性溫有小毒善逐風痰利九竅通關節治頭風殺
諸蟲精物消穀導痰除咳嗽心腹氣結疼痛脹滿開中風口
噤治咽喉痺塞腫痛行肺滯通大腸秘結墮胎破堅癥消腫
毒及風癬疥癩燒煙熏脫肛腫痛可爲丸散不入湯藥

巴豆　百八二

味辛性熱有大毒可升可降善開關竅破癥堅積聚逐痰飲
殺諸惡毒蟲毒蠱毒通秘結消宿食攻臟腑停寒生冷壅滯
心腹疼痛瀉痢驚癇諸水氣疝氣下活胎死胎逐瘀血血積
及消癰瘍疔毒惡瘡去瘜肉惡肉腐肉排膿消腫喉痺牙疼
諸證然其性剛氣烈無處不到故稱爲斬關奪門之將若誤

用之則有推牆倒壁之虞若善用之則有戡亂調中之妙用
者所當慎察
密蒙花 百八三
味甘平性微寒入肝經潤肝燥專理目疾痰兩肩去赤腫多
淚消目中赤脈膚翳羞明畏日及小兒疳氣攻目風熱
眼爛雲翳遮睛制用之法宜蜜酒拌蒸三次日乾用
雷丸 百八四
味苦性寒有小毒殺三虫逐蠱毒消積降胃中實熱痰火癲
狂除百邪惡氣并一應血積氣聚

大楓子 百八五
味辛性熱有毒能治風癬疥癩攻毒殺虫亦療楊梅諸瘡
蕪荑 百八六
味辛平性溫主心腹冷氣癥積痰涌散肌膚風濕淫淫如虫
行殺三虫去寸白及諸惡虫毒殺腸風痔漏惡瘡和猪脂搗
塗熱瘡和蜜可治濕癬
茯苓 百八七
味甘淡氣平性降而滲陽中陰也有赤白之分雖本草言赤
瀉丙丁白入壬癸然總不失為泄物故能利竅去濕利竅則

開心益智導濁生津去濕則逐水燥脾補中健胃去驚癇厚
腸藏治痰之本助藥之降以其味有微甘故曰補陽但補少
利多故多服最能損目久弱極不相宜若以人乳拌晒乳粉
既多補陰亦妙
茯神 百八八
附根而生近故能入心經通心氣補健忘止恍惚驚悸雖本
草所言如此然總不外於滲降之物與茯苓無甚相遠也
猪苓 百八九
味微苦甘氣平陽中陰也性善降滲入膀胱腎經通淋消水

腫除濕利小便因其苦故能泄滯因其淡故能利竅亦解傷
寒濕熱脚氣白濁亦治妊娠子淋胎腫
桑寄生 百九十
味苦性涼主女子血熱崩中胎漏固血安胎及產後血熱諸
疾去膚熱濕痺腰膝疼痛長鬚眉堅髮齒涼小兒熱毒癰疽
瘡瘍
琥珀 百九一
味甘淡性平安五臟清心肺定魂魄鎮癲癇殺邪鬼精魅消
瘀血痰涎解蠱毒破癥結通五淋利小便明目磨翳止血生

肌亦合金瘡傷損

松香百九二

味苦辛溫治癰疽惡瘡頭瘍白禿風濕疥瘙消煮研丸可治歷節風痛亦治婦人崩帶煎膏則活血生肌排膿止痛塞牙孔殺虫傳刺入肉中自出加銅末研掺大治金瘡折傷

乳香百九三

味苦辛性溫微熱辟邪惡諸氣治霍亂通血脉止大腸血痢疼痛及婦人氣逆血滯心腹作痛消癰疽諸毒托裏護心活血定痛舒筋脉療折傷煎膏止痛長肉

沒藥百九四

味苦氣平能破血散血消腫止痛療金瘡杖瘡諸惡瘡痔漏癰腫破宿血癥瘕及墮胎產後血氣作痛凡治金刃跌墜損傷筋骨心腹血氣作痛者並宜研爛熱酒調服則推陳致新無不可矣

阿魏百九五

味苦辛性熱有毒其氣辛臭乃能辟鬼臭氣逐瘟疫瘧痢傳尸鬼氣惡氣癥瘕霍亂隔噎癲癇心腹疼痛殺諸小虫牙蟲破癥積消痞塊除蠱毒及一切菌菜牛羊魚肉諸毒或散或丸隨意可服

樟腦百九六

味辛微苦性熱善通關竅破滯氣辟中惡邪氣治疥癬殺虫除蠹著鞋中去脚氣燒烟熏衣等席簟除蚤虱壁虱北方新生小貓極多跳蚤用此拌麪研勻掺擦之則盡落無遺亦妙方也

龍腦百九七 即冰片

味微甘大辛敷用者其凉如冰而氣雄力銳性本非熱陽中有陰也善散氣散血散火散滯通竅辟惡逐心腹邪氣療喉痺腦痛鼻瘜齒痛傷寒舌出小兒風痰邪熱驚癇痘疔黑陷凡氣壅不能開達者咸宜佐使用之亦通耳竅散目熱去目中赤膚翳障逐三虫消五痔療一切惡瘡聚毒下疳痔漏疼痛亦治婦人氣逆難產研末少許新汲水服之則下以熱酒服之則能殺人凡用此者宜少而暫多則走散真氣大能損人

血竭百九八

味甘鹹微澀性平善破積血止痛生肌療金瘡折傷打損血瘀疼痛內傷血逆婦人血氣凝滯亦能生血補虛俱可為末

酒服并治一切惡瘡癬疥久不合口然性能引膿不宜多用

蘆薈 百九九

味大苦性大寒氣味俱厚能升能降除風熱煩悶清肺胃降火凉血清肝明目治小兒風熱急驚癲癇五疳熱毒殺三虫及痔漏熱瘡單用殺疳蛀吹鼻治腦疳鼻熱鼻癢鼻瘡研末傅虫牙同甘草敷濕癬殺虫出黄水極妙

乾漆 二百

味辛性温有毒能破絶傷續筋骨殺三虫去蚘蟲削年深堅結之積滯破日久凝聚之瘀血用須炒熟入藥不爾損人腸

胃若外著其毒而生漆瘡者惟杉木湯紫蘇湯蟹湯浴之可解或用香油調鐵銹塗之

蘇合油 二百一

味甘辛性溫能辟邪惡諸氣殺鬼魅蠱毒虫毒療癲癇溫瘧止氣逆疼痛亦通神明可除夢魘

孩兒茶 二百二

味苦微澀性凉能降火生津清痰涎欬嗽治口瘡喉痺煩熱止消渴吐血衄血便血尿血濕熱痢血及婦人崩淋經血不止小兒疳熱口疳熱瘡濕爛諸瘡斂肌長肉亦殺諸蟲

穀部

麥芽 二百三

味甘微鹹氣溫善於化食和中破冷氣消一切米麪諸果食積去心腹脹滿止霍亂除煩熱消痰飲破癥結寬腸下氣病久不食者可借此谷氣以開胃元氣中虛者毋多用此以消腎亦善催生落胎單服二兩能消乳腫其耗散血氣如此而脾胃虛弱飲食不消方中每多用之何也故婦有胎妊者不宜多服

神麯 二百四

味甘氣平炒黃入藥善助中焦土臟健脾煖胃消食下氣化滯調中逐痰積破癥瘕運化水穀除霍亂脹滿嘔吐其氣腐故能除濕熱其性溫故又治瀉痢瘧疾女人胎動因滯治小兒腹堅因積若婦人產後欲回乳者炒研酒服二錢日二即止其陳者閃挫腰痛者淬酒溫服效良

白扁豆 二百五

味甘氣溫炒香用之補脾胃氣逆和中止嘔吐霍亂解河豚酒毒止泄瀉溫中亦能清暑治消渴欲用輕清緩補者此為最當

薏仁一百六

味甘淡氣微凉性微降而滲故能去濕利水以其去濕故能利關節除脚氣治痿弱拘攣濕痺消水腫疼痛利小便熱淋亦殺蚘虫以其微降故亦治欬嗽唾膿利胸膈以其性凉故能清熱止煩渴上氣但其功力甚緩用為佐使宜倍

綠豆一百七

味甘性凉能清火清痰下氣解煩熱止消渴安精神補五臟除氣去胃火吐逆及吐血衄血尿血便血濕熱瀉痢腫脹利小水療丹毒風疹皮膚燥澁大便秘結消癰腫瘡毒湯火傷

痛解酒毒鴆毒諸藥食牛馬金石諸毒尤解砒霜大毒或用漿作枕大能明耳目并治頭風頭痛

粟殼二百八

味微甘性多澁泡去筋膜醋拌炒用其固大腸久痢滑瀉必用須加甘補同煎久虛咳嗽劫藥欲用須辨虛實脫肛遺精俱所當用濕熱下痢乃非所宜

麻仁二百九　即黃麻也亦名大麻

味甘平性滑利能潤心肺滋五臟利大腸風熱結燥行水氣通小便濕熱秘澁五淋去積血下氣除風濕頑痺關節血燥拘攣止消渴通乳汁產難催生經脉閉滯凡病多燥澁者宜之若下元不固及便泄陽衰精滑多帶者皆所忌用

果部

芡實二百十

味甘氣平入脾腎兩臟能健脾養陰止渴治腰膝疼痛強志益神聰明耳目補腎固精治小便不禁遺精白濁帶下延年耐老或散丸或煮食皆妙但其性緩難收奇效

杏仁二百十一

味苦辛微甘味厚於氣降中有升有毒入肺胃大腸經其味辛故能入肺潤肺散風寒止頭痛退寒熱欬嗽上氣喘急發表解邪療溫病脚氣其味苦降性最疾觀其澄水極速可知故能定氣逆上衝消胸腹急滿脹痛解喉痺消痰下氣除驚癇煩熱通大腸氣閉乾結亦殺狗毒佐半夏生薑散風邪欬嗽佐麻黃發汗逐傷寒表邪同門冬乳酥煎膏潤肺治欬嗽極妙同輕粉研勻油調敷廣瘡肿毒最佳尤殺諸虫牙虫及頭面䵟斑瘡疱元氣虛陷者勿用恐其沉降太泄

桃仁二百十二

味苦辛微甘氣平陰中有陽入手足厥陰經去皮尖用善治瘀血血閉血結血燥通血隔破血癥殺三蟲潤大便逐瘀滯止鬼疰血逆疼痛膨脹撲跌損傷若血枯經閉者不可妄用

木瓜二十三

味酸氣溫用此者用其酸斂酸能走筋斂能固脫入脾肺肝腎四經亦善和胃得木味之正故尤專入肝益筋走血療腰膝無力腳氣引經所不可缺氣滯能和氣脫能固以能平胃故除脹逆霍亂轉筋除痰去濕行水以其酸收故可斂肺禁痢止煩滿止渴

陳皮二十四

味苦辛性溫散氣實痰滯必用留白者微甘而性緩去白者用辛而性速寫脾胃痰涎消膈中滯氣消食開胃利水通便吞酸嘈雜反胃嘔噦能逆底滿嘔除痞呃惡心皆效通達上下解酒除蟲表裏俱宜癰疽亦用尤消婦人乳癰并解魚肉諸毒

青皮二十五

味苦辛微酸味厚沉也陰中之陽苦能去滯酸能入肝又入少陽三焦膽府倒壁癖除脇痛解鬱怒劫疝疏肝破滯氣寬胸消食老弱虛羸戒之勿用

檳榔二十六

味辛澀微苦微甘氣微溫味厚氣薄降中有升陰中陽也能消宿食解酒毒除痰癖宣壅滯溫中快氣治腹脹積聚心腹疼痛喘急通關節利九竅逐五鬲奔豚膀胱諸氣殺三蟲除腳氣瘴瘧瘟疫邪本草言其治後重如馬奔此亦因其性溫行滯而然若氣虛下陷者乃非所宜又言其破氣極速較枳實尤甚若然則廣南之人朝夕笑噬而無傷又豈破氣極速者穩之此物性溫而辛故能醒脾利氣味甘兼澀故能固脾壯氣是誠行中有留之劑觀鶴林玉露云飢能使之飽飽能使之飢醉能使之醒醒能使之醉於此四句詳之可得其性矣○其服食之法小者氣烈俱以入藥廣中人惟用其大而橘者以米泔水浸而待用每一枚切四片每服一片外用細石灰以水調如糊亦預製待用用時以蔞葉一片抹石灰一二分入檳榔一片裹而嚼服蓋檳榔得石灰則滑而不澀石灰蔞葉得檳榔則甘而不辣服後必身面俱暖微汗微醉而胸腹豁然善解吞酸消宿食辟嵐瘴化痰醒酒

下氣健脾開胃潤腸殺蟲消脹固大便止瀉痢○又服法如無蔞葉即以肉桂或大茴香或陳皮俱可代用少抹石灰炙而食之然此三味之功多在石灰蔞葉以其能燥脾溫胃也然必得檳榔爲助其功始見此物理相成之妙若有不可意測者○一大約此物與烟性畧同但烟性暖勇用以散表逐寒則烟勝於此檳榔稍緩用以和中暖胃則此勝於烟二者皆壯氣辟邪之要藥故滇廣中人一日不可少也○又考俗之異在廣西用老蔞葉滇中人用清蔞檳榔廣東人多在蔞殼蔞檳榔亦各得其宜耳

烏梅 二一七

味酸澁性溫平下氣除煩熱止消渴吐逆反胃霍亂治虛勞骨蒸解酒毒斂肺澁腸治肺痿欬嗽喘急消癰疽瘡毒喉痺乳蛾澁腸止冷熱瀉痢便血尿血崩淋帶濁遺精夢泄殺虫伏蚘解虫魚馬汗硫黄毒和紫蘇煎湯解傷寒時氣瘴瘧大能作汗取肉燒存性研末傅金瘡惡瘡去腐肉弩肉死肌一夜立盡亦奇方也

山查 二一八

味甘微酸氣平其性善於消滯用此者用其氣輕故不甚耗眞氣善消宿食痰飲吞酸去瘀血疼痛行結滯散膨脹潤腸胃去積塊亦佳類疝仍可健脾小兒最宜亦發瘡疹婦人產後兒枕痛惡露不盡者煎汁入沙糖服之立效煮汁洗漆瘡亦佳腸滑者少用之

甜瓜蒂 二一九　一名苦丁香

味苦性寒有毒陰中有陽能升能降其升則吐善涌濕熱頑痰積飲去風熱頭痛癲癇喉痺頭目眩暈胸膈脹滿并諸惡毒在上焦者皆可除之其降則瀉善逐水濕痰飲消浮腫水膨殺蠱毒虫毒凡積聚在下焦者皆能下之蓋其性峻而急

不從上出即從下出也若治鼻中瘜肉不聞香臭當同麝香細辛爲末以綿裹塞鼻中日一換之當漸消縮

大腹皮 二百二十

味微辛性微溫上冷熱邪氣下一切逆氣滯氣攻衝心腹大腸消痰氣吞酸痞滿止霍亂逐水氣浮腫脚氣瘴瘧及婦人胎氣惡阻脹悶並宜加薑鹽同煎凡用此必須酒洗炒過恐其有鴆鳥毒也

吳茱萸 二二一

味辛苦氣味俱厚升少降多有小毒能助陽健脾治胸膈停

寒脹滿痞塞化滯消食除吞酸噎逆霍亂心腹痛冷中惡救痢寒痰逆氣殺諸蟲鬼疰邪疰及下焦肝腎膀胱寒疝陰毒疼痛止痛瀉血痢厚腸胃去濕氣腸風痔漏脚氣水腫然其性苦善降若氣陷而元氣虛者當以甘補諸藥制而用之

菜部

山藥 二二二

味微甘而淡性微澁所以能健脾補虛澁精固腎治諸虛百損療五勞七傷第其氣輕性緩非堪專任故補脾肺必主參

朮補腎水必君茱地澁帶濁須破故同研固遺泄仗兎絲相濟諸凡固本丸藥亦宜搗末爲糊總之性味柔弱但可用爲佐使

乾薑 二二三

味辛微苦性溫熱生者能散寒發汗熟者能溫中調脾善通神明去穢惡通四肢關竅開五藏六府消痰下氣除轉筋霍亂逐風濕冷痺陰寒諸毒寒痞脹滿腰腹疼痛扑損瘀血夜多小便孫眞人曰嘔家聖藥是生薑故凡脾寒嘔吐宜兼溫散者當以生薑煨熟用之若下元虛冷而爲腹疼瀉痢專宜溫補者當以乾薑炒黃用之若產後虛熱虛火盛而唾血痢血者炒焦用之若炒至黑炭已失薑性矣其亦有用以止血者用其黑澁之性已耳若陰盛格陽火不歸元及陽虛不能攝血而爲吐血衄血下血者但宜炒熟留性用之最爲止血之要藥若陰虛內熱多汗者皆忌用薑

大茴香 二二四

味辛氣溫入心腎二臟氣味香甜能升能降最煖命門故善逐膀胱寒滯疝氣腰疼亦能溫胃止吐調中止痛除霍亂反胃齒牙口疾下氣解毒兼理寒濕脚氣調和諸饌逐臭生香

小茴香 二二五

氣味略輕治亦同前但大茴性更煖而此則稍溫耳

白芥子 二二六

味大辛氣溫善開滯消痰療欬嗽喘急反胃嘔吐風毒流注四肢疼痛尤能祛辟冷氣解肌發汗消痰癖瘧痞除脹滿極速因其味厚氣輕故開導雖速而不甚耗氣既能除脇肋皮膜之痰則他近處者不言可知善調五藏亦熨散惡氣若肫白孔竅痰核初起研末用醋或水調傅甚效

蘿蔔子 二二七

味大辛氣溫氣味俱厚降也善於破氣消痰定喘除脹利大小便有推牆倒壁之功研水攪澄飲之止吐風痰盡出胃有氣食停滯致成鼓脹者非此不除同醋研敷大消腫毒中氣不足切忌妄用

葱 二二八

味辛性溫善散風寒邪氣通關節開腠理治傷寒寒熱天行時疾頭痛筋骨酸疼行滯氣除霍亂轉筋奔豚脚氣陰邪寒毒陽氣脫陷心腹疼痛及虫積氣積飲食毒百藥毒利大小便下痢下血小兒盤腸內釣婦人溺血通乳汁散乳癰消癰

疽腫毒傷寒結胸及金瘡折傷血瘀血出疼痛不止仝猘犬傷亦制蚯蚓毒

蒜 二二九

味辛性溫有小毒善理中溫胃行滯氣辟肥膩開胃進食消寒氣寒痰冤積食積魚肉諸積邪痹膨脹宿滯不安殺溪毒水毒蠱毒蛇蟲毒治疔腫灸癰疽塗疥癬傳蛇虫沙虱毒其良

韭菜 二百三十

味辛甘微酸性溫善溫中安五藏和胃氣健脾氣除濁氣開胃進食除心腹痼冷痃癖治胸膈噎滯氣止消渴瀉痢腰膝腹中冷痛壯腎氣療腰膝痿洩精帶濁俱宜常煮食之大能益人若欲消胃脘瘀血作痛及中風失音上氣喘息或中飲食藥毒或猝見吐血衄血尿血打撲傷血婦人經滯血逆上衝心腹或被狂犬蛇虫惡毒勢在危急者俱宜搗生韭汁服之或從吐出或從內消皆得愈也或用煎湯薰產婦血暈亦可洗腸痔脫肛

韭子 二三一

味辛性溫陰中陽也宜炒黃用之主夢泄遺精尿血腰膝

壯陽道治鬼交補肝腎命門止小便頻數遺尿及婦人白淫白帶陰寒小腹疼痛

百合 二三二

味微甘淡氣平功緩以其甘緩故能補益氣血潤肺除嗽定魄安心逐驚止悸緩時疫咳逆解乳癰喉痺兼治癰疽亦解蠱毒潤大小便消氣逆治腫仲景用之以治百合證者蓋欲藉其平緩不峻以收失散之緩功耳虛勞之嗽用之頗宜

蒲公英 二三三 即黃花地丁

味微苦氣平獨莖一花者是莖有椏者非入陽明太陰少陽

厥陰經同忍冬煎汁少加酒服潰堅消腫散結核瘰癧最佳破滞氣解食毒出毒刺俱妙若婦人乳癰用水酒煮飲以渣封之立消

金石部

金箔 二二四

味辛平性寒生者有毒氣沉質重降也陰也能鎮心神降邪火墜痰涎療風熱上壅吐血衄血神魂飛蕩狂邪躁擾及小兒驚風癲癇痰滞心竅上氣欬喘安魂魄定心志凡邪盛於

上宜降宜清者皆所當用若陽虚氣陷滑泄清寒者俱當遠之

水銀 二二五

味辛寒有大毒能利水道去熱毒同黑鉛結砂則鎮墜痰涎同硫黄結砂則救危疾極善墮胎殺諸虫及疥癬癩瘡凡有虫者皆宜之亦善走經絡透骨髓殺楊梅瘡毒其他内治不宜輕用頭瘡亦不可用恐入經絡必致筋骨百病不治也李時珍曰水銀乃至陰之精禀沈著之性得凡火煅煉則飛騰靈變得人氣熏蒸則入骨鑽筋絶陽蝕腦陰毒之物無似之者而大明言其無毒本經言其久服神仙甄權言其還丹元母抱朴子以為長生之藥六朝以下貪生者服食致成廢篤而喪厥軀不知若干人矣方士固不足道本草其可妄言哉水銀但不可服食爾而其治病之功不可掩也

輕粉 二三六

味微辛性温燥有大毒升也陽也治痰涎積聚消水腫鼓脹直達病所尤治瘰癧諸毒瘡去腐肉生新肉殺瘡癬疥虫及鼻上酒皶風瘡瘙癢然輕粉乃水銀加鹽礬升鍊而成其以金火之性燥烈流走直達骨髓故善損齒牙雖善劫痰涎水

濕瘡毒從齒齦而出邪得劫而暫開病亦隨愈然用不得法則金毒竄入經絡留而不出而傷筋敗骨以致筋攣骨痛癰疽瘡瘍遂成廢痼其害無窮嘗見丹家升鍊名若稍失固濟則雖以鐵石為器亦必爆裂而到以人之臟府血氣乎陳文中曰輕粉下痰而損心氣小兒不可輕用傷脾敗陽必變他證仍生者尤宜慎之

銅青 二三七 即銅綠

此銅之精華惟醋制者良硇制者有毒也味酸性平收斂善治風眼爛弦流淚合金瘡止血明目去膚赤息肉治惡瘡口鼻

痄腮若治走馬牙疳宜同滑石杏仁等分為末擦之立愈

朱砂 一百三十八

味微甘性寒有大毒通禀五行之氣其色屬火也其液屬水也其體屬土也其氣屬木也其入屬金也故能通五臟其入心可以安神而走血脉入肺可以降氣而走皮毛入脾可逐痰涎而走肌肉入肝可行血滯而走筋膜入腎可逐水邪而走骨髓或上或下無處不到故可以鎮心逐痰祛邪降火治驚癇殺虫毒祛蠱毒鬼魅中惡及瘡瘍疥癬之屬但其體重性急善走善降變化莫測用治有餘乃其所長用補不足及

長生久視之說則皆謬妄不可信也若同參芪歸术兼朱砂以治小兒亦可取效此必其虛中挾實者乃宜之否則不可概用

銀朱 九

乃水銀同硫黃升煉而成味辛溫有毒破積滯劫痰涎散結疥癬惡瘡殺虫及虱或燒烟薰之或以棗肉拌烟擦之其功尤捷

靈砂 一百四十

味甘性溫主五臟百病養神志安魂魄通血脉明耳目調和五臟主上盛下虛痰涎壅盛頭旋吐逆霍亂反胃心腹冷痛升降陰陽既濟水火久服通神明殺精魅惡鬼小兒驚吐其效如神研末糯米糊為丸棗湯服並為鎮墜神丹也或以陰陽水送下尤妙〇按胡演丹藥秘訣云升靈砂法用新鍋安逍遙爐上以蜜揩鍋底文火下燒入硫黃二兩熔化投水銀半斤以鐵匙急攪作青砂頭如有焰起噴醋解之待汞不見星取出細研盛入水火鼎內醋調泥固濟下以自然火升之乾水十二盞為度取出如束鍼紋者成矣

硫黃 一百四十一

味苦微酸性熱有毒療心腹久積冷霍亂欬逆上氣及冷風頑痺寒熱腰腎久冷脚膝疼痛虛寒久痢滑洩壯陽道補命門不足陽氣暴絕婦人血結小兒慢驚尤善殺蟲除疥癬惡瘡老人風秘用宜斟服亦治陰毒傷寒厥逆煩躁腹痛脉伏將危者以硫黃為末艾湯調服二錢即可得睡汗出而愈

雄黃 一百四十二

味苦甘辛性温有毒消痰涎治癲癇風瘧疳疾寒熱伏暑瀉痢酒癖頭風眩暈化瘀血殺精物鬼疰蠱毒邪氣中惡腹痛及蛇虺百虫獸毒疥癬痔虫腹瘤鼻中瘜肉癰疽腐肉并

鼠瘻癧瘍疔痔等毒欲逐毒蛇無如燒烟燻之其畏避尤速

自然銅 二四三

味辛平性凉能療折傷散瘀血續筋骨排膿止痛亦鎮心神安驚悸宜研細水飛用或以酒磨服然性多燥烈雖其接骨之功不可缺而絕無滋補之益故用不可多亦不可專任也

黃丹 二四四

味辛微鹹微澁性重而收大能燥濕故能鎮心安神墜痰降火治霍亂吐逆欬嗽吐血鎮驚癎癲狂客忤除熱下氣止瘧

止痢禁小便解熱毒殺諸虫毒治金瘡火瘡濕爛諸瘡血溢止痛生肌長肉收陰汗解狐臭亦去翳除瞞目

白礬 二四五

味酸澁性凉有小毒所用有四其味酸苦可以涌泄故能吐下痰涎治癲癇黃疸其性收澁可固脫滑故能治崩淋帶下腸風下血脫肛陰挺斂金瘡止血燒枯用之能止牙縫出血治狐腋氣收陰汗脚汗其性燥可治濕邪故能止瀉痢斂浮腫湯洗爛弦風眼其性毒大能解毒定痛故可療癰疽疔腫惡瘡息肉喉痹瘰癧疥癬去腐肉生新肉及虎犬蛇虫

蟲毒或洗或敷或生或枯皆有奇效

石脂 二四六

味甘澁性溫平脂有五色而今之入藥者惟赤白二種乃手足陽明足厥陰少陰藥也其味甘而溫故能益氣調中其性澁而重故能收濕固下調中則可療虛煩驚悸止吐血衂血壯筋骨厚腸胃除水濕黃疸癰腫瘡毒排膿長肉止血生肌之類是也固下則可治夢泄遺精腸風瀉痢崩漏帶濁大腸收脫肛痔漏陰瘡之類是也又治難產胞衣不出東垣曰胞衣不出惟澁劑可以下之即此是也然脂有五種雖在本

經言各隨五色補五藏又云白入氣分赤入血分第五脂之性味畧同似亦不必強分者且其性粘如骨故用固爐鼎甚良

爐甘石 二四七

味甘澁性溫能止血消腫生肌斂瘡去目中翳膜赤腫收濕爛目能除翳治目中一切諸目疾宜用其色紫白輕火煆而擊碎之湛者為下製宜炭火煆紅童便淬七次研粉水飛過曬用若收後堅硬不鬆不脆者不堪也

硃砂 二四八

味鹹微甘陰也降也消痰涎止欬嗽解喉痺生津液除上焦濕熱噎膈殺蟲痰血退眼目腫痛翳障口齒諸病皆硬惡瘡或為散丸或噙化嚥津俱可

水粉 二四九 即官粉亦名胡粉

味辛性寒有毒善殺蟲除疳治癰疽瘰癧諸瘡下疳瘻瘡不斂亦治疥癬狐臭黑鬚髮雖亦能墜痰消食然惟外敷所宜而內傷諸病似亦不宜用之

密陀僧 二百五十

味鹹平有小毒能鎮心神消痰涎治驚癇欬嗽嘔逆及胃熱

痰下痢止血殺蟲消積聚治諸瘡腫毒鼻皶面䵟汗斑金瘡五痔癧狐臭收陰汗脚氣

石膏 二五一

味甘辛氣大寒氣味俱薄體重能沉氣輕能升陰中有陽欲其緩者煅用欲其速者生用用此者用其寒散清肅尤善肺胃三焦之火而尤為陽明經之要藥辛能出汗解肌最逐溫暑熱證而除頭痛甘能緩脾消氣極能生津止渴而解熱煩邪火盛者不食胃火盛者多食皆其所長陽明實熱牙疼太陰火盛痰喘及陽狂熱結熱發斑發黃火載血上大吐大嘔大便熱秘等證皆當速用胃虛弱者忌服陰虛熱者禁嘗若誤用之則敗陽作瀉必反害人

滑石 二五二

味微甘氣寒性沉滑降中有升入膀胱大腸經能清三焦表裏之火利六府之濇結分水道逐凝血通九竅行津液止煩渴除積滯實大腸治瀉痢淋秘白濁疸黃疸水腫脚氣吐血衄血金瘡出血諸濕爛瘡腫痛通乳亦催生墮胎亦捷

青礞石 二五三

味微甘微鹹其性下行降也陰也乃肝脾之藥此藥重墜制

以硝石其性更利故能消宿食癥積頑痰治驚癇欬嗽喘急寶鑑云礞石為治痰利驚之聖藥若此痰在水上以石末糝之痰即隨水而下則其沉墜之性可知楊士瀛謂其功能利痰然性非胃家所好而王隱君謂痰為百病母不論虛實寒熱概用滾痰丸通治百病豈理也哉是以實痰堅積乃其所宜然久病痰多者必因脾虛人但知滾痰丸可以治痰而不知虛損服此則百無一生矣

朴硝 二五四

味苦鹹辛氣寒陰也降也有毒其性峻烈鹹能軟堅推逐陳

積化金石藥毒去六腑壅滯脹急大小便不通破瘀血堅癥
實痰卻濕熱疫癘傷寒脹悶熱狂消癰腫排膿凡脇各經實
熱悉可爲除孕婦忌用最易墮胎虛損者忌恐傷生反掌

玄明粉二五五

味辛微甘性冷沉也陰也降心火祛胃熱消痰涎平傷寒實
熱狂躁去腸胃藏腑宿滯癥瘕通大便秘結陰火疼痛亦消
瘰疽腫毒

礞石二五六

味鹹性微寒陰中陰也善降火下氣消食消熱痰化老痰除

癭瘤結核解熱渴熱淋止痰嗽喘急消積塊軟堅癥利水濕
痢氣亦消瘡腫

花蕊石二五七

此藥色如硫黃黃石中間有淡白點故名也李時珍曰此藥
舊無氣味今嘗試其氣平其味澀而酸蓋厥陰經血分藥也
其功專於止血能使血化爲水酸以收之也若治金瘡出血
則不必制但刮末傅之即合仍不作膿及治一切損傷失血
又療婦人惡血血暈帶下死胎胞衣去惡血血去而胎胞自
落也凡入丸散須用罐固濟火煅過研細水飛用之

代赭石二五八

一味微甘性涼而降血分藥也能下氣降痰清火除胸腹邪毒
殺鬼物精氣止反胃吐血衄血血痺血痢血中邪熱大人小
兒驚癇狂熱入藏腸風痔漏脫精遺尿及婦人赤白帶下難
產胞衣不出月經不止俱可爲散調服亦治金瘡生肌長肉

硇砂二五九

味鹹苦大辛性大熱有毒善消惡肉腐肉生肌傅金瘡生肉
去目翳弩肉除疣贅亦善殺蟲毒水調傅之或研末摻
之立愈本草言其消瘀血宿食破結氣止反胃肉食飽脹暖

子宮大益陽事但此物性熱大毒能化五金八石入人之藏府
豈能堪此故用以治外則可用以服食則不宜也若中其毒
惟生綠豆研汁飲一二升乃可解之

青鹽二百六十

味鹹微甘性涼能降火消痰明目除目痛益腎氣除五臟癥
結心腹積聚止血除口齒牙疼痛出血殺蟲與除疥癬
久堅筋骨明目此鹽不經火煉而成其味稍甘鹹性與大
鹽同而滋益之功則勝之

石灰二六一

味辛溫有毒入止水瀉血痢收白帶白淫可倍加茯苓為丸服之此外如散血定痛傳癰毒消結核瘻瘡惡瘡腐肉白癜黶斑疵肉收脫肛陰挺殺痔瘺諸蟲止金瘡血出生肌長肉或為末可摻或用醋調敷俱妙能解酒醉亦解酒毒

禽獸部

雞血 二六二

味鹹性平主蠱痿痺中惡腹痛解丹毒蠱毒蟲毒鹽滷毒及小兒驚風便結亦能下乳俱宜以熱血服之若馬咬人傷宜以熱血澆之

雉冠血治白癜風經絡風熱塗頰頰治口喎不正亦灌之治縊死欲絕及小兒卒驚客忤和酒服發痘最佳塗諸瘡癬蜈蚣蜘蛛馬嚙等毒若百蟲入耳宜用熱血滴之

鴨血 二六三

味鹹微涼善解諸毒凡中金銀丹石砒霜鹽滷之毒者俱宜服此解之若野葛毒殺人至死者熱飲之入口即解若溺水死者灌之即活蚯蚓咬瘡塗之即愈

虎骨 二六四

味微辛氣平主治邪惡氣殺鬼精心腹諸痛止驚悸壯筋骨治肢體毒風拘攣走注疼痛辟傷寒溫瘧及惡瘡鼠瘻犬咬諸毒頭骨作枕辟惡夢魘魅置戶上辟鬼祟寇宗奭曰風從虎者風木也虎金也木受金制安得弗從故可治風病攣急走注風毒癲癇驚癇諸病李時珍曰虎骨通可用凡辟邪疰驚癇頭風溫疰瘡疽當用頭骨治手足諸風當用脛骨治腰背諸風當用脊骨亦各從其類也吳球曰虎之一身筋節氣力皆出前足故以脛骨為勝

象牙 二六五

味甘氣涼能清心腎之火可療驚悸風狂骨蒸痰熱鬼精邪氣癰毒諸瘡並宜生屑入藥煮服若諸物鯁刺喉中宜磨水飲之竹木刺入肌肉宜刮牙屑和水敷之即出

鹿角膠 二六六

味甘鹹氣溫大補虛羸益血氣填精髓壯筋骨長肌肉悅顏色延年益壽療吐血下血尿精尿血及婦人崩淋赤白帶濁血虛無子止痛安胎亦治折跌損傷瘡瘍腫毒善助陰中之陽最為補陰要藥

鹿茸 二六七

味甘鹹氣溫破開含酥炙黃脆入藥益元氣填真陰扶衰羸瘦弱善助精血尤強筋骨堅齒牙益神志治耳聾目暗頭腦眩運補腰腎虛冷腳膝無力夜夢鬼交遺精滑泄小便頻數虛痢尿血及婦人崩中漏血赤白帶下道家云惟有斑龍頂上珠能補玉堂關下血者即此是也若得嫩而肥大如紫茄者較之鹿角膠其功力爲倍倍

犀角 二六八

味苦辛微甘氣寒氣味俱輕升也陽也其性靈通長於走散較諸角爲甚藥用黑色功力在尖專入陽明清胃火亦能祛

邪涼心定神鎮驚瀉肝明目能解大熱散風毒陽毒瘟疫熱煩磨汁治吐血衄血下血及傷寒畜血發狂發黃發斑譫語痘瘡稠密內熱黑陷或不結痂亦散瘡毒癰腫膿血腫痛殺妖狐精魅鬼邪百毒蠱疰鴆羽蛇毒辟溪毒山嵐瘴氣其性升而能散故治傷寒溫疫頭痛表煩熱悶而汗不得解者與尖磯入藥中取汗速如響應仲景云如無犀角以[redacted]代之者正以此兩物俱入陽明功皆升散今人莫得其解遂致疑詞是但知犀角之解心熱而不知犀角之能升散尤峻速於升麻也倘中氣虛弱脈細無神及痘瘡血虛真陰不足等證凡畏汗畏寒畏散者乃所當忌或必不得已宜兼補劑用之

羚羊角 二六九

味鹹性寒辛本火畜而此則屬木善走少陽厥陰二經故能清肝定風行血行氣辟鬼疰邪毒安魂魄定驚狂祛魘寐療傷寒邪熱一切邪毒中惡毒風卒死昏不知人及婦人子癇強痓小兒驚悸煩悶痰火不清俱宜爲末蜜水調服或燒研末酒調服之若治腫毒惡瘡磨水塗之亦可

牛黃 二百七十

味苦辛性涼氣平有小毒忌常山入心肺肝經能清心退熱化痰涼驚通關竅開結滯治小兒驚癇客忤熱痰口噤大人癲狂痰壅中風發痙辟邪魅中惡天行疫疾安魂定魄清神志不寧聰耳目開閉療痘瘡紫色痰盛躁狂亦能墮胎孕婦少用

阿膠 二七一

味甘微辛氣平微溫氣味俱薄陽中有陰製用蛤粉炒珠入肺肝腎三經其氣溫故能扶勞傷益中氣其性降故能化痰清肺治肺痿肺癰咳嗽喘急止嗽定喘其性養血故能止吐

血衄血便血尿血腸風下痢及婦人崩中帶濁血淋經脈不調其味甘緩故能安胎固漏養血滋腎實腠理止盜汗托補癰疽腫毒用惟鬆脆氣香者爲佳堅韌臭劣者不美

熊膽 二七二

味苦性寒能退熱清心療時氣黃疸平肝明目去翳除殺蛔蟯牙虫風痛及小兒熱疳䘌痰驚癇瘈瘲驚熱病俱宜以竹瀝化兩豆粒許服之甚良亦治鼻瘡熱瘡痔漏腫痛以膽化塗之少加冰片尤效欲辨其真惟取一粟許置水面如線而下一道不散者是也且凡是諸膽皆能水面旋轉惟此尤速乃亦可辨

麝香 二七三

味苦辛性溫能開諸竅通經絡透肌骨解酒毒吐風痰消積聚癥瘕散諸惡濁氣除心腹暴痛脹急殺鬼物邪氣魘寐藏腑虫積蛇虫毒蠱毒瘴瘧沙風毒及婦人難產尤善墮胎用熱水研服一粒治小兒驚癇客忤鎮心安神療鼻塞不聞香臭目疾可去翳膜除一切惡瘡痔漏腫痛膿水腐肉面䵟斑疹凡氣滯爲病者俱宜用之若鼠咬蟲咬成瘡但以麝香封之則愈欲辨其假但置些須於火炭上有油滾出而成焦黑炭者肉類也此由香之本體若燃火而化白灰者木類也是即假攙

蟲魚部

龍骨 二七四

味甘平性收澀其氣入肝腎故能安神志定魂魄鎮驚悸逐腸胃邪氣除夜夢鬼交吐血衄血遺精夢洩收虛汗止瀉痢縮小便禁腸風下血尿血虛滑脫肛女子崩淋帶濁失血漏胎小兒風熱驚癇亦療腸癰臟毒內疽陰蝕斂瘡生肌長肉澀可去脫即此謂也制須酒煮焙乾或用水飛過間黑豆蒸熟晒乾用之

海螵蛸 二七五 即烏賊魚骨

味鹹性微溫走厥陰少陰肝腎藥也鹹走血故專治血病療婦人經枯血閉血崩血淋赤白帶濁血瘕氣痰吐血下血崩腹痛環臍陰蝕腫痛亦治瘧疾消瘦及丈夫陰中腫痛益精固精令人有子小兒下痢膿血亦殺諸蟲俱可研末飲服尤治眼中熱淚磨翳去障並宜研末和蜜點之爲末可傅小兒疳瘡痘瘡臭爛膿濕下疳跌打出血湯火諸瘡燒灰存

性消服治婦人陰戶嫁痛同雞子黃塗小兒重舌鵝口同蒲
黃末傳舌腫出血如泉同槐花末吹鼻止衄血同麝香吹耳
治停耳耳聾〇烏賊魚骨補益精氣尤治婦人血枯經閉

牡蠣二七六
味微鹹微澁氣平用此者用其澁能固斂鹹能耎堅專入少
陰腎藏爲使藥亦走諸經能解傷寒溫瘧寒熱往來消疝血化
老痰去煩熱止驚癇心脚氣痛解喉痹欬嗽痃瘕積塊痢下
赤白澁腸止便利禁鬼交遺泄止滑精帶下及婦人崩中帶漏
小兒風痰虛汗同熟地固精氣禁遺尿同麻黃根斂陰汗同

杜仲止盜汗同白术燥脾利濕同大黃善消癰腫同柴胡治
脇下硬痛同天花粉消上焦瘰癧瘿瘤結核

穿山甲二七七
味鹹性微寒能通經絡達腠理除山嵐瘴氣瘧疾風痺強
直疼痛療小兒五邪驚啼婦人鬼魅悲泣下乳汁消癰腫排
膿血除痰瘧疥癬通竅殺蟲佐補藥行經善發痘瘡或炮焦
投入煎劑或燒灰存性酒服方寸匕亦可用傅惡瘡

青魚膽二七八
味苦性寒其色青故入肝膽二經能消赤目腫痛點瞖目可
吐喉痺痰涎塗熱瘡惡瘡亦消魚骨之鯁

白花蛇二七九　即蘄蛇也
味甘鹹性溫有毒諸蛇鼻俱向下惟此蛇鼻向上而龍頭虎
口黑質白花脇有方勝紋二十四個口有四長牙尾上有一
佛指甲者是用宜去頭尾各三寸以防其毒春秋酒浸三宿
夏一宿冬五宿火炙去盡皮骨取肉焙乾密封藏之久亦不
壞諸蛇之性皆竄而此蛇尤速故善於治風能透骨髓走臟
府徹肌膚無所不到療中風濕痺骨節疼痛手足拘攣不能
行並與風瘙痒疥癬大風癘癩及小兒驚風搐搦瘰癧楊

梅風毒惡瘡俱爲要藥凡服蛇酒藥者切忌見風

真珠二百八十
味微甘微鹹能鎮心明目去瞖膜除面可除䵟斑令人潤
澤好顏色亦除小兒驚熱安魂魄爲末可傅痘疔痘毒

地骨皮二八一
味微甘微鹹性微寒陰也能治痰瘧癥瘕堅積溫瘧傷寒勞
復骨中蒸熱消五內陰火除瘡痛下中能補陰益血清陰火續筋
骨退勞熱癰腫脚疫痛去疥瘡止血痢腸下亦可利產難消
療瘡燒灰可傅小兒頭瘡癰腫婦人陰瘡癰瘡亦治脫肛

龜板膠功用亦同龜板而性味濃厚尤屬純陰能退孤陽陰虛勞熱陰火上炎吐血衄血肺熱欬喘消渴煩擾熱汗驚悸譫妄狂躁之要藥然性禀陰寒善消陽氣凡陽虛假熱及脾胃命門虛寒等證皆切忌之毋混用也若誤用久之則必致敗脾妨食之患

殭蠶 二八二

味辛鹹性溫有小毒辛能散鹹能降毒能攻毒輕浮而升陽中有陰故能散風痰去頭風消結核瘰癧痰瘧破癥堅消散風熱喉痺危證尤治小兒風痰急驚客忤發痘疹攻瘡毒止夜啼殺三蟲婦人乳汁不通崩中帶下爲末可傅丹毒疔腫拔根極效滅頭面黑斑及諸瘡瘢痕金瘡痔瘻小兒疳蝕牙齦潰爛重舌木舌及大人風蟲牙痛皮膚風疹瘙癢

蟾蜍 二八三 俗名癩蝦蟆

眉間有兩鬚遍身有顆粒其中俱有蟾酥行極遲緩不能跳躍亦不能鳴者是也此物受土氣之精上應月魄賦性靈異穴土食蟲能制蜈蚣入足陽明胃經消疳散氣積聚破堅殺蟲脹治五疳八痢及小兒勞瘦疳熱殺疳蟲治癰腫鼠瘻陰瘡惡瘡若治破傷風宜同花椒剉爛入酒煮熱飲之通身汗出即愈亦解猘犬毒燒灰油調傅有蟲諸惡頑瘡極效又治瘟毒發斑危劇者去腸生擣一二枚絞汁飲之無不即瘥或燒灰湯送亦良

蟾酥 味辛麻性熱有毒主治發背癰疽疔腫一切惡毒若治風蟲牙痛及齒縫出血以紙撚蘸少許點齒縫中按之即止

水蛭 二八四

味鹹苦性微寒有毒能逐惡血瘀血破血癥積聚通經閉利水道墮胎亦治赤白遊彥癰疽腫毒及折傷跌撲蓄血不散

用之法當取田間嚙人腹中有血者佳須曬乾細剉以微火炒黃熟方可用或以冬月豬脂煎令焦黃用之亦可不爾入腹則活最能生子害人若受其害惟以田泥水或黃土水飲數升則必盡下蓋此物得土氣而化也或以牛羊熱血一二升同豬脂飲之亦下也

鼈甲 二八五

味鹹氣平此肝脾腎血分藥也能消癥瘕堅積溫瘧除骨節間血虛勞熱婦人血瘕惡血漏下五色經脈不通治難產及產後陰脫小兒驚癇斑痘煩喘亦消瘡腫腸

癰撲損瘀血斂潰毒去陰蝕疳瘡惡肉然須取活鱉大者去
肉用醋煮乾炙燥用之若誤煮熟筋骨露出者不堪用

蜈蚣 二八六 一名即蛆赤足者良

味辛溫有毒能啖諸蛇故治諸蛇蟲魚鬼疰蠱毒殺三蟲攻瘰癧便毒痔瘻丹毒亦療小兒驚風癇風丹毒禿瘡然此蟲性毒故能攻毒不宜輕用若入藥餌須去頭足以火炙熟用之

蟬脫 二八七

味微甘微鹹性微涼此物飲風吸露氣極清虛故能祛風熱之證亦善脫化故可發痘瘡痧疹滯起發不快凡小兒驚癇壯

熱煩渴天吊口噤驚哭夜啼及風熱目昏翳障疔腫瘡毒風疹痒痛破傷風之類俱宜以水煎服或為末以井花水調服一錢可治瘖啞之病

斑蝥 二八八

味辛性熱有大毒能攻鼠瘻瘰癧瘡疽破血積疝瘕墮胎凡解疔毒猘犬毒沙虱毒蠱毒輕粉毒亦傳惡瘡去死肌敗肉制用之法須去翅足同糯米炒熟然後可用或同麩炒或同醋煮亦可若中其毒用黑豆綠豆汁靛汁黃連濃茶蔥汁可以解之

蜂房 二八九

味微甘微鹹有毒療蜂毒腫毒合亂髮蛇脫燒灰以酒服二方寸匕治惡疽附骨疽疔腫諸毒亦治赤白痢遺尿失禁陰痿煎水可洗狐尿瘡乳癰蜂螫惡瘡及熱病後毒氣衝目煎齒牙止風蟲牙痛炙研和豬脂塗瘰癧成瘻

五靈脂 二百九十

味苦氣辛善走厥陰乃血中之氣藥也大能行血行氣逐瘀止痛凡男子女人有血中氣逆而脇肋刺痛或女人經水不通產後血滯男子疝氣腸風血痢冷氣惡氣心腹諸痛身體

血痺腸肋筋骨疼痛其效甚捷若女中血崩經水過多赤帶不止宜半炒半生酒調服之亦治小兒氣逆癲癇殺蟲毒解藥毒行氣極速但此物氣味俱厚辛膻難當善逐有餘之滯凡血氣不足者服之大損真氣亦善動吐所當避也制用之法當用酒飛去砂石晒乾入藥

全蠍 二九一

味甘辛有毒此東方色青屬木足厥陰肝經藥也故治中風諸風開風痰口眼喎斜半身不遂語言蹇澀瘧疾耳聾疝氣風瘡癮疹小兒風痰驚癇是亦治風之要藥

文蛤 二九二　即五倍子

味酸澁性微凉能斂能降故能降肺火化痰涎生津液解酒毒治心腹疼痛嘔泄通淋疳疾肺虛喉痺止欬嗽消渴盜汗失血腸風臟毒滑泄久痢痔瘻下血不止解蠱毒虫毒婦人崩淋帶濁子腸不收小兒夜啼脫肛俱可為散服之若煎湯用可洗赤眼濕爛皮膚風濕癬癩腸痔脫肛為末可傅金瘡折傷生肌斂毒

百藥煎 二九三　即五倍子釀造者

味酸澁微甘功用與五倍子頗同但經釀造而成其氣稍浮其味稍甘而純故用以清痰解渴止嗽及收斂耗散諸病作丸噙化為尤佳及治下焦滑泄諸病亦更優也

蝸牛 二九四　負殼而行者

味鹹性寒有小毒能瀉火解熱生研汁飲消喉痺止消渴療蚰蜒入耳發治腫毒痔漏脫肛小兒風熱驚癇加麝香搗塗臍間大利小便亦傅脫肛及治蜈蚣蠍毒俱宜研爛傅之

無殼者名蛞蝓治熱瘡腫毒脫肛少入水片研塗痔治脫肛熱痛最良解蜈蚣毒尤捷

蚯蚓 一九五

味鹹性寒沉也陰也有小毒能解熱毒利水道主傷寒瘧疾黄疸消渴二便不通殺蛇瘕三蟲伏尸鬼疰蠱毒射罔藥毒療癲狂喉痺風熱赤眼聤耳鼻瘜瘰癧陰囊熱腫脫肛去泥鹽化為水治天行瘟疫大熱狂躁或小兒風熱癲狂急驚飲汁最良亦可塗丹毒漆瘡炒為末服可去蛔蟲亦可傅蛇傷蜘蛛傷毒人急傅化汁可治耳聾及蚰蜒入耳若中蚯蚓毒者俱以鹽湯浸洗或飲一杯皆可解之

蚓糞名六一泥可塗火瘡丹腮熱毒亦止消渴解瘟疫瘧熱狂躁利小水通五淋熱閉疼痛

桑螵蛸 二九六

即螳螂育子房也深秋作房粘著桑枝之上房長寸許大如拇指其內重重有隔每房有子如蛆卵子是也味甘微鹹性平能益氣益精助陽生子療男子虛損陰痿夢遺疝瘕遺尿治女人血閉腰痛通五淋利水道炮熟空心食之可止小便不禁

人部

童便 二九七

味鹹氣寒沉也陰也鹹走血故善清諸血妄行止嘔血欬血衄血血悶熱狂退陰火定喘促降痰滯解煩熱利大小兩便痔腸者中暍發狂撲損瘀血暈絕難産胎衣不下及蛇犬諸虫毒傷者假熱便溏胃虛作嘔者俱不可妄用

紫河車二九八　一名混沌衣

味甘鹹性溫能補男婦一切精血虛損尤治癲癇失志精神短少怔忡驚悸肌肉羸瘦等證此舊說也但此物古人用少而始於陳氏本草自後丹溪復稱其功遂為時用予於初年亦惑於以人補人之說嘗制用之及用之再三則無所奇效

且制用之法若生搗之則補不宜生若煎熟煨熟則亦由肉餔之類耳又嘗見有以酒煮而食之者後必破腹泄瀉總亦因其性滑也近復有以純酒煮皆去粗收貯而日服其膏者較前諸法似為更善然其既離毛裏已絕生氣既無奇效又關恐食之以殘其子之先天東方朔曰銅山西崩洛鍾東應此母子自然之理不可不信故并述此以勸人少用可也

血餘二九九

味微苦性溫氣味升也陰中陽也在古藥性不過謂其治欬嗽消瘀血治五淋赤白痢疾大小便不通及小兒驚癇治喉痺癰腫乳腫燒灰吹鼻可止衄血等證然究其性味之理則自陰而生自下而長血盛則髮盛最得陰陽之生氣以火炮製其色甚黑大能壯腎其氣甚雄大能補肺此其陰中有陽靜中有動在陰可以培形體壯筋骨托癰疽在陽可以益神志辟寒邪溫氣海是誠精氣中最要之藥較之河車鹿角膠陰凝重著之質相去遠矣凡補藥中自人參熟地之外首當以此為亞

人中白三百

味鹹性微涼能降火清痰消瘀血止吐血衄血退勞熱清肺

癰肺痿心膈煩熱燒研為末大治諸濕潰爛下疳惡瘡口齒疳蝕喉痺腫痛湯火灼瘡及諸竅出血生肌長肉並解熱毒或生用為末亦可

本草正下卷終

卷之五十

新方引 八略　一補略　二和略

三攻略　四散略　五寒略

六熱略　七固略　八因略

卷之五十一

補陣

大補元煎一　左歸飲二

右歸飲三　左歸丸四

右歸丸五　五福飲六

七福飲七　一陰煎八

加味一陰煎九　二陰煎十

三陰煎十一　四陰煎十二

五陰煎十三　大營煎十四

小營煎十五　補陰益氣煎十六

舉元煎十七　兩儀膏十八

貞元飲十九　當歸地黃飲二十

濟川煎二十一　地黃醴二十二

歸腎丸二十三　贊化血餘丹二十四

養元粉二十五　玄武豆二十六

蟠桃果二十七　王母桃二十八

休瘧飲二十九

和陣

金水六君煎一　六安煎二

和胃二陳煎三　苓朮二陳煎四

和胃飲五　排氣飲六

大和中飲七　小和中飲八

大分清飲九　小分清飲十

解肝煎十一　二朮煎十二

廓清飲十三　掃蟲煎十四

十香丸十五　芍藥枳朮丸十六

蒼朮丸十七　貝母丸十八

括痰丸十九　神香散二十

攻陣

吐法一　赤金豆二
太平丸三　敦阜丸四
猎虫丸五　百順丸六

散陣

一柴胡飲一　二柴胡飲二
三柴胡飲三　四柴胡飲四
五柴胡飲五　正柴胡飲六
麻桂飲七　大溫中飲八
柴陳煎九　柴芩煎十
柴苓飲十一　柴胡白虎煎十二
歸葛飲十三　柴葛煎十四
秘傳走馬通聖散十五　秘傳白犀丹十六
歸柴飲十七

寒陣

保陰煎一　加減一陰煎二
抽薪飲三　徙薪飲四
大分清飲五　清流飲六
化陰煎七　茵陳飲八
清膈煎九　化肝煎十
安胃飲十一　玉女煎十二
太清飲十三　綠豆飲十四
玉泉散十五　雪梨漿十六
滋陰八味丸十七　約陰丸十八
服蠻煎十九　約營煎二十

熱陣

四味回陽飲一　六味回陽飲二
理陰煎三　養中煎四
溫胃飲五　五君子煎六
六味異功煎七　參薑飲八
胃關煎九　佐關煎十
抑扶煎十一　四維散十二

鎮陰煎十　歸氣飲十四
煖肝煎十五　壽脾煎十六
三氣飲十七　五德丸十八
七德丸十九　復陽丹二十
黄芽丸二十一　一炁丹二十二
九炁丹二十三　溫臟丸二十四
聖术煎二十五

固陣

秘元煎一　固陰煎二
菟絲煎三　惜紅煎四
苓术菟絲丸五　固眞丸六
粘米固腸糕七　玉關丸八
鞏隄丸九　敦阜糕十

因陣

逍遥飲一　決津煎二
五物煎三　調經飲四
通瘀煎五　胎元飲六
固胎煎七　涼胎飲八
滑胎煎九　殿胞煎十
脫花煎十一　九蜜煎十二
清化飲十三　毓麟珠十四
贊育丹又十四　柴歸飲十五
疏邪飲十六　涼血養營煎十七
柴葛煎十八　搜毒煎十九
六物煎二十　六氣煎二十一

九味異功煎二十二　透邪煎二十三
牛膝煎二十四　何人飲二十五
追瘧飲又二十五　木賊煎二十六
牙皂散二十七　荔香散二十八
豕膏二十九　罨傷寒結胸法三十
連翹金貝煎三十一　連翹歸尾煎三十二
桔梗杏仁煎三十三　當歸蒺藜煎三十四
芍藥蒺藜煎三十五　降癰散三十六
百草煎三十七　螵蛸散三十八

腸癰秘方 三九　槐花蕊 四十
飛丹散 四一　綿花瘡點藥 四一
鷄子黃連膏 四二　金露散 四四
二辛煎 四五　冰玉散 四六
冰白散 四七　代匙散 四八
三香散 四九　固齒將軍散 五十
熏疥方 五一　杖丹膏 五二
銀珠烟 五三　雷火鍼 五四
疥瘡丸 五五　鵝掌瘋四方 五六
秘傳水銀膏 五七 附四味敗毒散　臁瘡隔紙膏 五八
收瘡散 五九

會稽　張介賓　會卿著
瀛海　賈　棠　青南訂

新方八略引

藥不執方合宜而用此方之不必有也方以立法法以制宜此方之不可無也夫方之善者得其宜也得其宜者可爲法也方之不善者失其宜也失其宜者可爲鑒也第法有善不善人有知不知必善於知方者斯可以執方亦可以不執方能執方能不執方者非隨時之人不能也此方之所不可廢者正欲以啟發其人耳余因選古方之得宜者共若干首列爲八陣已不爲不多矣第以余觀之若夫猶有未盡因復制新方八陣此其中有心得焉有經驗焉有備古之未備焉凡各方之下多附加減等法及分兩之數但有出入不一者正以見方之不可執也凡陣之中如攻方寒方之不多及者以古法既多不必更爲添足也大都方宜從簡而余復冗之不冗鄙乎正意在冗中求簡耳此制方之意也然用方之意則猶有說焉夫意貴圓通用嫌執滯則其要也若但圓無執則流亂生而無不可矣不知疑似間自有一定不易之道此圓通中不可無執持也若執一不反則

偏拘亡而勤者左矣不知倏忽間每多三因難測之變此執持中不可無圓活也圓活宜從三思執持須有定見既能執持又能圓活其能方能圓之人乎而人其為誰哉

一補略

一補方之製補其虛也凡氣虛者宜補其上人參黃芪之屬是也精虛者宜補其下熟地枸杞之屬是也陽虛者宜補而兼煖桂附乾薑之屬是也陰虛者宜補而兼清門冬芍藥生地之屬是也此固陰陽之治辨也其有氣因精而虛者自當補精以化氣精因氣而虛者自當補氣以生精又有陽失陰而

離者不補陰何以收散亡之氣水失火而敗者不補火何以甦垂寂之陰此又陰陽相濟之妙用也故善補陽者必於陰中求陽則陽得陰助而生化無窮善補陰者必於陽中求陰則陰得陽升而泉源不竭余故曰以精氣分陰陽則陰陽不可離以寒熱分陰陽則陰陽不可混此又陰陽邪正之離合也故凡陽虛多寒者宜補以甘溫而清潤之品非所宜陰虛多熱者宜補以甘涼而辛燥之類不可用知宜知避則不惟用補而八方之制皆可得而貫通矣

一和略

一和方之製和其不和者也凡病兼虛者補而和之兼滯者行而和之兼寒者溫而和之兼熱者涼而和之和之為義廣矣亦猶土兼四氣其於補瀉溫涼之用無所不及務在調平元氣不失中和之為貴也故凡陰虛於下而精血虧損者忌利小水如四苓通草湯之屬是也陰虛於上而肺熱乾欬者忌用辛燥如半夏蒼朮細辛香附芎歸白朮之屬是也陽虛於上忌消耗如陳皮砂仁木香檳榔之屬是也陽虛於下者忌沉寒如黃柏知母梔子木通之屬是也大便溏泄者忌滑利如二冬牛膝蓯蓉當歸柴胡童便之屬是也表邪未解者忌

收斂如五味棗仁地榆文蛤之屬是也氣滯者忌閉塞如黃芪白朮薯蕷甘草之屬是也經滯者忌寒凝如門冬生地石斛芩連之屬是也凡邪火在上者不宜升火得升而愈熾矣沉寒在下者不宜降陰被降而愈亡矣諸動者不宜再動如火動者忌溫暖血動者忌辛香汗動者忌疏散神動者忌耗傷凡性味之不靜者皆所當慎其於剛暴更甚者則又在不言可知也諸靜者不宜再靜如沉微細弱者脈之靜也神昏氣怯者陽之靜也肌體清寒者表之靜也口腹畏寒者裏之靜也凡性味之陰柔者皆所當慎其於沉寒更甚者又在不

言可知也。大陽主動，以動濟動，火上添油也，不焦爛乎？陰主靜，以靜益靜，雪上加霜也，不寂滅乎？凡前所論，其略耳，而書不盡言，言不盡意，能因類而廣之，則存乎其人矣。不知此義，又何和劑之足云。

三　攻略

攻方之制，攻其實也。凡攻氣者攻其聚，聚可散也；攻血者攻其瘀，瘀可通也；攻積者攻其堅，在臟者可破可培，在經者可鍼可灸也；攻痰者攻其急，真實者暫宜解標，多虛者只宜求本也。但諸病之實有微甚，用攻之法分重輕。大實者，攻之未及，可以再加；微實者，攻之太過，每因致害，所當慎也。凡病在陽者，不可攻陰；病在胸者，不可攻臟。若此者，邪必乘虛內陷，所謂引賊入寇也。病在陰者，勿攻其陽；病在裏者，勿攻其表。若此者，病必因誤而甚，所謂自撤藩蔽也。大都治宜用攻，必其邪之甚者也。其若實邪果甚，自與攻藥相宜，不必雜之補劑。蓋實不嫌攻，若但略加甘滯，便相牽制；虛不嫌補，若但略加消耗，偏覺相妨。所以寒實者最不喜清，熱實者最不喜溫。然實而誤補，不過增病，病增者可解；虛而誤攻，必先脫元，元脫者無治矣。是皆攻法之要也。其或虛中有實，實中有虛，此

又當酌其權宜，不在急宜攻、急宜補者之例。雖然，凡用攻之法，所以除兇剪暴也，亦猶亂世之兵，必不可無，然惟必不得已乃可用之。若或有疑，寧加詳慎。蓋攻雖去邪，無弗傷氣，受益者四，受損者六。故攻之一法，實自古仁人所深忌者，正恐其成之難，敗之易耳。倘任意不思，此其人可知矣。

四　散略

一用散者，散表證也。觀仲景太陽證用麻黃湯，陽明證用升麻葛根湯，少陽證用小柴胡湯，此散表之準繩也。後世宗之，而復不能用之，在不得其意耳。蓋麻黃之氣，峻利而勇，凡太陽經陰邪在表者，寒毒既深，非此不達，故制用此方，非謂太陽經藥必須麻黃也。設以麻黃治陽明少陽之證，亦寒無不散，第恐性力太過，必反傷其氣，豈謂某經某藥必不可移易？亦不過分其輕重耳。故如陽明之升麻、乾葛，未有不走太陽少陽者；少陽之柴胡，亦未有不入太陽陽明者。但用散之法，當知性力緩急，及氣味寒溫之辨，用得其宜，諸經無不妙也。如麻黃、桂枝，峻散者也；防風、荊芥、紫蘇，平散者也；細辛、白芷、生薑，溫散者也；柴胡、乾葛、薄荷，涼散者也；羌活、蒼朮，能走經去濕而散者也；升麻、川芎，能舉陷上行而散者也。第邪淺者忌

陰利之屬氣弱者忌雄悍之屬多汗者忌溫燥之屬寒多者忌清涼之屬凡熱渴煩躁者喜於乾葛而嘔惡者忌之寒熱往來者宜柴胡而泄瀉者忌之寒邪在上者宜升麻川芎而內熱炎升者忌之此性用之宜忌所當辨也至於相配之法則尤當知要凡以平兼清自成涼散以平兼暖亦可溫經宜大溫者以熱濟熱宜大涼者以寒濟寒此其運用之權則毫釐進退自有伸縮之妙又何必膠柱刻舟以限無窮之病變哉此無他在不知仲景之意耳

五寒略

寒方之制為清火也為除熱也夫火有陰陽熱分上下據古方書咸謂黃連清心黃芩清肺石斛芍藥清脾龍膽清肝黃柏清腎今之用者多守此法是亦膠柱法也大凡寒涼之物皆能瀉火豈有涼此而不涼彼者但當分其輕清重濁性力微甚用得其宜則善矣夫輕清者宜以清上如黃芩石斛連翹天花之屬是也重濁者宜於清下如梔子黃柏龍膽滑石之屬也性力之厚者能清大熱如石膏黃連蘆薈苦參山豆根之屬也性力之緩者能清微熱如地骨皮玄參貝母石斛童便之屬也以攻而用者去實鬱之熱如大黃芒硝之屬也

以利而用者去癃閉之熱如木通茵陳豬苓澤瀉之屬也以補而用者去陰虛枯燥之熱如生地二冬芍藥梨漿細甘草之屬也方書之分經用藥者意正在此但不能明言其意耳然火之甚者在上亦宜重濁火之微者在下亦可輕清夫宜涼之熱皆實熱也實熱在下自宜清利實熱在上不可升提蓋火本屬陽宜從陰治從陰者宜降升則反從其陽矣經曰高者抑之義可知也外如東垣有升陽散火之法此以表邪生熱者設不得與伏火內炎者並論

六熱略

熱方之制為除寒也夫寒之為病有寒邪犯於肌表者有生冷傷於脾胃者有陰寒中於臟腑者此皆外來之寒去所從來則其治也是皆人所易知者至於本來之寒生於無形無響之間初無所感莫測其因人之病此者最多人之知此者最少果何謂哉觀丹溪曰氣有餘便是火余續之曰氣不足便是寒夫今人之氣有餘者能十中之幾其有或因稟受或因喪敗以致陽氣不足者多見寒從中生而陽衰之病無所不致第其由來者漸形見者微當其未覺也孰為之意及其既甚也始知治難矧庸醫多有不識每以假熱為真火因復

幾於無形無制者又不知其幾許也故惟高明見道之士常
以陽衰根本為憂此熱方之不可不預也凡用熱之法如乾
薑能溫中亦能散表嘔惡無汗者宜之肉桂能行血善達四
肢血滯多痛者宜之吳茱萸善煖下焦腹痛泄瀉者極妙肉
豆蔻可溫脾腎飧泄滑利者最奇胡椒溫胃和中其類近於
蓽茇丁香止嘔行氣其煖過於豆仁補骨脂性降而善閉故
能納氣定喘止帶濁泄瀉製附子性行如酒故無處不到能
救急回陽至若半夏南星細辛烏藥良薑香附木香茴香仙
茅巴戟之屬皆性溫之當辨者然用熱之法尚有其要以散

兼溫者散寒邪也以行兼溫者行寒滯也以補兼溫者補虛
寒也第多汗者忌薑薑能散也失血者忌桂桂動血也氣短
氣怯者忌故紙故紙降氣也大凡氣香者皆不利於氣虛證
味辛者多不利於見血證所當慎也是用熱之概也至於附
子之辨凡今之用者必待勢不可為不得已然後用之不知
回陽之功當用於陽氣將去之際便當漸用以望挽回若用
於既去之後死灰不可復然矣尚何益於事哉但附子性悍
獨任為難必得大甘之品如人參熟地炙甘草之類皆足以
制其剛而濟其勇以補倍之無往不利矣此壺天中大將軍
也可置之無用之地乎但知之真而用之善斯足稱將將之
手矣

七固略

一固方之制固其泄也如久嗽為喘而氣泄於上者宜固其肺
久遺成淋而精脫於下者宜固其腎小水不禁者宜固其膀
胱大便不禁者宜固其腸臟汗泄不止者宜固其皮毛血泄
不止者宜固其營衛凡因寒而泄者當固之以熱因熱而泄
者當固之以寒總之在上者在表者皆宜固氣氣主在肺也
在下者在裏者皆宜固精精主在腎也然虛者可固實者不

可固久者可固暴者不可固當固不固則滄海亦將竭不當
固而固則閉門延寇也二者俱當詳酌之

八因略

一因方之制因其可因者也凡病有相同者皆可按證而用之
是謂因方如癰毒之起腫可敷也蛇蟲之患毒可解也湯火
傷其肌膚熱可散也跌打傷其筋骨斷可續也凡此之類皆
因證而可藥者也然因中有不可因者又在乎證同而因不
同耳蓋人之虛實寒熱各有不齊表裏陰陽治當分類故有
宜於此而不宜於彼者有同於表而不同於裏者所以病雖

相類而但治內傷者須當於血氣中酌其可否之因不可謂因方之類盡可因之而用也因之爲用有因標者有因本者勿因此因字而誤認因方之義

景岳全書卷之五十終

景岳全書卷之五十一德集　新方八陣

會稽　張介賓　會卿著
瀛海　賈　棠　青南訂

補陣

大補元煎一　治男婦氣血大壞精神失守危劇等證此回天贊化救本培元第一要方○本方與後右歸飲出入互思

人參 補氣補陽以此爲主少則用一二錢多則用一二兩　山藥 炒二錢
熟地 補精補陰以此爲主少則用二三錢多則用二三兩　杜仲 二錢
當歸 二三錢若泄瀉者去之　山茱萸 一錢如畏酸吞酸者去之
枸杞 二三錢　炙甘草 一二錢

水二鍾煎七分食遠溫服○如元陽不足多寒者於本方加附子肉桂炮薑之類隨宜用之○如氣分偏虛者加黃芪白朮如胃口多滯者不必用○如血滯者加川芎去山茱萸○如滑泄者加五味故紙之屬

左歸飲二　此壯水之劑也凡命門之陰衰陽勝者宜此方加減主之○此一陰煎四陰煎之主方也

熟地 二三錢或加至一二兩　山藥 二錢

枸杞二錢　炙甘草一錢

茯苓一錢半　山茱萸一二錢畏酸者少用之

水二鍾煎七分食遠服○如肺熱而煩者加麥冬二錢○血滯者加丹皮二錢○心熱而躁者加玄參二錢○脾熱易饑者加芍藥一錢○腎熱骨蒸多汗者加地骨皮一錢○血熱妄動者加生地二三錢○陰虛不寧者加女貞子二錢○上實下虛者加牛膝二錢以導之○血虛而燥滯者加當歸二錢

右歸飲 二

此益火之劑也凡命門之陽衰陰勝者宜此方加減主之○此方與大補元煎出入互用如治陰盛格陽真寒假熱等證宜加澤瀉二錢煎成用涼水浸冷服之尤妙

熟地用如前　山藥炒二錢　山茱萸一錢　枸杞二錢

甘草炙一二錢　杜仲薑製二錢　肉桂一二錢　製附子一二三錢

水二鍾煎七分食遠溫服○如氣虛血脫或厥或昏或汗或運或虛狂或短氣者必大加人參白朮隨宜用之○如火衰不能生土為嘔噦吞酸者加炮乾薑二三錢○如陽衰中寒泄瀉腹痛加人參肉豆蔻隨宜用之○如小腹多痛者加吳茱萸五七分○如淋帶不止加破故紙一錢○如血少血滯腰膝軟痛者加當歸二三錢

左歸丸 四

治真陰腎水不足不能滋養營衛漸至衰弱或虛熱往來自汗盜汗或神不守舍血不歸原或虛損傷陰或遺淋不禁或氣虛昏運或眼花耳聾或口燥舌乾或腰痠腿軟凡精髓內虧津液枯涸等證俱速宜壯水之主以培左腎之元陰而精血自充矣宜此方主之

大懷熟八兩　山藥炒四兩　枸杞四兩　山茱萸肉四兩

川牛膝酒洗蒸熟三兩精滑者不用　菟絲子製四兩　鹿膠敲碎炒珠四兩

龜膠切碎炒珠四兩無火者不必用

右先將熟地蒸爛杵膏加煉蜜丸桐子大每食前用滾湯或淡鹽湯送下百餘丸

如真陰失守虛火炎上者宜用純陰至靜之劑於本方去枸杞鹿膠加女貞子三兩麥冬三兩○如火爍肺金乾枯多嗽者加百合三兩○如夜熱骨蒸加地骨皮三兩○如小水不利不清加茯苓三兩○如大便燥結去菟絲加肉蓯蓉三兩○如氣虛者加人參三四兩○如血虛微滯加當歸四兩○如腰膝痠痛加杜仲三兩鹽水炒用○如臟平無火而腎氣不充者加破故紙三兩去心蓮肉胡桃肉各四兩龜膠不必用○右凡五液皆主於腎故凡屬陰分之藥無不皆能走腎

有所必須導引者皆見之不明耳

右歸丸 五 治元陽不足或先天稟衰或勞傷過度以致命門火衰不能生土而為脾胃虛寒飲食少進或嘔惡膨脹或翻胃噎膈或怯寒畏冷或臍腹多痛或大便不實瀉痢頻作或小水自遺虛淋寒疝或寒侵谿谷而肢節痹痛或寒在下焦而水邪浮腫總之真陽不足者必神疲氣怯或心跳不寧或四體不收或眼見邪祟或陽衰無子等證俱速宜益火之原以培右腎之元陽而神氣自強矣此方主之

大懷熟八兩　山藥炒四兩　山茱萸微炒三兩　枸杞微炒四兩

鹿角膠炒珠四兩　菟絲子製四兩　杜仲薑湯炒四兩　當歸三兩便溏勿用

肉桂二兩漸可加至四兩　製附子自二兩漸可加至五六兩

右丸法如前或丸如彈子大每嚼服二三丸以滾白湯送下其效尤速

如陽衰氣虛必加人參以為之主或二三兩或五六兩隨人虛實以為增減蓋人參之功隨陽藥則入陽分隨陰藥則入陰分欲補命門之陽非加人參不能捷效○如陽虛精滑或帶濁便溏加補骨脂酒炒三兩○如飧泄腎泄不止加北五味子三兩肉豆蔻三兩麵炒去油用○如飲食減少或不易化或嘔惡吞酸皆脾胃虛寒之證加乾薑三四兩炒黃用○如腹痛不止加吳茱萸二兩湯泡半日炒用○如腰膝酸痛加胡桃肉連皮四兩○如陰虛陽痿加巴戟肉四兩肉蓯蓉三兩或加黃狗外腎一二付以酒煮爛搗入之

五福飲 六 凡五臟氣血虧損者此能兼治之足稱王道之最

人參隨宜心　熟地隨宜腎　當歸二三錢肝　白朮炒一錢半肺

炙甘草一錢脾

水二鍾煎七分食遠溫服○或加生薑三五片○凡治氣血俱虛等證以此為主或宜溫者加薑附宜散者加升麻柴葛左右逢源無不可也

七福飲 七 治氣血俱虛而心脾為甚者

即前方加棗仁二錢　遠志三五分製用

一陰煎 八 此治水虧火勝之劑故曰一陰凡腎水真陰虛損脈證多陽虛火發熱及陰虛動血等證或瘧疾傷寒屢散之後取汗既多脈虛氣弱而煩渴不止潮熱不退者此以汗多傷陰水虧而然也皆宜用此加減主之

生地二錢　熟地三五錢　芍藥二錢　麥冬二錢

甘草一錢　牛膝一錢半　丹參二錢

水二鍾煎七分食遠溫服○如火盛躁煩者入真龜膠二三錢化服○如氣虛者間用人參一二錢○如心虛不眠多汗者加棗仁當歸各一二錢○如汗多煩躁者加五味子十粒○或加山藥山茱萸○如見微火者加女貞子一二錢○如虛火上浮或吐血或衄血不止者加澤瀉一二錢茜根二錢或加川續斷一二錢以澁之亦妙

加減一陰煎九　治證如前而火之甚者宜用此方

生地　芍藥　麥冬各二錢　熟地三五錢

炙甘草五七分　知母　地骨皮各一錢

水二鍾煎服○如躁煩熱甚便結者加石膏二三錢○如小水熱澁者加梔子一二錢○如火浮於上者加澤瀉一二錢或黃芩一錢○如血燥血少者加當歸一二錢

二陰煎十　此治心經有熱水不制火之病故曰二陰凡驚狂失志多言多笑或瘍疹煩熱失血等證宜此主之

生地二三錢　麥冬二三錢　棗仁二錢　生甘草一錢

玄參一錢半　黃連或一二錢　茯苓一錢半　木通一錢半

水二鍾加燈草二十根或竹葉亦可煎七分食遠服○如痰

勝熱甚者加九製膽星一錢或天花粉一錢五分

三陰煎十一　此治肝脾虛損精血不足及營虛失血等病故曰三陰凡中風血不養筋及瘧疾汗多邪散而寒熱猶不能止是皆少陽厥陰陰虛少血之病微有火者宜一陰煎無火者宜此主之

當歸二三錢　熟地三五錢　炙甘草一錢　芍藥酒炒二錢

棗仁二錢　人參隨宜

水二鍾煎七分食遠服○如嘔惡者加生薑三五片○汗多煩躁者加五味子十四粒○汗多氣虛者加黃芪一二錢○小腹隱痛加枸杞二三錢○如有脹悶加陳皮一錢○如腰膝筋骨無力加杜仲牛膝

四陰煎十二　此保肺清金之劑故曰四陰治陰虛勞損相火熾盛津枯煩渴欬嗽吐衄多熱等證

生地二三錢　麥冬二錢　白芍藥二錢　百合二錢

沙參二錢　生甘草一錢　茯苓一錢半

水二鍾煎七分食遠服○如夜熱盜汗加地骨皮一二錢○如痰多氣盛加貝母二三錢阿膠一二錢天花粉亦可○如金水不能相滋而乾燥喘嗽者加熟地三五錢○如多汗不

眠神魂不寧加棗仁二錢○如多汗兼渴加北五味十四粒○如熱甚者加黃栢一二錢鹽水炒用或玄參亦可但分上下用之○如血燥經遲枯澁不至者加牛膝一二錢○如血熱吐衄加茜根二錢○如多火便燥或肺乾欬咯者加天門冬二錢或加童便亦可○如火載血上者去甘草加炒梔子一二錢

五陰煎十三　凡真陰虧損脾虛失血等證或見溏泄未甚者所重在脾故曰五陰忌用潤滑宜此主之

熟地五七錢或一兩　山藥炒二錢　扁豆炒二三錢　炙甘草一二錢　茯苓一錢半　芍藥炒黃二錢　五味子二十粒　人參隨宜　白朮炒一二錢

水二鍾加蓮肉去心二十粒煎服

大營煎十四　治真陰精血虧損及婦人經遲血少腰膝筋骨疼痛或氣血虛寒心腹疼痛等證

當歸二三錢或五錢　熟地三五七錢　枸杞二錢　炙甘草一二錢　杜仲二錢　牛膝一錢半　肉桂一二錢

水二鍾煎七分食遠溫服○如寒滯在經氣血不能流通筋骨疼痛之甚者必加製附子一二錢方效○如帶濁腹痛者

加故紙一錢炒用○如氣虛者加人參白朮○中氣虛寒嘔惡者加炒焦乾薑一二錢

小營煎十五　治血少陰虛此性味平和之方也

當歸二錢　熟地二三錢　芍藥酒炒二錢　山藥炒二錢　枸杞二錢　炙甘草一錢

水二鍾煎七分食遠溫服○如營虛於上而為驚恐怔忡不眠多汗者加棗仁茯神各二錢○如營虛兼寒者去芍藥加生薑○如氣滯有痛者加香附一二錢引而行之

補陰益氣煎十六　此補中益氣湯之變方也治勞倦傷陰精不化氣或陰虛內乏以致外感不解寒熱痎瘧陰虛便結不通等證凡屬陰氣不足而虛邪外侵者用此升散無不神效

人參一二三錢　當歸二三錢　山藥酒炒二三錢　熟地三五錢或一二兩　陳皮一錢　炙甘草一錢　升麻三五分火浮於上者去此不必用　柴胡一二錢如無外邪者不必用

水二鍾加生薑三五七片煎八分食遠溫服

舉元煎十七　治氣虛下陷血崩血脫亡陽垂危等證有不利於歸熟等劑而但宜補氣者以此主之

人參　黃芪炙各三五錢　炙甘草一二錢　升麻五七分炒用

白术二錢炒

水一鍾半煎七八分溫服○如兼陽氣虛寒者桂附乾薑隨宜佐用○如兼滑脫者加烏梅二個或文蛤七八分

兩儀膏十八　治精氣大虧諸藥不應或以克伐太過耗損真陰凡虛在陽分而氣不化者宜參朮膏若虛在陰分而精不化氣者莫妙於此其有未至大病而素覺陰虛者用以調元尤稱神妙

人參半斤或四兩　大熟地一斤

右二味用好甜水或長流水十五碗浸一宿以桑柴文武火

煎取濃汁若味有未盡再用水數碗煎柤取汁并熬稍濃乃入磁罐重湯熬成膏入真白蜜四兩或半斤收之每以白湯點服○若勞損欬嗽多痰加貝母四兩亦可

貞元飲十九　治氣短似喘呼吸促急提不能升嚥不能降氣道噎塞勢劇垂危者常人但知為氣急其病在上而不知元海無根虧損肝腎此子午不交氣脫證也尤為婦人血海常虧者最多此證宜急用此飲以濟之緩之敢云神劑凡診此證脉必微細無神若微而兼紧尤為可畏倘庸衆不知妄云痰逆氣滯用牛黃蘇合及青陳枳殼破氣等劑則速其危矣

熟地黃七八錢甚者一二兩　炙甘草一二三錢　當歸二三錢

水二鍾煎八分溫服○如兼嘔惡或惡寒者加煨薑三五片○如氣虛脉微至極者急加人參隨宜○如肝腎陰虛手足厥冷加肉桂一錢

當歸地黃飲二十　治腎虛腰膝疼痛等證

當歸二三錢　熟地三五錢　山藥二錢　杜仲二錢

牛膝一錢半　山茱萸一錢　炙甘草八分

水二鍾煎八分食遠服○如下部虛寒加肉桂一二錢甚者仍加附子○如多帶濁去牛膝加金櫻子二錢或加故紙一

錢○如氣虛者加人參一二錢枸杞二三錢

濟川煎二十一　凡病涉虛損而大便閉結不通則硝黃攻擊等劑必不可用若勢有不得不通者宜此主之此用通於補之劑也最妙最妙

當歸三五錢　牛膝二錢　肉蓯蓉酒洗去鹹二三錢

澤瀉一錢半　升麻五七分或一錢　枳殼一錢虛甚者不必用

水一鍾半煎七八分食前服○如氣虛者但加人參無礙○如有火加黃芩○如腎虛加熟地

地黃醴二十二　治男婦精血不足營衛不充等患宜製此常用

之

大懷熟 取味極甘者焙乾或曬乾以去水氣八兩 沉香一錢或白檀三分亦可

枸杞 用極肥者亦烘晒以去潤氣四兩

右約每藥一斤可用高燒酒十斤浸之不必煮但浸十日之外即可用矣凡服此者不得過飲服完又加酒六七斤再浸半月仍可用

歸腎丸 二三 治腎水真陰不足精衰血少腰痠脚軟形容憔悴遺泄陽衰等證○此左歸右歸二丸之次者也

熟地八兩 山藥四兩 山茱萸肉四兩 茯苓四兩

當歸三兩 枸杞四兩 杜仲鹽水炒四兩 菟絲子制四兩

煉蜜同熟地膏為丸桐子大每服百餘丸饑時或滾水或淡鹽湯送下

贊化血餘丹 二四 此藥大補氣血故能烏鬚髮壯形體其於培元贊育之功有不可盡述者

血餘八兩 熟地八兩蒸搗 枸杞 當歸

鹿角膠炒珠 菟絲子制 杜仲鹽水炒 巴戟肉酒浸剝炒乾

小茴香炒略 白茯苓乳拌蒸熟 肉蓯蓉酒洗去鱗甲

胡桃肉各四兩 何首烏小黑豆汁拌蒸七次如無黑豆或人乳牛乳拌蒸俱妙四兩

人參隨便用無亦可

右煉蜜丸服每食前用滾白湯送下二三錢許○精滑者加白朮山藥各三兩○便溏者去蓯蓉加補骨脂酒炒四兩○陽虛者加附子肉桂

養元粉 二五 大能實脾養胃氣

糯米一升水浸一宿瀝乾慢火炒熟 山藥炒 芡實炒

蓮肉各三兩 川椒去目及閉口者炒出汗取紅末二三錢

右為末每日饑時以滾水一碗入白糖三匙化開入藥末一二兩調服之或加四君山查肉各一二兩更妙

玄武豆 二六

羊腰子五十個 枸杞二斤 補骨脂一斤 大茴香六兩

小茴香六兩 肉蓯蓉十兩大便滑者去之 青鹽八兩如無蓯蓉此宜十二兩

大黑豆一斗圓淨者淘洗淨

右用甜水二斗以砂鍋煮前藥七味至半乾去藥渣入黑豆匀火煮乾為度如有餘汁俱宜拌參於內取出用新布攤晾晒乾磁瓶收貯日服之其效無窮如無砂鍋即鐵鍋亦可若陽虛者加制附子一二兩更妙

蟠桃果 二七 治遺精虛弱補脾滋腎最佳

芡實一斤炒　蓮肉一斤去心　膠棗肉一斤　熟地一斤

胡桃肉二斤去皮

右以猪腰六個掺大茴香蒸極熟去筋膜同前藥末搗成餅每日服二個空心食前用滾白湯或好酒一二鍾送下此方凡人參制附子俱可隨意加用

王母桃一　培補脾腎功力最勝

白朮用冬朮腿片味甘者佳苦者勿用以米泔浸一宿切片炒　大懷熟地蒸搗上二味等分

何首烏九蒸　巴戟甘草湯浸剝炒　枸杞子上三味減半

右為末煉蜜搗丸龍眼大每用三四丸饑時嚼服滾湯送下

〇或加人參其功尤大

休瘧飲　此止瘧最妙之劑也若汗散既多元氣不復或以衰老或以弱質而瘧有不能止者俱宜用此此化暴善後之第一方也其有他證加減俱宜如法

人參　白朮炒　當歸各三四錢　何首烏制五錢

炙甘草八分

水一鍾半煎七分食遠服渣再煎或用陰陽水各一鍾煎一鍾柤亦如之俱露一宿次早溫服一鍾飯後食遠再服一鍾

〇如陽虛多寒宜溫中散寒者加乾薑肉桂之類甚者或加

制附子〇如陰虛多熱煩渴喜冷宜滋陰清火者加麥冬生地芍藥甚者加知母或加黃芩〇如腎陰不足水不制火虛煩燥腰痠脚軟或脾虛痞悶者加熟地枸杞山藥杜仲之類以滋脾腎之真陰〇如邪有未淨而留連難愈者於此方加柴胡麻黃細辛紫蘇之屬自無不可〇如氣血多滯者或用酒水各一鍾煎服或服藥後飲酒數杯亦可

和陣

金水六君煎一　治肺腎虛寒水泛為痰或年邁陰虛血氣不足外受風寒咳嗽嘔惡多痰喘急等證神效

當歸二錢　熟地三五錢　陳皮一錢半　半夏二錢

茯苓二錢　炙甘草一錢

水二鍾生薑三五七片煎七八分食遠溫服〇如大便不實而多濕者去當歸加山藥〇如痰盛氣滯胸脇不快者加白芥子七八分〇如陰寒盛而嗽不愈者加細辛五七分〇如兼表邪寒熱者加柴胡一二錢

六安煎二　治風寒咳嗽及非風初感痰滯氣逆等證

陳皮一錢半　半夏二三錢　茯苓二錢　甘草一錢

杏仁一錢去皮尖切 白芥子五七分老年氣弱者不用

水一鍾半加生薑三五七片煎七分食遠服○凡外感風邪欬嗽而寒氣盛者多不易散宜加北細辛七八分或一錢○若冬月嚴寒邪甚者加麻黃桂枝亦可○若風勝而邪不甚者加防風一錢或蘇葉亦可○若頭痛鼻塞者加川芎白芷蔓荊子皆可○若兼寒熱者加柴胡蘇葉○若風邪咳嗽不止而兼肺胃之火者加黃芩一二錢甚者再加知母石膏所用生薑止宜一片○凡寒邪咳嗽痰不利者加當歸二三錢老年者尤宜若氣血不足者當以金水六君煎與此參用○

凡非風初感痰勝而氣不順者加藿香一錢五分兼脹滿者加厚朴一錢暫開痰氣然後察其寒熱虛實而調補之若氣虛猝倒及氣平無痰者皆不可用此

和胃二陳煎 四 治胃寒生痰惡心嘔吐胸膈滿悶噯氣

乾薑炒一二錢 砂仁四五分 陳皮 半夏 茯苓各一錢半 甘草炙七分

水一鍾半煎七分不拘時溫服

苓朮二陳煎 四 治痰飲水氣停蓄心下嘔吐吞酸等證

豬苓一錢半 白朮一二錢 澤瀉一錢半 陳皮一錢

半夏二三錢 茯苓一錢半 炙甘草八分 乾薑炒黃一二錢

水一鍾半煎服○如肝腎兼寒者加肉桂一二錢

和胃飲 五 治寒濕傷脾霍亂吐瀉及痰飲水氣胃脘不清嘔惡脹滿腹痛等證○此即平胃散之變方也凡嘔吐等證多有胃氣虛者一聞蒼朮之氣亦能動嘔故以乾薑代之

陳皮 厚朴各一錢半 乾薑炮一二錢 炙甘草一錢

水一鍾半煎七分溫服○此方凡藿香木香丁香茯苓半夏扁豆砂仁澤瀉之類皆可隨宜增用之若胸腹有滯而兼時氣寒熱者加柴胡

排氣飲 六 治氣逆食滯脹痛等證

陳皮一錢五分 木香七分或一錢 藿香一錢五分 香附二錢

枳殼一錢五分 澤瀉二錢 烏藥二錢 厚朴一錢

水一鍾半煎七分熱服○如食滯者加山查麥芽各二錢○如寒滯者加焦乾薑吳茱萸肉桂之屬○如氣逆之甚者加白芥子沉香青皮檳榔之屬○如嘔而兼痛者加半夏丁香之屬○如痛在小腹者加小茴香○如兼疝者加荔枝核煨熟搗碎用二三錢

大和中飲 七 治飲食留滯積聚等證

陳皮一二錢　枳實一錢　砂仁五分　山查二錢
麥芽二錢　厚朴一錢半　澤瀉一錢半
水一鍾半煎七八分食遠溫服○脹甚者加白芥子胃寒無
火或惡心者加炮乾薑一二錢疼痛者加木香烏藥香附之
類多痰者加半夏

小和中飲八　治胸膈脹悶或婦人胎氣滯滿等證
陳皮一錢五分　山查二錢　茯苓一錢半　厚朴一錢五分
甘草五分　扁豆炒二錢
水一鍾半加生薑三五片煎服○如嘔者加半夏一二錢○

如脹滿氣不順者加砂仁七八分○如火鬱於上者加焦梔
子一二錢○如婦人氣逆血滯者加紫蘇梗香附之屬○如
寒滯不行者加乾薑肉桂之屬

大分清飲九　方在寒陣五

小分清飲十　治小水不利濕滯腫脹不能受補等證此方
主之
茯苓二三錢　澤瀉二三錢　薏仁二錢　豬苓二三錢
枳殼一錢　厚朴一錢
水一鍾半煎七八分食前服○如陰虛水不能達者加生地
牛膝各二錢○如黃疸者加茵陳二錢　如無內熱而寒滯
不行者加肉桂一錢

解肝煎十一　治暴怒傷肝氣逆脹滿陰滯等證如兼肝火者
宜用化肝煎
陳皮　半夏　厚朴　茯苓各一錢半
蘇葉　芍藥各一錢　砂仁七分
水一鍾半加生薑三五片煎服○如脇肋脹痛加白芥子一
錢○如胸膈氣滯加枳殼香附藿香之屬

二术煎十二　治肝強脾弱氣泄濕泄等證

白术炒二錢　蒼术米泔浸炒二錢　芍藥炒黃二錢　陳皮炒一錢五分
炙甘草一錢　茯苓一二錢　厚朴薑湯炒一錢　木香六七分
乾薑炒黃一二錢　澤瀉炒一錢半
水一鍾半煎七分食遠服

廓清飲十三　治三焦壅滯胸膈脹滿氣道不清小水不利年
力未衰通身腫脹或肚腹單脹氣實非水等證
枳殼二錢　厚朴一錢半　大腹皮一二錢　白芥子五七分或一二錢
蘿蔔子生搗一錢如中不甚脹能食者不必用此　茯苓連皮用二三錢
澤瀉二三錢　陳皮一錢

水一鍾半煎七分食遠溫服○如內熱多火小水熱數者加梔子木通各一二錢○如身黃小水不利者加茵陳二錢○如小腹脹滿大便堅實不通者加生大黃三五錢○如肝滯脇痛者加青皮○如氣滯而痛疼痛者加烏藥香附○如食滯者加山查麥芽

扳蟲煎十四　治諸蟲上攻胸腹作痛

陳皮一錢　小茴香一錢　檳榔　烏藥各一錢半
榧肉三錢　吳茱萸五分　烏梅二箇　甘草八分
朱砂　雄黃各五分俱為極細末

右將前八味用水一鍾半煎八分去粗隨入後二味再煎三四沸攪勻徐徐服之○如惡心作吐加炒乾薑一二錢○或先啖牛肉脯少許俟一茶頃頓服之更妙

十香丸十五　治氣滯寒滯諸痛

木香　沉香　澤瀉　烏藥
陳皮　丁香　小茴香　香附酒炒
荔核煨焦等分　皂角微火燒煙盡

右為末酒糊丸彈子大者磨化服丸桐子大者湯引下○癩疝之屬溫酒下

芍藥枳朮丸十六　治食積痞滿及小兒腹大脹滿時常疼痛脾胃不和等證○此方較之枳朮丸其效如神

白朮二兩麪炒　赤芍藥二兩酒炒　枳實一兩麪炒　陳皮一兩

右為末用荷葉湯煮黃老米粥為丸桐子大米飲或滾白湯任下百餘丸○如臟寒加乾薑炒黃者五錢或一二兩○如脾胃氣虛者加人參一二兩

蒼朮丸十七　治寒濕在脾泄瀉久不能愈者

雲茯苓四兩　白芍藥炒黃三兩　炙甘草一兩　川椒去閉口者炒出汗
小茴香炒各一兩　厚朴三兩薑汁炒　真茅山蒼朮八兩米泔浸一宿切炒如無即以好

白朮代之　破故紙酒浸二日曬乾炒香四兩

右為末糯米糊為丸桐子大每食遠清湯送下七八十丸

貝母丸十八　治痰熱喘滿止咳或肺癰肺痿乃治標之妙劑

貝母一兩為末用砂糖或蜜和丸龍眼大或噙化或嚼服之○若欲劫止久嗽每貝母一兩宜加百藥煎　蓬砂　天竺黃各一錢佐之尤妙如無百藥煎即醋炒文蛤一錢亦可或玄明粉亦可酌用○若治肺癰宜加白礬一錢同貝母丸服如前最妙

括痰丸十九　治一切停痰積飲吞酸嘔酸胸脇脹悶疼痛等

證

半夏製二兩　白芥子二兩研　乾薑炒黃一兩　茯苓二兩

炙甘草五錢　陳皮四兩用鹽二錢入水中半浸一宿晒乾

右為末湯浸蒸餅為丸綠豆大每服一錢許滾白湯送下○如脇肋疼痛者加台烏藥　兩

神香散二　治胸脇胃脘逆氣難解疼痛嘔噦脹滿痰飲膈噎諸藥不效者惟此最妙

丁香　白豆蔻或砂仁亦可

右二味等分為末清湯調下五七分甚者一錢日數服不拘○若寒氣作痛者薑湯送下

攻陣

吐法一　此方可代瓜蒂三聖散之屬凡邪實上焦或痰或食或氣逆不通等證皆可以此吐之

用蘿蔔子搗碎以溫湯和攪取淡湯徐徐飲之少頃即當吐出即有吐不盡者亦必從下行矣○又法以蘿蔔子為末溫水調服一匙良久吐涎沫愈

一法用鹽少許於熱鍋中炒紅色乃入以水煮至將滾未滾之際攪勻試其鹹味稍淡乃可飲之每用半碗漸次增飲自然發吐以去病為度而止○一法凡諸藥皆可取吐但隨證作湯劑探而吐之無不可也

赤金豆二　○亦名八仙丹○治諸積不行凡血凝氣滯疼痛腫脹虫積結聚癥堅宜此主之此丸去病捷速較之硇黃稜莪之類過傷臟氣者大為勝之

巴霜去皮膜略去油一錢半　生附子切略炒燥二錢

皂角二錢炒微焦　輕粉一錢　丁香　木香

天竺黃各三錢　辰砂二錢為衣

右為末醋浸蒸餅為丸蘿蔔子大辰砂為衣欲漸去者每服五七丸欲驟行者每服一二十丸用滾水或煎藥或薑醋茶蜜茴香史君煎湯為引送下若利多不止可飲冷水一二口即止蓋此藥得熱則行得冷則止也○如治氣濕實滯鼓脹先用紅棗煮熟取肉一錢許隨用七八丸甚者一二十丸同棗肉研爛以熱燒酒加白糖少許送下　如治虫痛亦用棗肉加服止用清湯送下

太平丸三　治胸腹疼痛脹滿及食積氣積血積氣疝血疝邪實秘滯痛劇等證○此方借巴豆以行群藥之力去

滯最妙如欲其峻須用巴豆一錢

陳皮 厚朴 木香 烏藥

白芥子 草豆蔻 三稜 蓬术 煨

乾薑 牙皂 炒斷烟 澤瀉 各三錢

以上十一味俱為細末

巴豆 用滾湯泡去皮心膜稱足一錢用水一碗微火煮至半碗將巴豆撈起用乳缽研極細仍將前湯攙入研勻然後量藥多寡入蒸餅浸爛搗丸前藥如綠豆大每用三分或五分甚者一錢

右隨證用湯引送下○凡傷食停滯即以本物湯下○婦人血氣痛紅花湯或當歸湯下○氣痛陳皮湯○疝氣茴香湯○寒氣生薑湯○欲瀉者用熱薑湯送下一錢○未利再服○利多不止用冷水一二口即止

敦阜丸 四 治堅頑食積停滯腸胃痛劇不行等證

木香 山查 麥芽 皂角

丁香 烏藥 青皮 陳皮

澤瀉 各五錢 巴霜 一錢

右共為末用生蒜頭一兩研爛加熟水取汁浸蒸餅搗丸綠豆大每服二三十丸隨便用湯引送下如未愈徐徐漸加用之

獵虫丸 五 治諸虫積脹痛黃瘦等病

蕪荑 雷丸 桃仁 乾漆 炒烟盡

雄黃 微炒 錫灰 皂角 燒烟盡 檳榔

史君子 各等分 輕粉 減半 細榧肉 加倍

湯或蒸餅為丸綠豆大每服五七分滾白湯下陸續服之○如虫積堅固者加巴豆霜與輕粉同

百順丸 六 治一切陽邪積滯凡氣積血積蟲積食積傷寒實熱秘結等證但各為湯引隨宜送下無往不利

川大黃 錦紋者一斤 牙皂角 炒微黃一兩六錢

右為末用湯浸蒸餅搗丸綠豆大每用五分或一錢或二三錢酌宜用引送下或用蜜為丸亦可

散陣

柴胡飲 一 一為水數從寒散也○凡感四時不正之氣或為發熱或為寒熱或因勞因怒或婦人熱入血室或產後經後因而感寒以致寒熱如瘧等證但外有邪而內兼火者

須從涼散宜此主之

柴胡二三錢　黃芩一錢半　芍藥二錢　生地一錢半　陳皮一錢半　甘草八分

水一鍾半煎七八分溫服○如內熱甚者加連翹一二錢隨宜○如外邪甚者加防風一錢佐之○如邪結在胸而痞滿者去生地加枳實一二錢○如熱在陽明而兼渴者加天花粉或葛根一二錢熱甚者加知母石膏亦可

二柴胡飲　二為火數從溫散也○凡遇四時外感或其人元氣充實臟氣素平無火或時逢寒勝之令本無內熱等證者皆不宜妄用涼藥以致寒滯不散則為害非淺宜此主之

陳皮一錢半　半夏二錢　細辛一二錢　厚朴一錢半　生薑三五七片　柴胡一錢半或二三錢　甘草八分

水一鍾半煎七八分溫服○如邪盛者可加羌活白芷防風紫蘇之屬擇而用之○如頭痛不止者加川芎一二錢○如多濕者加蒼朮○如陰寒氣勝必加麻黃一二錢或兼桂枝不必疑也

三柴胡飲　三為木數從肝經血分也○凡人素稟陰分不足或肝經血少而偶感風寒者或感邪不深可兼補而散者或病後產後感冒有不得不從解散而血氣虛弱不能外達者宜此主之

柴胡二三錢　芍藥一錢半　炙甘草一錢　陳皮一錢　生薑三五片　當歸二錢溏泄者易以熟地

水一鍾半煎七八分溫服○如微寒咳嘔者加半夏一二錢

四柴胡飲　四為金數從氣分也○凡人元氣不足或忍饑勞倦而外感風寒或六脈緊數微細正不勝邪等證必須培助元氣兼之解散庶可保全宜此主之若但知散邪不顧根本未有不元氣先敗者察之慎之

柴胡一二錢　炙甘草一錢　生薑三五七片　當歸二三錢瀉者少用　人參二三錢或五七錢酌而用之

水二鍾煎七八分溫服○如胸膈滯悶者加陳皮一錢

五柴胡飲　五為土數從脾胃也○脾土為五臟之本凡中氣不足而外邪有不散者非此不可此與四柴胡飲相表裏但四柴胡飲止調氣分此則兼培血氣以逐寒邪尤切於時用者也神效不可盡述凡傷寒瘧疾痘瘡皆所宜用

柴胡一二三錢　當歸二三錢　熟地三五錢　白朮二三錢

芍藥錢生炒用　炙甘草一錢　陳皮酌用或不必用

水一鍾半煎七分食遠熱服○寒勝無火者減芍藥加生薑三五七片或炮乾薑一二錢或再加桂枝一二錢則更妙○脾滯者減白朮○氣虛者加人參隨宜　腰痛者加杜仲○頭痛者加川芎○勞倦傷脾陽虛者加升麻一錢

正柴胡飲六　凡外感風寒發熱惡寒頭疼身痛痎瘧初起等證凡血氣平和宜從平散者此方主之

柴胡一二三錢　防風一錢　陳皮一錢半　芍藥二錢

甘草一錢　生薑三五片

水一鍾半煎七八分熱服○如頭痛者加川芎一錢○如熱而兼渴者加葛根一二錢○如嘔惡者加半夏一錢五分○如濕勝者加蒼朮一錢○如胸腹有微滯者加厚朴一錢○如寒氣勝而邪不易解者加麻黃一二三錢去浮沫服之或蘇葉亦可

麻桂飲七　治傷寒瘟疫陰暑瘧疾凡陰寒氣勝而邪有不能散者非此不可無論諸經四季凡有是證即宜是藥勿謂夏月不可用也不必厚蓋但取津津微汗透徹為度此實麻黃桂枝二湯之變方而其神效則大有超出二方者不可不為細察

官桂一二錢　當歸三四錢　炙甘草一錢　陳皮隨宜用或不用亦可

麻黃二三錢

水一鍾半加生薑五七片或十片煎八分去浮沫不拘時服○若陰氣不足者加熟地黃三五錢○若三陽併病者加柴胡二三錢○若元氣大虛陰邪難解者當以大溫中飲更迭為用

大溫中飲八　凡患陽虛傷寒及一切四時勞倦寒疫陰暑之氣身雖熾熱時猶畏寒即在夏月亦欲衣被覆蓋或喜熱

湯或兼嘔惡泄瀉但六脈無力肩背怯寒邪氣不能外達等證此元陽大虛正不勝邪之候若非峻補托散則寒邪日深必致不救溫中自可散寒即此方也服後畏寒悉除覺有躁熱乃陽回作汗佳兆不可疑之畏之○此外凡以素禀薄弱之輩或感陰邪時疫發熱困倦雖未見如前陰證而熱邪未甚者但於初感時即速用此飲連進二三服無不隨愈真神劑也○此方宜與理陰煎麻桂飲相參用

熟地三五七錢　冬白朮三五錢　當歸三五錢如泄瀉者不宜用或以山藥代之

人參二三錢甚者一兩或不用亦可　炙甘草一錢　柴胡二三四錢

麻黃一二錢 肉桂一二錢 乾薑炒熟一二錢或用煨生薑三五七片亦可

水二鍾煎七分去浮沫溫服或略蓋取微汗○如氣虛加黃芪二三錢○如寒甚陽虛者加制附子一二錢○頭痛加川芎或白芷細辛○陽虛氣陷者加升麻○如肚腹泄瀉宜少減柴胡加防風細辛亦可○嘗見傷寒之治惟仲景能知溫散如麻黃桂枝等湯是也亦知補氣而散如小柴胡之屬是也至若陽根於陰汗化於液從補血而散而云腾致雨之妙則仲景猶所未及故予制此方乃邪從營解第一義也其功難悉所當深察

柴陳煎九 治傷風兼寒咳嗽發熱痞滿多痰等證

柴胡二三錢 陳皮一錢半 半夏二錢 茯苓二錢

甘草一錢 生薑三五七片

水一鍾半煎七分食遠溫服○如寒勝者加細辛七八分○如風勝氣滯者加蘇葉一錢五分○如冬月寒甚者加麻黃一錢五分○氣逆多嗽者加杏仁一錢○痞滿氣滯者加白芥子五七分

柴芩煎十 治傷寒表邪未解外內俱熱瀉痢煩渴喜冷氣壯脈滑數者宜此主之及瘧痢並行內熱去血兼表邪發黃等證

柴胡二三錢 黃芩 梔子 澤瀉

木通各二錢 枳殼一錢五分

水二鍾煎八分溫服○如瘧痢並行鮮血純血者加芍藥二錢甘草一錢○如濕勝氣陷者加防風一錢

柴苓飲十一 治風濕發黃發熱身痛脈緊表裏俱病小水不利中寒泄瀉等證

柴胡二三錢 豬苓 茯苓 澤瀉各二錢

白朮二三錢 肉桂一二三錢

水一鍾半煎服○如寒邪勝者加生薑三五片○如汗出熱不退者加芍藥一二錢

柴胡白虎煎十二 治陽明溫熱表邪不解等證

柴胡二錢 石膏三錢 黃芩一錢 麥冬二錢

細甘草七分

水一鍾半加竹葉二十片煎服

歸葛飲十三 治陽明溫暑時證大熱大渴津液枯涸陰虛不能作汗等證

當歸三五錢 乾葛二錢

水一鍾煎一鍾以冷水浸涼徐徐服之得汗即解

柴葛煎十四 方在因陣十八

治瘟毒表裏俱熱

秘傳走馬通聖散十五 治傷寒陰邪初感等證○此方宜用於倉卒之時其有質強而寒甚者俱可用

麻黃 炙甘草各一兩 雄黃二錢

右爲細末每服一錢熱酒下即汗○或加川芎二錢

秘傳白犀丹十六 發散外感瘟疫癰毒等證

白犀角 麻黃去節 山茨菇 玄明粉

血竭 甘草各一錢 雄黃八分

右共爲末用老薑汁拌丸如棗核大外以紅棗去核將藥塡入棗內用薄紙裹十五個入砂鍋內炒令烟盡存性取出去棗肉每藥一錢入冰片一分麝香半分研極細瓷罐收貯用時以角簪蘸麻油粘藥點眼大角輕者只點眼角重者仍用此須吹鼻男先左女先右吹點皆同如病甚者先吹鼻後點眼點後踡脚坐起用被齊項暖蓋半炷香時自當汗出邪解如汗不得出或汗不下達至腰者不治

又一製法將前藥用薑汁拌作二丸以烏金紙兩層包定外搗紅棗肉如泥包藥外約半指厚晒乾入砂鍋內再炒以砂盆用鹽泥固縫但留一小孔以候烟色乃上下加炭火先文後武待五色烟盡取出去棗肉每藥一錢止加冰片二分不用麝香○忌生冷麪食魚腥七情

右藥凡傷寒瘟疫及小兒痘毒痧閉癰毒喉痹及陰毒冷氣攻心或婦人吹乳或眼目腫痛鼻壅閉塞者皆治之

歸柴飲十七 治營虛不能作汗及眞陰不足外感寒邪難解者此神方也○如大便多溏者以冬朮代當歸亦佳

當歸一兩 柴胡五錢 炙甘草八分

水一鍾半煎服○或加生薑三五片○或加陳皮一錢○或加人參

寒陣

保陰煎一 治男婦帶濁遺淋色赤帶血脈滑多熱便血不止及血崩血淋或經期太早凡一切陰虛內熱動血等證

生地 熟地 芍藥各二錢 山藥

川續斷 黃芩 黃柏各一錢半 生甘草一錢

水二鍾煎七分食遠溫服○如小水多熱或兼怒火動血者

加焦梔子一二錢○如夜熱身熱加地骨皮一錢五分○如肺熱多汗者加麥冬棗仁○如血熱甚者加黃連一錢五分○如血虚血滯筋骨腫痛者加當歸二三錢○如氣滯而痛去熟地加陳皮青皮丹皮香附之屬○如血脫血滑及便血久不止者加地榆一二錢或烏梅一二個或百藥煎一二錢文蛤亦可○如少年或血氣正盛者不必用熟地山藥○如肢節筋骨疼痛或腫者加秦艽丹皮各一二錢

加減一陰煎二　方在補陣九

治水虧火勝之甚者

抽薪飲三　治諸凡火熾盛而不宜補者

黃芩　石斛　木通　梔子炒

黃柏各一二錢　枳殼錢半　澤瀉錢半　細甘草三分

水一鍾半煎七分食遠溫服内熱甚者冷服更佳○如熱在經絡肌膚者加連翹天花粉以解之○熱在血分大小腸者加槐蕊黃連以清之○熱在陽明頭面或躁煩便實者加生石膏以降之○熱在下焦小水痛澀者加草龍膽車前以利之○熱在陰分津液不足者加門冬生地芍藥之類以滋之○熱在腸胃實結者加大黃芒硝以通之

徙薪飲四　治三焦凡火一切内熱漸覺而未甚者先宜清以此劑其甚者宜抽薪飲

陳皮八分　黃芩二錢　麥冬　芍藥

黃柏　茯苓　牡丹皮各一錢半

水一鍾半煎七分食遠溫服○如多鬱氣逆傷肝脇肋疼痛或致動血者加青皮梔子

大分清飲五　治積熱閉結小水不利或致腰腹下部極痛或濕熱下利黃疸溺血邪熱蓄血腹痛淋閉等證

茯苓　澤瀉　木通各二錢　豬苓

梔子或倍之　枳殼　車前子各一錢

水一鍾半煎八分食遠溫服○如内熱甚者加黃芩黃柏草龍膽之屬○如大便堅硬脹滿者加大黃二三錢○如黃疸小水不利熱甚者加茵陳二錢○如邪熱蓄血腹痛者加紅花青皮各一錢五分

清流飲六　治陰虚挾熱瀉痢或發熱或喜冷或下純紅鮮血或小水痛赤等證

生地　芍藥　茯苓　澤瀉各二錢

當歸二錢　甘草一錢　黃芩　黃連各錢半

枳殼一錢

水一鍾半煎服○如熱甚者加黃栢○小水熱痛者加梔子

化陰煎七　治水虧陰涸陽火有餘小便癃閉淋濁疼痛等證

生地黃　熟地黃　牛膝　猪苓

澤瀉　生黃栢　生知母各二錢　綠豆三錢

龍膽草錢半　車前子一錢

水二鍾加食鹽少許用文武火煎八分食前溫服或冷服○若水虧者多而陰氣大有不足者可再加熟地黃即用至一二兩亦可

茵陳飲八　治挾熱泄瀉熱痢口渴喜冷小水不利黃疸濕熱閉澀等證

茵陳　焦梔子　澤瀉　青皮各二錢

甘草一錢　甘菊花二錢

用水三四鍾煎兩鍾不時陸續飲之治熱瀉者一服可愈

清膈煎九　治痰因火動氣壅喘滿內熱煩渴等證

陳皮一錢半　貝母二三錢微敲破　膽星一二錢　海石二錢

白芥子五七分　木通二錢

水一鍾半煎七分溫服○如火盛痰不降者加童便一小鍾○如渴甚者加天花粉一錢○如熱及下焦小水不利者加梔子一錢半○如熱在上焦頭面紅赤煩渴喜冷者加生石膏二三錢○如痰火上壅而小水不利者加澤瀉一二錢○如痰火閉結大便不通而兼脹滿者加大黃數錢或朴硝一二錢酌宜用之

化肝煎十　治怒氣傷肝因而氣逆動火致為煩熱脇痛脹滿動血等證

青皮　陳皮各二錢　芍藥二錢　丹皮

梔子炒　澤瀉各一錢半如血見下部者以甘草代之　土貝母二三錢

水一鍾半煎七八分食遠溫服○如大便下血者加地榆小便下血者加木通各一錢五分○如兼寒熱加柴胡一錢○如火盛加黃芩一二錢○如脇腹脹痛加白芥子一錢○脹滯多者勿用芍藥

安胃飲十一　治胃火上衝呃逆不止

陳皮　山查　麥芽　木通

澤瀉　黃芩　石斛

水一鍾半煎七分食遠服○如胃火熱甚脈滑實者加石膏

玉女煎十二　治水虧火盛，六脉浮洪滑大，少陰不足，陽明有餘，煩熱乾渴，頭痛牙疼，失血等證如神。若大便溏泄者，乃非所宜。

生石膏三五錢　熟地三五錢或一兩　麥冬二錢　知母　牛膝各錢半

水一鍾半，煎七分，溫服或冷服。○如火之盛極者，加梔子、地骨皮之屬亦可。○如多汗多渴者，加北五味十四粒。○如小水不利，或火不能降者，加澤瀉一錢五分，或茯苓亦可。○如金水俱虧，因精損氣者，加人參二三錢尤妙。

太清飲十三　治胃火煩熱，狂斑嘔吐等證。可與白虎湯出入酌用。

知母　石斛　木通各一錢半　石膏生用，五七錢

水一鍾半，煎七分，溫服或冷服。○或加麥門冬。

綠豆飲十四　凡熱毒劳熱，諸火熱極不能退者，用此最妙。

用綠豆不拘多寡，寬湯煮糜爛，入鹽少許，或蜜亦可，待冰冷，或厚或稀或汁，任意飲食之，日或三四次不拘。此物性非苦寒，不傷脾氣，且善於解毒除煩，退熱止渴，大利小水，乃浮中之最佳最捷者也。若火盛口甘，不宜厚味，但略煮半熟，清湯冷飲之，尤善除煩清火。

玉泉散十五　亦名一六甘露散。治陽明內熱，煩渴頭痛，二便閉結，溫疫斑黃，及熱痰喘嗽等證。○此益元散之變方也，其功倍之。

石膏六兩，生用　粉甘草一兩

上為極細末，每服一二三錢，新汲水或熱湯或人參湯調下。○此方加朱砂三錢亦妙。

雪梨漿十六　解煩熱，退陰火，此生津止渴之妙劑也。

用清香甘美大梨，削去皮，別用大碗盛清冷甘泉，將梨薄切，浸於水中，少頃，水必甘美，但頻飲其水，勿食其滓，退陰火極速也。

滋陰八味丸十七　治陰虛火盛，下焦濕熱等證。○此方變丸為湯，即名滋陰八味煎。

山藥四兩　丹皮三兩　白茯苓三兩　山茱萸肉四兩　澤瀉三兩　黃柏鹽水炒，三兩　熟地黃八兩，蒸搗　知母鹽水炒，三兩

右加煉蜜搗丸，梧桐子大。或空心，或午前，用滾白湯或淡鹽湯送下百餘丸。

約陰丸十八　治婦人血海有熱，經脉先期或過多者，或兼腎

火而帶濁不止及男婦大腸血熱便紅等證

當歸　白朮炒　芍藥酒炒　生地

茯苓　地榆　黃芩　白石脂醋煅淬

北五味　丹參　川續斷各等分

右爲末煉蜜丸服○火甚者倍用黃芩○兼肝腎之火甚者仍加知母黃柏各等分○大腸血熱便紅者加黃連防風各等分

服蠻煎二十九　此方性味極輕極清善入心肝二臟行滯氣開鬱結通神明養正除邪大有奇妙

生地　麥門冬　芍藥　石菖蒲

石斛　川丹皮極香者　茯神各二錢　陳皮一錢

木通　知母各一錢半

水一鍾半煎七分食遠服○如痰勝多鬱者加貝母二錢○痰盛兼火者加膽星一錢五分○陽明火盛內熱狂叫者加石膏二三錢○便結脹滿多熱者加玄明粉二三錢調服或暫加大黃亦可○氣虛神困者加人參隨宜

約營煎三十　治血熱便血無論脾胃小腸大腸膀胱等證皆宜用此

生地　芍藥　甘草　續斷

地榆　黃芩　槐花　荊芥穗炒焦

烏梅二個

水一鍾半煎七分食前服○如下焦火盛者可加梔子黃連龍膽草之屬○如氣虛者可加人參白朮○如氣陷者加升麻防風

熱陣

四味回陽飲一　治元陽虛脫危在頃刻者

人參一二兩　製附子二三錢　炙甘草一二錢　炮乾薑二三錢

水二鍾武火煎七八分溫服徐徐飲之

六味回陽飲二　治陰陽將脫等證

人參一二兩或數錢　製附子二三錢　炮乾薑二三錢　炙甘草一錢

熟地五錢或一兩　當歸身三錢如泄瀉者或血動者以冬朮易之多多益善

水二鍾武火煎七八分溫服○如肉振汗多者加炙黃芪四五錢或一兩或冬白朮三五錢○如泄瀉者加烏梅二枚或北五味二十粒亦可○如虛陽上浮者加茯苓二錢○如肝經鬱滯者加肉桂二三錢

理陰煎三　此理中湯之變方也○凡脾腎中虛等證宜剛燥者當用理中六君之類宜溫潤者當用理陰大營之類欲知調補當先察此○此方通治真陰虛弱脹滿嘔噦痰飲惡心吐瀉腹痛婦人經遲血滯等證○又凡真陰不足或素多勞倦之輩因而忽感寒邪不能解散或發熱或頭身疼痛或面赤舌焦或雖渴而不喜冷飲或背心肢體畏寒但脈見無力者悉是假熱之證若用寒涼攻之必死宜速用此湯照後加減以溫補陰分托散表邪連進數服使陰氣漸充則汗從陰達而寒邪不攻自散此最切於時用者也神效不可盡述

熟地三五七錢或一二兩　當歸二三錢或五七錢

炙甘草一二錢　乾薑炒黃色一二三錢　或加桂肉一二錢

水二鍾煎七八分熱服○此方加附子即名附子理陰煎再加人參即名六味回陽飲治命門火衰陰中無陽等證○若風寒外感邪未入深但見發熱身痛脈數不洪凡內無火證素稟不足者但用此湯加柴胡一錢半或二錢連進一二服其效如神若寒凝陰盛而邪有難解者必加麻黃一二錢放心用之或不用柴胡亦可恐其清利也此寒邪初感溫散第一方惟仲景獨知此義第仲景之溫散首用麻黃桂枝二湯余之溫散即以理陰煎及大溫中飲爲增減此雖一從陽分一從陰分其跡若異然一逐於外一托於內而用溫則一也學者當因所宜酌而用之○若陰勝之時外感寒邪脈細惡寒或背畏冷者乃太陽少陰證也加細辛一二錢甚者再加附子一二錢真神劑也或并加柴胡以助之亦可○若陰虛火盛其有內熱不宜用溫而氣血俱虛邪不能解者宜去薑桂單以三味加減與之或止加人參亦可○若治脾腎兩虛水泛爲痰或嘔或脹者於前方加茯苓一錢半或加白芥子五分以行之○若泄瀉不止及腎泄者少用當歸或并去之加山藥扁豆吳茱萸破故肉豆蔻附子之屬○若腰腹有痛加杜仲枸杞○若腹有脹滯疼痛加陳皮木香砂仁之屬

養中煎四　治中氣虛寒爲嘔爲泄者

人參一二三錢　山藥炒二錢　白扁豆炒二三錢　炙甘草一錢

茯苓二錢　乾薑炒黃一二錢

水二鍾煎七分食遠溫服○如嘔腐氣滯者加陳皮一錢或砂仁四分○如胃中空虛覺餒者加熟地三五錢

溫胃飲五　治中寒嘔吐吞酸泄瀉不思飲食及婦人臟寒嘔惡胎氣不安等證

人參一二三錢或一兩 白术炒，一二錢或一兩 扁豆炒，二錢 陳皮一錢或不用 乾薑炒焦，一二三錢 炙甘草一錢 當歸一二錢，滑泄者勿用

水二鍾，煎七分，食遠溫服。○如下寒帶濁者，加破故紙一錢。○如氣滯或兼胸腹痛者，加藿香、丁香、木香、白豆蔻、砂仁、白芥子之屬。○如兼外邪及肝腎之病者，加桂枝、肉桂，甚者加柴胡。○如脾氣陷而身熱者，加升麻五七分。○如水泛為痰而胸腹痞滿者，加茯苓一二錢。○如脾胃虛極，大嘔大吐不能止者，倍用參术，仍加胡椒二三分許，煎熟徐徐服之。

五君子煎六 治脾胃虛寒，嘔吐泄瀉而兼濕者。

人參二三錢 白术 茯苓各二錢 炙甘草一錢 乾薑炒黃，一二錢

水一鍾半，煎服。

六味異功煎七 治證同前而兼微滯者。

即前方加陳皮一錢。○此即五味異功散加乾薑也。

參薑飲八 治脾肺胃氣虛寒，嘔吐，欬嗽，氣短，小兒吐乳等證。

人參三五錢，或倍之 炙甘草三五分 乾薑炮，五分或一二錢，或用煨生薑三五片

水一鍾半，煎七八分，徐徐服之。○此方或陳皮，或蓽撥，或茯苓，皆可酌而佐之。

胃關煎九 治脾腎虛寒作瀉，或甚至久瀉，腹痛不止，冷痢等證。

熟地三五錢或一兩 山藥炒，二錢 白扁豆炒，二錢 炙甘草一二錢 焦乾薑一二三錢 吳茱萸製，五七分 白术炒，一二三錢

水二鍾，煎七分，食遠溫服。○瀉甚者加肉豆蔻一二錢，麪炒用，或破故紙亦可。○氣虛勢甚者加人參，隨宜用。○陽虛下脫不固者，加製附子一二三錢。○腹痛甚者加木香七八分，

或加厚朴八分。○滯痛不通者，加當歸二三錢。○滑脫不禁者，加烏梅二個，或北五味子二十粒。○若肝邪侮脾者，加肉桂一二錢。

佐關煎十 治生冷傷脾，瀉痢未久，腎氣未損者，宜用此湯以去寒濕，安脾胃，此胃關煎之佐者也。

厚朴炒，一錢 陳皮炒，一錢 山藥炒，二錢 扁豆炒，二錢 炙甘草七分 猪苓二錢 澤瀉二錢 乾薑炒，一二錢 肉桂一二錢

水一鍾半，煎服。○如腹痛甚者，加木香三五分，或吳茱萸亦

可。如瀉甚不止者，或破故紙，或肉豆蔻，皆可加用。

抑扶煎十一　治氣冷陰寒，或暴傷生冷，致成瀉痢。凡初起血氣未衰，脾腎未敗，或脹痛，或嘔惡，皆宜先用此湯。此胃關煎表裏藥也，宜察虛實用之。其有寒濕傷臟，霍亂邪實者，最宜用此。

厚朴　陳皮　烏藥各一錢五分　豬苓二錢
澤瀉一錢　炙甘草一錢　乾薑炮，一二錢　吳茱萸製，五七分

水一鍾半，煎七分，食遠溫服。如氣滯痛甚者，加木香五七分，或砂仁亦可。如血虛多痢者，加當歸二錢。如寒濕勝者，加蒼朮一錢半。

四維散十二　治脾腎虛寒滑脫之甚，或泄痢不能止，或氣虛下陷，二陰血脫不能禁者，無出此方之右。

人參一兩　製附子二錢　乾薑炒黃，二錢　炙甘草一二錢
烏梅肉五分或一錢，酌其味之微甚，隨病人之意而用之，或不用此亦可，總是陰陽伏也

右為末，和勻，用水拌濕，蒸一飯頃，取起烘乾，再為末，每服一二錢，溫湯調下。

鎮陰煎十三　治陰虛於下，格陽於上，則真陽失守，血隨而溢，以致大吐大衄，六脈細脫，手足厥冷，危在頃刻而血不能止者，速宜用此，使孤陽有歸，則血自安也。如治格陽喉痺上熱者，當以此湯冷服。

熟地一二兩　牛膝二錢　炙甘草一錢　澤瀉一錢半
肉桂一二錢　製附子五七分或一二三錢

水二鍾，速煎服。如兼嘔惡者，加乾薑炒黃一二錢。如氣脫倦言而脈弱極者，宜速速多加人參，隨宜用之。

歸氣飲十四　治氣逆不順，呃逆嘔吐，或寒中脾腎等證。

熟地三五錢　茯苓二錢　扁豆二錢　乾薑炮
丁香　陳皮各一錢　藿香一錢五分　炙甘草八分

水一鍾半，煎七分，食遠溫服。如中氣寒甚者，加製附子。肝腎寒者，加吳茱萸、肉桂，或加當歸。

暖肝煎十五　治肝腎陰寒，小腹疼痛，疝氣等證。

當歸二三錢　枸杞三錢　茯苓二錢　小茴香二錢
肉桂一二錢　烏藥二錢　沉香一錢，或木香亦可

水一鍾半，加生薑三五片，煎七分，食遠溫服。如寒甚者，加吳茱萸、乾薑，再甚者加附子。

壽脾煎十六　一名攝營煎　治脾虛不能攝血等證。凡憂思鬱怒積勞及誤用攻伐等藥犯損脾陰，以致中氣虧陷，神魂不

寧大便脫血不止或婦人經火崩淋等證凡兼嘔惡尤為危候速宜用此單救脾氣則統攝固而血自歸源此歸脾湯之變方其效如神若犯此證而再用寒涼則胃氣必脫無不即斃者

白朮二三錢 當歸二錢 山藥二錢 炙甘草一錢 棗仁錢半 遠志製三五分 乾薑炮一二三錢 蓮肉去心炒二十粒 人參隨宜一二錢急者用一兩

水二鍾煎服○如血未止加烏梅二個凡畏酸者不可用或加地榆一錢半亦可○滑脫不禁者加醋炒文蛤一錢下焦虛滑不禁加鹿角霜二錢為末攪入藥中服之氣虛甚者加炙黃芪二三錢○氣陷而墜者加炒升麻五七分或白芷亦可○血虛滑者加補骨脂一錢炒用○陽虛畏寒者加製附子一二三錢○血去過多陰虛氣餒心跳不寧者加熟地七八錢或一二兩

三氣飲十七 治血氣虧損風寒濕三氣乘虛內侵筋骨歷節痺痛之極及痢後鶴膝風痛等證

當歸 枸杞 杜仲各二錢 熟地三錢或五錢 牛膝 茯苓 芍藥酒炒 肉桂各一錢 北細辛或代以獨活 白芷 炙甘草各一錢 附子隨宜一二錢

水二鍾加生薑三片煎服○如氣虛者加人參白朮隨宜○風寒勝者加麻黃一二錢○此飲亦可浸酒大約每藥一斤可用燒酒六七升浸十餘日徐徐服之

五德丸十八 治脾腎虛寒飧泄鶩溏等證或暴傷生冷或受時氣寒濕或酒濕傷脾腹痛作泄或飲食失宜嘔惡痛泄無火等證

補骨脂四兩酒炒 吳茱萸製二兩 木香二兩 乾薑四兩炒 北五味二兩或以肉豆蔻代之麪炒用或用烏藥亦可

湯浸蒸餅丸桐子大每服六七十丸甚者百餘丸滾白湯或人參湯或米湯俱可下○腹痛多嘔者加胡椒二兩更妙

七德丸十九 治生冷傷脾初患瀉痢肚腹疼痛凡年壯氣血未衰及寒濕食滯凡宜和胃者無不神效此即佐關煎之偏裨也

台烏藥 吳茱萸製 乾薑炒黃 蒼朮炒各二兩 木香 茯苓各一兩 補骨脂炒四兩

神麯糊丸桐子大每服七八十丸或百丸滾白湯送下

復陽丹 二十 治陰寒嘔吐泄瀉腹痛寒疝等證

附子 製 炮薑 胡椒 北五味 炒

炙甘草 各一兩 白麪 二兩炒熟

右為末和勻入溫湯擣丸桐子大每服一錢隨證用藥引送下

黃芽丸 二十一 治脾胃虛寒或飲食不化或時多脹滿泄瀉吞酸嘔吐等證此藥隨身常用甚妙

人參 二兩 焦乾薑 二錢

煉白蜜為丸芡實大常嚼服之

一炁丹 二十二 治脾腎虛寒不時易瀉腹痛陽痿怯寒等證○此即參附湯之變方也

人參 製附子 各等分

煉白蜜丸如綠豆大每用滚白湯送下三五分或一錢凡藥餌不便之處或在途次隨帶此丹最妙

九炁丹 二十三 治脾腎虛寒如五德丸之甚者

熟地 八兩 製附子 四兩 肉豆蔻 麪炒二兩 焦薑

吳茱萸 補骨脂 酒炒 蓽茇 炒 五味子 炒各二兩

粉甘草 炒一兩

煉白蜜為丸或山藥糊丸如桐子大每服六七十丸或百丸滚白湯下○如氣虛者加人參或二兩或四兩尤妙甚

溫臟丸 二十四 治諸蟲積既逐而復生者多由臟氣虛寒宜溫健脾胃以杜其源此方主之

人參 隨宜用或一二兩或無亦可 白术 米泔浸炒 當歸 各四兩 芍藥 酒炒焦

茯苓 川椒 去合口者炒出汗 細榧肉

使君子 煨取肉 檳榔 各二兩 乾薑 炮 吳茱萸 湯泡一宿炒各一兩

右為末神麯糊為丸桐子大每服五七十丸或百丸饑時白湯下○如臟寒者加製附子一二兩○臟熱者加黃連一二

兩

聖术煎 二十五 治飲食偶傷或吐或瀉胸膈痞悶或脇肋疼痛或過用剋伐等藥致傷臟氣有同前證而脈息無力氣怯神倦者速宜用此不得因其虛痞虛脹而畏用白术此中虛實之機貴乎神悟也若兼有脹者即以此煎送神香散最妙若用治寒濕瀉痢嘔吐尤為聖藥

白术 用冬术味甘佳者五六七八錢炒黃或一二兩 乾薑 炒

肉桂 各一錢 陳皮 酒炒或不用

水一鍾半煎七分溫熱服○若治虛寒瀉痢嘔吐等證則人

參炙甘草之類當任意加用○若治中虛感寒則麻黃柴胡
亦任意加用

固陣

秘元煎 治遺精帶濁等病此方專主心脾

遠志八分炒 山藥二錢炒 芡實二錢炒 棗仁二錢炒搗碎
白朮炒 茯苓各錢半 炙甘草一錢 人參一二錢
五味十四粒畏酸者去之 金櫻子二錢去核

水二鍾煎七分食遠服○此治久遺無火不痛而滑者乃可
用之○如尚有火覺熱者加苦參一二錢○如氣大虛者加
黃芪一二三錢

固陰煎 治陰虛滑泄帶濁淋遺及經水因虛不固等證
此方專主肝腎

人參隨宜 熟地三五錢 山藥二錢炒 山茱萸一錢半
遠志七分炒 炙甘草一二錢 五味十四粒 菟絲子二三錢炒香

水二鍾煎七分食遠溫服○如虛滑遺甚者加金櫻子肉二
三錢或醋炒文蛤一錢或烏梅二個○如陰虛微熱而經血
不固者加川續斷二錢○如下焦陽氣不足而兼腹痛溏泄
者加補骨脂吳茱萸之類隨宜用之○如肝腎血虛小腹痛
而血不歸經者加當歸二三錢○如脾虛多濕或兼嘔惡者
加白朮一二錢○如氣陷不固者加炒升麻一錢○如兼心
虛不眠或多汗者加棗仁二錢炒用

菟絲煎 治心脾氣弱凡遇思慮勞倦即苦遺精者宜此
主之

人參二三錢 山藥二錢炒 當歸一錢半 菟絲子製炒四五錢
棗仁炒 茯苓各一錢半 炙甘草一錢或五分
遠志四分 鹿角霜為末每服加入四五匙

右用水一鍾半煎成加鹿角霜末調服食前○或加白朮一
二錢

惜紅煎 治婦人經血不固崩漏不止及腸風下血等證

白朮 山藥 炙甘草 地榆
續斷炒 芍藥炒 北五味十四粒 荊芥穗炒
烏梅二枚

水一鍾半煎七分食遠服○如火盛者加黃連黃芩○如脾
虛兼寒脾泄者加破故紙人參

苓朮菟絲丸 治脾腎虛損不能收攝以致夢遺精滑困

倦等證

白茯苓　白朮米泔洗炒　蓮肉去心各四兩　五味二兩酒蒸

山藥炒二兩　杜仲酒炒三兩　炙甘草五錢

菟絲子用好水淘淨入陳酒浸一日文火煮極爛搗為餅焙乾為末十兩

右用山藥末以陳酒煮糊為丸桐子大空心滚白湯或酒下百餘丸○如氣虛神倦不能收攝者加人參三四兩尤妙

固真丸 六　治夢遺精滑

菟絲子一斤淘淨用好酒浸一日煮極爛搗為餅焙乾或用白布包蒸亦佳

牡蠣煅四兩　金櫻子去子蒸熟四兩　茯苓酒拌蒸晒四兩

右蜜丸空心好酒送下三錢或鹽湯亦可

糯米固腸糕 七　治脾胃虛寒或因食滯氣滯腹痛泄瀉久不止者多服自效

用白糯米滚湯淘洗炒香熟為粉每粉一兩加乾薑末炒熟者一分半白糖二錢拌勻於飢時用滚水調服一二兩　如有微滯者加陳皮炒末二分或砂仁末一分俱妙○一法用陳老米粉亦妙○此與古方同類[illegible]九[illegible]經驗方大同小異并補脾養元粉參同

玉關丸 八　治腸風血脫崩漏帶濁不固諸藥難效者宜用此丸兼前藥治之及瀉痢滑泄不能止者亦宜用此

白麵炒熟四兩　枯礬二兩　文蛤醋炒黑二兩　北五味炒一兩

訶子二兩半生半炒

右為末用熟湯和丸梧子大以溫補脾腎等藥隨證加減煎湯送下或人參湯亦可○如血熱妄行者以涼藥送下

鞏堤丸 九　治膀胱不藏水泉不止命門火衰小水不禁等證

熟地二兩　菟絲子酒煮二兩　白朮炒二兩　北五味

益智仁酒炒　故紙酒炒　附子製　茯苓

家韭子炒各一兩

右為末山藥糊丸如桐子大每服百餘丸空心滚湯或溫酒下○如兼氣虛必加人參一二兩更妙

敦阜糕 十　治久瀉久痢腸滑不固妙方及婦人帶濁最佳

白麵炒黃二斤　冬白朮炒黃一斤　破故紙炒五錢

右共為末隨服隨加白糖隨宜用滚湯食前調服如糕法　如胃寒者每一兩加乾薑炒末五分或一錢如氣有不順或痛或嘔每末一兩加丁香一錢　如滑泄不禁於每兩加粟殼末炒黃一錢　若以作丸則宜一味等分用即名敦阜丸

因陣

逍遙飲 一　治婦人思鬱過度，致傷心脾衝任之源，血氣日枯，漸至經脈不調者

當歸 二三錢　芍藥 一錢半　熟地 三五錢　棗仁 二錢炒

茯神 一錢半　遠志 三五分　陳皮 八分　炙甘草 一錢

水二鍾，煎七分，食遠溫服。○如氣虛者，加人參一二錢。○如經水過期兼痛滯者，加酒炒香附一二錢。

決津煎 二　治婦人血虛經滯，不能流暢而痛極者，當以水濟水，若江河一決，而積垢皆去，宜用此湯，隨證加減主之。○此用補為瀉之神劑也。如氣虛者，宜少用香燥之類，甚者不用亦可。

當歸 三五錢或一兩　澤瀉 一錢半　牛膝 二錢　肉桂 一二三錢

熟地 二三錢或五七錢，或不用亦可　烏藥 一錢，如氣虛者不用亦可

水二鍾，煎七八分，食前服。○如嘔惡者，加焦薑一二錢。○如陰滯不行者，非加附子不可。○如氣滯而痛脹者，加香附一二錢，或木香七八分。○如血滯血澀者，加酒炒紅花一二錢。○如小腹不暖而痛極者，加吳茱萸七八分。○如大便結澀者，加肉蓯蓉一二三錢，微者以山楂代之。

五物煎 三　治婦人血虛凝滯，蓄積不行，小腹痛急，產難經滯，及痘瘡血虛寒滯等證神效。○此即四物湯加肉桂也。

當歸 三五七錢　熟地 三四錢　芍藥 二錢酒炒　川芎 一錢

肉桂 一二三錢

水一鍾半，煎服。○兼胃寒或嘔惡者，加炮乾薑炒用。○水道不利，加澤瀉或豬苓。○氣滯者，加香附或丁香、木香、砂仁、烏藥。○陰虛疝痛者，加小茴香。○血瘀不行，臍下若覆杯，漸成積塊者，加桃仁或酒炒紅花。○痘瘡血虛寒勝，寒邪在表者，加細辛、麻黃、柴胡、紫蘇之屬。

調經飲 四　治婦人經脈阻滯，氣逆不調，多痛而實者

當歸 三五錢　牛膝 二錢　山楂 二錢　香附 二錢

青皮　茯苓 各一錢半

水二鍾，煎七分，食遠服。○如因不避生冷而寒滯其血者，加肉桂、吳茱萸之類。○如兼脹悶者，加厚朴一錢，或砂仁亦可。○如氣滯者，加烏藥二錢。或痛在小腹者，加小茴香一錢半。

通瘀煎 五　治婦人氣滯血積，經脈不利，痛極拒按，及產後瘀血實痛，并男婦血逆血厥等證

歸尾三五錢 山楂 香附 紅花新者炒黃各二錢 烏藥一二錢 青皮錢半 木香七分 澤瀉錢半

水一鍾煎七分加酒一二小鍾食前服○兼寒滯者加肉桂一錢或吳茱萸五分○火盛內熱血燥不行者加炒梔子一二錢○微熱血虛者加芍藥二錢○血虛澀滯者加牛膝○血瘀不行者加桃仁三十粒去皮尖用或加蘇木玄胡索之類○瘀極而大便結燥者加大黃一二三錢或加芒硝蓬朮亦可

胎元飲六 治婦人衝任失守胎元不安不固者隨證加減用之或間日或二三日常服一二劑

人參隨宜 當歸 杜仲 芍藥各二錢 熟地二三錢 白朮錢半 炙甘草一錢 陳皮七分無滯者不必用

水二鍾煎七分食遠服○如下元不固而多遺濁者加山藥補骨脂五味之類○如氣分虛甚者倍白朮加黃芪但芪朮氣浮能滯胃口倘胸膈有飽悶不快者須慎用之○如虛而兼寒多嘔者加炮乾薑七八分或一二錢○如虛而兼熱者加黃芩一錢五分或加生地二錢去杜仲○如陰虛小腹作痛加枸杞二錢○如多怒氣逆者加香附無妨或砂仁亦妙○如有所觸而動血者加川續斷阿膠各一二錢○如嘔吐不止加半夏一二錢生薑三五片

固胎煎七 治肝脾多火多滯而屢墮胎者

黃芩二錢 白朮一二錢 當歸 芍藥 阿膠各錢半 陳皮一錢 砂仁五分

水一鍾半煎服

涼胎飲八 治胎氣內熱不安等證

生地 芍藥各二錢 黃芩 當歸各一二錢 甘草生七分 枳殼 石斛各一錢 茯苓錢半

水一鍾半煎七分食遠溫服○如熱甚者加黃柏一二錢

滑胎煎九 胎氣臨月宜常服數劑以便易生

當歸三五錢 川芎七分 杜仲一錢 熟地三錢 枳殼七分 山藥二錢

水二鍾煎八九分食前溫服○如氣體虛弱者加人參白朮隨宜用之○如便實多滯者加牛膝一二錢

殿胞煎十 治產後兒枕疼痛等證如神

當歸五七錢或一兩 川芎 炙甘草各一錢 茯苓一錢 肉桂五七分或一錢

水一鍾煎八分熱服○如脈細血欠或嘔者加乾薑炒黃色一二錢○如血熱多火者去肉桂加酒炒芍藥一二錢○如脈弱陰虛者加熟地三五錢○如氣滯者加香附一二錢或烏藥亦可○腰痛加杜仲一二錢

脫花煎十一 凡臨盆將產者宜先服此藥催生最佳并治產難經日或死胎不下俱妙

當歸七八錢或一兩 肉桂一二錢或三錢 川芎 牛膝各二錢 車前子錢半 紅花一錢催生者不用此味亦可

水二鍾煎八分熱服或服後飲酒數杯亦妙○若胎死腹中或堅滯不下者加朴硝三五錢即下○若氣虛困劇者加人參隨宜○若陰虛者必加熟地三五錢

九蜜煎十二 治產後陽氣虛寒或陰邪入臟心腹疼痛嘔吐不食四肢厥冷○此與大岩蜜湯略同而稍勝之

當歸 熟地各二錢 芍藥酒炒焦 茯苓各錢半 炙甘草 乾薑炒 肉桂 北細辛各一錢 吳茱萸製五分

水二鍾煎服

清化飲十三 治婦人產後因火發熱及血熱妄行陰虧諸火不清等證

芍藥 麥冬各二錢 丹皮 茯苓 黃芩 生地各二三錢 石斛一錢

水一鍾半煎七分食遠溫服○如覺骨蒸多汗者加地骨皮一錢半○熱甚而渴或頭痛者加石膏一二三錢○下熱便澀者加木通一二錢或黃柏梔子皆可隨證用之○如兼外邪發熱加柴胡一二錢○愚按丹溪云芍藥酸寒大伐發生之氣產後忌用之此亦言之過也夫芍藥之寒不過於生血藥中稍覺其清耳非若芩連輩之大苦大寒者也使芍藥猶

忌如此則他之更寒者尤為不可用矣余每見產家過慎者或因太寒或因年力方壯而飲食藥餌太補過度以致產後動火病熱者極多若盡以產後為虛必須皆補豈盡善哉且芍藥性清微酸而收最宜於陰氣散失之證豈不為產後之要藥乎不可不辨也

毓麟珠十四 治婦人氣血俱虛經脈不調或斷續或帶濁或腹痛或腰痠或飲食不甘瘦弱不孕服一二斤即可受胎凡種子諸方無以加此

人參 白朮土炒 茯苓 芍藥酒炒各二兩

川芎　炙甘草各一兩　當歸　熟地蒸搗各四兩
菟絲子製四兩　杜仲酒炒　鹿角霜　川椒各二兩

右爲末，煉蜜丸彈子大，每空心嚼服一二丸，用酒或白湯送下，或爲小丸吞服亦可。○如男子製服，宜加枸杞、胡桃肉、鹿角膠、山藥、山茱萸、巴戟肉各二兩。○如女人經遲腹痛，宜加酒炒破故紙、肉桂各一兩，甚者再加吳茱萸五錢，湯泡一宿炒用。○如帶多腹痛，加破故紙一兩、北五味五錢，或加龍骨一兩醋煅用。○如子宮寒甚，或泄或痛，加製附子、炮乾薑隨宜。○如多鬱怒，氣有不順而爲脹爲滯者，宜加酒炒香附二兩，或甚者再加沉香五錢。○如血熱多火，經早內熱者，加川續斷、地骨皮各二兩，或另以湯劑暫清其火，而後服此，或以湯引酌宜送下亦可。

贊育丹四十九　治陽痿精衰，虛寒無子等證妙方。

熟地八兩蒸搗　白朮用冬朮八兩　當歸　枸杞各六兩
杜仲酒炒　仙茅酒蒸一日　巴戟肉甘草湯炒　山茱萸
淫羊藿羊脂拌炒　肉蓯蓉酒洗去甲　韭子炒黃各四兩　蛇床子微炒
附子製　肉桂各二兩

右煉蜜丸服。○或加人參、鹿茸亦妙。

柴歸飲五十　治痘疹初起，發熱未退，無論是痘是邪，疑似之間，均宜用此平和養營之劑，以爲先着。有毒者可托，有邪者可散，實者不致助邪，虛者不致損氣。凡陽明實熱邪盛者，宜升麻葛根湯加減，如無實邪，則悉宜用此增減主之。

當歸二三錢　芍藥或生或炒一錢半　柴胡一錢或錢半
荊芥穗一錢　炙甘草七分或一錢

水一鍾半，煎服。或加生薑三片。○血熱者加生地。○陰虛者加熟地。○氣虛脈弱者加人參。○虛寒者加炮薑、肉桂。○火盛者加黃芩。○熱渴者加乾葛。○腹痛者加木香、砂仁。○嘔惡者加炮薑、陳皮。○若治麻疹，或以荊芥易乾葛。○陰寒盛而邪不能解者，加麻黃、桂枝。

疏邪飲五十一　治痘疹初起發熱。凡血氣強盛，無藉滋補者，單宜解邪，用此方爲主，以代升麻葛根湯及蘇葛湯等方，最爲妥當。

柴胡倍用　芍藥酒炒，倍用　蘇葉　荊芥穗
炙甘草減半

水一鍾半，煎服。○無火者加生薑三片。○火盛內熱者加黃芩。○渴者加乾葛。

涼血養營煎十七　治痘瘡血虛血熱，地紅熱渴，或色燥不起，及便結溺赤，凡陽盛陰虛者，悉宜用此。

生地黃　當歸　芍藥　生甘草

地骨皮　紫草　黃芩　紅花

水一鍾半，煎服。量兒大小加減用之。○渴加天花粉。○肌熱無汗加柴胡。○熱毒甚者加牛蒡子、木通、連翹之屬。○血熱毒不透者加犀角。

柴葛煎十八　治痘疹表裏俱熱，散毒養陰，及溫疫等證。

柴胡　乾葛　芍藥　黃芩

甘草　連翹

水一鍾半，煎服。

搜毒煎十九　解痘疹熱毒熾盛，紫黑乾枯，煩熱便結，純陽等證。

紫草　地骨皮　牛蒡子杵　黃芩

木通　連翹　蟬退　芍藥等分

水一鍾半，煎服。○渴者加天花粉、麥門冬。○陽明熱甚，頭面牙齦腫痛者，加石膏、知母。○大腸乾結，實脹腹脹者，加大黃、芒硝。○血熱妄行者，加犀角、童便。○小水熱閉者，加山梔、車前子。○兼表熱者，加柴胡。

六物煎廿　治痘疹血氣不充，隨證加減用之，神效不可盡述。并治男婦氣血俱虛等證。

炙甘草　當歸　熟地或用生地　川芎三四分不宜多

芍藥俱隨宜加減　人參或有或無，隨虛實用之。氣不虛者不必用

右㕮咀，用水煎服。○如發熱不解，或痘未出之先，宜加柴胡以疏表，或加防風佐之。○如見點後痘不起發，或起而不貫，或貫而漿薄，均宜單用此湯，或加糯米、人乳、好酒、肉桂、川芎以助營氣。○如氣虛癢塌不起，加川山甲炒用。○如紅紫血熱不起，宜加紫草或犀角。○如脾氣稍滯者，宜加陳皮、山查。○如胃氣虛寒多嘔者，加乾薑炒用，或加丁香。○如腹痛兼滯者，加木香、陳皮。○表虛氣陷不起，或多汗者，加黃芪。○氣血俱虛，未起未貫而先癢者，加肉桂、白芷。○如元氣大虛，寒戰咬牙泄瀉，宜去芍藥，加黃芪、大附子、乾薑、肉桂。

六氣煎廿一　治痘瘡氣虛，癢塌倒陷，寒戰咬牙，并治男婦陽氣虛寒等證。

黃芪炙　肉桂　人參　白朮

當歸　炙甘草

右既水煎服○加減法見前六物煎

九味異功煎 三二　治痘瘡寒戰咬牙倒陷嘔吐泄瀉腹痛虛寒等證○用代陳氏十二味異功散等方

人參二三錢　黃芪炙一二錢　當歸　熟地各二三錢

炙甘草七分或一錢　丁香三五分或一錢　肉桂一錢

乾薑炮一二錢　製附子一二錢

右量兒大小加減用之水一鍾半煎七分徐徐與服之○如泄瀉腹痛加肉豆蔻麵炒一錢或加白朮一二錢

疏邪煎 三三　凡麻疹初熱未出之時惟恐誤藥故云未出之先不宜用藥然解利得宜則毒必易散而勢自輕減欲求妥當當先用此方為主

當歸二三錢　芍藥酒炒錢半　防風七八分　荊芥一錢

炙甘草七分　升麻三分

水一鍾半煎服、如熱甚脈洪滑者加柴胡一錢○此外凡有雜證俱可隨宜加減

牛膝煎 三四　截瘧大效凡邪散已透而血氣微虛者宜此主之

牛膝二錢　當歸　陳皮各三錢

右用好酒一鍾浸一宿次早加水一鍾煎至八分溫服

何人飲 三五　截瘧如神凡氣血俱虛久瘧不止或急欲取效者宜此主之

何首烏自三錢以至一兩隨輕重用之　當歸二三錢　人參三五錢或一兩隨宜

陳皮二三錢大虛者不必用　煨生薑三片多寒者用三五錢

水二鍾煎八分於發前二三時溫服之○若善飲者以酒一鍾浸一宿次早加水一鍾煎服亦妙再煎不必用酒

追瘧飲 三六　截瘧甚佳凡血氣未衰屢散之後而瘧有不止者用此截之已經屢驗

何首烏一兩製　當歸　甘草　半夏

青皮　陳皮　柴胡各三錢

右用井水河水各一鍾煎一鍾渣亦如之同露一宿次早溫服一鍾飯後食遠再服一鍾

木賊煎 三七　凡瘧疾形實氣強多濕多痰者宜此截之大效

半夏　青皮各五錢　木賊　厚朴各三錢

白蒼朮　檳榔各一錢

用陳酒二鍾煎八分露一宿於未發之先二時溫服

牙皂散 三八　治胃脘痛劇諸藥不效者服此如神

用牙皂燒存性以烟將盡為度研末用燒酒調服一錢許即效

荔香散 二八 治疝氣痛極凡在氣分者最宜用之并治小腹氣痛等證神效○又心腹久痛方如後

荔枝核炮微焦 大茴香炒 等分

右為末用好酒調服二三錢○如寒甚者加制過吳茱萸減半用之○凡心腹胃脘久痛屢觸屢發者惟婦人多有之用荔核一錢木香八分為末每服一錢清湯調服數服除根

豕膏 二九 內經曰癰發於嗌中名曰猛疽猛疽不治化為膿膿不寫塞咽半日死其化為膿者寫則合豕膏冷食三日已○此必以豬板油煉淨服之也

又烏氏方○治肺熱暴瘖○用豬脂一斤煉過入白蜜一斤再煉少頃濾淨冷定不時挑服一匙即愈○按此方最能潤肺潤腸凡老人痰嗽不利及大腸秘結者最宜用之

又千金方○治關格閉塞○用豬脂薑汁各二升微火煎至二升加酒五合和煎分服之

愚意先以當歸半斤濃煎取汁煉過豬脂一斤同煉去其水氣乃入白蜜一斤再煉少頃濾淨收貯不時挑服用治老人

之秘結及噎膈閉結等證必無不妙如果陽氣不行者仍加生薑四兩同當歸煎入或宜酒者以酒送服亦可或氣有不利者加杏仁二兩去皮尖同煎入皆妙或有滯者當以餳代蜜更妙是即內經所謂以辛潤之也

罨傷寒結胸法 三十 凡病傷寒結胸其有中氣虛弱不堪攻擊內消者須以此法外罨之則滯行邪散其效如神

葱白頭 生薑 生蘿蔔 此味加倍如無以子代之

右用葱薑各數兩蘿蔔倍之共搗一處炒熱用手巾或白布包作大餅罨胸前脹痛處此藥須分二包冷則輪換罨之無不即時開通汗出而愈但不宜太熱恐炮烙難受也

又法以大蒜一二十頭搗爛攤厚紙或薄絹上貼於脹處少頃即散用治一切脹痛無不神妙

連翹金貝煎 三一 治陽分癰毒或在臟腑肺膈胸乳之間者此方最佳甚者連用數服無有不愈

金銀花 貝母土者更佳 蒲公英 夏枯草各三錢 紅藤七八錢 連翹一兩或五七錢

用好酒二碗煎一碗服服後暖臥片時○火盛煩渴乳腫者加天花粉○若陽毒內熱或在頭項之間者用水煎亦可

連翹歸尾煎二二　治一切無名癰毒丹毒流注等毒有火者最宜用之

連翹七八錢　歸尾三錢　甘草一錢　金銀花　紅藤各四五錢

用酒煎服如前○如邪熱火盛者加槐蕊二三錢

桔梗杏仁煎二三　此桔梗湯之變方也○治欬嗽吐膿痰中帶血或胸膈隱痛將成肺癰者此方為第一

桔梗　杏仁　甘草各一錢　阿膠　金銀花　麥冬　百合　夏枯草　連翹各二錢　貝母一錢　枳殼一錢半　紅藤三錢

水二鍾煎八分食遠服○如火盛兼渴者加天花粉二錢

當歸蒺藜煎二四　治癰疽瘡疹血氣不足邪毒不化內無實熱而腫痛淋漓者悉宜用之此與芍藥蒺藜煎相為奇正也

當歸　熟地　芍藥酒炒　何首烏各二錢　炙甘草　防風　川芎　荊芥穗　白芷各一錢　白蒺藜炒搗碎二錢或五錢

右或水或酒用二鍾煎服然水不如酒或以水煎服後飲酒

數杯以行藥力亦可○陽虛不能化毒者加桂枝甚者再加乾薑附子○氣虛不化者加黃芪人參○毒陷不能外達者加川山甲或皂角刺

芍藥蒺藜煎二五　治通身濕熱瘡疹及下部紅腫熱痛諸瘡神效外以螵蛸散敷之

龍膽草　梔子　黃芩　木通　澤瀉各一錢半　芍藥　生地各二錢　白蒺藜連刺搗碎五錢甚者一兩

水二鍾煎八分食遠服○如火不甚者宜去龍膽梔子加當歸茯苓薏仁之屬○如濕毒甚者加土茯苓五錢或一二兩

降癰散二六　治癰疽諸毒消腫止痛散毒未成者即消已成者斂毒速潰可愈若陽毒熾盛而疼痛勢凶者宜先用此方其解毒散毒之功神效最速若堅頑深固者宜用後方

薄荷新者用葉　野菊花連根葉各一握　土貝母半之　茅根一握

右乾者可為末鮮者可搗爛同貝母研勻外將茅根煎濃湯去柤用調前末乘熱敷患處仍留前剩湯頓暖不時潤於藥上但不可用冷湯冷則不散不行反能爲痛約敷半日即宜

與之眞妙方也

後方　凡疽毒堅頑深固及結核痰滯宜用此方

腦荷倍用　生南星　土貝母　朴硝各等分

石灰風化者亦倍用或倍倍用之

右同爲末用鹽滷調炸稠粘敷患處經宿乾即易之不必揭頭若膿成者留頭亦可或炒熱攤絹上隔絹貼之亦可或用麻油調或用熱茅根湯調亦可若欲止痛速效加麝香冰片少許更妙

百草煎一七　治百般癰毒諸瘡損傷疼痛腐肉腫脹或風寒

濕氣留聚走注疼痛等證無不奇效

百草　凡田野山間者無論諸品皆可取用然猶以山草爲勝辛香者佳冬月可用乾者須預爲收採之

在不論多寡取以多煎濃湯乘熱熏洗患處仍用布帛蘸熨良久務令藥氣蒸透然後敷貼他藥每日一二次不拘但以頻數爲佳其性之爽者可以除濕熱者可以散寒香者可以行氣毒者可以解毒無所不用亦無所不到湯得藥性則湯氣無害藥得湯氣則藥力愈行凡用百草以煎者其義亦此此誠外科中最要最佳之法亦傳之方外人者也○若

洗水鼓腫脹每次須用草二三十斤煎濃湯二三鍋用大盆盛貯以席簟遮風熏洗良久每日一次或二次内服廓清飲分利等劑妙甚

螵蛸散一八　治濕熱破爛毒水淋漓等瘡或下部腎囊足股腫痛下疳諸瘡無不神效○又治濕瘡治下疳方在外科下疳門

海螵蛸不必浸淡　人中白或人中黃硼砂亦可等分

右爲細末先以百草多煎濃湯乘熱熏洗後以此藥摻之如乾者以麻油或熬熟豬油或蜜水調敷之○若腫而痛甚者

加冰片少許更妙○若濕疹膿水甚者加密陀僧等分或煅過官粉亦可或煅制爐甘石更佳

腸癰秘方一九　凡腸癰生於小肚角微腫而小腹隱痛不止者是若毒氣不散漸大內攻而潰則成大患急宜以此藥治之

先用紅藤一兩許以好酒二碗煎一碗午前一服醉臥之○午後用紫花地丁一兩許亦如前煎服服後痛必漸止爲效然後服後末藥除根神妙

當歸五錢　蟬退　殭蠶各二錢　天龍

大黃各一錢　石螞蚆五錢此草藥也　老蜘蛛二個促放新瓦上以酒鍾蓋定外用火煅乾存性

右共為末每空心用酒調送一錢許日逐漸服自消

槐花蕊四十　治楊梅瘡下疳神方

凡綿花瘡毒及下疳初感或毒盛經久難愈者速用新槐蕊揀淨不必炒每食前用清酒吞下三錢許早午晚每日三服服至二三升則熱毒盡去可免終身餘毒之患亦無寒涼敗脾之虞此經驗神方也如不能飲即用滚水鹽湯俱可送下但不及酒送之效捷也

飛丹散四一　治寒濕風濕腳腿等瘡

飛丹　人中黃白更妙　輕粉　水粉各等分

為末凡濕爛者可以乾摻外用油紙包蓋○若乾陷者以豬骨髓或豬油調貼之○先以百草煎湯乘熱熏洗然後貼之日洗數次妙

綿花瘡點藥四二

杏仁取霜　輕粉真者

二味等分為末敷於瘡上二三日即痂脫而落

又武定侯方用雄黃錢半杏仁三十粒去皮輕粉一錢同為末用雄豬膽汁調敷之二三日即愈百發百中天下第一方

雞子黃連膏四三　治火眼暴赤疼痛熱在膚膜淺而易解者

用此點之數次可愈若熱由內發火在陰分者不宜外用涼藥非惟不能去內熱而且以閉火邪也用雞子一枚開一小竅單取其清盛以磁碗外用黃連一錢研為粗末摻於雞子清上用筯猛攪打數百使成浮沫約得半碗許即其度矣安放少頃用筯撥開浮沫傾出清汁用點眼眥勿得緊閉眼胞務出其藥必熱淚湧出數次即愈○內加冰片少許尤妙○若雞子小而清少者加水二三匙同打亦可

金露散四四　治赤目腫痛翳障諸疾

天竺黃擇辛香者用　海螵蛸不必浸洗　月石各一兩

硃砂飛　爐甘石片子者佳煅淬童便七次飛淨各八錢

右為極細末磁瓶收貯每用時旋取數分研入冰片少許點目疾皆妙○若治內外障取一錢許加珍珠八厘膽礬三厘內珍珠須放豆腐中蒸熟用○若爛弦風眼每一錢加銅綠飛丹各八厘○如赤眼腫痛每一錢加乳香沒藥各半分

二辛煎四五　治陽明胃火牙根口舌腫痛不可當先用此湯漱之漱後俾以二香散或仍服清胃等藥以治其本

北細辛 三錢 生石膏 一兩
右二味用水二碗煎一碗乘熱頻噉之
氷玉散 因六 治牙疳牙痛口瘡齒衄喉痺
生石膏一兩 月石七錢 氷三分 殭蚕一錢
右爲極細末小磁瓶盛貯敷之吹之
氷白散 因七 治口舌糜爛及走馬牙疳等證
人中白 倍用之 氷片少許 銅綠 用醋製者 杏仁 二味等分
右爲細末敷患處 此方按之古法有以人中白七分與枯
礬三分同用者 又有以蜜炙黃柏與人中白等分仍加氷

片同用者是皆可倣之法諸當隨宜用之
代匙散 因八 治喉痺
月石 石膏 各一錢 腦荷 五分 膽礬 五分
粉草 二分 殭蚕 炒 五分 氷 一分 皂角 炙烟盡 五分
右爲極細末用竹管頻吹喉中 加牛黃五分更佳
三香散 因九 治牙根腫痛
丁香 川椒 取紅 等分 氷片 少許
右爲末敷痛處 如無川椒以蓽撥代之亦可
固齒將軍散 五十 治牙痛牙傷胃火糜腫久之牢牙固齒

錦紋大黃 炒微焦 杜仲 各十兩 青鹽 四兩
右爲末每日清晨擦漱火盛者嚥之亦可
熏疥方 五一
硃砂 雄黃 銀硃 各二分 大楓子
木別子 各三個
右將大楓木別先搗碎乃入前三味拌勻外以乾艾鋪捲成
筒約長二寸許足矣凡熏時須解衣將身疥悉行抓破熏之
始效後五六日復熏 兩次無不悉愈
杖丹膏 五二
猪板油 半斤 黃占 四兩 輕粉 三錢 水銀 三錢

氷片 三分
先將水銀輕粉同研細俟猪油放溶去滓先下黃占溶化後
入末藥攪勻收貯以水浸一二日令出火毒用竹紙攤貼覺
熱即換輕者以一四日重者不過旬日
銀硃烟 五三 治頭髮生虱及諸瘡之有虫者
用銀硃四五分搽於厚紙上點着置一乾碗中上用一濕碗
蓋緊覆之其烟皆着於濕碗之上乃用指搽擦髮中復以包
帕固髮虱皆盡矣 此烟以猪肉和臘作餅或作丸或擦於

猪雞熟肝之間用貼諸瘡瘻之有蟲者及蟲蝕肛門者以絹裹藥丸納肛門中一宿無不神效須留綿帶在外以便出之

雷火鍼 五四 治風寒濕毒之氣留滯經絡而爲痛爲腫不能散者

五月五日取東引桃枝去皮兩頭削如鷄子尖樣長一二寸許鍼時以鍼向燈上點着隨用紙三五層或布亦可貼蓋患處將鍼按於紙上隨即念呪三遍病淺者再燃再刺之立愈○呪曰天火地火三昧眞火鍼天天開鍼地地裂鍼鬼鬼滅鍼人人得長生百病消除萬病消滅吾奉太上老君急急如律令

又雷火鍼新方乃以藥爲鍼者其法更妙

白芷 獨活 川芎 細辛

牙皂 川山甲 炮倍用 丁香 枳殼

松香 雄黃 乳香 沒藥

杜仲 桂枝 各一錢 硫黃 二錢 射香 不拘

熟艾 二兩

右爲粗末和勻取艾鋪底摻藥於上用上好皮紙捲筒先須用線紮約兩頭防其伸長然後加紙再捲務令極實粗如鷄子尖樣是其度也乃用鷄子清盡刷外層捲而裹之陰乾用法如前○一方有巴豆仁八分班蝥三錢去頭足翅用

疥癬光 五五 治疥瘡搽上即愈癬瘡亦妙

松香 一錢 水銀 硫黃 枯礬 各二錢

樟腦 各二錢 或一錢 麻油

右先將松香水銀加麻油少許研如糊後入三味研如膏搽之神效

鵝掌瘋四方 五六 附錄

猪胰一具去油勿經水 花椒三錢

右用好酒溫熱將二味同浸一二三日取胰不時擦手微火烘之自愈

又方 用白砒三錢打如豆粒以麻油一兩熬砒至黑去砒用油擦手微火烘之不過一二次即愈

又方 用葱五六根搥破再用花椒一把同入磁瓦罐中入醋一碗後以滾湯衝入熏洗數次即愈

又方 用殺豬桑煎湯溫洗以火烘乾隨用桕白油搽之再以火烘乾必須又洗又烘如此日行二次不過三五日即愈

秘傳水銀膏五七 擦治楊梅瘋毒潰爛危惡多年不愈者經驗神方

黃藥　黃連各一錢　川大黃五分三味另研

雄黃　膽礬　孩兒茶　銅青各三分

輕粉　枯礬各五分　大楓子去殼取淨霜五分黑者勿用

珍珠一分半生用　冰片一分半二味另研　人言壯人七厘弱者半分中者六厘

右十四味爲極細末分作二分每分約一錢八分

番打麻　另爲末若瘡重而人壯能食者每分用五分人弱不起者每分用三分中者四分以末入前藥各分內

研勻

水銀　人健者每分用一兩或八九錢中者或五六錢卧床不起而極弱者只可用一錢決不可再多矣

右先將麻末并前藥各一分俱入盞內再入真芝麻油少許用手指研開務使水藥混爲一家漸次增油久研以不見米星爲度大約如稀糊可矣○一擦法用此藥擦手足內腕動脈處每藥一分務分擦三日每日早晚各擦一次每次以六七百數爲度擦完用布包之擦藥時凡周身有打破傷處俱用無礙膏藥貼之膏藥須厚攤每一二日一換換時不可經風

常須避帳幔中冬月須用厚被煖坑他時亦須常煖爲方則多用破碎益墊可也擦至七日毒必從齒縫中發出口吐臭涎若口齒破爛出血但用甘草蜂房煎湯候冷漱口不可嚥下輕者只以花椒湯漱之亦可夜處必皮破不可畏疼而少擦也○忌鹽十餘日多吃好炸魚腥生冷沙氣發風等物一個月忌房事外如牛肉燒酒團魚之類須忌二三年惟蕎麥麵羊肉則終身忌之○治楊梅瘡初發者五六日可愈但每分用汞四五錢足矣○若治蛀幹瘡甚或兩腿潰爛或遍身牛皮癬俱照前中治法○若治久爛臁瘡爛處難擦則

擦脚心俱照前中治法亦布包貼膏如前○一自擦起之日卽當服後敗毒散至七日後發口則止

二十四味敗毒散 除前水銀膏

當歸	川芎	生地	熟地
芍藥	牛膝	防風	荊芥
白芷	防巳	忍冬	桔梗
羌活	獨活	白蘚皮	薏仁
連翹	木通	陳皮	粉草
黃蘖	知母	梔子	黃連

右每貼加土茯苓乾者四兩鮮者須半斤用水六碗煎二碗
分三次每日早午晚各服一碗○右方後四味須察其人陰
陽寒熱酌而用之
按右水銀膏方先用此者其於筋骨經絡無處不到既能追
毒亦善殺蟲若用治大麻瘋癧必有奇效但未經試效表諸
此以俟後人試用之或於大麻瘋癢癬瘡之相宜者同用尤
妙倘獲濟人其幸多矣

臁瘡隔紙膏五八

黃占四兩　飛丹　鉛粉各四兩　輕粉
乳香　沒藥各二錢　冰三分　麻油春夏二兩 秋冬三兩
右先將占油煎五六沸下乳沒再二三沸下輕粉隨下丹粉
槐柳枝攪十餘沸取起冷定後下冰攪勻瓶盛浸水中一宿
出火毒先以苦茶洗瘡淨將膏用油紙刺孔厚攤開貼瘡
背面貼之一日一換三貼即可愈

完瘡散九　治瘰癧諸瘡肉平不斂及諸瘡毒內肉既平而
口有不收者皆宜用此最妙

滑石飛一兩　赤石脂飛五錢　粉甘草三錢
右為末乾摻或用麻油調敷　或加枯礬一錢癢者極宜

若癢甚者必有虫先用水銀三四錢同松香二錢研勻後拌
前藥和勻付之

五十二卷

會稽 張介賓 會卿著
瀛海 賈棠 青南訂

古方總目 以下總列共十二卷

附古方條序

愚按古方之散列於諸家者既多且雜或互見於各門或彼此之重複欲通其用涉獵固難欲盡收之徒資莠亂今余採其要者類爲八陣曰補和攻散寒熱固因八陣之外復列有婦人小兒痘疹外科之四方且於諸方之中仍以類聚庶乎奇正羅列緩急並陳或舍短可以就長或因此可以校彼慧眼所及朗如日星引而伸之觸類而長之則古人之繩墨得資我之變通醫中之能事斯亦先幾一着也凡從可忘其所省焉

一曰補陣 存亡之幾幾在根本元氣既虧不補將何以復故方有補陣

二曰和陣 病有在虛實氣血之間補之不可攻之又不可者欲得其平須從緩治故方有和陣

三曰攻陣 邪固疾深勢如强寇速宜伐之不可緩也故方有攻陣

四曰散陣 邪在肌表當逐於外拒之不早病必日深故方有散陣

五曰寒陣 陽亢傷陰陰竭則死或去其火或壯其水故方有寒陣

六曰熱陣 陰極亡陽陽盡則斃或祛其寒或助其火故方有熱陣

七曰固陣 元氣既傷虛而且滑滑漏泄日甚不盡不已故方有固陣

八曰因陣 病有相同治有相類因證用方亦有不必移易者故方有因陣

附列四方 古方於八陣之外其有未盡者如婦人有經脉胎產之異小兒有驚疳之異痘疹有出沒變化之異外科有經絡表裏之異隨機應變治有不同故并列方目於左

五十三卷

補陣

四君子湯 一
加味四君湯 二
生脈四君湯 三
五味異功散 四
六君子湯 五
加味六君湯 六
香砂六君湯 七
四物湯 八
薛氏加味四物湯 九
正傳加味四物湯 十

東垣加減四物湯 十一
保命柴胡四物湯 十二
萬氏柴胡四物湯 十三
奇效四物湯 十四
增損四物湯 十五
元戎四物湯 十六
良方加減四物湯 十七
四物二連湯 十八
八珍湯 十九
十全大補湯 二十
人參養榮湯 二一
小建中湯 二三
金匱大建中湯 二二
局方十四味大建中湯 二四
八味大建中湯 二五
人參建中湯 二六
黃芪建中湯 二七
當歸建中湯 二八
三味建中湯 二九
補中益氣湯 三一
調理益氣湯 三二
歸脾湯 三三
加味歸脾湯 三四
人參湯 三五
獨參湯 三六
奇命散 三七
參附湯 三八
參歸湯 三九
參朮膏 四十
參朮湯 四一
仲景朮附湯 四二
濟生朮附湯 四三
芪附湯 四四
當歸補血湯 四五
黃芪湯 四六
良方黃芪湯 四七

大補黃芪湯 四八
神效黃芪湯 四九
黃芪六一湯 五十
玉屏風散 五一
潤神散 五二
當歸六黃湯 五三
參苓散 五四
參苓白朮散 五五
七味白朮散 五六
生脈散 五七
五味子湯 五八
孫氏五味子湯 五九
人參胡桃湯 六十
瓊玉膏 六一
補肺湯 六二
寧肺湯 六二
寧肺散 六四
鳳髓湯 六五

蜜酥煎 六六　醍醐膏 六七
黃芪散 六八　五味黃芪散 六九
黃芪益損湯 七十　易簡地黃散 七一
柔脾湯 七三　東垣麥門冬飲子 七二
拔萃麥門冬飲子 七四　宣明麥門冬飲 七五
麥門冬湯 七六　萬氏麥門冬湯 七七
麥門冬散 七八　旋神飲 七九
醫統養心湯 八十　錢氏養心湯 八一
正心湯 八二　開心散 八三

茯苓補心湯 八四　酸棗仁湯 八五
秘方酸棗仁湯 八六　仲景酸棗仁湯 八七
錢氏酸棗仁湯 八八　遠志湯 八九
遠志飲子 九十　聖愈湯 九一
益榮湯 九二　逍遙散 九三
加味逍遙散 九四　生薑汁煎 九五
局方胃風湯 九六　十寶湯 九七
當歸黃芪湯 九八　大防風湯 九九
河間地黃飲子 百　金櫻膏 百一

心虛白濁歌 百二　劫勞散 百三
益氣補腎湯 百四　當歸酒 百五
人參丸 百六　人參固本丸 百七
團參丸 百八　天王補心丹 百九
補心神效丸 百十　平補鎮心丹 百十一
柏子養心丸 百十二　心腎丸 百十三
遠志丸 百十四　寧志丸 百十五
寧志膏 百十六　定志丸 百十七
人參定志丸 百十八　十四友丸 百十九

琥珀多寐丸 百二十　六味地黃丸 一二一
八味地黃丸 一二二　陳氏加減八味丸 一二三
又方益陰腎氣丸 一二五　加減金匱腎氣丸 一二六
滋陰大補丸 一二七　大造丸 一二八
全鹿丸 一二九　斑龍丸 百三十
斑龍二至百補丸 一三一　鹿角膠丸 一三二
鹿茸丸 一三三　集驗鹿茸丸 一三四
二四鹿茸丸 一三五　本事麋茸丸 一三六
還少丹 一三七　無比山藥丸 一三八

還元丹 一三九
養榮丸 百四十
三才丸 一四一
七珍至寶丹 一四二
補髓丹 一四三
枸杞子丸 一四四
青娥丸 一四五
加味青娥丸 一四六
十補丸 一四七
煨腎丸 一四八
煨腎散 一四九
安腎丸 百五十
小安腎丸 一五一
石刻安腎丸 一五二
紅鉛丸 一五三
打老兒丸 一五四
肉蓯蓉丸 一五五
四味肉蓯蓉丸 一五六

黃芪丸 一五七
二丹丸 一五八
益血丹 一五九
集要四神丸 百六十
虎骨四斤丸 一六一
加味四斤丸 一六二
二四加減四斤丸 一六三
金剛丸 一六四
人參膏 一六五

五十四卷

和陣

二陳湯 一
加減二陳湯 二
加味二陳湯 三
二术二陳湯 四
宣明黃芩二陳湯 五
柴芩二陳湯 六
桂附二陳湯 七
小半夏湯 八
小半夏加茯苓湯 九
金匱大半夏湯 十
御藥大半夏湯 十一
茯苓半夏湯 十二
橘皮半夏湯 十三
秫米半夏湯 十四
半夏白朮天麻湯 十五
黃芩半夏生薑湯 十六
平胃散 十七
調氣平胃散 十八
益黃散 十九
藿香正氣散 二十

不換金正氣散 二一
陳氏不換金正氣散 二二
正氣散 二三
大正氣散 二四
升陽益胃湯 二五
海藏白朮湯 二六
濟生白朮湯 二七
良方三味白朮湯 二八
良方四味白朮湯 二九
白朮散 三十
宣明白朮散 三一
良方白朮散 三二
調胃白朮散 三三
白朮芍藥湯 三四
白朮芍藥散 三五
苓桂朮甘湯 三六
神朮散 三七
局方神朮散 三八

海藏神术湯三九
沉香降氣散四十
蘇子降氣湯四一
小降氣湯四二
木香順氣散四三
木香調氣散四四
流氣飲子四五
二十四味流氣飲四六
七氣湯四七
三因七氣湯四八
加味七氣湯四九
局方七氣湯五十
指迷七氣湯五一
四磨飲五二
蹤蹊飲五三
良方厚朴湯五四
木香寬中散五五
木香分氣飲五六

人參木香散五七
消導寬中湯五八
化滯調中湯五九
三和湯六十
導滯通經湯六一
導水茯苓湯六二
健脾散六三
參朮健脾湯六四
當歸散六五
當歸活血散六六
局方五皮散六七
澹寮五皮散六八
沉香琥珀丸六九
法製陳皮七十
祛痛散七一
調痛散七二
丁香止痛散七三
良方烏藥散七四

手拈散七五
遊山套七六
舒筋湯七七
玄桂丸七八
枳朮丸七九
香砂枳朮丸八十
麴蘗枳朮丸八一
木香人參生薑枳朮丸八二
加味枳朮丸八三
枳實丸八四
大健脾丸八五
啓脾丸八六
和中丸八七
東垣和中丸八八
養胃進食丸八九
消食丸九十
導痰湯九一
五飲湯九二

茯苓飲九三
茯苓飲子九四
千緡湯九五
玉液湯九六
四七湯九七
加味四七湯九八
澤瀉湯九九
孫砂消痰飲百
消飲丸百一
星香丸百二
化痰丸百三
天花丸百四
局方玉壺丸百五
玉液丸百六
玉粉丸百七
杏仁丸百八
許學士神朮丸百九
麴朮丸百十

三仙丸 百十一
青州白丸子 百十二
琥珀壽星丸 百十三
茯苓丸 百十四 附節易方
白螺丸 百十五
淡潤下丸 百十六
集成潤下丸 百十七
黃瓜蔞丸 百十八
杏仁蘿蔔子丸 百十九
陳皮湯 百二十
竹茹湯 一二一
橘皮竹茹湯 一二二
二汁飲 一二三
葛花解酲湯 一二四
豬苓散 一二五
人參散 一二六
六和湯 一二七
丁香散 一二八

丁香半夏丸 一二九
半夏丁香丸 百三十
大七香丸 一三一
許則仁半夏丸 一三二
定喘湯 一三三
人參定喘湯 一三四
百合湯 一三五
五虎湯 一三六
回神秘湯 一三七
直指神秘湯 一三八
蘿蔔子湯 一三九
葶藶大棗瀉肺湯 百四十
蘇子煎 一四一
杏仁煎 一四二
杏仁膏 一四三
前胡散 一四四
百花膏 一四五
枳殼散 一四六

保和湯 一四七
十味保和湯 一四八
六鬱湯 一四九
三和散 百五十
生韭飲 一五一
溫膽湯 一五二
十味溫膽湯 一五三
越麴丸 一五四
流氣丸 一五五
五膈散 一五六
五膈寬中散 一五七
十膈散 一五八
五噎散 一五九
蒼朮散 百六十
人參豆蔻湯 一六一
紫蘇子飲 一六
枇杷葉散 一六三
補氣運脾湯 一六四

利膈散 一六五
人參利膈丸 一六六
草豆蔻丸 一六七
清暑益氣湯 一六八
香薷飲 一六九
五物香薷飲 百七十
十味香薷飲 一七一
黃連香薷飲 一七二
縮脾飲 一七三
七味滲濕湯 一七四
清熱滲濕湯 一七五
防己黃芪湯 一七六
除濕湯 一七七
羌活除濕湯 一七八
升陽除濕湯 一七九
升陽除濕防風湯 百八十
白朮酒 一八一
五苓散 一八二

加減五苓散 一八三　加味五苓散 一八四
茵陳五苓散 一八五　柴胡茵陳五苓散 一八六
四苓散 一八七　猪苓湯 一八八
茯苓湯 一八九　胃苓湯 百九十
橘半胃苓湯 一九一　柴苓湯 一九二
加減柴苓湯 一九三　寅人參敗毒湯 一九四
草果散 一九五　大橘皮湯 一九六
消食導氣飲 一九七　外臺黃芩湯 一九八
秘傳斗門方 一九九　治痢簡易八方 二百
麴朮丸 二百一　戊己丸 二百二
雙荷散 二百三　側柏散 二百四
地黃煎 二百五　枇杷葉散 二百六
阿膠散 二百七　良方阿膠散 二百八
錢氏阿膠散 二百九　綠雲散 二百十
簡易黑神散 二一一　局方黑神散 二一二
天門冬丸 二一三　髮灰散 二一四
棕灰散 二一五　平胃地榆湯 二一六
海藏愈風湯 二一七 即舉卿古拜散　小烏沈湯 二一八

除濕和血湯 二一九　驅瘧飲 二百二十
截瘧飲 二二一　捷瘧飲 二二二
萬安散 二二三　鱉甲飲子 二二四
清脾飲 二二五　草果飲 二二六
七寶飲 二二七　四獸飲 二二八
局方常山飲 二二九　丹溪截瘧丹 二百三十
集成截瘧常山飲 二三一　寶鑑交加飲子 二三二
柴平湯 二三三　人參養胃湯 二三四
和解散 二三五　檳榔煎 二三六
屠蘇酒 二三七　降椒酒 二三八
省風湯 二三九　八風散 二百四十
防風當歸湯 二四一　順風勻氣散 二四二
星香湯 二四三　八味順氣散 二四四
大秦艽湯 二四五　養血當歸地黃湯 二四六
薏苡仁湯 二四七　滌痰湯 二四八
清心散 二四九　簡易虎骨散 二百五十
虎骨散 二五一　交加散 二五二
良方交加散 二五三　四白丹 二五四

續斷丹 二五五　豨薟丸 二五六
獨痺湯 二五七　三痺湯 二五八
加味五痺湯 二五九　人參散 二百六十
六味茯苓湯 二六一　枳殼散 二六二
紫蘇子湯 二六三　除濕蠲痛湯 二六四
桂心散 二六五　滲濕湯 二六六
趁痛散 二六七　秦艽地黃湯 二六八
活絡飲 二六九　獨活寄生湯 二百七十
透經解攣湯 二七一　薰蒸痺痛法 二七二

薰洗痛風法 二七三　愈風丹 二七四
易老天麻丸 二七五　愈風燥濕化痰丸 二七六
活絡丹 二七七　開結導飲丸 二七八
換骨丹 二七九　換腿丸 二百八十
史國公浸酒方 二八一　煨腎散 二八二
調榮活絡飲 二八三　胡桃湯 二八四
雞鳴散 二八五　茱萸木瓜湯 二八六
立效散 二八七　防己飲 二八八
紫蘇散 二八九　紫蘇湯 二百九十

濟生檳榔湯 二九一　加減檳榔湯 二九二
檳榔散 二九三　桑白皮散 二九四
木香散 二九五　木通散 二九六
人參桂心散 二九七　橘皮湯 二九八
半夏散 二九九　大腹皮散 三百
大腹子散 三百一　地黃湯 三百二
木瓜湯 三百三　沉香湯 三百四
續斷丸 三百五　本事續斷丸 三百六
保命牛膝丸 三百七　酒浸牛膝丸 三百八

茱萸丸 三百九　健步丸 三百十
調元健步丸 三一一　三因勝駿丸 三一二
神應養真丹 三一三　透骨丹 三一四
虎骨酒 三一五　薏仁酒 三一六
椒艾囊 三一七　敷腳氣方 三一八
蒺藜散 三一九　直指蒺藜散 三百二十
榧子煎 三二一　聖效方 三二二
仲景烏梅丸 三二三　濟生烏梅丸 三二四
神授散 三二五　川楝散 三二六

荔核散 二一七
蒼朮散 三一八
天台烏藥散 三二九
桃仁膏 二百三十
守效丸 二三一
來復丹 二三二
潤腸湯 二三三
通幽湯 二三四
導滯通幽湯 二三五
河間厚朴湯 二三六
皂角散 二三七
三仁丸 二三八
脾約丸 二三九
東垣潤腸丸 三百四十
蓯蓉潤腸丸 二四一
益血潤腸丸 三四二
搜風順氣丸 二四三
聖惠搜風順氣丸 三四四

地髓湯 三四五
牛膝膏 三四六
經驗琥珀散 三四七
導赤散 三四八
萬全木通湯 三四九
葱白湯 二百五十
東垣清肺飲子 二五一
半夏丸 三五二
良方醍醐膏 二五三
養勞湯 三五四
絲[illegible]丸 三五五
簡易濟衆方 三五六
抱膽丸 三五七
靈苑辰砂散 二五八
歸神丹 二五九
寧志丸 二百六十
人參琥珀丸 二六一
秘方半夏丸 三六二

神應丹 二六三
楊氏五癇神應丸 二六四
局方牛黃清心丸 三六五
醫統牛黃丸 二六六
萬氏牛黃清心丸 二六七
陳氏牛黃丸 二六八
雜著牛黃丸 三六九
三味牛黃丸 二百七十
蘇合香丸 二七一
龍腦雞蘇丸 二七二
九還金液丹 三七二
香橘湯 三七四
分氣紫蘇飲 三七五
枳實散 三七六
推氣散 三七七
白朮丸 二七八

五十五卷

攻陣

大承氣湯 一
小承氣湯 二
調胃承氣湯 三
桃仁承氣湯 四
良方桃仁承氣湯 五
當歸承氣湯 六
大柴胡湯 七
六一順氣湯 八
大陷胸湯 九
小陷胸湯 十
河間大黃湯 十一
外科大黃湯 十二
大黃甘草湯 十三
大黃硝石湯 十四

梔子大黃湯 十五　防風通聖散 十六
雙解散 十七　牛黃雙解散 十八
局方涼膈散 十九　東垣涼膈散 二十
劉氏黃龍湯 二一　良方黃龍湯 二二
錢氏黃龍湯 二三　玉燭散 二四
四順清涼飲子 二五　元戎四物湯 二六
抵當湯 二七　十棗湯 二八
三化湯 二九　透膈湯 三十
茵陳蒿湯 三一　芍藥湯 三二
枳實大黃湯 三三　羌活導滯湯 三四
牛黃清心湯 三五　三稜散 三六
三稜丸 三七　三聖膏 三八
桃仁煎 三九　穿山甲散 四十
禹功散 四一　濬川散 四二
稀涎散 四三　大異香散 四四
流金膏 四五　子和通經散 四六
茶棟湯 四七　三花神佑丸 四八
木香檳榔丸 四九　寶鑑木香檳榔丸 五十

遇仙丹 五一　備急丸 五二
神保丸 五三　感應丸 五四
大金花丸 五五　大硝石丸 五六
枳實導滯丸 五七　良方化滯丸 五八 附邵山房感應丸
化鐵丹 五九　陳米三稜丸 六十
局方溫白丸 六一 附萬病紫菀丸　陳氏溫白丸 六二
丹溪阿魏丸 六三　醫林阿魏丸 六四
守病丸 六五　勝紅丸 六六
助氣丸 六七　三黃丸 六八
雄黃聖餅子 六九　舟車丸 七十
導水丸 七一　神芎丸 七二
小胃丹 七三　清氣化痰丸 七四
丹溪清氣化痰丸 七五　法製清氣化痰丸 七六
滾痰丸 七七　硃砂滾涎丸 七八
青礞石丸 七九　化痰丸 八十
辰砂化痰丸 八一　控痰丹 八二
烏巴丸 八三　吐痰方 八四
人參利膈丸 八五　青木香丸 八六

消痞核桃 八十七　熨痞方 八八
開結導飲丸 八九　局方犀角丸 九十
河間犀角丸 九一　郁李仁丸 九二
脾約丸 九三　七宣丸 九四
七聖丸 九五　局方紅丸子 九六
追蟲丸 九七　化蟲散 九八
萬應丸 九九　妙應丸 百
五瘟丹 百一　大青丸 百二
硃砂丸 百三　八毒赤丸 百四

瓜蒂散 百五　獨聖散 百六
茶調散 百七　陳氏獨聖散 百八
良方獨聖散 百九　錢氏獨聖散 百十
木通散 百十一　大黃附子湯 百十二
外臺走馬湯 百十三

五十六卷

散陣

麻黃湯 一　麻黃加朮湯 二

麻黃附子細辛湯 三　麻黃杏仁甘草石膏湯 四
麻黃附子甘草湯 五　麻黃甘草湯 六
大青龍湯 七　小青龍湯 八
桂枝湯 九　桂枝加葛根湯 十
桂枝加大黃湯 十一　栝蔞桂枝湯 十二
桂枝人參湯 十三　桂枝麻黃各半湯 十四
桂枝附子湯 十五　桂枝甘草湯 十六
桂枝葛根湯 十七　柴胡桂枝湯 十八
小柴胡湯 十九　薛氏加味小柴胡湯 二十

良方加味小柴胡湯 二十一　加減小柴胡湯 二十二
柴胡石膏湯 二三　大柴胡湯 二四
柴平湯 二五　柴苓湯 二六
加味柴苓湯 二七　四逆散 二八
葛根湯 二九　升麻葛根湯 三十
柴葛解肌湯 三十一　葛根葱白湯 三十二
連鬚葱白湯 三十三　參蘇飲 三十四
加減參蘇飲 三十五　敗毒散 三十六
加味敗毒散 三十七　荊防敗毒散 三十九

五積散 二九　十神湯 四十
升陽散火湯 四一　升陽益胃湯 四二
聖散子 四三　九味羌活湯 四四
六神通解散 四五　消風百解散 四六
局方消風散 四七　子和消風散 四八
二味消風散 四九　黃芩半夏湯 五十
千金續命湯 五一　小續命湯 五二
大續命湯 五三　續命煮散 五四
秦艽升麻黃湯 五五　愈風湯 五六
胃風湯 五七　地黃散 五八
東垣羌活附子湯 五九　寶鑑羌活附子湯 六十
羌活勝風湯 六一　川芎散 六二
玉機川芎散 六三　川芎茶調散 六四
局方神术散 六五　入香散 六六
芎芷散 六七　芎辛導痰湯 六八
上清散 六九　透頂散 七十
菊花散 七一　如聖散 七二
點頭散 七三　清空膏 七四

愈風餅子 七五　八般頭風 七六
都梁丸 七七　三拗湯 七八
華蓋散 七九　沖和散 八十
金沸草散 八一　活人旋復花湯 八二
良方旋復花湯 八三　桑皮散 八四
蘇陳九寶湯 八五　局方羌活散 八六
羌活散 八七　芎芷香蘇散 八八
越婢湯 八九　越婢加半夏湯 九十
當歸湯 九一　羌活勝濕湯 九二
烏藥順氣散 九三　通關散 九四
神效左經丸 九五　麻黃左經湯 九六
半夏左經湯 九七　大黃左經湯 九八
第一麻黃湯 九九　第二獨活湯 百
第三兼補厚朴湯 百一　第四風引獨活湯 百二
獨活湯 百三　追毒湯 百四
排風湯 百五　陽毒升麻湯 百六
栝蔞根湯 百七　再造散 百八
枳殼煮散 百九　柴胡升麻湯 百十

桂枝散 百十一
河間葛根湯 百十二
升麻湯 百十三
柴胡桂枝乾薑湯 百十四
五十七卷

寒陣

黃連解毒湯 一
白虎湯
白虎加人參湯 三
白虎加桂枝湯 四
仲景竹葉石膏湯 五
六味竹葉石膏湯 六
竹葉黃芪湯 七
宣明桂苓甘露飲 八

子和桂苓甘露飲 九
子和甘露飲 十
三黃石膏湯 十一
羌活升麻湯 十二
普濟消毒飲 十三
芩連消毒飲 十四
六神通解散 十五
小陷胸湯 十六
雞子清飲 十七
黃連阿膠湯 十八
梔子仁湯 十九
梔子豉湯 二十
梔子厚朴湯 二一
梔子乾薑湯 二二
梔子蘗皮湯 二三
解瘟疫熱毒 二四
漏蘆升麻湯 二五
黃連香薷飲 二六

瀉心湯 二七
甘草瀉心湯 二八 夏瀉心湯附
生薑瀉心湯 二九
大黃黃連瀉心湯 三十
附子瀉心湯 三一
清心蓮子飲 三二
加味通心飲 三三
清心湯 三四
外科清心湯 三五
人參清肺湯 三六
人參平肺散 三七
黃芩清肺飲 三八
清肺湯 三九
東垣清肺飲子 四十
蕭氏清肺飲 四一
瀉白散 四二
五味瀉白散 四三
正傳麥門冬湯 四四

類方麥門冬湯 四五
萬氏麥門冬湯 四六
家抄麥門冬飲 四七
宣明麥門冬飲子 四八
二母散 四九
陳氏二母散 五十
黃芩知母湯 五一
桑白皮湯 五二
紫菀散 五三
東垣清胃散 五四
加味清胃散 五五
秘驗清胃飲 五六
瀉黃散 五七
和中湯 五八
柴胡清肝散 五九
梔子清肝散 六十
芍藥清肝散 六一
良方龍膽瀉肝湯 六二

七味龍膽瀉肝湯 六三　加味龍膽瀉肝湯 六四
當歸六黃湯 六五　正氣湯 六六
芍藥甘草湯 六七　生地黃煎 六八
石膏散 六九　荊芥散 七十
雙玉散 七一　秘方茶調散 七二
天花散 七三　地骨皮散 七四
玉泉丸 七五　清膈導痰湯 七六
生鐵落飲 七七　大連翹飲 七八
局方犀角地黃湯 七九　良方犀角地黃湯 八十
拔萃犀角地黃湯 八一　外科犀角地黃湯 八二
生地黃散 八三　生地黃飲子 八四
茜根散 八五　人參五味子湯 八六
二神散 八七　四生丸 八八
滋陰地黃湯 八九　黃芪鱉甲煎 九十
地黃膏 九一　秦艽扶羸湯 九二
退熱湯 九三　團魚丸 九四
地榆散 九五　四味地榆散 九六
本事槐花散 九七　外科槐花散 九八

東垣加減四物湯 九九　枳殼湯 百
枳殼散 百一　小薊飲子 百二
仲景黃連湯 百三　黃連湯 百四
仲景黃芩湯 百五　外科黃芩湯 百六
直指黃芩湯 百七　黃芪散 百八
黃芩芍藥湯 百九　木香化滯湯 百十
清熱滲濕湯 百十一　益元散 百十二
香連丸 百十三　六神丸 百十四
八正散 百十五　七正散 百十六
五淋散 百十七　猪苓湯 百十八
太平丸 百十九　火府丹 百二十
真珠粉丸 一二一　導赤散 一二二
赤茯苓湯 一二三　葵子湯 一二四
牛膝湯 一二五　三味牛膝湯 一二六
海金沙散 一二七　茵陳湯 一二八
茯苓滲濕湯 一二九　當歸拈痛湯 百三十
活人犀角散 一三一　清燥湯 一三二
蒼朮湯 一三三　二妙散 一三四

加味二妙丸一三五
蒼朮黃柏丸一三六
虎脛骨丸一三七
河間苦參丸一三八
陳氏苦參丸一三九
錢氏苦參丸百四十
硃砂涼膈丸一四一
硃砂安神丸一四二
錢氏安神丸一四三
秘旨安神丸一四四
十味安神丸一四五
七味安神丸一四六
集驗龍腦安神丸一四七
萬氏龍腦安神丸一四八
抑青丸一四九
錢氏抑青丸百五十
瀉青丸一五一
瀉金丸一五二

茱連丸一五三
左金丸一五四
大補丸一五五
大造丸一五六
大補陰丸一五七
大補天丸一五七
大補地黃丸一五九
丹溪補陰丸一五九
節齋補陰丸一六一
三補丸一六二
滋腎丸一六三
加味虎潛丸一六四
加味坎離丸一六五
三才封髓丹一六六
當歸龍薈丸一六七
良方蘆薈丸一六八
大蘆薈丸一六九
加減蘆薈丸百七十
三聖丸一七一
木連丸一七二
軟石膏丸一七三
地榆丸一七四
槐角丸一七五
阿膠丸一七六
聚金丸一七七
檗連丸一七八
酒蒸黃連丸一七九
黃連丸百八十
豬臟丸一八一
保和丸一八二
四順清涼飲一八三
白頭翁湯一八四

五十八卷

熱陣

理中湯一
附子理中湯二
附子理中丸三
理中加丁香湯四
加味理中湯五
胡椒理中湯六
八味理中丸七
枳實理中丸八
理中化痰丸九
治中湯十
丁香溫中湯十一
良方溫胃湯十二
東垣溫胃湯十三
四逆湯十四

四逆加人參湯 十五
四逆加豬膽汁湯 十六
茯苓四逆湯 十七
茱萸四逆湯 十八
茵陳四逆湯 十九
當歸四逆湯 二十
四逆散 二一
附子湯 二二
三因附子湯 二三
朮附湯 二四
參附湯 二五
朮附湯 二六
芪附湯 二七
濟生朮附湯 二八
桂枝附子湯 二九
金匱白朮附子湯 三十
甘草附子湯 三一
薑附湯 三二

生薑附子湯 三三
乾薑附子湯 三四
羌活附子湯 三五
芍藥甘草附子湯 三六
附子八味湯 三七
六物附子湯 三八
小建中湯 三九
局方大建中湯 四十
八味大建中湯 四一
十建湯 四二
炙甘草湯 四三
桂枝甘草湯 四四
回陽返本湯 四五
華佗救陽脫方 四六
旋覆代赭石湯 四七
厚朴甘草半夏人參湯 四八
十味剉散 四九
芎朮湯 五十

正元散 五二
生薑半夏湯 五三
半夏乾薑散 五四
甘草乾薑湯 五五
橘皮乾薑湯 五六
人參橘皮湯 五七
嚴氏橘皮湯 五八
橘皮竹茹湯 五九
小半夏湯 六十
丁香散 六一
丁香煮散 六二
丁附散 六三
丁香茯苓散 六四
良方丁香柿蒂散 六五
寶鑑丁香柿蒂散 六六
柿蒂湯 六七
安脾散 六八
補脾湯 六九

養胃湯 七十
胃愛散 七一
藿香安胃散 七二
七味人參丸 七三
甘露湯 七四
茯苓澤瀉湯 七五
茯苓甘草湯 七六
草豆蔻湯 七七
人參散 七八
四順附子湯 七九
附子粳米湯 八十
冷香飲子 八一
冷香湯 八二
直指木瓜湯 八三
訶子散 八四
霍亂二方 八五
千金霍亂方 八六
乾霍亂一方 八七

苓桂朮甘湯 八八
韭朮湯 八九
韓氏溫中湯 九十
厚朴溫中湯 九一
大正氣散 九二
强中湯 九三
强中丸 九四
三木伏 九五
三生丸 九六
五生丸 九七
溫中□丸 九八
溫胃化滯丸 九九
倍朮丸 百
丁香半夏丸 百一
丁香五套丸 百二
復元丹 百三
薛氏加減金匱腎氣丸 百四
濟生實脾散 百五

嚴氏實脾散 百六
簡易腹脹方 百七
丁香止痛散 百八
勝金散 百九
鐵刷散 百十
蟠蔥散 百十一
沈香桂附丸 百十二
椒附丸 百十三
大沈香丸 百十四
椒附二陳湯 百十五
扶陽助胃湯 百十六
五味沈附湯 百十七
二味沈附湯 百十八
七棗湯 百十九
冷湯 百二十
生薑煎 一二一
芎附散 一二二
參附滲濕湯 一二三

七味滲濕湯 一二四
劉背散 一二五
溫中法麴丸 一二六
龍虎丹 一二七
活絡丹 一二八
二至丸 一二九
腎着湯 百三十
茵陳附子湯 一三一
小茵陳湯 一三二
茵陳橘皮湯 一三三
五苓散 一三四
七苓散 一三五
五噎散 一三六
白朮聖散子 一三七
仲景吳茱萸湯 一三八
直指方吳茱萸湯 一三九
吳茱萸散 百四十
吳茱萸丸 百四一

八味湯 百四二
仲景真武湯 百四三
九寶丹 一四四
四柱散 一四五
白通湯 一四六
桃花湯 一四七
漿水散 一四八
附子茴香散 一四九
五味子散 百五十
二神丸 一五一
薛氏四神丸 一五二
濟安四神丸 一五三
蕭林四神丸 一五四
集要四神丸 一五五
五味子丸 一五六
蓽撥丸 一五七
局方肉豆蔻丸 一五八
陳氏肉豆蔻丸 一五九

訶梨勒丸 百六十　厚朴丸 一六一
縮脾丸 一六二　桂香丸 一六三
陳麴丸 一六四　萆薢分清飲 一六五
益志湯 一六六　局方安腎丸 一六七
小安腎丸 一六八　石刻安腎丸 一六九
小巳寒丸 百七十　局方大巳寒丸 一七一
元戎大巳寒丸 一七二　海藏巳寒丸 一七三
十補丸 一七四　百一選十補丸 七五
神應散 七六　當歸生薑羊肉湯 一七七

腎氣丸 一七八　胡蘆巴丸 一七九
丁香楝實丸 百八十　苦楝丸 一八一
三層茴香丸 一八二　奪命丹 一八三
良方奪命丹 一八四　萬氏奪命丹 一八五
外科奪命丹 一八六　二氣丹 一八七
半硫丸 一八八　養正丹 一八九
黑錫丹 百九十　紅丸子 一九一
椒囊法 一九二　椒紅丸 一九三
五十九卷

固陣

牡蠣散 一　牡蠣白朮散 二
宣明白朮散 三　神效麥麩湯 四
黃芪湯 五　寧肺散 六
安眠散 七　百藥煎 八
三妙湯 九　九仙散 十
劫嗽丸 十一　五味子丸 十二
罌粟丸 十三　潤肺丸 十四

辰砂妙香散 十五　王荊公妙香散 十六
金鎖丹 十七　金鎖正元丹 十八
金鎖思仙丹 十九　金鎖匙丹 二十
玉鎖丹 二一　御院玉鎖丹 二二
水陸二仙丹 二三　經驗金櫻丸 二四
經驗秘真丹 二五　鎖精丸 二六
固真丸 二七　固真散 二八
濟生固精丸 二九　直指固精丸 三十
固元丹 三一　秘元丹 三二

韭子丸 三三　家韭子丸 三四

小兎絲子丸 三五　大兎絲子丸 三六

濟生兎絲子丸 三七　茯兎丸 三八

猪肚丸 三九　經驗猪肚丸 四十

三仙丸 四一　九龍丸 四二

小温金散 四三　蓮子六一散 四四

威喜丸 四五　五子丸 四六

遠志丸 四七　猪苓丸 四八

泄瀉經驗方 四九　固腸散 五十

白朮聖散子 五一　陳氏肉豆蔻丸 五二

固腸丸 五三　大斷下丸 五四

椿皮散 五五　桃花丸 五六

生地黃湯 五七　香梅丸 五八

勝金丸 五九　濟生烏梅丸 六十

縮泉丸 六一　四味肉蓯蓉丸 六二

固脬丸 六三　牡蠣丸 六四

茴香益智丸 六五　溺血方 六六

六十卷

因陣

以下眼目方

當歸補血湯 一　益氣聰明湯 二

蔓荆子湯 三　益陰腎氣丸 四

濟陰地黃丸 五　神效黃芪湯 六

明目地黃丸 七　加減駐景丸 八

滋陰地黃丸 九　還睛散 十

八味還睛散 十一　還睛丸 十二

祖傳固本還睛丸 十三　定志丸 十四

地芝丸 十五　助陽和血湯 十六

芎辛散 十七　明目細辛湯 十八

決明夜光散 十九　石斛夜光丸 二十

瀉熱黃連湯 二一　黃芩黃連湯 二二

當歸龍膽湯 二三　芍藥清肝散 二四

蟬花散 二五　五味瀉白散 二六

明目羊肝丸 二七　黃連羊肝丸 二八

黃連天花粉丸 二九　蜜蒙花散 三十

春雪膏 二一
玄明春雪膏 二二
龍腦黃連膏 三三
立消膏 三四
黃連甘石散 三五
黃連人參膏 三六
丹砂散 三七
清涼膏 三八
正傳光明丹 三九
青火金鍼 四十
赤火金鍼 四一
吹鼻六神散 四二
點鹽法 四三
洗爛弦風赤眼方 四四 萬金膏
傳爛弦歌 四五
搜風散 四六
拜堂散 四七
湯泡散 四八
收淚散 四九
去星 五十
眼目打傷青腫 五一
明目第一方 五二

以下耳病方

桂星散 五三
復元通氣散 五四
補腎丸 五五
聰耳益氣湯 五六
肉蓯蓉丸 五七
聤耳明礬散 五八
聤耳流膿方 五九
白龍散 六十
百蟲入耳 六一
蜈蚣入耳 六二
暴聾灸法 六三
塞耳丹 六四

龍腦膏 六五
杏仁膏 六六
通氣散 六七
通耳法 六八

以下面鼻方

川芎散 六九
辛荑散 七十
溫肺散 七一
細辛膏 七二
蒼耳散 七三
神愈散 七四
醍醐散 七五
良方防風湯 七六
宣明防風湯 七七
荊芥散 七八
腦漏秘方 七九
黃白散 八十
細辛散 八一
菖蒲散 八二
輕黃散 八三
雄黃散 八四
千金瘜肉方 八五
簡易瘜肉方 八六
白礬散 八七
二神散 八八
酒齄鼻粉痣 八九
點痣去斑 九十
面鼻雀斑 九一
面瘡二方 九二
止衄方 九三
止衄歌 九四
鼻衄蒸法 九五
鼻塞不通熨法 九六
硝石散 九七
良方通關散 九八

陳氏通關散 九九　擦牙通關散 百
以下口舌方
玄參散 百一　玄參升麻湯 百二
清涼飲子 百三　清熱化痰湯 百四
甘露飲 百五　龍膽瀉肝湯 百六
五福化毒丹 百七　冰蘗丸 百八
上清丸 百九　硼砂丸 百十
聖金散 百十一　金花煎 百十二
飛礬散 百十三　寸金散 百十四

黃柏散 百十五　升麻黃連丸 百十六
丁香丸 百十七　應手散 百十八
陰陽散 百十九　外科陰陽散 百二十
綠雲散 一二一　細辛黃蘗散 一二二
白礬黃蘗散 一二三　硼砂散 一二四
黃連朴硝散 一二五　柳華散 一二六
搽口藥 一二七　碧雪 一二八
絳雪 一二九　孫真人口瘡方 百三十
皂角散 百三一　千金口臭方 一三二

聖惠口齒方 一三三
以下齒牙方
神功丸 一三四　東垣清胃散 一三五
秘驗清胃飲 一三六　三因安腎丸 一三七
立效散 一三八　細辛煎 一三九
驅毒飲 百四十　丁香散 一四一
芫花散 一四二　如神散 一四三
赴筵散 一四四　蟾酥膏 一四五
蟲牙痛 一四六　韭子湯 一四七

瑞竹堂方 一四八　巴豆丸 一四九
藜蘆散 百五十　北棗丹 一五一
青金散 一五二　三仙散 一五三
麝礬散 一五四　神授丹 一五五
黃連散 一五六　雄黃麝香散 一五七
齒縫出血 一五八　固齒雄鼠骨散 一五九
秘方雄鼠骨散 百六十　荊槐散 一六一
石膏升麻散 一六二　蒲黃散 一六三
香鹽散 一六四　牙宜散 一六五

槐鹽散 一六六　椒鹽散 一六七
宜風牢牙散 一六八　青白散 一六九
御前白牙散 百七十　東垣白牙散 一七一
道藏經方 一七二　取牙不犯手 一七三
以下咽喉方
局方甘桔湯 一七四　拔萃甘桔湯 一七三
加味甘桔湯 一七六　訶子甘桔湯 一七七
清咽秘膈散 一七八　消梨飲 一七九
透天一塊冰 百八十　龍花丸 一八一

杏仁煎 一八二　蜜附子
牛黃益金散 一八四　秘方三黃丸 一八五
人參平補湯 一八六　百合丸 一八七
竹衣麥門冬湯 一八八　射干丸 一八九
鐵笛丸 百九十　雄黃解毒丸 一九一
玉鑰匙 一九二　二聖散 一九三
奪命散 一九四　馬牙硝散 一九五
燒鹽散 一九六　捆關散 一九七
七寶散 一九八　破關丹 一九九

通氣散 二百
以下諸毒方
紫金錠 二百一　三因解毒丸 二百二
藍根散 二百三　白扁豆散 二百四
八毒赤丸 二百五　飲食中毒 二百六
中酒毒 二百七　解麪毒 二百八
解一切食毒 二百九　食魚中毒 二百十
河豚毒 二一一　河豚魚膽狗肉毒 二一二
鱉魚蟹蕈禽獸自死毒 二一三

中蠱毒 二一四　食牛馬肉中毒 二一五
金蠶子毒 二一六　食斑鳩毒 二一七
解花椒毒 二一八　解諸菜毒 二一九
解魚毒 二百二十　巴豆毒 二二一
解砒毒 二二二　鉤吻毒 二二三
附子等毒 二二四　烏頭草烏毒 二二五
半夏毒 二二六　斑蝥芫青毒 二二七
藜蘆毒 二二八　雄黃毒 二二九
杏仁毒 二百三十　解服丹毒 二三一

中藥箭毒　解鹽滷 二三三
解漆毒 二三四
以下蟲毒方
解虎傷毒 二三五　蛇毒 二三六
雄黃辟蛇毒 二三七　風犬毒 二三八
避犬法 二三九　糯米散 二百四十
定風散 二四一　諸犬咬蟲傷灸法 二四二
解毒散 二四三　馬咬傷毒 二四四
蜈蚣毒 二四五　誤吞蜈蚣 二四六

蠍螫毒 二四七　蜂螫毒 二四八
鼠咬毒 二四九　誤吞水蛭 二百五十
蚯蚓毒 二五一　蚕咬毒 二五二
蜘蛛咬毒 二五三　神授散 二五四
射工溪毒 二五五　雄黃兌散 二五六
大孔蟲痒方 二五七　雄麝散 二五八
丹砂丸 二五九　七寶丹 二百六十
蜜髓煎 二六一　歸冤散 二六二
麥麪散 二六三　挑生蠱毒簡易方 二六四

以下雜方
嗽烟筒 二六五　雲霧烟筒 二六六
七寶美髯丹 二六七　北京烏鬚方 二六八
擦牙烏鬚方 二六九　便易擦牙方 二七十
疝氣神方 二七一　神仙六子丸 二七二
四製川楝子丸 二七三　木香導氣丸 二七四
去鈴丸 二七五　事後中寒腹痛 二七六
濕疝陰丸作痛 二七七　薰發脫肛方 二七八
薰洗脫肛法 二七九　參朮芎歸湯 二百八十

涼血清腸散 二八一　縮砂散 二八二
訶子人參湯 二八三　猪腸散 二八四
蟠龍散 二八五　伏龍肝散 二八六
獨蒜通便方 二八七　小便不通方 二八八
小便不通葱熨法 二八九　雞肉金散 二百九十
狐腋五方 二九一　脚汗牡蠣散 二九二
煖囊牡蠣散 二九三　蒸洗陰囊法 二九四
梅蘇丸 二九五　冰梅丸 二九六
龍腦上清丸 二九七　上清丸 二九八

辟邪丹 二九九　福建香茶餅 三百
香髮木犀油 三百一　玉容散 三百二
硫黃膏 三百三

六十一卷

婦人

安胎飲 一　安胎散 二
泰山磐石散 三　地黃當歸湯 四
良方當歸湯 五　良方阿膠散 六

良方膠艾湯 七　七味阿膠散 八
良方黃芪湯 九　良方鉤藤湯 十
良方白朮散 十一　三味白朮湯 十二
四味白朮湯 十三　全生白朮散 十四
保胎飲 十五　當歸芍藥湯 十六
益母地黃湯 十七　良方獨聖散 十八
安胎寄生湯 十九　二黃散 二十
四聖散 二一　續斷湯 二二
枳殼湯 二三　滑胎枳殼散 二四

枳殼散 二五　鯉魚湯 二六
竹葉湯 二七　紫蘇飲 二八
安榮散 二九　天仙藤散 三十
羚羊角散 三一　人參橘皮湯 三二
竹茹湯 三三　半夏茯苓湯 三四
烏附湯 三五　千金保孕丸 三六
一母丸 三七　束胎丸 三八
茯苓丸 三九　達生散 四十
佛手散 四一　生化湯 四二

當歸川芎湯 四三　加味芎歸湯 四四
當歸黃芪湯 四五　芎歸補中湯 四六
保生無憂散 四七　人參黃芪湯 四八
良方牛膝散 四九　局方黑神散 五十
簡易黑聖散 五一　經驗滑石散 五二
難產方 五三　桂心散 五四
桂香散 五五　下胎小品方 五六
廣濟下胎方 五七　扶羸小品方 五八
下死胎 五九　千金去胎方 六十

硫黃散 六一　硫黃湯 六二
益母丸 六三　良方奪命丹 六四
廻生丹 六五　斷產灸法 六六
千金斷產方 六七　斷產小品方 六八
丹溪斷子法 六九　仲景羊肉湯 七十
良方羊肉湯 七一　黃雌雞湯 七二
母雞湯 七三　豬腰湯 七四
四神散 七五　大岩蜜湯 七六
良方人參湯 七七　白茯苓散 七八

七珍散 七九　良方趁痛散 八十
補脬飲 八一　止汗散 八二
麻黃根湯 八三　二味參蘇飲 八四
良方黃龍湯 八五　陳氏二母散 八六
豬蹄湯 八七　湧泉散 八八
玉露散 八九　良方漏蘆湯 九十
栝蔞散 九一　補肝散 九二
金匱膠艾湯 九三　加味八珍湯 九四
調衛養榮湯 九五　良方當歸散 九六

丹參散 九七　玄胡當歸散 九八
牛膝散 九九　良方交加散 百
蒲黃散 百一　琥珀散 百二
溫經湯 百三　失笑散 百四
澤蘭湯 百五　當歸沒藥丸 百六
醋附丸 百七　柏子仁丸 百八
烏賊魚骨丸 百九　增損四物湯 百十
奇效四物湯 百十一　良方加減四物湯 百十二
四物二連湯 百十三　人參當歸湯 百十四

一味防風散 百十五　龍骨散 百十六
如聖散 百十七　槐榆散 百十八
七灰散 百十九　棕灰散 百二十
柏葉散 一二一　子芩散 一二二
防風黃芩丸 一二三　[illegible]芎散 一二四
歸神湯 一二五　白芷散 一二六
海藏白芍藥散 一二七　克應丸 一二八
滑石散 一二九　芍藥散 百三十
通氣散 一三一　四製香附丸 一三二

女金丹 一二二　琥珀丸 一二四
延年益嗣丹 一二五　續嗣降生丹 一二六
河車種玉丸 一二七　八珍益母丸 一二八
烏雞丸 一二九　又烏雞丸 百四十
唐氏烏雞丸 一四一　秘方烏雞煎丸 一四二
萬病丸 一四三
以下通用方
四君子湯 一四四　六君子湯 一四五
五味異功散 一四六　補中益氣湯 一四七
四物湯 一四八　八珍湯 一四九
十全大補湯 一五十　歸脾湯 一五一
人參理中湯 一五二　逍遙散 一五三
加味逍遙散 一五四　七味白朮散 一五五
六味地黃丸 一五六　八味地黃丸 一五七
劉氏四聖丸 一五八　五積散 一五九
參蘇飲 百六十　人參敗毒散 百六一
當歸六黃湯 一六二　柴胡清肝散 一六三
梔子清肝散 一六四　八正散 一六五

五苓散 一六六　犀角地黃湯 一六七
導赤散 一六八　桃仁承氣湯 一六九
玉燭散 百七十　野菊湯 一七一
舒筋湯 一七二　交加散 一七三
加味小柴胡湯 一七四　良方當歸煎 一七五
柴胡石膏湯 一七六　都梁丸 一七七
瓜子仁湯 一七八　子和通經散 一七九
二神散 百八十　小薊飲子 一八一
海藏愈風湯 一八二　鎖精丸 一八三
青娥丸 一八四　獨參湯 一八五
奪命散 一八六
六十二卷

小兒

錢氏益脾湯 一　調中湯 一
調中丸 二　人參理中丸 四
觀音散 五　助胃膏 六
七味白朮散 七　白朮散 八

太和餅 九　團參散 十
止汗散 十一　調元散 十二
平和飲子 十三　調氣散 十四
錢氏當歸散 十五　撮要當歸散 十六
人參黃連散 十七　燈華散 十八
天麻散 十九　湯氏異攻散 二十
柴胡散 二一　柴苓散 二二
惺惺散 二三　星蘇散 二四
錢氏黃龍湯 二五　人參羌活散 二六

牛黃散 二七　錢氏生犀散 二八
二黃犀角散 二九　柴胡飲子 三十
地骨皮散 三一　天麻定喘湯 三二
補肺散 三三　錢氏阿膠散 三四
保和丸 三五　大安丸 三六
消食丸 三七　消乳丸 三八
白餅子 三九　宣風散 四十
人參養胃湯 四一　人參安胃散 四二
生附四君湯 四三　釀乳法 四四

銀白散 四五　朱砂散 四六
二順散 四七　香朴散 四八
沉香散 四九　玉露散 五十
六神散 五一　香橘餅 五二
錢氏黃芩湯 五三　清腸散 五四
破故紙散 五五　陳氏肉豆蔻丸 五六
寧神湯 五七　當歸養心湯 五八
錢氏養心湯 五九　茯神湯 六十
清神湯 六一　錢氏酸棗仁湯 六二

黑附子湯 六三　鈎藤散 六四
鈎藤飲子 六五　錢氏鈎藤飲 六六
抑肝散 六七　大青膏 六八
地黃清肺飲 六九　甘草湯 七十
秘旨安神丸 七一　七味安神丸 七二
十味安神丸 七三　硃砂安神丸 七四
錢氏安神丸 七五　安神鎮驚丸 七六
萬氏龍腦安神丸 七七　鎮心丸 七八
金箔鎮心丸 七九　辰砂膏 八十

琥珀散 八一　千金龍膽湯 八二
梅花飲 八三　擦牙通關散 八四
抱龍丸 八五　至聖保命丹 八六
定命丹 八七　九還金液丹 八八
膽星天竺丸 八九　溫白丸 九十
粉紅丸 九一　錢氏牛黄丸 九二
曾青牛黄丸 九三　萬氏牛黄清心丸 九四
三味牛黄丸 九五　涼驚丸 九六
利驚丸 九七　錢氏抑青丸 九八

化痰丸 九九　比金丸 百
虎睛丸 百一　五癇丸 百二
斷癇丸 百三　消風丸 百四
妙聖丹 百五　褊銀丸 百六
紫河車丸 百七　大蕪荑湯 百八
生熟地黄湯 百九　蘭香散 百十
四味肥兒丸 百十一　六味肥兒丸 百十二
七味肥兒丸 百十三　蘆薈肥兒丸 百十四
大蘆薈丸 百十五　加減蘆薈丸 百十六
當歸龍薈丸 百十七　張氏蘆薈丸 百十八
龍膽丸 百十九　木香丸 百二十
黄連丸 一二一　胡黄連丸 一二二
蟾蜍丸 一二三　天麻丸 一二四
靈脂丸 一二五　如聖丸 一二六
褐子丸 一二七　消積丸 一二八
塌氣丸 一二九　紫霜丸 百三十
化慝丸 一三一　丁蟲丸 一三二
史君子丸 一三三　白玉散 一三四

以下通用方
四君子湯 一三五　六君子湯 一三六
五味異攻散 一三七　四物湯 一三八
八珍湯 一三九　十全大補湯 百四十
獨參湯 一四一　歸脾湯 一四二
參术湯 一四三　參术膏 一四四
參苓散 一四五　參附湯 一四六
參苓白术散 一四七　理中湯 一四八
生脉散 一四九　五福飲 百五十

五君子煎一五一　理陰煎一五二
溫胃飲一五三　養中煎一五四
參薑飲一五五　六味回陽飲一五六
六味異功煎一五七　六味丸一五八
八味丸一五九　胃關煎百六十
佐關煎一六一　五德丸一六二
二陳湯一六三　芍藥枳朮丸一六四
枳朮丸一六五　大和中飲一六六
小和中飲一六七　四順清涼飲一六八

青州白丸子一六九　瀉青丸百七十
掃蟲煎一七一

六十三卷

痘疹

保元湯一　調元湯二
內補湯三　托裏散四
解毒內托散五　陳氏托裏消毒散六
參芪內托散七　參芪四聖散八
陳氏四聖散九　加味四聖散十
如聖湯十一　人參固肌湯十二
人參透肌散十三　十宣散十四
芎歸湯十五　活血散十六
當歸活血散十七　養血化斑湯十八
胃愛散十九　三仙散二十
陳氏木香散二一　陳氏十二味異功散二二
人參麥門冬散二三　柴胡麥門冬散二四
升均湯二五　升麻葛根湯二六

蘇葛湯二七　連翹升麻湯二八
柴胡橘皮湯二九　人參敗毒散三十
荊防敗毒散三一　柴葛敗毒散三二
參蘇飲三三　加減參蘇飲三四
麻黃甘草湯三五　柴胡桂枝湯三六
桂枝葛根湯三七　十味羌活散三八
十三味羌活散三九　羌活湯四十
雙解散四一　柴胡飲子四二
桂枝大黃湯四三　防風芍藥甘草湯四四

荆芥防風甘草湯 四五
蟬退膏 四六
消毒散 四七
四味消毒飲 四八
六味消毒飲 四九
消毒化斑湯 五十
解毒湯 五一
真人解毒湯 五二
葛根解毒湯 五三
寶元解毒湯 五四
通源解毒湯 五五
解毒防風湯 五六
化毒湯 五七
消風化毒湯 五八
涼血化毒湯 五九
犀角化毒丸 六十
五福化毒丹 六一
外科五福化毒丹 六二

犀角散 六三
紫草化毒散 六四
紫草散 六五
紫草飲 六六
紫草飲子 六七
紫草快斑湯 六八
紫草木香湯 六九
紫草木通湯 七十
紫草膏 七一
紅綿散 七二
快斑湯 七三
快斑越婢湯 七四
快透散 七五
鼠粘子湯 七六
射干鼠粘子湯 七七
錢氏獨聖散 七八
無價散 七九
三酥餅 八十
神應奪命丹 八一
萬氏奪命丹 八二
東垣涼膈散 八三
退火丹 八四
陳氏通關散 八五
玄參地黃湯 八六
萬氏清肺飲 八七
導赤通氣散 八八
甘桔清金散 八九
加味甘桔湯 九十
大如聖飲子 九一
萬氏橘皮湯 九二
勻氣散 九三
前胡枳殼湯 九四
當歸丸 九五
百祥丸 九六
棗變百祥丸 九七
拔毒散 九八

錢氏苦參丸 九九
稀痘方 百
稀痘酒 百一
三豆湯 百二
絲瓜湯 百三
辰砂散 百四
保嬰丹 百五
洗肝明目散 百六
洗肝散 百七
羊肝散 百八
蒺藜散 百九
蟬菊散 百十
秦皮散 百十一
通神散 百十二
黃柏膏 百十三
瘡疹散 百十四
四聖丹 百十五
萬氏四聖散 百十六

神效隔蒜灸法 百十七　胡荽酒 百十八
茵陳薰法 百十九　水楊湯 百二十
茶葉方 一二一　猪髓膏 一二二
百花膏 一二三　蕎麥散 一二四
臙脂汁 一二五　敗草散 一二六
白龍散 一二七　救苦滅瘢散 一二八
滅瘢散 一二九　辟邪丹 百三十
砭法 一三一　蝌蚪法 一三二
雄黃散 一三三　綿繭散 一三四

搽牙散 一三五　吹口丹 一三六
生肌散 一三七　馬鳴散 一三八

以下麻疹方

升麻湯 一三九　升麻透斑湯 百四十
葛根麥門冬散 一四一　萬氏麥門冬湯 一四三
錢氏柴胡四物湯 一四二　生地黃散 一四四
清肺湯 一四五　清肺消毒湯 一四六
門冬清肺湯 一四七　清肺消毒化痰湯 一四八
清金降火湯 一四九　二母散 百五十

透斑和中湯 一五一　解毒化滯湯 一五二
大青湯 一五三　羚羊角散 一五四
羌菊散 一五五

以下通用方

人參理中湯 一五六　六物煎 一五七
六氣煎 一五八　九味異功煎 一五九
柴歸飲 百六十　柴葛煎 一六一
疏邪飲 一六二　五積散 一六三
四順清涼飲 一六四　涼血養榮煎 一六五

搜毒煎 一六六　犀角地黃湯 一六七
仲陽黃芪湯 一六八　透邪煎 一六九
化斑湯 百七十　小柴胡湯 一七一
益元散 一七三　四苓散 一七二
導赤散 一七四

六十四卷

外科

仙方活命飲 一　托裏消毒散

秘方托裏散 三
神功托裏散 四
參芪托裏散 五
參芪內托散 六
托裏養營湯 七
托裏黃芪湯 八
內補黃芪湯 九
托裏當歸湯 十
托裏健中湯 十一
托裏溫中湯 十二
托裏益中湯 十三
托裏溫經湯 十四
托裏益黃湯 十五
托裏清中湯 十六
托裏抑青湯 十七
托裏榮衛湯 十八
托裏越鞠湯 十九
定痛托裏散 二十
內托復煎散 二一
內托羌活湯 二二
內塞散 二三
沖和湯 二四
神效酒煎散 二五
人參黃芪湯 二六
黃芪人參湯 二七
黃芪建中湯 二八
參朮補脾湯 二九
參芪補肺湯 三十
益氣養榮湯 三一
補陰八珍湯 三二
參朮薑附湯 三三
附子理中湯 三四
六物附子湯 三五
附子八物湯 三六
回陽湯 三七
薛氏加減八味丸 三八

加味地黃丸 三九
當歸川芎散 四十
加味敗毒散 四一
九味羌活湯 四二
加味羌活湯 四三
白芷胃風湯 四四
葛根牛蒡湯 四五
犀角地黃湯 四六
犀角升麻湯 四七
玄參升麻湯 四八
升麻黃連湯 四九
連翹湯 五十
五香連翹湯 五一
復元通氣散 五二
當歸散 五三
方脉流氣飲 五四
瘡科流氣飲 五五
陳氏獨聖散 五六
乳香定痛丸 五七
消毒散 五八
清熱消毒散 五九
黃連消毒散 六十
連翹消毒散 六一
加味解毒湯 六二
解毒防風湯 六三
陳氏解毒防風湯 六四
散腫潰堅湯 六五
瓜蔞托裏散 六六
萬金散 六七
製甘草湯 六八
梅花飲子 六九
牛膠飲 七十
明膠飲子 七一
護心散 七二
內固金粉散 七三
蠟礬丸 七四

千金化毒丸 七五　五福化毒丹 七六
奪命丹 七七　飛龍奪命丹 七八
回生丹 七九　通氣散 八十
梔子仁湯 八一　六味梔子仁湯 八二
清肝益榮湯 八三　清心湯 八四
滋陰湯 八五　地骨皮散 八六
一味苦參丸 八七　陳氏苦參丸 八八
五利大黃湯 八九　清涼飲 九十
宣毒散 九一　拔毒散 九二

內疏黃連湯 九三　桃仁湯 九四
漏蘆湯 九五　千金漏蘆湯 九六
漏蘆升麻湯 九七　潤腸丸 九八
沒藥丸 九九　當歸丸 百
破棺丹 百一　忍冬酒 百二
金銀花酒 百三　槐花酒 百四
蒲公英酒 百五　遠志酒 百六
牛膝酒 百七　消癭酒 百八
桑枝煎 百九　神仙截法 百十
砭法 百十一　刺少商法 百十二
洪氏用蜞鍼法 百十三　騎竹馬灸法 百十四
隔蒜灸法 百十五　附子餅 百十六
豆豉餅 百十七　木香餅 百十八
香附餅 百十九　桑枝灸 百二十
葱熨法 一二一　神仙薰照法 一二二
洗藥神效散 一二三　雄黃解毒散 一二四
豬蹄湯 一二五　集香散 一二六
敷藥方 一二七　圍藥鐵井欄 一二八

大黃揭毒散 一二九　草烏揭毒散 百三十
抑陰散 一三一　抑陽散 一三二
陰陽散 一三三　神功散 一三四
清涼救苦散 一三五　二黃膏 一三六
迴陽玉龍膏 一三七　冲和膏 一三八
麥飯石膏 一三九　黑末子 百四十
乳香定痛散 一四一　烏金膏 一四二
透骨丹 一四三　鍼頭散 一四四
代鍼膏 一四五　替鍼丸 一四六

三合散 一四七 穀[illegible]膏 一四八
生肌散 一四九 收口掺藥 百五十
桔梗湯 一五一 濟生桔梗湯 一五二
人參五味子湯 一五三 四順散 一五四
合歡飲 一五五 紫苑茸湯 一五六
升麻湯 一五七 如金解毒散 一五八
如聖柘黃湯 一五九 葶藶散 百六十
知母茯苓湯 一六一 四味排膿散 一六二
八味排膿散 一六三 薏苡仁湯 一六四 即瓜子仁湯

牡丹皮散 一六五 梅仁湯 一六六
大黃湯 一六七 即牡丹皮湯 射干湯 一六八
槐花散 一六九 除濕和血湯 百七十
夏枯草湯 一七一 必效散 一七二
射干連翹散 一七三 如神散 一七四
遇仙無比丸 一七五 肘後治瘿方 一七六
神效開結散 一七七 生地黃丸 一七八
昆布丸 一七九 濟生玉壺散 百八十
神效瓜蔞散 一八一 海藻散堅丸 一八二
連翹飲子 一八三 清肝解鬱湯 一八四
羌活白芷散 一八五 胡麻散 一八六
四生散 一八七 檳蘇散 一八八
升麻和氣飲 一八九 當歸飲 百九十
羌活當歸散 一九一 一掃散 一九二
烏金散 附舍 一九三 蛇床子散 一九四
金黃散 天泡瘡 一九五 白粉散 癬瘡 一九六
滑石散 一九七 仙遺粮湯 一九八
土萆薢湯 一九九 五加皮飲 二百

換肌消毒散 即萆薢湯 二百一 蠲痺消毒散 二百二
七賢方 二百三 茯苓膏 二百四
五寶丹 二百五 楊梅癰漏方 二百六
會膿散 二百七 牡蠣散 二百八
牛黃雙解散 二百九 內托羌活湯 二百十
加味瀉肝湯 二一一 加味托裏散 二一二
加味十全大補湯 二一三 五味當歸散 二一四
婦人陰瘡 二一五 塌腫湯 二一六
白芷升麻湯 二一七 痔漏腸紅方 二一八

地榆散 二一九
皂莢皮散 二百十
秦艽防風湯 二二一
硫黃丸 二二二
痔瘡方 二二三
血竭子 二二四
羊膽膏 二二五
水銀棗子膏 二二六
熊膽膏 二二七
蝸牛膏 二二八
芫花線 二二九
枯痔水澄膏 二百三十
如神千金方 二三一
秘傳正骨丹 二三二
本事接骨方 二三三
沒藥降聖丹 二三四
十味沒藥丸 二三五
花蕊石散 二三六

黑丸子 二三七
封口藥 二三八
當歸導滯散 二三九
復元活血湯 二百四十
金瘡方 二四一
金瘡降真散 二四二
金瘡夾番散 二四三
龍骨散 二四四
桃花散 二四五
刀傷跌打經驗方 二四六
損傷敷夾法 二四七
蹶跌閃腫痛 二四八
洗損傷方 二四九
箭鏃竹木刺方 二百五十
蹶跌打夾棍傷 二五一
治撲傷 二五二
杖瘡四方 二五三
諸骨諸物鯁 二五四

破傷風驗方 二五五
豨薟酒 二五六
防風湯 二五七
白朮防風湯 二五八
羌活湯 二五九
羌活防風湯 二百六十
大芎黃湯 二六一
玉真散 二六二
養血當歸地黃湯 二六三
蜈蚣散 二六四
破傷風灸法 二六五
愈風丹 二六六
二聖散 二六七
樺皮散 二六八
升麻湯 二六九
醉仙散 二百七十
和浮萍散 二七一
寶鑑換肌散 二七二

通天再造散 二七三
白花蛇丸 二七四
白花蛇膏 二七五
防風天麻丸 二七六
行藥方 二七七
皂角散 二七八
雷丸散 二七九
黑虎丹 二百八十
苦參酒 二八一
何首酒 二八二
七珍湯 二八三
烏頭湯 二八四
敷瘡方 二八五
洗瘡方 二八六
桃花癬 二八七
臘梨瘡 二八八
痿瘡二方 二八九
頭面黃水肥瘡 二百九十

諸癬疥頑瘡 一九一　白屯丹 一九二
紫白癜 一九三　汗斑四方 一九四
漆瘡 一九五　手足甲疽 一九六
木板瘡 一九七　臁瘡神效膏 一九八
隔紙膏 一九九　二味隔紙膏 二百
爛腿瘡久不愈 二百一　凍瘡方 二百二
湯火六方 二百三　湯火至聖膏 二百四
湯火止痛散 二百五　小兒丹毒 二百六
小兒熱口 二百七　加味太乙膏 二百八

會通膏 二百九　神異膏 二百十
清涼膏 二一一　阿魏膏 二一二
硃砂膏 二一三　神效當歸膏 二一四
攻堅敗毒膏 二一五　消痞膏 二一六
琥珀膏 二一七　貼痞琥珀膏 二一八
水紅花膏 二一九　火龍膏 二百二十
趙府膏 二二一　濟陀膏 二二二
八仙紅玉膏 二二三　碧油膏 二二四
長肉膏 二二五　保養元氣膏 二二六
藥煮松香 二二七
以下通用方
四君子湯 二二八　六君子湯 二二九
加味四君子湯 二百三十　四物湯 二三一
八珍湯 二三二　十全大補湯 二三三
補中益氣湯 二三四　歸脾湯 二三五
獨參湯 二三六　人參養榮湯 二三七
五味異功散 二三八　生脈散 二三九
當歸補血湯 二百四十　黃芪六一湯 二四一

參术膏 二四二　聖愈湯 二四三
錢氏七味白术散 二四四　陳氏五味子湯 二四五
參附湯 二四六　人參理中湯 二四七
六味丸 二四八　八味丸 二四九
陳氏加減八味丸 二百五十　還少丹 二五一
大防風湯 二五二　十宣散 二五三
薛氏四神丸 二五四　五積散 二五五
二陳湯 二五六　小柴胡湯 二五七
小青龍湯 二五八　人參敗毒散 二五九

不換金正氣散二百六十　加味逍遙散三六一
防風通聖散三六二　消風散三六三
犀角散二六四　黃連解毒湯三六五
普濟消毒飲二六六　梔子清肝散三六七
柴胡清肝散二六八　加味龍膽瀉肝湯三六九
清心蓮子飲二百七十　黃芩清肺飲三七一
東垣清胃散三七二　竹葉石膏湯三七三
竹葉黃芪湯二七四　滋腎丸三七五
瀉青丸二七六　大蘆薈丸三七七

五苓散三七八　五淋散三七九
八正散三百八十　清肺飲三八一
益元散二八二　四順清涼飲三八三
玉燭散二八四　人參平肺散三八五
葶藶大棗瀉肺湯三八六　枳殼散二八七
失笑散二八八　槐角丸二八九
紫金錠二百九十　良方通關散二九一
全書五十二卷終

景岳全書卷之五十三圖集　古方八陣

會稽　張介賓　會卿著
瀛海　賈棠　青南訂

補陣

四君子湯一　治脾胃虛弱飲食少思或大便不實體瘦面黃或胸膈虛痞吞酸痰嗽或脾胃虛弱善患瘧痢等證

人參　白朮　茯苓各二錢　炙甘草一錢

加薑棗水煎服或加粳米百粒

加味四君湯二　治痔漏下血面色痿黃怔忡耳鳴腳軟氣弱及一切脾胃氣虛口淡食不知味又治氣虛不能攝血以致下血不禁

人參　白朮炒　茯苓　炙甘草

黃芪炙　白扁豆炒

右水煎服或爲末每服三錢滾湯調服

子附四君湯三　方在小兒四三

治脾胃虛寒吐瀉

五味異功散四　治脾胃虛寒飲食少思嘔吐或久患咳嗽面

浮氣逆腹滿等證

人參　白朮炒　茯苓　炙甘草

陳皮各一錢　此即四君子湯加陳皮也

右加薑棗水煎服

六君子湯五　治脾胃虛弱飲食少思或久患瘧痢或食飲難化或嘔吐吞酸或欬嗽喘促若虛火等證須加炮薑其功尤速

即前四君子湯加陳皮半夏各一錢五分

加味六君湯六　治一切脾胃虛弱泄瀉及傷寒病後米穀不化腸中虛滑發渴微痛久不瘥者及治小兒脾疳瀉痢

人參　白朮　黃芪　山藥

甘草　白茯苓各一兩　砂仁　厚朴

肉豆蔻麪裹煨各七錢

右每服一兩用水煎服或為細末用米湯調服二錢不拘時

香砂六君子湯七　治過服涼藥以致食少作嘔或中氣虛滿惡心脹滿等證

人參　白朮　茯苓　半夏

陳皮各一錢　砂仁炒　藿香各八分　炙甘草六分

右薑水煎服

局方四物湯八　治血虛營弱一切血病當以此為主

熟地黃　當歸各二錢　川芎一錢　芍藥二錢

水二鍾煎服

薛氏加味四物湯九

即前方加山梔柴胡丹皮

正傳加味四物湯十　治血虛陰虛諸痿四肢軟弱不能舉動

當歸一錢　五味子九粒　熟地二錢　麥冬

黃柏　蒼朮各一錢　白芍藥　川芎各七分

人參　黃連各五分　杜仲七分　牛膝足不軟者不用

知母各三分

水二鍾煎一鍾空心溫服酒糊丸服亦可

東垣加減四物湯十一　方在寒陣九九

治腸風下血

保命柴胡四物湯十二　治日久虛勞微有寒熱脈滑而數者

當歸　熟地　芍藥　川芎各錢半

柴胡八分　人參　黃芩　半夏

甘草各二錢

加生薑三片水煎服

單氏柴胡四物湯十三　方在痘疹一四三

治疹後餘熱

奇效四物湯十四　方在婦人百十一

治肝經虛熱血崩

增損四物湯十五　方在婦人百十

治脾虛不攝去血不止

元戎四物湯十六　方在攻陣二六

治血虛臟結

良方加減四物湯十七　方在婦人百十三

治婦人血積

四物二連湯十八　方在婦人百十二

治婦人陰虛內熱

局方八珍湯十九　治氣血兩虛調和陰陽

即前四君子四物湯相合也○本方加黃柏知母即名補陰

八珍湯方見外科三二

十全大補湯二十　治氣血俱虛惡寒發熱自汗盜汗肢體困倦眩暈驚悸晡熱作渴遺精白濁二便見血小便短少便泄閉結喘欬下墜等證

即前八珍湯加黃芪肉桂各一錢

局方人參養榮湯二一　治脾肺俱虛惡寒發熱肢體瘦倦食少作瀉口乾心悸自汗等證

人參　黃芪　當歸　白朮

炙甘草　桂心　陳皮各一錢　熟地

五味　茯苓各七分　白芍錢半　遠志五分

加薑棗水煎服

金匱小建中湯二二　治虛勞裏急腹痛失精四肢痠疼手足煩

熱咽乾口燥等證

炙甘草　桂枝　生薑各三兩　大棗十二枚

芍藥六兩　膠飴一升

右六味以水七升煮取三升去滓內膠飴更上微火消解溫服一升日三服嘔家不可用建中湯以甜故也

按此即桂枝湯加膠飴也今方俱改兩為錢而以阿膠代膠飴殊失本方之妙矣

金匱大建中湯二三　治胸中大寒痛嘔不能飲食腹中寒氣上衝上下疼痛不可觸近

人參二兩 蜀椒二合炒去汗 乾薑四兩 膠飴一升

右三味以水四升煮取一升去滓內膠飴一升微火煎取一升半分二次溫服加一炊頃可食溫粥覆之

局方十四味大建中湯 一四 治陰陽虛氣血不足腰腳筋骨疼痛及榮衛失調積勞虛損形體羸瘠短氣嗜臥漸成勞瘵者

人參 白朮 茯苓 甘草

川芎 白芍 熟地

黃芪 肉桂 附子炮 麥冬

半夏 肉蓯蓉酒洗各等分

右㕮咀每服五錢水一鍾薑三片棗二枚煎八分空心溫服

八味大建中湯 一五 治中氣不足手足厥冷小腹攣急或腹滿不食陰縮多汗腹中寒痛唇乾精出寒熱煩冤四體痠痛及無根失守之火出於肌表而為疹為斑厥逆嘔吐等證

人參 甘草炙各一錢 黃芪炙 當歸

芍藥酒炒 桂心各二錢 半夏 附子製各二錢半

右㕮咀每服五錢水二鍾薑三片棗二枚煎七分食前服

人參建中湯 二六 治虛勞自汗

即前小建中湯加人參一兩煎法同

黃芪建中湯 二七 治諸虛羸百病

即前小建中湯加黃芪一兩五錢煎法同

當歸建中湯 二八 治婦人血虛自汗

即前小建中湯加當歸二兩煎法同

三味建中湯 二九 治表虛自汗

芍藥二錢 甘草一錢 官桂五分

薑三片棗一枚水煎服

東垣補中益氣湯 三一 治勞倦傷脾中氣不足清陽不升外感不解體倦食少寒熱瘧痢氣虛不能攝血等證

人參 黃芪炒 白朮炒 甘草炙各錢半

當歸一錢 陳皮五分 升麻 柴胡各三分

右加薑棗水煎空心午前服

東垣調中益氣湯 三二 治濕熱所傷體重煩悶口失滋味或痰嗽稠粘寒熱不調體倦少食等證

黃芪一錢 人參 炙甘草 蒼朮各五分

橘紅 木香 柴胡 升麻各二分

水煎空心服（）一方有白芍三分五味十五粒

歸脾湯 三三 治思慮傷脾不能攝血致血妄行或健忘怔忡

驚悸盗汗嗜臥少食或大便不調心脾疼痛瘧痢鬱結或因
病用藥失宜尅伐傷脾以致變證者最宜用之
人參　黃芪　白朮　茯苓
棗仁各二錢　遠志　當歸各一錢　木香
炙甘草各五分
水二鍾加圓眼肉七枚煎七分食遠服
愚意此湯之用木香特因鬱結疼痛者設如無痛鬱等證必須除去木香以避香燥豈不於氣虛血動者爲尤善乎又遠志味辛氣升而散凡多汗而躁熱者亦宜酌用

加味歸脾湯　三四　治脾經血虛發熱等證
即前方加柴胡山梔各一錢

人參湯　三五　治吐血咯血後宜服并治吐血不止
人參一兩爲細末
五更時用雞蛋清調如稀糊每用二錢茶匙抄服服訖却臥參盡則效○愚意此方固佳其或有忌脾者但以真牛乳稀調頓熱或溫飲之凡無火及微火者豈不更妙○一方治吐衄咯血不止用人參爲末以雞子清投新汲水攪勻調服一二錢

獨參湯　三六　治諸氣虛氣脫及反胃嘔吐喘促粥湯入胃即吐凡諸虛證垂危者
用人參二兩水一升煮取四合乘熱頓服日再進之兼以人參煮粥食之尤妙

奪命散　三七　治傷寒瘧疾陰陽不明或誤用藥致病愈困煩躁發渴及婦人胎前產後受熱瘟疾
上黨人參七錢
水二鍾煎一鍾去滓連罐浸新汲水中取冷一服而盡若鼻上有汗滴尤妙

參附湯　三八　治真陽不足上氣喘急呃逆自利臍腹疼痛手足厥冷嘔惡不食自汗盗汗氣短頭暈等證
人參　製附子　用須參倍於附或等分不拘五錢或一兩酌宜用薑水煎服○良方有丁香十五粒名加減參附湯

參歸湯　三九　此即獨參散見小兒門十亦名人參湯見婦人門七七○治心虛盗汗
人參　當歸等分
右先用豬心一枚破作數片煎湯澄取清汁煎藥服

參术膏 四十 治中氣虛弱諸藥不應或因用藥失宜耗傷元
氣虛證蜂起但用此藥補其中氣諸證自愈
人參 白术 等分
用水煎稠化服之○一方用白术一斤人參四兩切片以流
水十五碗浸一宿桑柴文武火煎取濃汁再用重湯熬膏入
真白蜜收之每以白湯點服
參术湯 四一 治氣虛顫掉泄瀉嘔吐等證
人參 白术 黄芪各二錢 白茯苓
陳皮 炙甘草各一錢

甚者加製附子一錢
水二鍾煎八分食遠服
仲景 术附湯 四二 一名白术附子湯○治中寒中氣不足四肢
逆冷口噤牙關緊急痰盛脉弱風虛頭眩頭重苦極不知食
味
白术二兩 炙甘草一兩 附子一兩半炮去皮
每用五六錢薑五片棗一枚水一鍾半煎七分食遠溫服或
用此化蘇合丸通進三服效
濟生 术附湯 四三 治寒濕腰痛重冷小便自利

白术炒 附子炮製各一 杜仲炒半兩
右咀每服四錢入薑煎服
嚴氏 芪附湯 四四 治氣虛陽弱虛汗倦怠
黄芪蜜炙 製附子等分
每服四錢水一鍾薑五片煎六分食遠服
寶鑑 當歸補血湯 四五 治血氣損傷或因誤攻致虛肌熱口渴
目赤面紅脉大而虛重按全無及病因饑飽勞役者
黄芪炙一兩 當歸二錢
水一鍾半煎八分食遠服

濟生 黄芪湯 四六 治喜怒驚恐房勞致陰陽偏虛者或自汗盜
汗不止
黄芪蜜炙 熟地 白茯苓 天門冬
麻黄根 肉桂 龍骨各一錢 小麥炒
五味子 防風各八分 當歸 炙甘草各七分
水二鍾薑三片煎服○如冷汗加熟附子二片發熱自汗加
石斛一錢
良方 黄芪湯 四七 方在婦人九
安胎治腹痛

魏氏大補黃芪湯 四八 治虛弱自汗

人參　白茯苓　肉蓯蓉　熟地 各一錢

黃芪　白朮　當歸　山茱萸

防風 各八分　炙甘草　肉桂 各四分　五味子 十一粒

水一鍾半加薑三片棗一枚煎七分不拘時服

東垣神效黃芪湯 四九 治渾身或頭面手足麻木不仁目緊縮小及羞明畏日視物不明

黃芪 二錢　人參 八分　炙甘草　蔓荊子

芍藥 各一錢　陳皮 五分

水煎臨卧熱服如麻木不仁雖有熱證不得用黃柏但加黃芪

黃芪六一湯 五十 治陰陽俱虛盜汗

黃芪 蜜炙六錢　炙甘草 一錢

水一鍾半煎八分食遠服

玉屏風散 五一 治表虛自汗

黃芪 蜜炙　防風 各一錢　白朮 炒二錢

水一鍾薑三片煎服

良方潤肺散 五一 治勞瘵咳嗽壯熱口乾咽燥自汗疲倦煩躁

人參　麥門冬　黃芪　桔梗

淡竹葉　炙甘草 等分

右每服一兩水煎服○如自汗加小麥同煎

當歸六黃湯 五二 方在寒陣六五

治陰虛血熱盜汗神效

參苓散 五四 治睡中汗出

人參　酸棗仁　白茯苓 各等分

右為細末每服二錢食遠米飲調下大人小兒皆可服

局方參苓白朮散 五五 治脾胃虛弱飲食不進嘔吐泄瀉或久瀉或大病後調助脾胃

人參　山藥 炒　白扁豆 去皮薑汁炒　蓮肉 去心各一斤

白朮 一斤米泔浸炒　桔梗 炒黃色　砂仁　薏仁 炒各半斤

白茯苓 去皮　炙甘草 各一斤

右為細末每服二錢米湯調下或加薑棗水煎服或煉蜜丸桐子大每服七八十丸空心米飲白湯任下

七味白朮散 五六 方在小兒七

治脾虛熱渴

錢氏生脈散 五七 治熱傷元氣肢體倦怠氣短口渴汗出不止

或金為火制水失所生而致欬嗽喘促肢體痿弱腳軟眼黑等證

人參五錢 麥冬 五味子各二錢

水煎服○此方以生脉為名故俗醫之治脉脫者每多用此是豈知脉脫由陽氣豈麥冬五味之所宜乎見亦淺矣

五味子湯五八 治喘促脉伏而數或虛煩作渴

五味子一錢 人參 麥冬 杏仁 橘紅各一錢五分

水二鍾薑三片棗二枚煎八分無時服

陳氏 五味子湯五九 治腎水枯涸口燥舌乾

五味子 麥門冬各一兩 黃芪炒三兩 人參二兩

粉草炙五錢

右每服五錢水煎日夜服數劑

人參胡桃湯六十 治喘急不能臥

人參錢半 胡桃肉五枚泡去皮

水一鍾半薑一片棗一枚煎八分食後溫服

丹溪 瓊玉膏六一 治虛勞乾欬嗽或好酒者久嗽尤效

人參什二兩 白茯苓十五兩 白蜜五斤煉去沫 琥珀

沉香各五錢 大生地十斤以銀石器杵取自然汁

右先以地黃汁同蜜熬沸攪勻用密絹濾過將人參等為極細末和蜜汁入磁銀瓶內用綿紙十餘層加箬封紮瓶口入砂鍋或銅鍋以桑柴火長流水沒瓶煮三晝夜取出換油蠟紙紮口懸浸井中半日以出火氣提起仍煮半日以去水氣然後收藏每日清晨及午後取二匙用溫酒一兩許調服或白湯亦可製須淨室中忌雞犬婦人○本方原無琥珀沉香二味乃臞仙加入者云甚效異常今并錄其方

補肺湯六二 治勞嗽

人參 黃芪 北五味 紫菀各七分半

熟地黃 桑白皮各錢半

水二鍾煎八分入蜜少許食遠溫服

楊氏 寧肺湯六三 治榮衛俱虛發熱自汗欬嗽痰涎肺氣喘急唾膿

人參 茯苓 當歸 白芍藥

白朮 甘草炙 川芎 熟地黃

麥門冬 五味 桑白皮各七分 阿膠炒一錢

水二鍾薑一片紫蘇五葉煎八分食遠服

聖惠寧肺散 六四 方在欬嗽門六

治久嗽攻蟲之劑

鳳髓湯 六五 治欬嗽人能潤肺

牛髓一斤骨中者 白蜜半斤 乾山藥四兩炒 杏仁四兩泡去皮尖研如泥

胡桃仁去皮四兩另研

右將牛髓白蜜用砂鍋熬沸以絹濾去渣盛磁瓶內將杏仁等三味同入瓶內以紙密封瓶口重湯煮一日夜取出冷定每空心以白湯化服一二匙

良方蜜酥煎 六六 治欬嗽胸痛上氣喘塞此爲邪搏於肺氣不宣通故欬而喘氣上逆面目浮腫此方非獨治嗽兼補虛損去風燥悅肌膚婦人服之尤佳

白沙蜜一升 牛酥一升 杏仁三升去皮尖研如泥

右將杏仁於磁盆中用水研取汁五升以淨銅鍋先傾汁一升熬減其半又傾汁一升再以慢火熬減令一升將前入蜜酥一味煎熟其藥乃成貯於磁器中每日三次以溫酒或米飲白湯調服一匙服至七日唾色變白二七唾稀三七嗽止

醍醐膏 六七 治一切欬血肺痿

用好牛酥五斤鎔三遍凝取當出醍醐服一合即瘥

良方黃芪散 六八 治嗽久勞嗽唾血

黃芪蜜炙 糯米炒 阿膠炒等分

右爲細末每服二錢米飲調下

拔萃五味黃芪散 六九 治欬嗽咯血成勞眼睛疼痛四肢困倦腳膝無力

五味子 人參 芍藥 甘草各五分

黃芪 桔梗各錢半 熟地 麥冬各二錢

水二鍾煎八分食後溫服

黃芪益損湯 七十 治男婦諸虛百損五勞七傷骨蒸潮熱百節疼痛盜汗驚惕咽燥唇焦羸瘦少力欬嗽多痰咯吐血寒熱往來頰赤昏倦少食服熱藥則煩躁滿脹寒藥則臟滿腹痛及大病後榮衛不調或婦人產後血氣不足俱宜服此

人參 黃芪 當歸 熟地黃

白朮 川芎 芍藥 麥冬

甘草 茯苓 山藥 五味子

木香 石斛 肉桂 丹皮等分

右㕮咀每服一兩水一鍾半薑五片棗二枚小麥五十粒烏梅一箇煎七分食前服

丹溪 地黃散七一 治衄血往來久不愈

生地黃 熟地黃 地骨皮 枸杞子

右等分焙乾爲細末每服二錢蜜湯調下不拘時

良方 求肺湯七二 治虛熱吐血衄汗出

甘草炒 白芍藥炒 黃芪炒各一兩 熟地黃兩半

右每服五七錢水煎服○世治吐血並用竹茹地黃藕汁亦佛此亦不可拘泥如陽乘於陰血得熱則流散經水沸溢理宜良解以大黃犀角之類如陰乘於陽所謂天寒地凍水凝成冰須當温散宜乾薑肉桂或理中湯之類

東垣 麥門冬飲子七三 治吐血久不愈者

麥門冬 黃芪各一錢 人參 歸身

生地各五分 五味子十粒

右㕮咀水煎服

宣明 麥門冬飲子七四 治脾胃虛弱氣促氣弱精神短少衄血吐血氣虛不能攝血者

麥冬 當歸 芍藥 紫菀各一錢

人參 黃芪各八分 甘草五分 五味子九粒

水二鍾煎一鍾食後服

家抄 麥門冬飲七五 治虛火欬嗽陰虛勞損 方在寒陣四七

麥門冬湯七六 治肺熱欬嗽見血 方在寒陣四四

錢氏 麥門冬湯七七 治表邪內熱欬嗽 方在痘疹一四二

麥門冬散七八 治鼻衄

麥門冬 生地各一錢 白芍藥 蒲黃各一錢

水二蓋薑三片煎八分食後温服

旋神飲七九 治勞瘵憎寒壯熱口乾咽燥自汗煩躁欬嗽唾血瘦劇困倦

人參 白朮 黃芪 當歸

熟地黃 麥門冬 白芍藥 茯神

白茯苓 蓮肉 五味子 炙甘草

桔梗 半夏麴各五分

水一鍾半紅棗一枚烏梅一個煎七分食遠服○如嗽加阿

膠○胸滿加木香以濕紙包炮用或加沉香亦可○如不思飲食加扁豆炒用

醫統 養心湯八十 治體質素弱或病後思慮過多心虛驚悸不寐

歸身 生地 熟地 茯神各一錢

人參錢半 麥冬錢半 棗仁 柏子仁各八分

炙甘草四分 五味子十五粒

加燈心蓮子水煎八分服

錢氏 養心湯八一 方在小兒五九

治心虛驚癇

正心湯八二 治七情五志久逆心風妄言妄笑不知所苦

人參 當歸酒洗 生地黃 茯神各一錢

羚羊角鎊末 棗仁炒研 甘草炙 遠志製各八分

水一鍾半蓮子七枚煎七分入羚羊角末麝香半分和勻食後臨卧服

開心散八三 治好忘○後定志丸稍勝於此百十七

人參 遠志各一錢 石菖蒲一兩 白茯苓二兩

右為細末每服二錢食後米飲調下

局方 茯苓補心湯八四 治心虛過多心神潰亂煩躁不寐

白茯苓 白茯神 麥門冬 生地黃

當歸 半夏麴 陳皮各一錢 甘草五分

右加竹葉燈心同煎服

酸棗仁湯八五 治病後氣血俱虛內亡津液煩熱諸虛不眠者

棗仁微炒 人參各一錢 [illegible]一錢 竹茹一錢

加龍眼肉五枚煎服無時

秘旨 酸棗仁湯八六 治心腎水火不交精血虛耗痰飲內蓄怔忡恍惚夜卧不安

棗仁炒 遠志 黃芪 白茯苓

蓮肉去心 當歸 人參 茯神各一錢

陳皮 炙甘草各五分

水一鍾半加生薑三片棗一枚煎七分日服臨卧一服

仲景 酸棗湯八七 治虛勞虛損不得眠

酸棗仁二升 甘草一兩 知母 茯苓

川芎各二兩 深師方仍有生薑二兩

右五味以水八升煮酸棗仁得六升內諸藥再煮取三升分

溫三服

錢氏酸棗仁湯八八 方在小兒六

治心肺虛熱煩躁

遠志湯八九 治心虛煩熱夜卧不寧及病後虛煩

遠志去心 甘草炙 黄芪 當歸 麥冬

棗仁炒 石斛各錢半 人參 茯神各七分

甘草五分

水二鍾煎八分食遠服○煩甚者加竹葉知母

遠志飲子九十 治心勞虛寒夢寐驚悸

遠志肉 茯神 人參 當歸酒洗

棗仁 黄芪 肉桂各一兩 炙甘草五錢

右㕮咀每服一兩水一鍾半薑五片煎服無時

奇效聖愈湯九一 治血虛心煩睡卧不寧或五心煩熱

人參 川芎 當歸 熟地黄酒拌蒸

生地黄酒拌 黄芪炙各一錢

右水煎服

益榮湯九二 治思慮過度心血耗傷怔忡恍惚不寐

人參 芍藥 棗仁 柏子仁各五分

當歸 黄芪 茯神去心各一錢 紫石英五分

遠志 甘草 木香各三分

水一鍾半薑三片棗一枚煎八分服

丹溪逍遙散九三 治肝脾血虛及鬱怒傷肝少血目暗發熱脇

痛等證

當歸 芍藥 白朮 茯神

甘草 柴胡各等分

右每水煎服

薛氏加味逍遙散九四 治肝脾血虛發熱小水不利

即前逍遙散加丹皮梔子各七分

生韭汁飲九五 治噎食不下咽喉閉塞胸膈煩悶

生韭汁 白蜜 牛酥各五兩 人參

百合各二兩

右入銅銚中以慢火熬膏每用一二匙用人參百合湯調下

或嚥下

和劑胃風湯九六 治風冷乘虛入客腸胃水穀不化泄瀉注下

及腸胃濕毒下如豆汁或下瘀血日夜無度

人參 白朮 茯苓 當歸

川芎　白芍藥　肉桂等分

右爲粗散每服二錢入粟米數粒同煎食前服此方名爲治風而實非治風乃補血和血益胃氣之藥下血痢而挾虛者實可倚仗出太陽桂苓湯例藥也

十寶湯九七 逆要 治冷痢虛甚下物如魚腦三服愈

黃芪炙四錢　熟地黃　人參　白朮

白芍藥　當歸　茯苓　半夏

五味子　肉桂各一錢　甘草炙五分

水一鍾薑三片烏梅一箇煎七分食遠服

當歸黃芪湯九八 良方 治妊娠下痢腹痛小便澁

當歸炒　黃芪各一兩　糯米一合

水一鍾煎一鍾溫服

大防風湯九九 局方 治足三陰虧損寒濕外邪乘虛內侵患鶴膝附骨等症不問已潰未潰宜先用此及治痢後脚膝痠痛不能動履名曰痢後風此藥祛風順氣活血壯筋骨行履如故

人參　白朮　防風　羗活各一錢

黃芪一錢　熟地　杜仲各一錢　官桂

甘草炙各五分　白芍　牛膝　附子各一錢

川芎錢半

水煎服〇一方有當歸無官桂加薑七片

地黃飲子百 河間 治舌瘖不能言足廢不能行此謂少陰氣厥不至急當溫之名曰痱證凡陰虛有二有陰中之水虛有陰中之火虛此治火虛之劑

熟地　巴戟去心　山茱萸　肉蓯蓉酒浸

附子　石斛　五味　石菖蒲

茯苓　遠志　官桂　麥門冬

右等分每服五錢入薄荷少許薑棗煎服

金櫻膏百一 治虛勞遺精白濁最效

金櫻子 [illegible]

人參　桑螵蛸[illegible]　山藥各二兩　杜仲[illegible]

益智仁各　薏仁　山茱萸　芡實

枸杞各四兩　青鹽一錢

右咀用水同熬二次去滓熬成膏將金櫻膏對半和勻空心白滾湯下二四匙

心虛白濁歌百二

白濁皆因心氣虛　不應只作腎虛醫
四君子湯加遠志　一服之間見效奇
劫勞散百三　方在婦人一二四
治虛勞咳嗽盜汗發熱
益氣補腎湯百四　治氣虛眩暈
人參　黃芪各一錢二分　白朮二錢　白茯苓一錢
山藥　山茱萸各一錢半　炙甘草五分
水二鍾棗一枚煎八分食前服
元戎當歸酒百五　治血虛頭痛欲裂

當歸一兩　好酒一升　煮取六合服之
人參丸百六　寧心益智安神固精
人參　茯苓　茯神　棗仁
遠志　益智　牡蠣各五錢　硃砂一錢半
為末棗肉丸服
千金人參固本丸百七　治脾虛煩熱金水不足及肺氣燥熱作
渴作嗽或小便短少赤色澁滯如淋大便燥結此陰虛有火
之聖藥也
人參二兩　天冬炒　麥冬炒　生地黃

熟地黃各四兩
蜜丸桐子大每服五六十丸空心溫酒或淡鹽湯下中寒之
人不可服○如欲作膏俟煎成外加白蜜四兩
團參丸百八　治吐血欬嗽服涼藥不得者○團參散方在小
兒十
人參　黃芪　飛羅麪各一兩
右為細末滴水和丸桐子大每服五七十丸茅根湯下
天王補心丹百九　寧心保神固精益血壯力強志令人不忘
去煩熱除驚悸清三焦解乾渴育養心氣○此方之傳未考

所自道藏偈云昔志公和尚日夜講經鄧天王憫其勞者也
錫之此方因以名焉
生地黃洗淨四兩　人參　玄參炒　丹參炒
遠志炒　桔梗各五錢　白茯苓五錢　五味炒
當歸酒洗　麥冬炒　天冬炒　柏子仁炒
酸棗仁炒各二兩
右為細末煉蜜為丸每兩分作十丸金箔為衣每服一丸燈
心棗湯化下食遠臨卧服或作小丸亦可
類方　如前方內多黃連二兩酒炒

醫統方　此較前多百部菖蒲杜仲三味

生地黃二兩用砂仁五錢茯苓一兩同煮去砂仁不用　人參

玄參　丹參　遠志　柏子仁炒

棗仁炒　白茯神　杜仲製　百部各一兩

歸身一兩六錢　天冬　麥冬各一兩二錢　桔梗八錢

五味　石菖蒲各四錢

得效方用熟地不用生地餘如醫統又外加茯苓炙甘草共一十八味分兩俱各等分

按右方惟前十二味者乃道藏經本方此外各有不同亦惟隨宜擇用可也

補心神效丸　百十

黃芪蜜炙　茯神　人參各四兩　遠志製二兩

熟地黃三兩　棗仁炒　柏子仁另研　五味子各二兩

硃砂兩另研

右為末煉蜜丸梧子大每服五十丸米飲溫酒任下○盜汗不止麥麩湯下○夢遺失精人參龍骨湯下○卒暴心痛乳香湯下○虛煩發熱麥門冬湯下○吐血人參湯下○大便下血地榆湯下○小便出血茯苓車前子湯下○中風不語薄荷生薑湯下○風癇痰氣防風湯下

荷方　平補鎮心丹　百十一　治心血不足時或怔忡夜多亂夢如墮崖谷常服安心腎益榮衛

人參　龍齒各二兩五錢　白茯苓　茯神

麥冬　五味各一兩半　車前子　遠志製

天冬　山藥薑汁炒　熟地酒蒸各一兩半　硃砂兩半為衣

棗仁炒三錢

煉蜜丸梧子大每服八九十丸空心早晚米飲或溫酒下○一方有肉桂一兩二錢五分○一方有當歸柏子仁石菖蒲

集驗　柏子養心丸　百十二　治心勞太過神不守舍合眼則夢遺泄不常

柏子仁鮮白不油者以紙包搥去油　白茯神　酸棗仁

生地黃　當歸身各二兩　五味子　辰砂細研

犀角鎊　甘草各半兩

右為末煉蜜丸如芡實大金箔為衣午後臨臥各津嚥一丸

古菴　心腎丸　百十三　治水火不濟心下怔忡夜多盜汗便赤夢遺

牛膝酒浸　蓯蓉酒浸　熟地黃各二兩　兔絲子酒蒸三兩

人參　黃芪蜜炙　當歸酒浸　山藥炒
鹿茸酥炙　附子炮去皮臍　茯神　五味子
龍骨煅　遠志甘草湯浸剉薑汁炒各一兩
右爲細末酒煮麪糊丸桐子大每服百丸空心棗湯或清湯送下

濟生 遠志丸百十四　治心神恍惚不寧夢泄遺精
人參　茯神　白茯苓　龍齒
遠志薑湯浸炒　石菖蒲各一兩
蜜丸桐子大硃砂爲衣每服七八十丸空心鹽湯下

寧志丸百十五　治怔忡驚悸顛癇○得效寧志丸方在和陣一百六十與此稍同
人參　棗仁酒浸　茯苓　柏子仁
當歸　遠志酒浸　茯神　石菖蒲
琥珀各五錢　乳香　硃砂各三錢
右爲末煉蜜丸桐子大每服三五十丸食後棗湯下

寧志膏百十六　治因驚失志
人參　棗仁泡去皮紙炒　硃砂各半兩　滴乳香一錢另研
右爲末煉蜜丸彈子大每服十丸薄荷湯下

定志丸百十七　治心氣不足驚悸恐怯或語鬼神喜笑及目不能近視反能遠視乃陽氣不足也宜此方主之○此方與前開心散小異八二
人參　茯苓各二兩　菖蒲　遠志製各一兩
煉蜜丸桐子大硃砂爲衣每服五七十丸米飲下

拔萃 八物定志丸百十八　補心神安魂魄去熱除痰
人參一兩半　石菖蒲　茯神　遠志製各一兩
麥門冬　白朮各五錢　硃砂一錢　牛黃二錢另研
右爲細末煉蜜丸桐子大硃砂爲衣每服五十丸米飲下○一方有茯苓一兩

十四友丸百十九　治驚悸怔忡
人參　黃芪　當歸　生地黃
遠志　茯神　茯苓　棗仁泡去皮隔紙炒
阿膠炒　龍腦　紫石英　薄荷
硃砂各一兩
右爲末煉蜜丸桐子大每服五七十丸食後臨卧棗湯下

秘驗 琥珀多寐丸百二十　治健忘恍惚神虛不寐
眞琥珀　眞羚羊角細鎊　人參　白茯神

遠志 製 甘草 等分

右爲細末猪心血和煉蜜丸芡實大金箔爲衣每服一丸燈心湯嚼下

金匱 六味地黄丸 一一一 即金匱腎氣丸亦名地黄丸治腎水虧損小便淋閉頭目眩暈腰腿痠軟陰虚發熱自汗盜汗憔悴瘦弱精神疲困失血失音水泛爲痰爲腫脹壯水制火之劑也

熟地黄 八兩蒸搗 山茱萸 山藥 炒各四兩 丹皮 澤瀉 白茯苓 各三兩

右爲細末和地黄膏加煉蜜爲丸桐子大每服七八十丸空心食前滚白湯或淡鹽湯任下○此方用水煎湯即名六味地黄湯下八味丸亦同

崔氏 八味丸 一一二 治命門火衰不能生土以致脾胃虚寒飲食少思大便不實或下元冷憊臍腹疼痛等證○王太僕曰益火之源以消陰翳即此謂也○即前六味地黄丸加肉桂製附子各一兩

陳氏 加減八味丸 一一三 治腎水不足虚火上炎發熱作渴口舌生瘡或牙根潰蝕咽喉疼痛寢汗憔悴等證此臨川陳自

明方李氏云凡發背之熱未有不由腎虚而得之者必須五更服加減八味丸○即前六味丸加肉桂一兩五味子四兩炒用内澤瀉切片蒸五次焙用○一方五味止用一兩

良方 益陰腎氣丸 一一五 治陰虚潮熱盜汗煩熱作渴筋骨疼痛月經不調等證○即前六味丸加當歸生地各四兩五味子二兩

薛氏 加減金匱腎氣丸 一一六 治脾腎陽虚不能行水小便不利腰重脚腫或肚腹腫脹四肢浮腫或喘急痰盛已成臌證其效如神此證多因脾胃虚弱或治失其宜元氣復傷而變此證若非速救腎中之火則陽氣不充於下何以生土土虚又何以制水此必用之劑也苟不知此必不能救若病在燃眉當變丸爲湯治之

熟地 四兩酒拌蒸 山藥 山茱萸 川牛膝 丹皮 澤瀉 車前子 肉桂 各一兩 白茯苓 三兩 附子 製五錢

右爲末煉蜜同地黄膏搗丸桐子大每服七八十丸空心米飲下

抄集 滋陰大補丸 一一七 治諸虚不足腰腿疼痛行步無力壯

元陽益腎水

熟地二兩　山藥炒　牛膝各兩半　山茱萸

杜仲　巴戟肉　白茯苓　五味子

小茴香炒　肉蓯蓉酒洗去甲新瓦焙　遠志甘草湯煮晒乾各一兩

石菖蒲　枸杞各五錢

右爲末紅棗肉和或煉蜜爲丸梧桐子大每服七八十丸空心淡鹽湯或溫酒任下

天造丸　一二八　方在寒陣一五六

治陰虛血熱諸證

全鹿丸　一二九　此藥能補諸虛百損五勞七傷功效不能盡述人製一料服之可以延年一紀其法須四人共製一鹿分而服之逾年又共製之四人共製四年則每人得一全鹿若一人獨製一料恐久留變壞藥力不全矣

中鹿一隻　縛殺之退去毛將肚雜洗淨同鹿肉加酒煮熟將肉横切焙乾爲末取皮同雜仍入原湯熬膏和藥末肉末加煉蜜和搗爲丸其骨須酥炙爲末同入之

人參　白术炒　茯苓　炙甘草

當歸　川芎　生地黄　熟地黄

黄芪蜜炙　天門冬　麥門冬　枸杞

杜仲鹽水炒　牛膝酒拌蒸　山藥炒　芡實炒

兎絲製　五味子　鎖陽酒洗　肉蓯蓉

破故酒炒　巴戟肉　胡蘆巴酒拌　川續斷

覆盆子酒拌蒸　楮實子酒拌蒸　秋石　陳皮上各一斤

川椒去目　小茴香炒　沉香　青鹽各半斤

右先須精製諸藥爲末和勻一處候鹿膠成就和搗爲丸梧子大焙乾用生黄絹作小袋五十條每袋約盛一斤懸置透風處用盡一袋又取一袋陰濕天須用火烘一二次爲妙每

服八九十丸空心臨卧薑湯鹽湯白湯任下冬月溫酒亦可

仙傳斑龍丸　百三十　壯精神除百病養氣血補百損老人虛人常服延年益壽昔蜀中有道士酣歌酒肆口尾閭不禁滄海竭九轉金丹都謾說惟有斑龍頂上珠能補玉堂關下血眞人仲源索方傳世

鹿角膠　鹿角霜　柏子仁　兎絲子製

熟地黄各八兩　白茯苓　補骨脂各四兩

右將膠先溶化量入無灰酒打糊丸梧子大每服六七十丸空心淡鹽湯或酒任下

秘驗班龍二至百補丸 一一　此藥固本保元生精養血培復天眞大補虛損益五內除骨蒸壯元陽多子嗣充血脉强健筋骸美顏色增延壽算聰明耳目潤澤髭鬚眞王道奇品之方功難盡述也

鹿角五十兩爲一斤 取新角連腦骨者佳鋸長二寸許用米泔浸宿刷洗淨同後藥入鐔煮膠

黃精八兩　枸杞　懷熟地　兎絲子酒洗淨

金櫻子去毛子各四兩　天門冬去心　麥門冬去心　川牛膝

龍眼肉　楮實子各二兩

已上十味同角入金華好鐔磨層放實以新汲淡水入鐔平肩用箬葉布四層包口以新磚壓之置大鍋中井字架上以水甑蓋好重湯煮三日夜毋得間斷火候傍用小鍋燒滾水不時添注鐔內并鍋水勿使乾涸日足取起濾去渣將汁用羅底絹絞出入淨砂鍋內文火熬成膏約一斤半外煉蜜二斤滴水成珠攪入調和後藥杵合爲丸

鹿角霜十兩　人參五兩　黃芪蜜炙　芡實炒

白茯苓　山藥炒　山茱萸　生地黃酒洗飯上蒸過

知母鹽水炒各四兩　北五味子一兩

夏月加川黃柏四兩炒褐色

以上十味爲細末用前膏和勻木杵搗丸桐子大空心淡鹽湯送下百餘丸隨用煮熟蓮肉或乾棗數枚壓之俾納丹田也

正傳鹿角膠丸 一二二　治血氣虧損兩足痿弱不能行動久臥牀褥者神效

鹿角膠一斤　鹿角霜　熟地各半斤　當歸四兩

人參　牛膝　兎絲子製　白茯苓各三兩

白朮　杜仲各二兩　虎脛骨酥炙　龜板酥炙各一兩

右爲末先將鹿角膠用無灰酒二鐘溶化加煉蜜擣丸桐子大每服百丸空心鹽薑湯下

鹿茸丸 一二三　治脚氣腿腕生瘡及陰虛下元痿弱欬嗽等證

鹿茸酥炙另制成片　五味子　當歸　熟地黃各等分

酒糊和丸桐子大每服四五十丸酒或鹽湯任下

集驗鹿茸丸 一二四　治諸虛勞倦補心腎益氣血

鹿茸酥炙　熟地黃　當歸　枸杞

棗仁炒　附子製　牛膝　遠志甘汁去皮炒

山藥　沉香　肉蓯蓉酒浸各一兩　麝香五分
煉蜜丸桐子大每服五十丸鹽湯下
三因鹿茸丸 一二五　治失志傷腎腎虛消渴小便無度
鹿茸酥炙　麥門冬　熟地黃　黃芪炙
五味　肉蓯蓉　雞內金酒炒　山茱萸
破故紙炒各七錢　茯苓　人參　牛膝酒浸
玄參　地骨皮各半兩
右為末煉蜜丸桐子大每服七八十丸米飲下
本事麋茸丸 一二六　治腎虛腰痛不能轉側

麋茸鹿茸亦可　兎絲子製各一兩　舶茴香五錢
右為末以羊腎二對用酒煮爛去膜研如泥和丸桐子大陰
乾如太乾以酒糊佐之每服三五十丸溫酒或鹽湯下
楊氏還少丹 一二七　治脾腎虛寒飲食少思發熱盜汗遺精白
濁真氣虧損肌體瘦弱等證
熟地黃二兩　山藥　山茱萸　杜仲薑湯炒
枸杞一兩　牛膝酒浸　遠志甘草汁炒去心　肉蓯蓉酒浸
北五味　川續斷　楮實子　舶茴香
兎絲子製　巴戟肉各一兩

右為細末煉蜜丸桐子大每服五十丸空心鹽湯下
局方無比山藥丸 一三八　治諸虛損傷肌肉消瘦耳聾目暗常
服壯筋骨益腎水令人不老
山藥二兩　兎絲子三兩製　五味揀淨六兩　肉蓯蓉四兩切片酒浸焙
杜仲三兩炒　牛膝一兩酒浸蒸　熟地　澤瀉
山茱萸　茯苓　巴戟肉　赤石脂各一兩
右為細末煉蜜和丸桐子大每服三五十丸食前溫酒或米
飲下
還元丹 一三九　一名延年益壽不老丹○此藥大補元氣服

一月自覺異常功效不可盡述○按此方為陰虛血熱者宜
之諸陽虛者不可用
何首烏半斤　用米泔水浸軟竹刀刮去皮分四製
忌鐵器以砂鍋茯苓爲末拌之蒸一次晒乾又用牛
肉一斤切片拌蒸一次晒乾再用酒拌蒸一次黑豆拌
蒸一次各晒乾
熟地　生地酒洗焙各一兩　天冬　麥冬合末一兩
人參五錢　地骨皮童便浸晒　白茯苓酒浸晒乾取末各一兩
右取乳汁六兩白蜜十兩同煉一器中合前末爲膏磁器取

貯勿令泄氣不拘時服　二兆沸湯潡熱之

經驗養榮丸　百四十　治男婦氣血兩虛精神短少脾胃不足形體羸瘦

人參　白朮土炒　當歸　熟地黃

黃芪　芍藥　山藥各一兩　遠志製

生地黃　山茱萸各半兩　白茯苓二兩　陳皮八錢

右為細末用鴨一隻取血入煉蜜和丸桐子大每服八九十丸食前淡鹽湯送下或酒亦可

三才丸　一四一

天門冬　熟地黃　人參等分

右為不煉蜜丸服

七珍至寶丹　一四二　補血生精瀉火益水强筋骨黑鬚髮補益之功甚大

何首烏　赤白各半斤酒浸軟竹刀刮去皮同牛膝蒸

川牛膝　半斤淨用黑豆二升同何首烏層層拌鋪甑內蒸極熟取出去豆與何首烏共搗如泥

白茯苓　一斤用人乳五升煮乾為度

赤茯苓　一斤用牛乳五升煮乾為度

當歸四兩酒洗焙乾　枸杞四兩　破故炒香　菟絲子製各半兩

煉蜜為丸彈頭子大每服一丸日進二服空心溫酒午後鹽湯臨卧鹽湯送下

補髓丹　一四三　治老人虛弱腎傷腰痛不可屈伸

杜仲十兩　補骨脂用芝麻五兩同炒以芝麻黑色無聲為度去麻十兩

鹿茸二兩燎去毛酒浸炙

右為末用胡桃肉三十箇浸去皮搗為膏入麫少許煮糊為丸桐子大每服百丸溫酒鹽湯任下

枸杞子丸　一四四　治腎虛精滑補精氣

甘州枸杞　黃精九蒸九晒

右二味等分相和搗作餅子焙乾為末煉蜜丸桐子大每服百餘丸空心溫酒送下

局方青娥丸　一四五　治腎虛腰痛益精助陽烏鬚壯脚力婦人隨證用引吞送神效

破故紙四兩炒香　杜仲四兩薑湯炒　胡桃肉去皮八兩

右為末用蒜四兩搗膏和丸桐子大每服三五十丸空心溫酒送下〇一法不用蒜以酒糊為丸或煉蜜為丸服者更佳

按此方可加巴戟肉大茴香各四兩為丸妙或再加肉蓯

蓉亦可

良方加味青娥丸 一四六 補諸虛不足滋益陰陽美容顏健腰膝止腰痛尤效

破故 炒　小茴 鹽水炒　胡蘆巴 炒各四兩　杜仲 薑汁炒

胡桃肉 五十個　蓮蕊 一兩　青鹽 微炒五錢　穿山甲 酥炙一錢五分

右為末將胡桃肉搗爛加酒煮麪糊為丸桐子大每服三十丸空心溫酒下

十補丸 一四七 方在熱陣一七四

治腎臟虛冷等證

保命煨腎丸 一四八 治腎肝虛損骨痿不能起牀筋弱不能收持及脾損穀不化益精緩中消穀

杜仲 薑湯炒　牛膝　萆薢　白蒺藜

防風　兔絲子 製　胡蘆巴　肉蓯蓉 酒洗

破故紙 酒炒各等分　官桂 減半

右為末豬腰子製如食法搗爛加煉蜜和杵千餘為丸桐子大每服五七十丸空心用溫酒送下治腰痛不起甚效

局方煨腎散 一四九 治腎虛腰痛

杜仲 薑汁炒　花椒 炒出汗　食鹽 少許

右為末以豬腰子一枚薄批作五七片以椒鹽淹去腥水摻杜仲末三錢在內以薄荷包外加濕紙二三層煨熟食之酒下

安腎丸 百五十 方在熱陣一六七

治腎經積冷下元衰弱

小安腎丸 一五一 方在熱陣一六八

治腎氣虛寒多溺腰膝沉重

石刻安腎丸 一五二 方在熱陣一六九

治真氣虛憊夢遺便數腳膝軟弱

紅鉛丸 一五三 一名一炁丹 一名人精妙合丸

紫河車 用頭產壯盛男胎者 以銀針挑去紫血米泔水洗淨用酒黏煮爛焙乾

人乳 以磁盤曬乾者四兩 或以茯苓末 兩收曬至五兩者亦可

秋石 以童男女小便煉成者四兩

紅鉛 亦名先天梅子五錢 此室女初次經血扣算女子年歲凡五千四十八日即女子天癸將至之日須預備錫船候取以茯苓末收滲曬乾或以絲綿滲取用烏

梅煎湯送下夫水晒乾亦可

右為細末以蜜為丸每丸重七錢此藥俗傳云以人補人得先天之氣神妙不可盡述每丸價一兩

打老兒丸 五四

熟地　山藥炒各五兩　牛膝酒洗　巴戟枸杞湯洗炒

楮實子去膜　枸杞　石菖蒲　遠志肉甘草湯製

白茯苓去筋　杜仲鹽水炒　北五味蜜水拌蒸焙乾　一一晒搗餅

山茱萸上各四兩　小茴香　續斷各三兩　肉蓯蓉切片酥炒五兩

右為末煉蜜丸桐子大每服五六十丸空心午前臨睡或酒或鹽湯下百餘丸

肉蓯蓉丸 一五五　治腎虛耳聾

肉蓯蓉酒浸　菟絲子酒浸　山茱萸　白茯苓

熟地黃　人參　官桂　防風

芍藥　黃芪各五錢　附子炮　羌活

澤瀉各半錢　羊腎一對切去筋膜炙乾

煉蜜丸桐子大每服五十丸空心溫酒下

四味肉蓯蓉丸 一五六　方在固陣六二

治小便不禁

黃芪丸 一五七　治虛風羸瘦心神不寧筋脈拘攣疼痛少睡

黃芪炙　人參　熟地黃　白茯苓

薏苡仁　山茱萸各一兩　棗仁　羌活去蘆

當歸　羚羊角屑　枸杞子　桂心各七錢半

防風　遠志各半兩

右為細末煉蜜和丸梧子大每服七八十丸溫酒下不拘時

二丹丸 一五八　治風邪健忘和血養神定志內安心神外華腠理

丹參　天門冬　熟地黃各一兩半　麥門冬

白茯苓　甘草各一兩　人參　丹皮

遠志各半兩

右為細末煉蜜和丸桐子大以硃砂半兩為衣每服五七十丸加至百丸空心煎愈風湯送下

益血丹 百九　治大便燥久虛亡血

當歸酒浸焙　熟地黃等分

右為末煉蜜丸彈子大細嚼酒下一丸

四脚丸 百六十　治腎臟虛弱小便頻數不禁

五味子　菟絲餅各四兩　熟地黃六兩　肉蓯蓉一斤去甲

右為末酒煮山藥糊丸梧子大每服五十丸空心鹽湯下

局方虎骨四斤丸 一六一

宣州木瓜去穰 天麻去蘆 肉蓯蓉洗 牛膝焙乾各一斤

附子炮去皮臍二兩 虎骨酥炙一兩

右先將前四味用無灰酒五升浸春秋五日夏三日冬十日取出焙乾入附子虎骨共為末用前浸藥酒打麪糊丸梧子大每服五十丸食前鹽湯送下

加味四斤丸 一六二 治肝腎二經氣血不足足膝酸痛步履不隨如受風寒濕毒以致腳氣者最宜服之

虎脛骨酥炙一兩 乳香另研 沒藥另研各五錢 川烏炮去皮一兩

肉蓯蓉 牛膝各一兩半 天麻一兩 木瓜一斤去穰蒸

右各為末先將木瓜蓯蓉搗膏加酒糊和杵丸梧子大每服七八十丸空心溫酒或鹽湯任下

三因加味四斤丸 一六三 治腎虛肺熱熱淫於內致筋骨痿弱不能收持

肉蓯蓉酒浸 牛膝酒浸 天麻 木瓜

鹿茸酥炙 熟地黃 五味酒浸 菟絲子酒浸等分

右為末煉蜜丸梧子大每服五十丸食前溫酒或米飲送下

○劉宗厚曰按此方云熱淫於內而用溫補何也然陰血衰弱血不養筋筋緩不能自收持今陽燥熱淫於內故用此以養陽滋陰陰實則水升火降矣

金剛丸 一六四 治腎損骨痿不能起牀宜此益精

萆薢 杜仲鹽水炒 肉蓯蓉酒洗 菟絲子製

右用酒煮猪腰子搗丸梧子大每服五七十丸空心溫酒送下

人參膏 一六五

用人參十兩細切以活水二十盞浸透入銀石器內桑柴火緩緩煎取十盞濾汁再以水十盞煎濃取汁五盞并入前汁合煎成膏磁瓶收貯隨證作湯使調服○丹溪云多慾之人腎氣衰憊欬嗽不止用生薑橘皮煎湯化膏服之○浦江鄭兄五月患痢又犯房室忽發昏運不知人事手撒目暗白汗如雨喉中痰鳴聲如拽鋸小便遺失脉大無倫此陰虧陽絕之證也予令急煎大料人參膏仍與灸氣海十八壯右手能動再三壯唇口微動遂與膏服一盞半夜後服三盞眼能動盡三斤方能言而索粥盡五斤而痢止至十斤而全安若作風治則誤矣○一人背疽服內托十宣藥已多膿出作嘔發

熱六脈沉數有力此濱湯所忌也遂用大料人參膏入竹瀝飲之參盡十六斤竹伐百餘竿而安後經旬餘值大風拔木瘡復起有膿中有紅線一道過肩胛抵右脇予曰急作參膏以芎歸橘皮作湯入竹瀝薑汁飲之盡三斤而瘡潰調理乃安若癰疽潰後氣血俱虛嘔逆不食變證不一者以參芪歸朮等分煎膏服之最妙

全書五十三卷終

會稽 張介賓 會卿著
瀛海 賈 棠 青南訂

和陣

局方 二陳湯一 治痰飲嘔惡風寒欬嗽或頭眩心悸或中脘不快或因生冷或飲酒過多脾胃不和等證

陳皮 半夏制各三錢 茯苓一錢 炙甘草一錢

水二鍾薑三五片棗一枚煎八分食遠服

加減二陳湯二 治嘔吐吞酸胃脘痛呃逆

即前方加丁香九粒氣滯甚者可加一二錢

丹溪 加味二陳湯三 治食鬱痰滯胸膈不快

蒼朮米泔浸 白朮炒 橘紅 半夏泡

茯苓 川芎 香附各八分 枳殼

黃連薑炒 甘草各五分

水盞半煎八分食前稍熱服

二朮二陳湯四 治一切嘔吐清水如注

蒼朮土炒 白朮炒 陳皮 半夏制

茯苓各一錢　炙甘草五分

水一鍾半薑三片棗一枚煎八分稍熱服○虛者加人參煨乾薑○痰飲加南星倍半夏○宿食加神麯砂仁

宣明 黃芩二陳湯五　治熱痰

黃芩　陳皮　半夏　茯苓等分

甘草減半

水一鍾半薑三片煎七分食遠服

釋疑 柴葛二陳湯六　治一切瘧暑濕勞食等證

柴胡　乾葛　陳皮　半夏

茯苓　甘草　白朮　蒼朮制

川芎　黃芩各等分若陰瘧除此味

水二鍾薑三片煎服○內乾葛川芎蒼朮乃發散之劑若久瘧及發散過者除之○陽分汗多加人參黃芪去乾葛○陰分虛者加酒炒芍藥當歸生地○久瘧微邪潮熱加四君子湯大祛邪之藥○若欲截瘧加常山檳榔青皮貝母各一錢

桂附二陳湯七　方在熱陣百十五

治寒瘧厥冷

金匱 小半夏湯八　治嘔吐穀不得下及心下有停飲者

半夏一升　生薑半斤

右二味以水七升煮取一升半分溫再服○局方用半夏五錢生薑二錢半水一鍾半煎服

金匱 小半夏加茯苓湯九　治卒嘔吐心下痞膈間有水眩悸者

即前方加茯苓三兩煎法同

金匱 大半夏湯十　治胃反不受食食入即吐○外臺云治嘔而心下痞鞕者

半夏二升洗完用　人參三兩　白蜜一斤

右三味以水一斗二升和蜜揚之二百四十遍煮藥取二升

半溫服一升餘分再服

和劑 大半夏湯十一　一名橘皮湯　治痰飲及脾胃不和

半夏　陳皮　白茯苓各二錢

水二鍾薑五片煎八分溫服

茯苓半夏湯十二　治嘔吐噦心下堅痞膈間有水痰眩驚悸及小兒等病

白茯苓二兩　半夏五錢

右每服三五七錢薑水煎服

局方 橘皮半夏湯十三　治痰涎壅嗽久不已者常服潤燥解肌

熱止嗽

陳皮五錢　半夏制二錢半

水一鍾半加生薑三五片煎七分温服

靈樞 秫米半夏湯十四　久病不寐者神效世醫鮮用之

秫米一升　半夏五合

右用千里長流水八升揚之萬遍取清者五升煮秫米半夏炊以葦薪令沸至一升半去滓飲汁一小杯日三服其新病者覆杯即卧汗之即已久病者三日而已也

東垣 半夏白术天麻湯十五　治脾虚及足太陰痰厥頭疼

半夏一錢半　白术　神曲炒各一錢　麥芽

陳皮各錢半　人參　黄芪　茯苓

蒼术　天麻　澤瀉各五分　黄栢二分

乾薑三分

右㕮咀每服半兩水二鍾煎八分食遠熱服

金匱 黄芩半夏生薑湯十六　治乾嘔而利者

黄芩　生薑各三兩　炙甘草　芍藥各二兩

半夏半升　大棗十二箇

右六味以水一斗煮取三升去滓温服一升日再夜一服

東垣 平胃散十七　治脾胃不和不思飲食心腹脇肋脹滿刺痛嘔噦惡心吞酸噫氣體重節痛自利霍亂噎膈反胃等證

厚朴薑制炒　陳皮去白各五兩　蒼术去皮米泔浸炒八兩　炙甘草二兩

本方加人參茯苓各二兩即名參苓平胃散

右為末每服二錢水一鍾薑三片棗二枚煎七分去滓温服或去薑棗入鹽一小捻以沸湯點服亦可○如小便不利加茯苓澤瀉○如飲食不化加神麯麥芽枳實○如胃中氣痛加木香枳實或枳殼○如脾胃困倦加人參黄芪○如有痰加半夏○如便鞕脹加大黄芒硝○如脉大内熱加黄連黄芩

調氣平胃散十八　治胃氣不和脹滿腹痛

厚朴制　陳皮　木香　烏藥

白豆蔻　砂仁　白檀香各一錢　甘草五分

蒼术一錢半　藿香一錢二分

水一鍾半生薑三片煎八分食遠温服

錢氏 益黄散十九　治脾土虚寒寒水反來侮土而嘔吐不食或肚腹作痛或大便不實手足逆冷等證

陳皮一兩　青皮　訶子肉炮去核　炙甘草各半兩

丁香一錢

右每服四錢水煎服

藿香正氣散 二十　治外感風寒內停飲食頭疼寒熱或霍亂泄瀉痞滿嘔逆及四時不正之氣瘴瘧傷寒等證

藿香　紫蘇　桔梗　白芷

大腹皮洗各一錢　陳皮　半夏　茯苓

甘草　白朮　厚朴各八分

水二鍾薑三片棗一枚煎八分熱服取汗

不換金正氣散 二一　治脾氣虛弱寒邪相搏痰停胸膈致發寒熱或作瘧疾或受山嵐瘴氣等證

厚朴 薑製　藿香　半夏　蒼朮 米泔浸

陳皮各一錢　甘草炙五分

薑棗水煎服

東垣 不換金正氣散 二二　治感冒風寒或傷生冷或瘧痢或疫癘

蒼朮 米泔浸　厚朴 薑汁炒　橘紅 三兩　炙甘草

半夏 湯泡　藿香 各二兩　人參　木香 濕紙裹煨

白茯苓各一兩

右每服一兩薑棗水煎服

徐氏 正氣散 二三　正胃氣進飲食退寒熱食瘧瘴氣脾胃滯者用之為宜

藿香　草果各二兩　半夏 制　陳皮

厚朴　砂仁　炙甘草各一兩

右為末每服二錢加生薑七片棗一枚同煎候瘧未發前和滓服

局方 大正氣散 二四　治脾胃不和為風寒濕氣所傷心腹脹悶有妨飲食

白朮　陳皮各二錢　半夏 制　藿香葉

厚朴 薑炒　桂枝　枳殼　檳榔

乾薑 炮各五錢　甘草炙五分

水一鍾半薑三片棗一枚煎七分不拘時溫服

東垣 升陽益胃湯 二五　治秋燥令行濕熱少退脾胃虛弱怠惰嗜臥體重節痛四肢不收口苦舌乾飲食不消大便不調小便頻數兼見肺病灑淅惡寒慘慘不樂面色惡而不和乃陽氣不伸故也當升陽益胃 良方無黃芪甘草半夏芍藥四味

人參　炙甘草　半夏麴炒各一錢　黃芪二錢
白朮三分　白芍　防風　羌活
獨活各五分　柴胡　茯苓小便自利不淋者勿用　澤瀉用各二分
陳皮四分　黃連二分
右㕮咀每服二錢漸加至五錢生薑五片棗一枚水二鍾煎
一鍾早飯午飯之間溫服忌語話一二時及酒濕助火之物
○服藥後如小便量而病反增是不宜利小便也當去茯苓
澤瀉若得病食增食初一二日間不可太飽恐藥力尚淺胃
氣再傷不得轉運也或用美食以助藥力而滋胃氣慎不可

淡食以損藥力而助邪氣之沉降也亦可小役形體使胃氣
升發切勿大勞致令復傷但以胃氣安靜為尤善

海藏白朮湯二六　治風濕惡寒脈緩
白朮　防風　甘草
右㕮咀加生薑煎服

濟生白朮湯二七　治五臟受濕欬嗽痰多氣喘身重脈濡細
白朮　橘紅　半夏　茯苓各二錢
炙甘草一錢
水一鍾半薑五片煎七分食遠服

良方二味白朮湯二八　方在婦人十二
治妊娠內熱心痛

良方四味白朮湯二九　方在婦人十三
治妊娠胃虛惡阻

白朮散三十　治自汗不止極效
白朮半斤
右將白朮切成小塊用浮麥一升水一斗同煮乾如白朮尚
硬再加水煮透爛取起切片焙乾為末每服二三錢仍用浮
麥煎湯食遠調服○如治小兒以炒黃芪煎湯量兒大小與
服○忌雞肉辛辣炙煿之物乳母尤忌

宣明白朮散三一　方在因陣二
治虛風多汗羸弱

良方白朮散三二　方在婦人十一
治妊娠傷寒內熱等證

調胃白朮散三三　治脾胃不和腹脹泄瀉身面浮腫
白朮　茯苓各二錢　陳皮　白芍藥炒
澤瀉　檳榔各一錢　木香五分
水二鍾薑三片煎八分食遠服○如噎不進倍加白朮并枳

質麩炒，一錢

白术芍藥湯 三四 治脾經受濕，水泄體重微滿，困弱無力，不欲飲食，或暴泄無數，水穀不化，宜此和之

白术炒 芍藥炒，各一兩 甘草炒，半兩

右每用一兩，水煎服

草窗 白术芍藥散 三五 治痛瀉要方

白术炒，三兩 芍藥炒，二兩 陳皮炒，兩半 防風一兩

右或煎或丸或散皆可用。久瀉者加炒升麻六錢

金匱 苓桂术甘湯 三六 病痰飲者，當以溫藥和之。凡心下有痰飲，胸脅支滿，目眩，此方主之

茯苓四兩 桂枝 白术各三兩 甘草二兩

右以水六升，煮取三升，溫分三服，小便則利

局方 神术散 三七 治傷寒頭痛身熱等證

蒼术二錢 川芎 藁本 甘草各一錢

水二鍾，薑三片，煎一鍾，不拘時服

神术散 三八 方在散陣六五 治因時疫頭痛發熱

海藏 神术散 三九 治風與濕寒脈緊

蒼术 防風 甘草

右㕮咀，加葱白煎服。○治風濕無汗者，加羌活、獨活、麻黃。

沉香降氣散 四十 治陰陽壅滯，氣不升降，胸膈痞塞，或留飲吞酸，脅下妨悶

沉香二錢八分 砂仁七錢半 香附子去毛，鹽水炒，六兩一錢五分 炙甘草五錢五分

右為極細末，每服二錢，入鹽少許，沸湯調，不拘時服，或淡薑湯亦可

和劑 蘇子降氣湯 四一 治心腹脹滿，喘促氣急，消痰進食

蘇子炒 半夏麯 前胡 當歸

陳皮 厚朴制，各八分 桂 甘草各三分

水二鍾，薑三片，煎七分，不拘時服

醫林 小降氣湯 四二 治濁氣在上，痰涎壅盛

家紫蘇 台烏藥 白芍 陳皮各二錢

炙甘草五分

水一鍾半，薑三片，棗一枚，煎七分，食遠服

統旨 木香順氣散 四三 治氣滯腹[illegible]脇痛

木香 香附 檳榔 青皮

陳皮　枳殼　砂仁　厚朴薑
蒼朮各一錢　炙甘草五分
水二鍾薑三片煎八分食遠服

局方 木香調氣散四四
木香　白檀香　白豆蔻　丁香各二錢
炙甘草　藿香各八錢　砂仁四錢
右為末每服二錢入鹽少許沸湯點服

流氣飲子四五　治三焦氣壅五臟不和胸膈痞滿肩背攻痛嘔吐氣喘痰盛浮腫等證(一)即外科方脉流氣飲

木香磨汁　檳榔　青皮　陳皮
枳殼　烏藥　大腹皮　枳實
茯苓　紫蘇　桔梗　防風
黃芪　當歸　川芎　芍藥
甘草　半夏制各等分
水一鍾半薑三片棗一枚煎服

局方 二十四味流氣飲四六　調營衛利三焦行痞滯消腫脹
紫蘇　陳皮　青皮　厚朴制
炙甘草　香附炒各四兩　木通二兩　大腹皮

丁香皮　檳榔　肉桂　木香
草果　莪朮炮　藿香葉各一兩　麥冬
人參　白朮　赤茯苓　木瓜
白芷　半夏　枳殼炒　石菖蒲各二兩
右每服三錢薑四片棗二枚水煎服

七氣湯四七　治七情之氣鬱結於中心腹絞痛不可忍及不能飲食
半夏制五兩　人參　肉桂　甘草炙各一兩
右每服三五錢水一鍾半薑三片煎八分服

二七氣湯四八　治如前　按此方即局方四七湯也在後九七
半夏五兩制　茯苓四兩　厚朴三兩　紫蘇二兩
右每服三五錢薑七片棗一枚水煎服

加味七氣湯四九
即前七氣湯加厚朴茯苓各等分

局方 七氣湯五十　治七情鬱結臟氣互相刑剋陰陽不和揮霍撩亂吐瀉交作
半夏制　厚朴　芍藥　茯苓各二錢
人參　肉桂　橘紅　紫蘇各一錢

水一鍾加薑棗煎服

指迷 七氣湯 五一 治七情相干陰陽不得升降氣道壅滯攻衝作疼積聚癥瘕脹滿等證

半夏 甘草各七分 香附錢半 青皮
陳皮 桔梗 官桂 藿香
益智 莪术煨各一錢

右㕮咀每服三五錢薑三片棗一枚水煎服○統旨七氣湯有三稜玄胡索薑黃草豆蔻無半夏桔梗○濟生大七氣湯有三稜無半夏

四磨飲 五二 治氣逆氣

沉香 烏藥 枳實 檳榔

右四味用白湯共磨服或下養正丹尤佳○一方用白酒磨○濟生方用人參無枳實○本方加木香削名五磨飲

濟生 疏鑿飲 五三 治水氣通身浮腫喘呼氣急煩渴大小便不利

澤瀉 茯苓皮 木通 商陸
大腹皮 檳榔 羌活去蘆 秦艽去蘆
椒目 赤小豆炒

右㕮咀每服六七錢水一鍾半薑五片煎服

良方 厚朴湯 五四 治心腹脹滿此病氣壅實者之治法也

厚朴四五錢薑汁炒

加生薑五七片水煎溫服○或間用沉香降氣散

木香寬中散 五五 治七情傷感脾胃以致胸膈痞滿停痰氣逆或成五膈之病

青皮 陳皮 丁香各四兩 厚朴薑製一斤
甘草炙五兩 白豆蔻二兩 香附炒 砂仁
木香各三兩

右為末每服二錢薑鹽湯調服○若脾胃虛損之證不可過服或與六君子兼用之

良方 木香分氣飲 五六 治氣滯腹注四肢腫急中滿胸膈膨脹虛氣上衝小便臭濁

木香 豬苓 澤瀉 赤茯苓
半夏 枳殼 檳榔 燈草
蘇子等分

右㕮咀每服一兩水一鍾半煎八分入麝香末少許食遠服

良方 人參木香散 五七 治水氣病

人參　木香　茯苓　滑石
琥珀　海金沙　枳殼　檳榔
猪苓　甘草各等分
右㕮咀每服一兩生薑三片水一鍾半煎七分日進三服不
拘時
消導寛中湯五八　治氣滯食滯水腫脹滿
白术一錢半　枳實麩炒　厚朴薑制　陳皮
半夏　茯苓　山查　神麯炒
麥芽炒　蘿蔔子炒各一錢
水一鍾半薑三片煎八分食遠服○小便不利加猪苓澤瀉

化滯調中湯五九　治食滯脹滿
白术錢半　人參　白茯苓　陳皮
厚朴薑汁炒　山查　半夏各一錢　神麯炒
麥芽炒各八分　砂仁七分
水一鍾半薑三片煎七分食前服○脹甚者加蘿蔔子炒用
一錢麪食傷者尤宜用
新案三和湯六十　治脾濕腫滿
陳皮　厚朴薑炒　白术　檳榔各一錢

紫蘇七分　海金沙　木通各八分
水一鍾半薑三片棗一枚煎七分食遠服
寶鑑導滯通經湯六一　治脾濕氣不宣通面目手足浮腫
木香　白术　桑白皮　陳皮各五錢
茯苓一兩
右㕮咀每服七八錢水一鍾半煎八分食前溫服
良方導水茯苓湯六二　治水腫頭面手足徧身腫如爛瓜之狀
按而塌陷胸腹喘滿不能轉側安睡飲食不下小便秘澀溺
出如割或如黑豆汁而絶少服喘嗽氣逆諸藥不效者用此
即漸利而愈

赤茯苓　麥門冬去心　澤瀉　白术各三兩
桑白皮　紫蘇　檳榔　木瓜各一兩
大腹皮　陳皮　砂仁　木香各七錢半
右㕮咀每服一二兩水二鍾燈草三十根煎八分食前服○
如病重者可用藥五兩再倍加麥冬及燈草半兩以水一斗
於砂鍋內熬至一大碗再下小銚內煎至一鍾五更空心服
柤再煎連進此三服自然小水通利一日添如一日
健脾散六三　和中健胃消食快氣

人參　白朮炒　丁香　藿香
砂仁炒　肉果煨　神麯炒　炙甘草等分
右為細末每服二錢不拘時陳皮湯下
參朮健脾湯六四　治脾虛兼滯脹滿
人參　白茯苓　陳皮　半夏
砂仁　厚朴薑製各一錢　白朮二錢　甘草三分
水一鍾半薑三片煎七分食遠服○加神麯麥芽山查消服
尤佳
三因 當歸散六五　水腫之疾多由火不養土土不制水故水氣
盈溢脈道閉塞滲透經絡發為浮腫心腹脹滿之證

當歸　桂心　木香　赤茯苓
木通　檳榔　赤芍藥　牡丹皮
陳皮　白朮各一錢半　木瓜一斤
水二鍾加紫蘇五葉煎八分不拘時服
當歸活血散六六　治瘀血脹滿
赤芍藥　歸尾酒洗　生地黃各一錢半　桃仁去皮尖炒
紅花酒洗　香附童便浸各一錢　川芎　牡丹皮
玄胡索　蓬朮炮各八分　三稜炮　青皮各七分

水一鍾半煎七分食前服
局方 五皮散六七　治風濕客於脾經以致面目虛浮四肢腫滿
心腹膨脹上氣急促兼治皮水胕水
五加皮　地骨皮　大腹皮　茯苓皮
生薑皮等分
右㕮咀每服三錢水一大鍾煎七分熱服無時
澹寮 五皮散六八　治病後身面四肢浮腫小便不利脉虛而大
此由脾氣不能運行散漫於皮膚肌腠之間故令腫滿此藥
最宜

大腹皮　陳皮　生薑皮　桑白皮炒
赤茯苓皮各等分
右㕮咀每服五六錢水一大鍾煎八分不拘時溫服日三次
忌生冷油膩堅硬之物
沉香琥珀丸六九　治水腫一切小便不通難治之證
沉香　郁李仁去皮　葶藶炒各一兩半　琥珀
杏仁去皮尖　紫蘇　赤茯苓　澤瀉各半兩
橘紅　防己各七錢半
右為細末煉蜜丸梧子大以麝香為衣每服二十五丸漸加

至五七十丸空心人參湯送下昝虛寄璚效

法製陳皮七十　消食化氣寬利胸膈美進飲食

茴香炒　甘草炙各二兩　青鹽炒一兩　乾薑

烏梅肉各半兩　白檀香二錢半

右六味共爲末外以廣陳皮半斤湯浸去白淨取四兩切作細條子用水一大碗煎藥末二兩同陳皮條子一處慢火煮候陳皮極軟拆乾少時用餘剩乾藥末拌勻焙乾每服不拘多少細嚼溫薑湯下無時

家寶 祛痛散七一　治諸般心氣痛或氣滿不行攻刺心腹痛連

胸脇小腸吊痛及婦人血氣刺痛此方屢用無不神效

青皮　五靈脂　大不川楝子　川山甲

大茴香各一錢　良薑香油炒　玄胡索　沒藥

檳榔各錢半　沉香一錢　木香錢二分　砂仁少許

右㕮咀用木別子仁一錢二分同前藥炒令焦燥去木別不用共爲細末每服一錢加鹽一星用酒或滾水送下

調痛散七二　治脾痛氣膈

木香　丁香　檀香　大香附

台烏藥　莪朮　肉桂　片薑黃

白生薑　白豆蔻　砂仁　炙甘草等分

右㕮咀每服二錢半加紫蘇四葉煎湯服

丁香止痛散七三　方在熱痛百八

治心痛

良方 烏藥散七四　治血氣壅滯心腹作痛

烏藥　莪朮醋浸炒　桂心　桃仁

當歸　青皮　木香等分

右爲末每服二錢熱酒調下

奇效 手拈散七五　治心脾氣痛

延胡索　五靈脂　草果　沒藥等分

右爲細末每服二三錢不拘時熱酒調下

良方 遊山方七六　治心脾痛此藥極奇葉石林遊山見一小寺頗整潔問僧所以仰給者則曰素無田產亦不苦求只貨數藥以贍其衆疼藥最爲流布有詩云

草果玄胡索　靈脂并沒藥
酒調一二錢　一似手拈却

右等分爲末每服二錢不拘時溫酒調下

舒筋湯七七　一名如神湯　治臂腳血滞腰腹疼痛及產後

血滯作痛者更妙

當歸　玄胡索　桂心等分

右為細末每服二錢不拘時溫酒調服〇一方加杜仲牛膝桃仁續斷亦可

丹溪玄桂丸七八　治死血留胃脘當心作痛

玄胡索一兩半　官桂　紅花　紅麴

滑石各五錢　桃仁三十粒

右為細末湯浸蒸餅為丸綠豆大每服四十丸薑湯下

潔古枳朮丸七九　治痞積消食強胃

枳實麩炒一兩　白朮麪炒二兩

右為末荷葉裹燒飯為丸桐子大每服五十丸白朮湯下但久服之令人胃氣強實不復傷也〇東垣橘皮枳朮丸即前方加陳皮一兩半夏一兩即名橘半枳朮丸

香砂枳朮丸八十　破滯氣消宿食開胃進食

木香　砂仁各五錢　枳實麩炒一兩　白朮米泔浸炒二兩

右制服如朮丸法

麴櫱枳朮丸八一　治强食多食心胸滿悶不快

神麴炒　麥櫱炒　枳實麩炒各一兩　白朮二兩

右制服如枳朮丸法

東垣木香人參生薑枳朮丸八二　開胃進飲食

木香三錢　人參五錢　乾生薑二錢半　陳皮四錢

枳實一兩炒　白朮一兩半

右為細末荷葉燒飯為丸桐子大每服三五十丸食前溫水下

直指加味枳朮丸八三　治脾胃虛弱食積氣滯胸腹脹滿常服進食寬中和暢脾胃

白朮米泔浸土炒二兩　枳實麩炒一兩　神麴炒　麥芽炒

陳皮　山查　香附炒各一兩　砂仁炒半兩

如前法丸服

丹溪枳實丸八四　專治食積痞塊

枳實　白朮　山查　麥芽

神麴　半夏各一兩　蒼朮　陳皮各五錢

木香錢半　黃連三錢

荷葉蒸飯為丸桐子大每服百丸食後薑湯下

醫統大健脾丸八五　又名百穀丸〇徐東皐曰此方健脾養胃滋穀氣除濕熱寬胸膈去痞滿久服強中益氣百病不生

人參　白茯苓飯上蒸　廣陳皮各二兩　枳實飯上蒸

青皮木醋洗　半夏麯炒　山查肉飯上蒸　白朮土炒各二兩

穀芽炒一兩　白豆蔻炒　廣木香各五錢

川黃連一兩六錢同吳茱萸五錢浸炒去茱萸

右爲末用長流水煮荷葉老米粥搗丸綠豆大每服百丸食前白湯下　愚按此方雖佳但脾多畏寒若非有火當去黃連或仍加炮薑一二兩爲妙

楊氏啓脾丸 八六　治脾胃不和氣不升降中滿痞塞心腹膨脹腸鳴泄瀉不思飲食

人參　白朮　陳皮　青皮去瓤

神麯炒　麥芽炒　砂仁　厚朴

乾薑各一兩　甘草兩半炙

煉蜜爲丸彈子大每服一丸食前細嚼米飲下

和中丸 八七　治久病厭厭不能食而臟腑或秘或溏此皆胃虛所致常服之和中理氣消痰積去濕滯厚腸胃進飲食

白朮數炒二兩四錢　厚朴薑製二兩　陳皮一兩六錢　半夏湯泡一兩

檳榔五錢　枳實五錢　炙甘草四錢　木香二錢

右用生薑自然汁浸蒸餅爲丸桐子大每服三四十丸食遠

溫水送下

東垣和中丸 八八　開胃進食

人參　白朮各三錢　乾薑炮　甘草炙

陳皮各一錢　木瓜一枚

右爲末蒸餅丸桐子大食前白湯下三五十丸

養胃進食丸 八九　治脾胃虛弱心腹脹滿面色痿黃肌肉消瘦怠惰嗜臥或不思食常服滋養脾胃進飲食消痰涎辟風寒濕冷邪氣

人參　白茯苓　白朮泔浸炒　厚朴薑炒各二兩

神麯炒二兩半　大麥蘖炒　橘紅各一兩　甘草炙一兩

蒼朮堅小而甘者米泔浸去皮五兩炒

右九味爲末水麪糊丸桐子大每服三五十丸食前米湯或薑湯送下

消食丸 九十　治一切食積停滯

山查　神麯炒　麥芽炒　蘿蔔子

青皮　陳皮　香附各二兩　阿魏一兩醋浸另研

湯泡蒸餅爲丸桐子大每服五十丸食遠白湯下

濟生導痰湯 九一　治一切痰涎壅盛或胸膈留飲痞塞不通

陳皮　半夏　茯苓　甘草
南星　枳殼炒
右等分每服六錢水二鍾薑五片或十片煎七分食後服
海藏五飲湯九二　一留飲在心下二澼飲在脇下三痰飲在胃中四溢飲在膈上五留飲在腸間凡此五飲以酒後飲冷過多所致
旋覆花　人參　橘紅炒　枳實
厚朴薑汁炒　半夏　茯苓　澤瀉
白术　豬苓各八分　前胡　桂心

芍藥　炙甘草各五分
水二鍾薑十片煎八分不拘時服飲酒傷者加葛根砂仁
外臺茯苓飲九三　治胸有停痰宿水自吐出水後心胸間虛氣滿不能食消痰氣令能食
茯苓　人參　白术各三兩　枳實二兩
陳皮兩半　生薑四兩
右六味水六升煮取一升八合分溫三服如人行八九里進之
茯苓飲子九四　治痰迷心竅怔忡不止

陳皮　半夏　茯苓　茯神
麥冬各錢半　沉香　甘草各五分
右水一鍾半薑五片煎七分服
千緡湯九五　治痰喘不得臥人扶而坐一服即安
半夏泡七個　炙甘草　皂角炙各一寸　生薑一指大
水一鍾半煎七分不拘時服
玉液湯九六　治七情所傷氣鬱生涎隨氣上逆頭目眩暈心嘈忪悸眉稜骨痛
半夏大者六錢湯泡七次切片
右作一服水鍾半薑十片煎七分入沉香末少許不拘時溫

服
局方四七湯九七　治七情之氣結成痰涎狀如破絮或如梅核在咽喉之間咯不出嚥不下此七情所為也或中脘痞滿氣不舒快痰飲嘔惡皆治之
半夏湯泡錢半　茯苓一錢二分　蘇葉六分　厚朴薑制九分
水一鍾半生薑七片紅棗一枚煎八分不拘時服
得效加味四七湯九八　治心氣鬱滯豁痰散驚
半夏制二錢半　厚朴制　茯苓各一錢半　蘇葉

茯神各一錢 遠志 石菖蒲 甘草各五分

水二鍾加薑棗煎服

玉機 澤瀉湯九九 治心下有支飲苦眩冒

澤瀉五錢 白术二錢

水一鍾煎七分食遠溫服

朱砂消痰飲百 治痰迷心竅驚悸怔忡

膽星五錢 朱砂二錢半另研 射香二分另研

右為末臨卧薑湯調下一錢

保命 消飲丸百一 治停飲胸滿嘔逆腹中水聲不思飲食

白术二兩炒 茯苓五錢 枳實炒 乾薑炮各七錢

右為細末蜜丸桐子大溫水下三十丸

秘方 星香丸百二 治諸般氣嗽生痰

南星礬水泡一宿 半夏制同上 香附皂角水浸一宿晒乾各 陳皮去白四兩

右不見火為末薑汁糊丸每服五十丸臨卧薑湯送下

祛痰丸百三 治風痰頭旋惡逆胸膈不利

南星生 半夏生 赤茯苓 橘紅

乾薑炮等分

右為細末麪糊丸梧子大每服五七十丸不拘時米飲送下

天花丸百四 亦名玉壺丸 治消渴引飲無度

人參 天花粉各等分

右為細末煉蜜丸桐子大每服三五十丸麥門冬湯下

簡易方 玉壺丸百五 治風痰頭痛亦治諸痰

南星生 半夏生各一兩 天麻五錢 白麪三兩

右為末水和為丸梧子大每服三五十丸用水一大盞煎沸入藥煮令藥浮即熟漉出放溫別用生薑湯下○一方用南星半夏各二兩俱制天麻白礬各五錢共為末以薑汁糊丸如胡椒大每服三十丸白湯下

上液丸百六 治風熱痰涎壅盛利咽膈清頭目止欬嗽除煩熱

半夏湯泡為細末 枯礬研細各一兩 寒水石煆赤另研水飛三兩

右研勻麪糊丸桐子大每服三十丸食後淡薑湯下

保命 玉粉丸百七 治氣痰欬嗽

南星 半夏各一兩俱湯洗 橘紅一兩

右為末湯浸蒸餅為丸桐子大每服五七十丸人參生薑湯任下食後

瑞竹 杏仁丸百八 治久嗽及老人欬嗽喘急不已睡卧不得服

此立效

杏仁去皮尖炒　胡桃肉去皮

右等分研爲膏加煉蜜丸如彈子大每服一丸食後細嚼薑湯下

許學士神术丸百九　治痰飲此足陽明太陽治濕發散之劑也

茅山蒼术一斤米泔浸一宿去皮切片焙乾爲末　生油麻五錢水二盞研細取漿

大棗十五個煮取肉研旋入麻漿并和藥

右三味和丸桐子大日乾每服五七十丸空心溫酒下

麴术丸百十一　治中脘宿食留飲酸蜇心痛嘈雜口吐清水

神麴炒一兩　陳皮一兩　蒼术米泔浸三宿切炒一兩半

右爲末生薑汁別煮神麴糊爲丸薑湯送下

三仙丸百十二　治一切濕痰痰飲胸膈煩滿痰涎不利頭目不清

南星　半夏　香附各等分

右南星半夏以滾湯泡過爲末用生薑自然汁和不可太軟用楮葉或荷葉包住外以蒲包再包罨之令發黃色晒乾收用須五六月內造如造麴之法每制丸藥用藥二兩香附一兩同爲細末麪糊爲丸綠豆大每服四五十丸食後薑湯下

青州白丸子百十二　治男婦風痰壅盛手足癱瘓嘔吐涎沫牙關緊急痰喘麻木及小兒驚風嘔吐

半夏七兩　南星三兩　白附子二兩　川烏半兩俱生用

右俱研羅爲細末用生絹袋盛以磁盆盛井花水擺洗粉出未出者以手揉擺再搖再擺以盡爲度然後日晒夜露每日一換新水攪而復澄春五夏三秋七冬十日去水晒乾白如玉片以糯米粉作稀糊丸如綠豆大每服二十丸生薑湯下無時如癱瘓用酒下小兒驚風薄荷湯下五七丸

局方　琥珀壽星丸百十三

天南星一斤　硃砂二兩研　琥珀一兩研

右先掘地坑深二尺用炭火五斤於坑內燒熱紅取出炭掃淨以好酒一升澆之將南星乘熱下坑內用盆急蓋以泥壅護經一宿取出焙乾爲末同二味和勻用生薑汁打麪糊丸如梧子大每服五十丸煎人參湯空心送下日三服（一方用琥珀四兩硃砂一兩仍用豬心血三個和藥末內加糊爲丸如前服

指迷　茯苓丸百十四　治人有臂痛手足不能舉或時左右轉移

此伏痰在內中脘停滯脾氣不能流行上與氣搏脾屬四肢而氣不下故上行攻臂其脈沉細者是也但治其痰則臂痛自止及婦人產後發喘四肢浮腫者用此則愈此治痰第一方也

半夏製二兩　茯苓一兩　枳殼炒半兩　風化硝一錢半

右為末薑汁煮糊丸桐子大每服三五十丸薑湯下累有人為痰所苦夜間兩臂常覺抽掣兩手戰掉至於茶盞亦不能舉隨服隨效

又簡易方　治痰飲流注痰痛止用大半夏二兩風化硝一兩為末以薑汁煮糊丸桐子大薑湯下十五丸痰在上臨臥服在下食前服

丹溪白螺丸百十五　治痰飲積胃脘痛

白螺螄殼墻上年久者燒　滑石炒　蒼朮

山梔　香附　南星各一兩　枳殼

青皮　木香　半夏　砂仁各五錢

右為末生薑汁浸蒸餅為丸綠豆大每服三四十丸薑湯下

春加川芎夏加黃連冬加吳茱萸各五錢

丹溪潤下丸百十六　降痰甚妙

半夏二兩依橘紅制　南星依橘紅制　炙甘草　黃芩

黃連各一兩　橘紅半斤以水化鹽五錢拌令得煮乾焙

右為末蒸餅丸綠豆大每服五七十丸白湯下

集成潤下丸百十七　治胸膈停痰降痰甚妙

橘紅一斤鹽五錢同水浸煮乾　甘草炙一兩

右為末湯浸蒸餅為丸綠豆大每服五十丸白湯下

丹溪黃瓜蔞丸百十八　治食積作痰壅滯喘急

瓜蔞仁　半夏　山查　神麴炒等分

右為末瓜蔞汁丸薑湯下五十丸

丹溪杏仁蘿蔔子丸百十九　治氣壅痰盛咳嗽

杏仁　蘿蔔子炒各一兩

右為末粥糊丸桐子大每服五十丸白湯下

金匱陳皮湯百二十　治嘔吐呃逆

陳皮四兩　生薑半斤

水七升煮取三升溫服一升下咽即愈

本事竹茹湯百二十一　治胃熱嘔吐

半夏薑汁制　乾葛各三錢　甘草二錢

右為末每服二錢水一鍾薑三片竹茹一彈許棗一枚同煎

七分去柤溫服

橘皮竹茹湯 一二二 治吐利後胃虛膈熱呃逆者

人參 竹茹 橘紅各一錢 甘草炙一錢

水一鍾半生薑五片棗一枚煎八分溫服

二汁飲 一二三 治反胃

甘蔗汁二分 薑汁一分

一味和勻每溫服一碗日三服則吐止

東垣 葛花解酲湯 一二四 治飲酒太過痰逆嘔吐心神煩亂胸膈痞塞手足顫搖飲食減少小便不利

人參 白朮 茯苓 砂仁

白豆蔻 葛花各一錢 青皮 陳皮

豬苓 澤瀉各七分 神麯 木香各五分

水二鍾生薑五片煎七分食遠稍熱服取微汗酒病去矣或為末薑湯調服二三錢亦可

金匱 豬苓散 一二五 治嘔吐病在膈上思水者

豬苓 茯苓 白朮等分

右三味杵為散飲服方寸匕日三服

入全 人參散 一二六 治脾胃虛寒霍亂吐瀉心煩腹痛飲食不

入

人參 當歸 厚朴 橘紅各一錢

乾薑炮 炙甘草各五分

加棗一枚水煎服

局方 六和湯 一二七 治夏秋暑熱傷脾或飲冷乘風多食瓜果以致客寒犯胃食留不化遂成痞膈霍亂嘔吐及瘧痢寒月瘧疾寒熱等證

半夏 人參 炙甘草 砂仁

杏仁各一錢 赤茯苓 扁豆炒 藿香

木瓜各二錢

右㕮咀每服五錢水二鍾生薑三片棗一枚煎溫服

一方有白朮香薷厚朴各一錢名六和半夏湯

良方 丁香散 一二八 治霍亂嘔吐不止

丁香五分 藿香 枇杷葉拭去毛各一錢

右㕮咀水一鍾半薑一片煎六分熱服

局方 丁香半夏丸 一二九 治胃寒嘔吐吞酸

丁香一兩 紅豆炒 半夏制 白朮炒各一兩

陳皮三兩

右為末薑汁打糊丸胡椒大每服二三十丸薑湯下

局方 半夏丁香丸 一二〇 治脾胃宿冷胸膈停痰嘔吐惡心吞酸噫醋心腹否滿不思飲食

肉豆蔻　丁香　木香　藿香

人參　陳皮去白各二錢　半夏制三兩

右為細末薑汁煮糊丸桐子大每服二十丸薑湯下

和劑 大七香丸 一二一 治脾胃虛冷心膈噎塞漸成膈氣及脾泄瀉痢反胃嘔吐

香附二兩　麥芽炒一兩　砂仁　藿香

官桂　甘草　陳皮各二兩半　丁香皮三兩半

甘松　烏藥各六錢半

右為末蜜丸彈子大每服一丸嚼碎鹽酒鹽湯任下忌生冷肥膩

良方 訶則仁半夏丸 一二二 治胃冷嘔逆不食

半夏先以湯洗一斤　小麥麪一斤

右水和丸彈子大水煮熟初服四五丸二服加至十四五丸旋煮溫服之

萬氏 定喘湯 一二三 治哮喘久不愈(一)按此方必風痰在肺者乃可用他則忌之

白果二十一枚去殼切碎炒　款冬花　桑白皮蜜炒　麻黃

制半夏各二錢　蘇子二錢　黃芩微炒　杏仁各錢半

水三鍾煎二鍾作二次服不拘時徐徐飲

歌曰　諸病原來有藥方　惟愁齁喘最難當

麻黃桑杏尋蘇子　白果冬花用更良

甘草黃芩同半夏　水煎百沸不須薑

病人遇此仙丹藥　服後方知定喘湯

局方 人參定喘湯 一二四 治肺氣上喘喉中有聲坐卧不安胸膈緊痛及治肺感寒邪欬嗽聲重

人參　麻黃　阿膠　半夏麯

五味子　粟殼　甘草各八分　桑白皮錢半

水二鍾薑三片煎八分食後服

良方 百合湯 一二五 治肺氣壅滞欬嗽喘悶多渴腰膝浮腫小便淋瀝

百合　赤茯苓　陳皮　桑白皮

紫蘇　大腹皮　枳殼　馬兜苓

人參　猪苓　炙甘草　麥冬各一錢

右分二服每服水一鍾半薑一片棗一枚煎七分不拘時溫
服
局方 五虎湯 一三六 治風寒所感熱痰喘急
麻黃七分 細茶八分 杏仁去皮尖一錢 石膏一錢半
甘草四分
水一鍾半薑三片葱一枝煎服
三因 神秘湯 一三七 治上氣喘急不得臥
人參一錢 陳皮 桔梗 紫蘇各錢半
五味子十五粒
水一鍾半煎七分食遠溫服
直指 神秘湯 一三八 治水氣作喘
人參 陳皮 桔梗 紫蘇
半夏 桑白皮 檳榔各一錢 炙甘草五分
五味子十五粒
水二鍾薑三片煎八分食遠溫服
蘿蔔子湯 一三九 治積年上氣喘促唾膿血不止而氣實者
宜之
蘿蔔子 一合研碎水煎食後服其效如神

三因 葶藶大棗瀉肺湯 一百四十 治上氣喘急身與面目俱浮鼻
塞聲重不聞香臭胸脇脹滿將成肺癰
甜葶藶炒研細二錢 大棗十枚去核
水二鍾先煎大棗至一鍾去棗入葶藶煎至八分食後服○
須先服小青龍湯一服方用此
三因 蘇子煎 一四一 治上氣欬嗽
蘇子 杏仁 生薑汁 生地黃汁
白蜜各一斤
右將蘇子搗爛以二汁和之絞取汁又搗又和如此六七
次則味盡乃去柤以蜜和之置銅器中於湯上煎之如飴每
服一匙日三夜一 欬嗽愈即止
醫林 杏仁煎 一四二 治咳嗽
杏仁去皮尖炒 胡桃肉去皮
右等分研膏煉蜜丸彈子大每服一丸臨臥細嚼薑湯送下
○一方以胡桃肉三枚薑三片臨臥嚼服飲湯三四口再嚼
再飲就臥止嗽無痰
良方 杏仁膏 一四三 治欬嗽喘急喉中似物塞氣呼血不
止

杏仁一兩去皮尖炒研如脂　真酥一兩　阿膠二兩研炒為末
生薑汁一合　白蜜五合　蘇子二兩微炒研膏
右和勻銀鍋內慢火熬成膏每服一匙不拘時米飲調下
良方 前胡散 一四四 治心胸煩熱不利欬嗽涕唾稠粘
前胡　桑白皮　麥門冬　貝母各錢半
甘草炙五分　杏仁去皮尖一錢
水一鍾半薑三片煎七分溫服
濟生 百花膏 一四五 治欬嗽不已或痰中有血
百合蒸焙乾　欵冬花等分

右為細末煉蜜丸龍眼大臨臥細嚼一丸薑湯下
本事 枳殼散 一四六 治心下痞悶作痛噯氣如敗卵
枳殼　白朮各五錢　香附一兩　檳榔二錢
右為細末每服二錢米飲調下日二三服不拘時
保和湯 一四七 治中寒痞氣發熱嘔吐腹滿不食
厚朴薑制　半夏制　大腹皮黑豆水洗　橘紅各八分
柴胡　枳殼　甘草各五分　生薑三錢煨
水煎溫服
十味保和湯 一四八 治胃虛氣滯作嘔

人參　白朮　茯苓　半夏制
陳皮各一錢　藿香　香附　砂仁各六分
炙甘草　木香各一錢
水一鍾半薑三片棗一枚煎七分食前溫服
丹溪 六鬱湯 一四九 能解諸鬱
香附二錢　橘紅　蒼朮　撫芎
半夏薑製各一錢　赤茯苓　梔子炒各七分　炙甘草
砂仁各五分
水二鍾薑三片煎八分溫服○氣鬱加烏藥木香檳榔紫蘇

乾薑倍砂仁香附○濕鬱加白朮○熱鬱加黃芩倍梔子○痰鬱加南星枳殼小皂莢○血鬱加桃仁紅花丹皮○食鬱加山查神麯麥芽
局方 三和散 一五十 治七情氣結脾胃不和心腹痞滿大便秘澁
羌活　紫蘇　木瓜　大腹皮
沉香各一錢　木香　檳榔　陳皮
白朮　川芎　炙甘草各七分半
右㕮咀分二服每服水一鍾煎六分不拘時服

丹溪生韭飲 一五二 治食鬱久則胃脘有瘀血作痛大能開提氣血

生韭 搗取自然汁一盞 加溫酒一二杯同服

右先以桃仁連皮細嚼數十枚後以韭汁送下

三因溫膽湯 一五三 治氣鬱生涎夢寐不寧怔忡驚悸心虛膽怯變生諸證

半夏泡 枳實 竹茹各一兩 陳皮一兩五錢

茯苓七錢 炙甘草四錢

每服四五錢生薑七片棗一枚水一鍾半煎七分食遠溫服

(一)一方有遠志一兩

十味溫膽湯 治證同前兼治四肢浮腫飲食無味心虛煩悶坐臥不安及遺精消等證

半夏湯泡 枳實麩炒 陳皮各二錢 白茯苓一錢半

人參 熟地 棗仁炒 遠志制

五味各一錢 炙甘草五分

水二鍾生薑五片棗一枚煎八分不拘時服

越鞠丸 一五四 治六鬱胸膈痞滿或吞酸嘔吐飲食不和瘡疥等證

香附 山查 神麴炒 麥芽炒

撫芎 蒼朮 梔子炒各等分

右為末水調神麴糊丸梧子大每服五七十丸滾湯下(一)丹溪越鞠丸無山查麥芽

沉氣丸 一五五 治五積六聚痰飲痞塊留飲之疾是皆鬱氣客於腸胃之間皮膚之下久而停留變而為痞此藥能通滯氣和陰陽消痞飲雖年高氣弱亦可緩緩服之

木香 小茴香 橘紅 菖蒲

青皮 廣茂炮 檳榔 蘿蔔子

神麴炒 麥芽炒 枳殼麩炒 補骨脂炒

砂仁 蓽澄茄各一兩

右為末麪糊丸梧子大每服五十丸細嚼白豆蔻仁一枚食後白湯送下

嚴氏五膈散 一五六 治五膈五噎

人參 白朮 甘草 白豆蔻

半夏 桔梗 乾薑 蓽澄茄

木香 杵頭糠 沉香各二分 枇杷葉五片炙去毛

水二鍾薑七片煎七分溫服

局方五膈寬中散 一五七 治七情四氣傷於脾胃以致陰陽不
和遂成膈噎一切氣逆並治
青皮 陳皮各五錢 香附童便浸 厚朴薑汁炒
甘草各六錢 白豆蔻 砂仁 丁香
木香各二錢
右為細末每服二錢薑鹽湯點服
選要十膈散 一五八 治十般膈氣○風冷氣熱痰食水憂思膈
人參 白朮 茯苓 炙甘草
陳皮 枳殼麩炒 神麯炒 麥芽

乾薑炮 官桂 訶子煨 三稜煨
莪朮煨各一兩 厚朴薑炒 檳榔 木香各半兩
右為細末每服一錢入鹽少許白湯調服如脾胃不和腹滿
脹悶用水一鍾薑五片鹽少許煎七分服
局方五噎散 一五九 治胸膈痞悶諸氣結聚脇肋脹滿痰逆噁
心不進飲食
白朮 桔梗 半夏麯 枳殼麩炒
青皮 草果 麥芽 大腹皮
乾薑 丁香各一錢 甘草五分
水一鍾半薑五片煎七分不拘時服
嘉禾散 百六十 一名穀神散 治脾胃不和胸膈痞悶氣逆
生痰不進飲食五膈五噎
白茯苓 砂仁 薏苡仁炒 枇杷葉去毛薑炙
桑白皮炒 沉香磨汁 五味子 白豆蔻
炙甘草 丁香 人參 白朮各五分
木香磨汁 青皮 陳皮 杜仲薑汁炒
穀芽炒 藿香 大腹皮洗 石斛酒炒
半夏麯炒 神麯炒 隨風子 檳榔各三分

右水二鍾薑三片棗二枚煎八分食遠服○五噎入棓米一
撮同煎膈氣吐逆入薤白十枚五枚同煎
局方人參豆蔻湯 一六一 治膈噎寬中順氣
人參 炙甘草 白豆蔻 石菖蒲各五分
白朮 陳皮 半夏麯 蘿蔔子炒研
當歸 厚朴各八分 藿香 丁香各三分
水一鍾半薑三片粟米一撮煎七分服
良方紫蘇子飲 一六二 治膈噎上氣欬逆因怒未定便夾氣飲
食或食飲畢便怒以致食與氣相逆遂成膈噎之候

真蘇子　訶子煨　蘿蔔子微炒　杏仁去皮尖麩炒
人參各一錢　木香五分　[illegible]　炙甘草各一錢
右㕮咀水一鍾半薑三片煎七分服
枇杷葉煎 一六三 治瘧咳之效
枇杷葉拭去毛炙　橘紅各[illegible]　生薑半兩
水一鍾半煎七分作二次溫服
統旨 補氣運脾湯 一六四 治中氣不運噎塞
人參二錢　白术三錢　黃芪一錢炙　橘紅
茯苓各錢半　砂仁八分　甘草炙五分

水一鍾半薑一片棗一枚煎八分食遠服
利膈散 一六五 治胸痺膈塞不通
人參　白术　陳皮　赤茯苓
前胡各一錢　乾薑　桂心　訶子
甘草各五分
水一鍾半薑五片煎七分頻頻服之效
發明 人參利膈丸 一六六 治胸中不利痰逆喘滿利脾胃壅滯
治噎膈聖藥○按此方必噎膈而大便秘結者乃可用
人參　當歸　藿香各一兩　木香

檳榔各七錢　枳實炒　甘草各八錢　厚朴薑炒
大黃酒浸各二兩
右為末滴水丸梧子大溫水送下三十丸
草豆蔻丸 一六七 治酒積胃口痛咽膈不通
草豆蔻炒八錢　白术各一兩　麥芽炒　神麯炒
黃芩　半夏炮各五錢　枳實炒二兩　橘紅
青皮各二錢　乾薑一錢　炒鹽五分
湯浸蒸餅為丸綠豆大每服百丸煎白湯下○按此方當去
黃芩庶乎不滯

東垣 清暑益氣湯 一六八 治暑熱蒸人四肢倦怠胸滿氣促肢
節疼痛身熱而煩小便黃數大便溏瀉自汗口渴不思飲食
人參　黃芪　升麻　蒼术各一錢
白术炒　神麯炒各五分　陳皮　炙甘草
黃柏　麥冬　當歸各五分　乾葛
五味　澤瀉　青皮各三分
水煎溫服
局方 香薷飲 一六九 治一切暑熱腹痛或霍亂吐利煩心等證
○按此方惟治陽暑陰暑不宜用

香薷一斤 厚朴制 白扁豆炒各半斤

每服五錢水一鍾半煎八分不拘時溫服

五物香薷飲 百七十 治一切暑毒腹痛霍亂吐瀉或頭痛昏憒等證

香薷 茯苓 白扁豆 厚朴

炙甘草各一錢

右為咀水一鍾半煎服○本方加黃連即名黃連香薷飲

十味香薷飲 百七十一 治伏暑身體倦怠神昏頭重吐瀉等證

香薷二錢 人參 黃芪 白朮

茯苓 厚朴薑炒 陳皮 白扁豆炒各一錢

木瓜 炙甘草各五分

水二鍾煎七分食遠溫服

黃連香薷飲 一七二 治陽暑中熱

黃連四兩 香薷一斤 厚朴半斤

每服四錢如前煎服

局方 縮脾飲 一七三 解伏暑除煩渴消暑毒止吐瀉霍亂

白扁豆炒 乾葛各二兩作[illegible] 炙甘草 烏梅肉

砂仁 草果各四兩

右㕮咀每服四錢水煎冷服

局方 七味滲濕湯 一七四 治寒濕所傷身體重著如坐水中小便或赤澀大便溏泄因坐卧濕地或為陰雨之所襲也

炙甘草 蒼朮 白朮各一錢 茯苓

乾薑各二錢 丁香 橘紅各二分半

水一鍾半薑三片棗一枚煎七分食前服

清熱滲濕湯 一七五 方在寒陣百十一

治濕熱浮腫小水不利

金匱 防己黃芪湯 一七六 治風濕脈浮身重汗出惡風者

防己 黃芪去蘆各一兩 甘草炙半兩 白朮七錢半

右㕮咀每用五錢生薑四片棗一枚水盞半煎八分溫服良久再服○喘者加麻黃半兩○胃中不和加芍藥○氣上衝者加桂枝○下有陳寒者加細辛○服後當如虫行皮中從腰下如氷厚坐被上又以一被繞腰下溫令微差

百一 除濕湯 一七七 治中濕身體重著腰腿痠疼大便溏小便或澁或利

半夏麯 蒼朮 厚朴 茯苓各錢半

陳皮七分　藿香　炙甘草各五分
水二鍾薑七片棗二枚煎七分食遠服
羌活勝濕湯 一七八　治外傷濕氣一身盡痛者此方通治濕
證
羌活　獨活各二錢　藁本　防風各錢半
蔓荊子　川芎　炙甘草各五分
水二鍾煎八分食後温服○如身重腰痛沉沉然經有寒也
加酒防已五分附子五分
東垣 升陽除濕湯 一七九　治脾胃虛弱不思飲食腸鳴腹痛泄

瀉無度小便黃四肢困弱
升麻　柴胡　羌活　防風
半夏　益智仁　神麴　澤瀉各五分
麥蘖麵　陳皮　猪苓　甘草各二分
蒼术一錢
右㕮咀作一服水三大盞生薑三片棗二枚煎至一盞去柤
空心服
拔萃 升陽除濕防風湯 一八十　治下痢下血大便秘澀裏急後
重數至圊而不能便或下白膿慎勿利之舉其陽則陰自降

矣
防風二錢　白术　白茯苓　白芍藥各一錢
蒼术酒浸去皮炒四錢
右先將蒼术用水一鍾半煎至一鍾入諸藥同煎至八分食
前服
白术酒 一八一　治中濕骨節疼痛
白术一兩
用酒三盞煎一盞不拘時頻服不能飲酒者以水代之
仲景 五苓散 一八二　治暑熱煩燥霍亂泄瀉小便不利而渴淋

瀝作痛下部濕熱
白术　猪苓　茯苓各七錢半　肉桂五錢
澤瀉一兩二錢半
古法爲細末每服二錢白湯調下日三服○今法以水煎服
加減五苓散 一八三　治濕熱黃疸小水不利
即前五苓散去肉桂加茵陳各等分
加味五苓散 一八四　治濕勝身痛小便不利體痛發渴此太
陽經解表滲利之劑治風濕寒濕藥也
即前五苓散加羌活

茵陳五苓散一八五　治黄疸
茵陳蒿末十分　五苓散五分
右和勻先食飲方寸匕日三服
柴胡茵陳五苓散一八六　治傷寒溫濕熱病發黄小便赤黑
煩渴發熱此以汗下太早濕熱未除以致發黄宜用此
治之甚效
五苓散一兩　加茵陳半兩　車前子一錢　木通
柴胡各一錢半
右分二服用水一鍾半燈草五十莖煎服連進數服小便清

利爲愈○因酒後者加乾葛二錢
四苓散一八七
即前五苓散去肉桂
仲景豬苓湯一八八　治傷寒下後脈浮發熱渴欲飲水小便不
利及少陰病下利欬而嘔渴心煩不得眠者
豬苓去皮　伏苓　阿膠　滑石
澤瀉各一兩
右五味以水四升先煮四味取二升去滓內阿膠烊盡服七
合日三服

伏苓湯一八九　治濕熱泄瀉或飲食泄瀉
茯苓　白朮炒各五錢
右用水煎食前服○一方有芍藥等分名白朮散
胃苓湯百九十　治脾濕太過泄瀉不止
陳皮　厚朴　甘草　蒼朮
白朮　茯苓　澤瀉　豬苓
肉桂各等分
每服五六錢薑五片棗二枚水煎服
橘半胃苓湯一九一　治嘔吐泄瀉脹滿不下食不知味

橘紅　半夏製各錢　蒼朮米甘浸炒　白朮炒
厚朴　炙甘草　人參　茯苓
澤瀉　芋根各二錢　薑汁數匙
水二鍾煎一鍾入薑汁再煎一二沸陸續飲之
柴苓湯一九二　治身熱煩渴泄瀉
白朮　茯苓　澤瀉　柴胡
豬苓　黄芩
右水煎服
加減柴苓湯一九三　治諸瘧此和肝腎順氣消痞治瘧之劑

柴胡　甘草　半夏　茯苓

白朮　澤瀉　豬苓　山梔炒

山查　荔核煨各等分

右㕮咀水二鍾薑三片煎八分食前服

局方 眞人養臟湯 一九四　治大人小兒冷熱不調下痢赤白或如膿血魚腦裏急後重臍腹疞痛或脫肛墜下酒毒便血並治之

人參　當歸　訶子　肉豆蔻麵煨

炙甘草　木香各一錢　芍藥　白朮各三錢

肉桂五分　粟殼蜜炙二錢

水二鍾煎八分食遠服。臟寒者加附子一錢

良方 草果散 一九五　治中寒泄瀉腹痛無度

厚朴二兩薑汁炒　肉豆蔻麵煨　草豆蔻煨各十個

右每服三錢薑水煎服

經驗 大橘皮湯 一九六　治濕熱內甚心腹脹滿水瀉小便不利

橘皮　檳榔各一錢　滑石　茯苓

豬苓　澤瀉　白朮各一錢　官桂

甘草各五分

水一鍾半生薑三片煎八分食遠服

消食導氣飲 一九七　治凡遇氣怒便作泄瀉此必因怒挾食所致其有脾土本虛不勝肝氣者此方主之

人參　白朮　茯苓　炙甘草

川芎　半夏　青皮　陳皮

枳實　香附　神麯　砂仁

木香　上酌虛實增減用

水一鍾半薑三片煎七分食遠溫服

外臺 黃芩湯 一九八　治乾嘔下利

黃芩　人參　乾薑各三兩　桂枝一兩

半夏半升　大棗十二枚

右六味以水七升煮取三升溫分三服

秘傳十門方 一九九　治毒痢臟腑撮痛膿血赤白或下血片日夜不息及噤口惡痢裏急後重全不進食久渴不止他藥不能治者立見神效

乾薑炒四錢　粟殼蜜炙八錢　地榆　甘草炙各六錢

白芍藥炒二錢　黑豆炒去皮一兩半

右㕮咀可分三四貼用水一鍾半煎七分食遠熱服

治痢簡易八方 二百

外臺秘要方 治痢下白膿不止用白麪一味炒熟擣篩煮米粥內方寸匕食之此療瀉痢日至百行藥所不及者也

千金方 治痢用薤白一握細切煮粥食之

聖惠方 治赤白痢疾以葱一握切和米煮粥空腹食之

千金翼方 用雞子以醋煮熟空腹食之治久痢赤白

又方 用乾薑於火內燒焦黑不可成炭放磁瓶中閉冷為末每服一錢米飲調下

炙雞散 治脾胃氣虛腸滑下痢用黃雌雞一隻製如食法以炭火炙之槌碎用鹽醋刷遍又炙令極熟而燥空腹食之

一方 治熱毒下血痢久不已用當歸黃連各三錢烏梅五個水煎八分空心服

類方 麯朮丸 二百一 治暑濕暴瀉壯脾溫胃及治飲食所傷胸膈痞悶

神麯炒 蒼朮米泔浸一宿切炒 等分

右為細末麪糊丸桐子大每服七八十丸米飲下不拘時

局方 戊己丸 二百二 治脾經受濕瀉痢不止米穀不化臍腹刺痛

黃連炒 吳茱萸泡炒 白芍藥各五兩

一方黃連四兩吳茱萸二兩芍藥二兩

右為細末麪糊丸桐子大每服七十丸空心食前米飲下

本事 雙荷散 二百三 治卒暴吐血

藕節七個 荷葉頂七個

右入蜜一匙擂細水二鍾煎八分溫服或為末蜜湯調下二錢亦妙

良方 側柏散 二百四 治內損失血飲酒大過勞傷於內氣血妄行血如湧泉口鼻皆出須臾不救服此即安又治男婦九竅出血

人參 荊芥穗燒灰各一兩 側柏葉蒸乾一兩半

右為末每服二錢入飛羅麪二錢拌勻汲水調稀啜服

地黃煎 二百五 治吐血發熱內傷肺痿咳嗽及虛勞吐血自痢久服佳

用生地黃一斤擣取汁於銀鍋或砂鍋設火煎一二沸入白蜜一斤再煎至三升每服半升日三服

一方用生地黃汁 升生薑汁一合和勻溫服日三四次

一方治虚勞吐血用生地黄五斤搗以好酒五升煮去查服

局方 枇杷葉散 二百六 治暑毒攻心嘔吐鮮血

香薷二錢 厚朴 甘草 麥門冬

木瓜 茅根各一錢 陳皮 枇杷葉

丁香各五分

右爲末每服二錢溫水煎服

阿膠散 二百七 治肺燥咳嗽不已及唾血

阿膠炒 白芨各二錢 天門冬 北五味子

人參 生地黄 茯苓各一錢

右以白芨爲細末除藥用水一鐘半入蜜一匙秫米百粒生薑五片同煎熬入白芨末調食後溫服

良方 阿膠散 二百八 方在婦人六

安胎補血氣

錢氏 阿膠散 二百九 方在小兒二四

治小兒欬嗽喘急

綠雲散 二百十 治吐血

柏葉 人參 阿膠炒珠 百合

右等分爲末每服一錢不拘時糯米飲調下

簡易 黑神散 二一一 治一切吐血及傷酒食醉飽低頭掬損吐血致多并血熱妄行口鼻俱出但聲未失無有不效

百草霜 不拘多少村居者佳

右研細每服二錢糯米煎湯下亦涼水者以新汲水調服○衄血者用少許吹鼻○皮破出血或炙瘡出血摻之即止

局方 黑神散 二一二 方在婦人五十

治產後惡露不盡胎衣不下攻心腹痛

天門冬丸 二一三 治吐血咯血大能潤肺止嗽

天門冬一兩 貝母 杏仁炒各七錢 白茯苓

阿膠 甘草各五錢

右爲細末煉蜜丸如彈子大每噙化一丸津嚥下

髮灰散 二一四 治起居所傷小便尿血或忍尿脬轉臍下急痛小便不通又治肺疽心衄内崩吐血舌上出血

亂髮燒灰即血餘也

右每服二錢以米醋湯調服

棕灰散 二一五 治大腸下血不止或婦人崩漏下血

敗棕 不拘多少燒灰存性爲細末

每服二錢空心好酒或清米飲調服

寶鑑平胃地榆湯 二一八 治邪陷陰分則陰結便血

陳皮 厚朴 蒼朮 甘草

地榆 人參 白朮 當歸

芍藥 升麻 乾葛 茯苓

神麯 乾薑炒 香附 各等分

右㕮咀每服五錢加薑棗煎空心服

寶鑑 愈風湯 七 一名舉卿古拜散○治一切失血筋脈緊急產後或汗後搐搦

荊芥穗 為細末

右先炒大豆黃卷以酒沃之去黃卷取淨汁調前末三四錢服之輕者一服重者二三服即止氣虛者忌服童便調亦可

局方 小烏沉湯 二一八 治氣逆便血不止

烏藥 一兩 炙甘草 香附 醋炒四兩

右為末每服二錢食前鹽湯下

除濕和血湯 二一九 治陽明經濕熱症陷便血腹痛

當歸身 酒拌 牡丹皮 生地黃 熟地黃

黃芪 炙 炙甘草 各一錢 白芍藥 錢半 生甘草

升麻 陳皮 秦艽 蒼朮

肉桂 各五分

水二鍾煎八分空心候宿食消盡熱服

驅瘧飲 二百二十 治諸瘧久瘧不愈者

草果 青皮 陳皮 人參

茯苓 半夏 製 厚朴 蒼朮 炒

檳榔 白朮 甘草 各一錢 良薑 五分

水二鍾棗二枚烏梅一個煎八分食遠服 一發後久發久瘧者可因其衰而減之立效

住瘧飲

貝母 去心 紫蘇 各一錢 橘紅 山查肉

枳實 各錢半 檳榔 八分 柴胡 七分 甘草 炙 一分

知母 去毛淨鹽酒炒過 五錢

右用水二鍾煎一鍾又將渣再煎至八分共一處露過宿臨發日早溫服一半未發前一時許再溫服後半

攝瘧飲 二二二 史崇質傳云得之四明胡君屢試屢驗

黃芪 炙錢六分 人參 白朮 白茯苓

橘紅 砂仁 草果 五味子 各一錢

甘草 七分 烏梅 一枚

水二鍾薑三片棗二枚煎一鍾溫服

濟生 萬安散二二二 治一切瘧病之初邪盛氣壯者進此藥以逐邪取效若氣虛胃弱及妊婦皆不宜用

蒼朮　厚朴薑炒　陳皮　檳榔

常山酒浸　甘草炙各一錢半

右㕮咀水一鍾半煎八分露一宿臨發早溫服忌熱物

濟生 鱉甲飲子二二三 治瘧疾久不愈脇下痞滿腹中結塊名曰瘧母

鱉甲醋炙　川芎　黃芪　草果仁

檳榔　白朮　橘紅　白芍藥

甘草　厚朴薑製等分

右㕮咀每服五七錢水一鍾薑七片棗一枚烏梅少許煎七分溫服無時

濟生 清脾飲二二五 治癉瘧脉來弦數但熱不寒或熱多寒少口苦咽乾小便赤濇

厚朴製　青皮　白朮　草果仁

柴胡　茯苓　黃芩　半夏

甘草各等分

每服四五錢水一鍾半薑三片棗一枚未發前服忌生冷油

膩○寒多者可加肉桂熱多者可加黃連

局方 草果飲二二六 治諸瘧通用

草果　川芎　白芷　蘇葉

青皮　陳皮　良薑　炙甘草

右等分㕮咀每服五錢水一鍾半煎七分溫服留滓兩服并煎當發日進一服不以時加鹽煎亦治寒熱

簡易 七寶飲二二七 治一切瘧疾不問寒熱鬼瘧食瘧

常山　草果　檳榔　厚朴薑製

青皮　陳皮　甘草各一錢

右用酒水各一鍾共煎一鍾將滓亦如前再煎一鍾各另放俱露一宿至次日當發清晨面東先溫服頭服少須再飲二服大有神效

簡易 四獸飲二二八 治諸瘧和胃消痰

人參　白朮　茯苓　甘草炙減半

陳皮　半夏　草果　烏梅各等分

大棗三枚　生薑五片

右㕮咀以鹽少許醃食頃濕紙厚裹慢火煨香熟每服四五錢水一鍾半煎七分溫服

局方常山飲 二一九 治瘧疾發散不愈漸成瘴瘧

知母　常山　草果　烏梅肉 各一斤

良薑 二十兩　炙甘草 一斤

右㕮咀每服五錢薑五片棗一枚水煎服

丹溪截瘧丹 二百二十

雄黃 一兩　人參 五錢

右爲末於端午日用粽子尖丸桐子大每服一丸發日早面東井花水吞之忌諸熱味

集成截瘧常山飲 二二一

常山　草果　川山甲 炙　甘草 炙

檳榔　知母　烏梅

右等分用水酒各一鍾煎至一鍾露一宿發前二時溫服如吐則順之

醫學交加飲子 二二二 治瘧食瘧氣虛寒等瘧

肉豆蔻　草豆蔻 各二個一個生一個麵煨　厚朴 二錢半生半薑製　大甘草 一錢半生半炙

生薑 一兩半生半煨

右水二鍾半煎八分發日空心服未愈再服

宋半夏湯 二二三 治脾瘧甚痛一作其痛手足沉重寒多熱少

柴胡　人參　半夏　黃芩

甘草　陳皮　厚朴　蒼朮

水二鍾加薑棗煎服

局方人參養胃湯 二二四 治外感風寒內傷飲食寒熱頭疼身體拘急山嵐瘴氣瘟疫瘧疾等症

半夏　厚朴 薑製　橘紅 各八分　藿香

草果　茯苓　人參 各五分　蒼朮 一錢

炙甘草 三分

薑七片烏梅一個水煎服

和解散 二二五 治瘧病初作胸腹滿悶頭眩發熱

厚朴 薑汁炒　陳皮 各二兩　甘草 四兩炒　藁本

桔梗 各三兩　蒼朮 半斤米泔浸一宿 二兩

右爲粗末每服五七錢水鍾半薑三片棗二枚煎七分熱服日三服夜一服○此藥不拘傷風傷寒初作未分證候任服之大能助胃祛邪和解百病

檳榔煎 二二六 治山嵐瘴氣寒熱嘔吐腹滿不思飲食

檳榔　蒼朮　厚朴 薑製　陳皮

草果 各一錢　甘草 寸　煨生薑 一塊

水一鍾半棗三枚煎八分食遠熱服

屠蘇酒 一二七 辟山嵐瘴氣瘟疫等氣

麻黃 川椒去合口者 細辛 防風

蒼术製 乾薑 肉桂去粗皮 桔梗等分

右為粗末絳囊貯浸酒中密封瓶口三日後可服每日空心服一二杯冒霧遠行辟諸邪氣但不宜多飲使醉

降椒酒 一二八 辟一切瘴氣尋常宜飲之

降真香二兩細剉 川椒一兩去合口者

右用絹囊貯浸無灰酒中約二十斤每日飲數杯百邪皆不

能犯兼治風濕脚氣疝氣冷氣及背面惡寒風痰有效

易簡方 省風湯 一二九 治中風痰熱痰壅口噤口眼歪斜筋急疼痛風盛痰實

防風 南星生用各四兩 半夏湯洗生用 黃芩

甘草各一錢

水二鍾生薑五片煎八分不拘時服〇此湯同導痰湯合服尤妙

局方 八風散 二百四十 治風氣上攻頭目昏眩肢體拘急煩疼或皮膚風瘡痒痛及寒壅不調鼻塞聲重

藿香去土半斤 前胡去蘆 白芷各一斤 黃芪炙

甘草炙 人參各二斤 羌活 防風各三斤

右為細末每服二錢水一鍾入薄荷少許煎七分食後溫服或用臘茶清調服一錢亦可〇小兒虛風用臘茶清調下半錢更量兒大小加減服

防風當歸湯 二四一 治發汗過多發熱頭搖口噤背反張太陽兼陽明證也宜去風養血

防風 當歸 川芎 熟地黃等分

每服一兩水二鍾煎一鍾溫服

順風勻氣散 二四二 治中風中氣半身不遂口眼喎斜先宜服此

白术 人參 天麻各五分 沉香

白芷 青皮 甘草各四分 紫蘇

木瓜各三分 烏藥一錢半

水一鍾半薑三片煎七分食遠服

簡易 星香湯 二四三 治中風痰盛服熱藥不得者此痰厥氣厥身熱而亦者宜服之

南星八錢 木香一錢

右作二貼水二鐘生薑十片煎七分不拘時服

濟生 八味順氣散 二四四 治氣厥身冷似中風凡患中風者先服此藥順氣次進治風藥

人參 白朮 茯苓 青皮

陳皮 白芷 台烏 各一兩 甘草 半兩

右㕮咀每服三錢水一盞煎七分溫服

機要 大秦艽湯 二四五 治中風外無六經之形證內無便溺之阻隔血弱不能養筋故手足不能運動舌強不能言語宜養血而筋自愈

當歸 芍藥 白朮 生地

熟地 川芎 甘草 茯苓

防風 白芷 獨活 羌活

黃芩 各七分 秦艽 石膏 各一錢 細辛 五分

春夏加知母一錢

水二鐘煎一鐘溫服○如遇天陰加生薑七片如心下痞加枳實五分○按此湯自河間東垣而下俱用為中風之要藥夫既無六經之外證而胡為用羌活防芷等藥既內無便溺之阻隔而何用石膏秦艽黃芩之類且為風邪痛痺而血虛

有火者乃宜此方耳

良方 養血當歸地黃湯 二四六 治中風少血偏枯筋脉拘攣疼痛

當歸 川芎 熟地黃 芍藥

藁本 防風 白芷 各一錢 細辛 五分

水一鐘半煎八分食遠溫服

薏苡仁湯 二四七 治中風流注手足疼痛麻痺不仁難以伸屈

薏苡仁 當歸 芍藥 麻黃

官桂 蒼朮 米泔浸切炒 甘草

水一鐘半生薑七片煎八分食前服○自汗去麻黃有熱減官桂

滌痰湯 二四八 治中風痰迷心竅舌強不能言

南星 製 半夏 湯洗七次各 枳實 麩炒 茯苓 各二錢

橘紅 一錢半 石菖蒲 人參 各一錢 竹茹 七分

甘草 五分

水一鐘半生薑五片煎八分食後服

清心散 二四九 治風痰不開

青黛　硼砂　薄荷各二分半　真
冰片各三分
右為細末，先以蜜水洗舌，後以薑汁擦舌，將藥末蜜水調稀
搽舌本上
簡易 虎骨散 二百五十　治半身不遂，肌肉乾瘦，名為偏枯。忌用麻
黃發汗，恐枯津液，惟此方潤筋去風
當歸　烏蛇肉各二兩　赤芍藥　白朮
續斷　藁本　虎骨各一兩
右為細末，每服二錢，食後溫酒調下。○若骨中煩疼，加生地

黃一兩。○若臟寒自利，加天雄半兩
虎骨散 二五一　治風毒走注，疼痛不定，少得睡臥
虎脛骨醋炙　敗龜板醋炙，各二兩　血竭另研　沒藥另研
自然銅醋淬　赤芍藥　當歸　蒼耳子炒
骨碎補去毛　防風各七錢　牛膝酒浸　天麻
檳榔　五加皮　羌活各一兩　白附子炮
桂心　白芷各半兩
右為細末，每服二錢，溫酒調下，不拘時
交加散 二五二　治瘈瘲或顫振，或產後不省人事，口吐痰涎

當歸　荊芥穗等分
右為細末，每服二錢，水一鍾，酒少許，煎七分，灌服神效
良方 交加散 二五三　方在婦人百
治經脈結聚不調，腹中撮痛
潔古 四白丹 二五四　清肺氣，養魄，謂中風多昏冒，氣不清利
也，兼能下強骨髓
白朮　白茯苓　人參　川芎
甘草　砂仁　香附　防風各半兩
白芷一兩　白檀香　藿香各錢半　知母

細辛各二錢　羌活　薄荷　獨活各二錢半
麝香一錢，另研　牛黃　片腦各五分，另研　甜竹葉
右為末，煉蜜為丸，每兩作十丸，臨睡嚼一丸，煎愈風湯送下
上清肺氣，下強骨髓
續斷丹 二五五　治中風寒濕，筋攣骨痛
續斷　萆薢酒浸　牛膝酒浸　乾木瓜
杜仲炒，各二兩
右為末，煉蜜和丸，每兩作四丸，每服一丸，細嚼，溫酒下，不拘
時

豨薟丸 二五六 治中風口眼喎斜時吐涎沫語言蹇澀手
足緩弱

豨薟草　生於沃壤間帶豬氣者是

五月五日或六月六日採葉洗淨不拘多少九蒸九曬每蒸
用酒蜜灑之蒸一飯頃日乾爲末煉蜜丸桐子大每
服百丸空心溫酒米飲任下

一方每豨薟草一斤加四物料各半兩川烏羌活防風各二
錢丸服

蠲痹湯 二五七 治周痹及手足冷痺腳腿沉重或身體煩疼
背項拘急

當歸　赤芍藥煨　黃芪　薑黃

羌活各錢半　甘草五分

水二鍾薑三片棗一枚不拘時服

三痹湯 二五八 治血氣凝滯手足拘攣風痺等疾皆效

人參　黃芪　當歸　川芎

熟地黃　白芍藥　杜仲薑汁炒　續斷

桂心　牛膝　細辛　白茯苓

防風　秦艽　獨活　甘草等分

水二鍾薑三片棗一枚煎七分不拘時服

加味五痺湯 二五九 治五臟痺證

人參　白芍藥煨　茯苓　川芎或倍之

當歸各一錢　五味子十五粒　細辛七分　甘草五分

白朮一錢脾痺倍用

水二鍾薑一片煎八分食遠服○肝痺加棗仁柴胡○心痺
加遠志茯神麥冬犀角○脾痺加厚朴枳實砂仁神麴○肺
痺加紫菀半夏杏仁麻黃○腎痺加獨活官桂杜仲牛膝黃
芪萆薢

人參散 二百六十 治肝脾氣逆胸脇引痛眠臥多驚筋脈攣
急此藥鎮肝去邪

人參二兩　杜仲炒　黃芪炙　棗仁微炒

茯神各一兩　五味子　細辛去苗　熟地黃

秦艽　羌活去蘆　芎藭　丹砂細研各半兩

右爲細末入丹砂再研勻每服一錢不拘時溫酒調下日三
服

六味茯苓湯 二六一 治肢體手足麻痺多痰唾眩冒者

半夏製　赤茯苓　橘紅各二錢　枳殼麩炒

・桔梗去蘆　甘草炙各一錢

水二鍾薑五片煎八分不拘時服

枳實散 二六二　治心痺胸中氣堅急心微痛氣短促欬唾亦痛不能飲食

枳實麩炒　桂心　細辛　桔梗各七錢半

青皮一兩

右㕮咀每服三錢水一鍾生薑一錢半煎六分不拘時服

紫蘇子湯 二六三　治肺痺心胸滿塞上氣不下

紫蘇子炒八兩　半夏湯泡五兩　橘紅　桂心各三兩

人參　白朮　甘草炙各二兩

右㕮咀每服四五錢水一鍾生薑五片棗二枚煎七分不拘時溫服

除濕蠲痛湯 二六四　治風濕痛痺

羌活　茯苓　澤瀉　白朮各一錢半

陳皮一錢　甘草四分　蒼朮米泔浸炒二錢

水二鍾煎八分入薑汁竹瀝各二三匙服○痛在上者加桂枝威靈仙桔梗○痛在下者加防己木通黃蘗牛膝

桂心散 二六五　治風邪走注疼痛

・桂心　漏蘆　芎藭　威靈仙

白芷　當歸　木香　白殭蠶炒

地龍去土炒乾各半兩

右爲細末每服二錢溫酒調下不拘時

濕鬱湯 二六六　治雨露所襲或嵐氣所侵或坐卧濕地或汗出衣衫濕鬱其狀身重而痛倦怠嗜卧遇陰寒則發脉沉而細緩者是也

蒼朮三錢　白朮　香附　橘紅

厚朴薑汁炒　半夏製　白茯苓　撫芎

羌活　獨活各一錢　甘草五分

生薑五片水煎服

趂痛散 二六七

乳香　沒藥　桃仁　紅花

當歸　羌活　地龍酒炒　牛膝酒洗

甘草　香附童便炒　五靈脂酒炒

右爲末每服二錢酒調服○或加酒炒芩蘗

秦艽地黃湯 二六八　治風熱血燥筋骨作痛

秦艽　生地黃　當歸　川芎

白芍藥　甘草　防風　荆芥
升麻　白芷　蔓荆子　大力子炒
羌活各一錢
右水煎服
活絡飲 二六九　治風濕痺痛諸藥不效
當歸　白朮　川芎　羌活
獨活各一錢　甘草五分
水一鍾半薑五分煎七分溫服
獨活寄生湯 二百七十　治腎虛卧冷寒濕當風腰脚疼痛

獨活一錢　杜仲炒　細辛　桑寄生
人參　當歸　川芎　芍藥
茯苓　牛膝　甘草　桂心
熟地黃　防風　秦艽
水一鍾半薑三片煎七分空心服
透經解攣湯 二七一　治風熱筋攣骨痛
穿山甲炮三錢　荆芥　紅花　蘇木
羌活　當歸　蟬蛻去土　防風
天麻　甘草各七分　白芷一錢　連翹

川芎各五分
右酒水各半煎服
熏蒸方 二七二　治腎氣虛弱或肝脾腎三經受風寒濕氣停於腿膝經絡致成脚痺疼痛宜用此藥和榮衛通經絡是亦治痺之法
花椒一撮　葱三大莖切　鹽一把　小麥麩約四五升
酒一盞　醋不拘多少以拌前件令濕爲度
右放銅器內炒令極熱攤卧褥下將患脚熏蒸其上蓋以衣被穩卧一時要汗出爲度勿見風〇或加麻桂亦妙

熏洗痛風法 二七三　治手足冷痛如虎咬者
右用樟木屑一斗以急流水一擔煮沸將樟木屑入大桶內用前湯泡之桶邊放一凡凳桶內安一矮凳令病人坐桶邊放脚在桶內外以草薦一領圍之勿令湯氣入眼恐致壞眼其功甚捷
愈風丹 二七四　治足三陰虧損風邪所傷肢體麻木手足不隨等證
羌活十四兩　當歸　熟地　生地各一斤
杜仲七兩　天麻　萆薢另研細　牛膝酒浸焙乾

玄參各六兩 獨活五兩 肉桂三兩

煉蜜丸桐子大每服五七十丸或百丸空心食前溫酒或白湯下

易老天麻丸 二七五 治諸風肢節麻木手足不隨等證

天麻酒浸三日曬乾 牛膝製同前 萆薢另研末各六兩 當歸二十兩

附子製一兩 羌活十兩 生地一斤

丸服如前法○一方有玄參六兩 杜仲七兩 獨活五兩○按此方與前愈風丹大同但生地性涼恐滯經絡宜改用熟地爲妥且以六十四兩之諸藥而佐以一兩之附子果能效否

此最少亦宜四兩或六兩方可也

愈風燥濕化痰丸 二七六 治歷節風濕痰壅滯晝夜疼痛無休者

白朮炒 蒼朮米泔浸 杜仲鹽汁炒各二兩 牛膝酒洗

川芎 薏仁 巴戟 破故炒各一兩

當歸 牙皂炙炒 防風 羌活

生地 獨活 防已 天麻

南星 半夏 陳皮 木香

沉香 川烏 殭蠶 全蝎各五錢

右爲末酒糊丸桐子大每服百丸空心食前酒送下日二次食乾物壓之

活絡丹 二七七 治中風手足不用日久不愈經絡中有濕痰死血者

草烏泡去皮 川烏泡去皮 膽星各六兩 地龍去土焙乾

乳香去油 沒藥各二兩二錢

蜜丸桐子大每服二三十丸溫酒茶清任下

東垣開結導飲丸 二七八 治飲食不消心下痞悶腿腳腫痛

白朮炒 陳皮炒 澤瀉 茯苓

神麯炒 麥芽炒 半夏製各一兩 枳實炒

青皮 乾薑各五錢 如有積塊者加巴霜錢半

爲末湯浸蒸餅爲丸梧子大每服四五十丸或七十丸溫水下此

內傷飲食脾胃之氣不能運行上升則注爲脚氣故用此以導引行水化脾氣也

換骨丹 二七九 通治諸風痺病兼治鶴膝風○此與後史國公浸酒方大同

虎骨酥炙 防風 牛膝 當歸

羌活 獨活 敗龜板 秦艽

萆薢　晚蠶沙　松節各一兩　枸杞一兩半
茄根洗淨二兩

酒糊丸服或酒浸或為末服亦可

換腿丸二百八十（局方）治足三陰經為風寒暑濕所侵發為痺緩疼痛上攻胸脇下至腳膝足心發熱行步艱難

薏仁　南星　防己　防風
石斛　檳榔　萆薢　石南藥
羌活　木瓜各四兩　牛膝酒浸　當歸
天麻　續斷各一兩　黃芪一兩半

右為末酒糊丸梧子大每服五七十丸空心鹽酒下

史國公浸酒方二八一　一名萬病無憂酒　治諸風五痺左癱右瘓四肢頑麻口眼歪斜骨節痠疼諸般寒濕風氣效難盡述

當歸　鱉甲炙　羌活　萆薢
秦艽　防風去蘆　牛膝　晚蠶沙
松節各二兩　枸杞五兩　乾茄根八兩飯上蒸　虎脛骨酒浸一日焙乾酥炙

用無灰酒一斗絹袋盛藥入酒內封十日可服取飲時不可面向罈口恐藥氣衝人頭面飲酒不可間斷飲盡將藥查晒

乾為末米糊丸梧子大空心酒下五十丸忌發風動氣等物

煨腎散二八二（類方）治腰痛

人參　當歸　杜仲　肉蓯蓉
破故紙　巴戟　鹿角霜　秋石等分

為末用豬腰子一個洗淨血水淡鹽泡過劈開兩半勿令斷中間細細花開用前藥摻入另用稀絹包裹線縛定外用小砂罐入酒少許用紙封固毋令泄藥氣者腰子候熟取食之仍飲醇酒三杯立愈

調榮活絡飲二八三　治失力閃腰或跌撲瘀血及大便不通

腰痛

當歸　牛膝　杏仁研如泥　大黃各二錢
生地　芍藥　紅花　羌活各一錢
桂枝三分　川芎一錢半

水一鍾半煎八分食前溫服

胡桃湯二八四　治腎虛腰痛

胡桃肉　補骨脂　杜仲各四兩一作各四錢

右㕮咀分二貼用水二鍾煎七分空心服

雞鳴散二八五（良方）治腳氣第一品藥不問男女皆可服如感

風濕流注脚痛不可忍筋脉浮腫者並宜服之其效如神

檳榔七枚　橘紅　木瓜各一兩　吳茱萸

蘇葉各三錢　桔梗去蘆　生薑連皮各半兩

右㕮咀用水三大碗慢火煎至一碗半取查再入水二碗煎取一小碗兩汁相和安置床頭次日五更分作三五次冷服之冬月略温亦可服了用乾物壓下如服不盡留次日漸漸服之亦可服藥至天明當下黑糞水即是腎家所感寒濕之毒氣也至早飯時必痛住腫消只宜遲喫飯使藥力作效此藥並無所忌

茱萸木瓜湯一八六　治脚氣衝心悶亂不識人手足脉欲絶

吳茱萸半兩　乾木瓜一兩　檳榔二兩

右㕮咀每服八錢水一鍾半生薑五片煎八分不拘時温服

立效散二八七　治脚氣攻心此方消腫甚效及治暴腫

檳榔七枚　生薑二兩　陳皮　吳茱萸

紫蘇　木瓜各一兩

右水三升煎一升分作二服

防己飲一八八　治脚氣　丹溪

白朮　木通　防己　檳榔

川芎　甘草梢　犀角　蒼朮鹽水炒

生地黃　黃栢酒炒等分

右水煎服○大便實加桃仁○小便澁加牛膝○有熱加黃芩黃連○大熱及時令熱加石膏○有痰加竹瀝薑汁

紫蘇散二八九　治脚氣上氣心胸壅悶不得眠卧

蘇葉　桑白皮　赤茯苓　檳榔

木瓜各一兩　炙甘草　紫菀　前胡去蘆

杏仁去皮尖　百合各七錢

右㕮咀每服八錢水一鍾半生薑五片煎八分不拘時温服

紫蘇湯二百九十　治脚氣陰陽交錯上重下虚中滿喘急嘔吐自汗

蘇子炒　半夏製各一錢　前胡　厚朴薑汁炒

甘草炒　歸身各七分　陳皮　肉桂各四分

水一鍾半薑三片煎七分不拘時服

檳榔湯二九一　治一切脚氣散氣快壅

檳榔　香附　陳皮　蘇葉

木瓜　五加皮　甘草炙各七分

右㕮咀水一鍾半生薑三片煎服

加減檳榔湯 二九二 治一切脚氣脚弱名曰壅疾貴在疎通春夏尤宜服之

檳榔 橘紅 蘇葉各一兩 甘草炙半兩

右每服五七錢水一鍾半生薑五片煎八分不拘時溫服○如脚痛不已者加木香五加皮○婦人脚痛加當歸○室女脚痛多是肝血滯實宜加赤芍藥○中滿不食加枳實○痰厥或吐加半夏○腹痛大便不通用此湯下青木香丸或加大黃○小便不利加木通○轉筋者加吳茱萸○脚腫而痛者加大腹皮木瓜○脚痛而熱加地骨皮

檳榔散 二九三 治脚氣衝心煩悶不識人

檳榔 茴香 木香各半兩

右㕮咀每服五錢以童便一鍾煎七分不拘時溫服

活人桑白皮散 二九四 治脚氣盛發上氣喘促兩脚浮腫小便赤澁腹脇脹滿氣急坐臥不得

桑白皮 郁李仁各一兩 赤茯苓二兩 木香

防已 大腹子各一兩半 蘇子 木通

檳榔 青皮各七錢半

右每服三五錢薑三片水煎服

木香散 二九五 治脚氣衝心煩悶喘急下氣滯

木香半兩 檳榔 木通各一兩

右㕮咀每服八錢水一鍾半生薑五片葱白七寸煎八分不拘時溫服

木通散 二九六 治脚氣遍身腫滿喘促煩悶

木通去皮 蘇葉 猪苓各一兩 桑白皮

赤茯苓 檳榔各二兩

右㕮咀每服五七錢水一鍾半生薑五片葱白七寸煎一鍾不拘時溫服

人參桂心散 二九七 治脚氣上逆心煩不能飲食

人參去蘆 赤茯苓 檳榔 麥門冬

橘紅各一兩 桂心七錢半

右㕮咀每用八錢水一鍾半生薑七片煎服

橘皮湯 二九八 治脚氣痰壅嘔逆心胸滿悶不思飲食

橘紅 人參去蘆 蘇葉各一兩

右㕮咀每服八錢水一鍾半生薑五片煎一鍾不拘時溫服

集驗半夏散 二九九 治脚氣煩悶嘔逆心胸壅悶不能飲食

半夏泡七次 桂心各七錢半 赤茯苓 人參去蘆

橘紅　前胡去蘆　檳榔各一兩　蘇葉一兩半

右㕮咀每服五七錢水一鍾半生薑七片淡竹茹二錢煎七分溫服無時

大腹皮散 三百　治諸脚氣浮腫心腹痞悶小便不利

大腹皮一兩　木瓜　蘇子　檳榔

荊芥穗　烏藥　橘紅　蘇葉各一兩

蘿蔔子半兩　沉香　枳殼麩炒　桑白皮各兩半

右㕮咀每服八錢水一鍾半薑五片煎八分溫服○御醫撮要方加木通白茯苓炒茴香炙甘草四味即名沉香大腹皮散

活人大腹子散 三百一　治風毒脚氣肢節煩疼心神壅悶

大腹子　紫蘇　木通　桑白皮

羌活　木瓜　荊芥　赤芍藥

青皮　獨活各一兩　枳殼一兩

右每服四錢水一盞薑五片葱白七寸煎空心溫服

地黃湯 三百二　治穿心脚氣

熟地黃四兩　當歸二兩　芍藥　川芎

牛膝酒浸　三柰各一兩　杜仲去皮薑汁炒

右㕮咀每服一兩水一鍾半煎八分不拘時溫服

木瓜湯 三百三　治脚氣

木瓜　大腹皮　紫蘇　木香

羌活　炙甘草各一錢　茯苓　陳皮各八分

水一鍾半煎八分食前服

沉香湯 三百四　治脚氣攻心悶亂氣促脅疼

沉香　木通　檳榔各五分　吳茱萸三分

赤芍藥半兩　紫蘇錢

水一鍾半生薑三片煎八分不拘時溫服

續斷丸 三百五　治風濕流注四肢浮腫肌肉麻痺

川續斷　當歸　萆薢　附子

防風　天麻各一兩　乳香　沒藥各半兩

川芎七錢半

右為細末煉蜜丸梧子大每服四十丸空心溫酒或米飲下

本事續斷丸 三百六　治肝腎風寒氣弱脚不可踐地脚痛痠疼風毒流注下部行止艱難小便餘瀝此藥補五藏內傷調中益氣涼血强筋骨

杜仲五兩　五加皮　防風　薏仁

羌活　續斷　牛膝酒浸　萆薢四兩

生地黃 一兩

右為末用好酒三升化青鹽一兩用木瓜一斤去皮子以前鹽酒煮成膏和藥為丸梧子大每服五七十丸空心食前溫酒鹽湯任下

保命 牛膝丸 三百七 治腎肝虛損骨痿不能起於牀筋弱不能收持宜益精緩中

牛膝 酒浸 萆薢 杜仲 炒 白蒺藜

防風 兔絲子 酒煮 肉蓯蓉 酒浸 各等分 官桂 減半

右為末酒煮豬腰子搗和丸桐子大每服五七十丸空心溫

酒送下

本事 酒浸牛膝丸 三百八 治腰腳筋骨痠軟無力

牛膝 三兩炙黃 川椒 去合口者 虎骨 真者醋炙黃各一兩 附子 一枚炮去皮臍

右㕮咀用生絹作袋盛藥以好酒一斗春秋浸十日夏七日冬十四日每日空心飲一大盞酒盡出藥為末醋糊丸每服二三十丸空心溫酒鹽湯任下忌動風等物

茱萸丸 三百九 治腳氣入腹喘急欲死

吳茱萸 泡 木瓜 等分

右為末酒糊丸梧子大每服五七十丸至百丸空心酒飲任下○或以木瓜蒸爛研膏丸服尤妙○此方內加大黃名三將軍丸

東垣 健步丸 三百十 治腳膝無力屈伸不得腰背腿腳沉重行步艱難

防己 酒洗一兩 羌活 柴胡 滑石 炒

炙甘草 天花粉 酒洗各五錢 防風 澤瀉 各三錢

苦參 酒洗 川烏 各一錢 肉桂 五分

右為細末酒糊丸桐子大每服七八十丸煎愈風湯空心送下

調元健步丸 三百十一 治陰虛血少濕熱兼行足履無力

當歸 酒洗 川黃柏 鹽酒炒 枸杞 各一兩 牛膝 二兩鹽酒浸

白芍藥 微炒 白茯苓 白朮 炒 蒼朮

陳皮 各一兩 炙甘草 二錢 木瓜 五加皮 各八錢

川續斷 七錢 澤瀉 防己 各五錢

蜜丸桐子大空心鹽湯送下七八十丸或百丸

丹溪 勝駿丸 三百十二 治元氣不足為寒濕之氣所襲腰足攣拳或腳面連指走痛無定筋脈不伸行步不隨常服益真氣壯筋骨

附子炮製　當歸　天麻　牛膝
木香　酸棗仁炒　熟地酒蒸　防風各二兩
木瓜四兩　羌活　乳香各半兩　全蝎炒
甘草炙　沒藥各一兩　麝香二錢
右爲末用生地黄三斤以無灰酒四升煮乾晒二日杵爛如膏入前末和勻杵千餘下每兩作十丸每服一二丸細嚼臨卧酒下作小丸服亦可

神應養真丹 三一三　治厥陰經爲四氣所襲脚膝無力或右癱左瘓半身不遂手足頑麻語言蹇澁氣血凝滯遍身疼痛

當歸酒浸焙　熟地黄酒蒸搗　川芎　芍藥
羌活　天麻　兎絲子酒製　木瓜等分
右爲末入地黄當歸膏加蜜搗丸梧子大每服百丸空心酒下鹽湯亦可

透骨丹 三一四　專治脚氣
川烏炮　羌活　沉香　乳香另研
川芎　檳榔　木瓜各一兩　木香一兩半
白茯苓二兩
右爲末麵糊丸梧子大食前鹽湯下六七十丸

本事虎骨酒 三一五　去風補血益氣壯筋骨强脚力
虎脛骨真者　萆薢　仙靈脾　薏苡仁
牛膝　熟地黄各二兩
右剉細絹袋盛浸酒二斗飲了一盞入一盞可得百日婦人去牛膝

活人薏仁酒 三一六　治脚痺
薏苡仁　牛膝各二兩　海桐皮　五加皮
獨活　防風　杜仲各一兩　熟地黄一兩半
白朮半兩

右爲粗末以生絹袋盛用好酒五升浸春秋冬二七日夏月分作數貼逐貼浸酒用之每日空心溫服一盞或半盞日三四服常令酒氣不絶久服覺皮膚下如有蟲行即風濕氣散

椒艾囊 三一七　治脚氣極效及避一切脚氣風氣受冷
艾葉陳者半斤　川椒一斤淨　草烏二兩爲粗末
右三味和勻用布絮鋪如綿襖樣裝足底及足脛即用火踏下加微火烘踏於上使椒艾之氣徐行於足自然寒濕風氣消氣皆得消散亦能止痛痛止後仍要一二日一爲之或夜卧包之達旦去之用此方法無不效者

丹溪敷脚氣方 三一八 治脚氣腫痛

芥菜子 白芷 等分

右為末薑汁和敷痛處

蕪荑散 三一九 治大人小兒蚘咬心痛不可忍或吐青黄綠水涎沫或吐蟲出發有休止此蚘心痛也宜此主之

蕪荑 雷丸 各半兩 乾漆 搥碎炒大烟盡一兩

右為細末每服三錢用溫水七分鍾調和服不拘時甚者不過三服小兒每服五分

直指蕪荑散 三百二十 取諸蟲

雞心檳榔 蕪荑 各三錢 木香 一錢

右為末作一服先以酸石榴根煎湯伺五更時乃嚼炙肉引蟲頭向上然後以石榴根湯調藥溫服蟲自軟困而下

榧子煎 三二一 治寸白蟲化為水

細榧子 四十九枚去殼

以砂糖水半盞用砂鍋煮乾熟食之每月上旬平日空心服七枚七日服盡蟲化為水 不瘥○一方以百枚食盡佳不能食者盡五十枚經宿蟲消自下非治三蟲神效方也

聖效方 三二二 治寸白蟲神效

檳榔 半兩 南木香 二錢

右為細末每服三錢濃米飲調下須五更空心先嚼炙肉只嚥汁下咽吐其肉隨即服藥已間當蟲下盡去病根此方簡易屢驗

仲景烏梅丸 三二三 治胃寒吐蚘蚘厥等證

烏梅肉 三十個 人參 黄柏 炙 細辛

附子 炮 桂枝 各六錢 黄連 炒一兩 乾薑 一兩

當歸 酒浸 川椒 去目及閉口者各四錢 撮要作各四兩

右研末先將烏梅用酒蒸爛擣膏加煉蜜丸桐子大每服一

二十丸日三服忌生冷滑物或用理中湯下○成無巳曰肺欲收急食酸以收之烏梅之酸以收肺氣脾欲緩急食甘以緩之人參之甘以緩脾氣寒淫於內以辛潤之當歸桂椒細辛之辛以潤內寒寒淫所勝平以辛熱薑附之辛熱以勝寒蚘得甘則動得苦則安黄連黄柏之苦以安蚘

濟生烏梅丸 三二四 治大便下血 方在因陣六十

神授散 三二五 方在因陣二五五

治傳尸勞蟲

寶鑑川楝散 三二六 治諸疝小腸氣

木香 小茴香鹽炒各一兩 川楝子一兩，用巴豆十五粒打破，同炒黃，去巴豆不用

右爲末，空心酒下二錢

荔核散 三二七 治疝氣陰核腫大痛不可忍

大茴香炒 沉香 木香 青鹽

食鹽各一錢 川楝肉 小茴香各二錢 荔枝核十四枚，用新者燒焦裂

右爲細末，每三錢，食前熱酒調服

經驗蒼朮散 三二八 治下元虛損，偏墜，腎莖痛楚

真茅山蒼朮六斤，分六製○一斤用老米泔水浸一日夜○一斤酒浸二日，切片曬乾○一斤用[illegible]青鹽半斤同炒黃色，不用鹽○一斤小茴香四兩同炒黃色，去茴香不用○一斤用大茴香四兩同炒如前○一斤桑椹二斤取汁拌製曬乾

右爲細末，每服三錢，空心酒下

寶鑑天台烏藥散 三二九 治小腸疝氣，牽引臍腹疼痛

烏藥 木香 茴香炒 良薑炒

青皮各半兩 檳榔二個 川楝子十個 巴豆七十粒

右將巴豆微打破，同川楝子加麩炒黑，去麩及巴豆不用，其

餘共爲細末，每服一錢，溫酒下，甚者薑酒下

百選桃仁膏 三百三十 治氣血凝滯，疝氣，膀胱小腸氣痛不可忍

桃仁炒去皮尖 大茴香炒

右等分爲末，每服二錢，蔥白二寸煨熟，蘸藥細嚼，空心熱酒下

局方守效丸 三三一 治癩疝不痛者之要藥

蒼朮 南星 白芷 川芎

山查 半夏 枳實一云橘核

右等分爲末，薑汁糊丸桐子大，每服七八十丸，鹽湯下○有寒加吳茱萸○有熱加山梔子○又或加青皮、荔枝核

來復丹 三三二 治伏暑泄瀉，裏寒外熱，其效如神，及治諸腹痛疝氣，小兒驚風

硝石一兩，同硫黃爲末，入磁碟內，用微火炒，以柳枝攪，結砂子，火不可大，恐傷藥力，再研極細，名二氣末

舶上硫黃一兩 五靈脂澄去砂 橘紅 青皮各一兩，一作各二錢

太陰玄精石各一兩

右爲末，醋糊丸豌豆大，每服三十丸，空心米飲下○伏暑悶亂，紫蘇湯下○大人疝氣諸痛，恐宜服之○小兒驚風欲絕

研碎米湯下
衛生 潤腸湯 三三三 治大便燥結不通
生地黄 生甘草 熟地黄 當歸尾
大黄煨各五錢 桃仁 麻子仁各一錢 紅花
右用水二盞煎一盞空心服。
通幽湯 三三四 治大便燥結堅黑服此
熟地 生地 歸稍 紅花
桃仁泥 大黄各一錢 升麻二分
水一鍾半煎服○古方加麻仁甘草即名潤燥湯

東垣 導滯通幽湯 三三五 治幽門不通氣不升降大便閉塞凡
脾胃初受熱中多有此證治在幽門以辛潤之
升麻稍 桃仁泥 歸身各一錢 炙甘草
紅花各三分 熟地 生地各五分
水二鍾煎一鍾調檳榔末五分稍熱服
河間 厚朴湯 三三六 治大便氣秘不通不能飲食小便清利者
謂之虛秘此湯主之蓋實秘者物也虛秘者氣也
厚朴一錢半 白朮二錢 半夏 枳殼
陳皮 甘草各一錢

水一鍾半生薑三片棗二枚煎八分食遠服○如不通加大黄
一錢
會編 皂角散 三三七 治大小便關格不通經三五日者
大皂角燒存性
右爲末米湯調下○又以豬脂一兩煮熟以汁及脂俱食之
○又宜以八正散加檳榔枳殼朴硝桃仁燈心茶煎服
良方 三仁丸 三三八 治大腸有熱津液竭燥大便澁
柏子仁 松子仁 火麻仁各一兩
右研勻用黄蠟半兩溶化和丸桐子大每服二十丸食前米
飲下未快加數服之

脾約丸 三三九 方在攻陣九三
通人便秘結
東垣 潤腸丸 三四十 治胃中伏火大便秘澁不通不思飲食
及風結血秘皆須潤燥和血疏風則自通矣
歸稍 大黄煨 羌活各五錢 麻仁
桃仁去皮尖各一兩
右以二仁另研爲泥外爲細末煉蜜爲丸桐子大每服三五
十丸空心白湯送下○一方有皂角仁秦艽各五錢

濟生 蓯蓉潤腸丸 三四一 治發汗利小便致亡津液大腑秘結老人虛人宜服

肉蓯蓉 酒浸焙二兩 沉香 一兩另研

右為末取麻子仁搗爛和水取汁打糊丸梧子大每服七八十丸空心米飲或酒送下

益血潤腸丸 二四一 治老人大便秘結

熟地黃 六兩 杏仁 炒去皮尖 麻仁 各三兩以上三味同杵膏

枳殼 麩炒 橘紅 各二兩 肉蓯蓉 酒洗去甲 阿膠 炒各一兩

蘇子 荊芥 各一兩 當歸 三兩

右以後七味為末同前三味膏和杵千餘下仍加煉蜜丸梧子大每服五六十丸空心白湯或酒下

搜風順氣丸 二四二 治痔漏風熱閉結老人燥秘等證

車前子 兩半 大麻子 微炒二錢 大黃 五錢半生半熟 牛膝 酒浸

郁李仁 兔絲子 酒浸 枳殼 山藥 各二錢

右為末煉蜜丸梧子大每服二十丸溫酒下

聖惠 搜風順氣丸 二四四 治風氣腳氣凡老人小兒血熱風熱而大便秘結者宜服

車前子 兩半 大麻仁 微炒去殼 郁李仁 泡去皮 兔絲子 酒浸煮

牛膝 酒浸 乾山藥 各二兩 白檳榔 一兩 枳殼 麩炒

防風 獨活 各八錢 大黃 五錢半生半熟

煉蜜丸小豆大茶酒湯任下早晚各一服

地髓湯 三四五 治死血作淋痛不可忍及五淋小便不通莖中痛甚欲死〇一名牛膝膏又名苦杖散

牛膝不拘多少

或用一兩槌碎以水一鍾煎濃汁一鍾去查日三服〇又法入麝香少許空心服或止以酒煎亦可

牛膝膏 二四六 治死血作淋

桃仁 去皮尖 歸尾 酒洗各一兩 生地黃 酒洗 赤芍藥 各兩半

川芎 五錢 牛膝 去蘆酒浸一宿

右㕮咀用好水十鍾炭火慢煎至二鍾入麝香少許分四次空心服如夏月須用冷水換浸之則不壞

經驗 琥珀散 二四七 治老人虛人小便不通淋澁

琥珀 為末 人參 湯

空心以人參湯調服琥珀末一錢

導赤散 三四八 方在寒門一二二

利小腸熱澁

萬全木通湯 二四九 治小便赤而黃

木通 赤茯苓 車前葉 滑石各二錢

瞿麥一錢

水一鍾半煎七分食前服

葱白湯 二百五十 治小便卒暴不通小腹脹急氣上衝心悶絕欲死此由暴氣乘膀胱或因驚憂氣無所伸衝逆胞系鬱閉不流

陳皮一兩 葵子一兩 葱白三莖

右㕮咀用水五升煮取二升分三服○一云每服五錢葱白

東垣 清肺飲子 二五一 治渴而小便不利邪熱在上焦氣分也

茯苓 猪苓 澤瀉各一錢半 車前子

琥珀 木通 瞿麥 萹蓄各一錢

通草 燈心各五分

水二鍾煎一鍾食遠服

半夏丸 二五二 治濕痰流注白濁神效

半夏製 猪苓等分

右爲末神麯糊丸服○按此方與本草猪苓丸同宜詳閱附

良方 醍醐膏 二五三 治消渴

白砂蜜五斤 砂仁一兩為末 烏梅一斤捶碎用水四大碗煎一碗去查

右入砂鍋慢火熬赤色成膏取下放冷加白檀細末一錢麝香一字攪勻以磁器收貯密封冬月以熱湯調服夏月涼水亦可

無擇 養勞湯 二五四 治五疸虛弱腳軟心悸口淡耳鳴微發寒熱氣急小便白濁當作虛勞治之

人參 黃芪 白朮 當歸

甘草炙 桂心 陳皮各一兩 白芍藥三兩

生地黃 茯苓各五錢 五味子 遠志各二錢

右㕮咀每服一兩水一鍾半薑三片棗三枚煎七分食前服

綱目 綠礬散 二五五 治黃腫

綠礬六兩以米醋入鐵鍋內炒七次乾為度放地上出火氣 海星炒黃色

神麯一兩炒黃色 大皂角一斤鐵鍋水煮爛揉汁去滓入棗肉內熬成膏和藥

紅棗六兩蒸去皮核入皂角汁內熬膏

右前三味為細末以皂角棗膠搗丸如桐子大每服五丸清晨下臥時用鹽湯下夜臥上床時再服五丸忌油膩煎炒如身

上發紅斑急煎棗湯解之自愈

簡易濟衆方二五六　治心氣不寧怔忡驚悸消上膈風熱痰飲

白石英　朱砂等分

右爲細末每服五分金銀湯調下

抱膽丸二五七　治男婦一切癲癇風狂或因驚恐畏怖所致及婦人產後驚氣入心并室女經脈通時驚邪蘊結氣實上盛者累效

水銀二兩　黑鉛一兩半　朱砂細研　乳香細研各一兩

右將黑鉛入銚子內溶化下水銀結成砂子次下朱砂乳香乘熱用柳木槌研勻丸雞頭子大每服一丸空心井花水吞下病者得睡切莫驚動覺來即安再一丸可除根

靈苑辰砂散二五八　治風癇語煩狂言妄走精神恍惚思慮迷亂不歇作哭飲食失常狂發仆地吐沫戴眼魂魄不守

辰砂光明者一兩　棗仁微炒　乳香明者各半兩

右爲細末先令病人隨量恣飲沉醉但勿令吐居靜室中將前藥都作一服用溫酒一盞調勻令頓飲之如量淺者但隨量取醉服藥訖便令安卧病淺者半日至一日病深者例二三兩日只令家人潛伺之候其鼻息勻調切勿喚覺亦不可驚使覺必得其自醒即神魂定矣萬一驚寤則不可復治矣

正肅公少時心病服此一劑五日方寤遂瘥

歸神丹二五九　治五種諸風痰癲驚悸神不守舍

人參　當歸　棗仁　白茯苓各二兩

朱砂人塊者　琥珀　遠志甘草湯浸　龍齒各一兩

金箔　銀箔各二十片

右爲末酒糊丸桐子大每服三五十丸麥門冬湯下

寧志丸二百六十　治心風癲癇服此一料其病頓減

朱砂一兩光者　人參　白茯苓　當歸

石菖蒲　乳香另研　棗仁去皮取仁炒香熟各半兩

右將朱砂用熟絹一小片包裹線紮用獖猪心一枚竹刀切開紙拭去血入朱砂包定內用線縛外以竹箬重裹麻皮紮緊用無灰酒二升同入砂銚煮酒盡取出朱砂另研將猪心用竹刀細切砂盆內研爛拌入藥末再加煮熟淨棗肉四兩搗丸桐子大留少朱砂爲衣每服五七十丸人參湯下

人參琥珀丸二百六十一　治癲癇

人參　琥珀另研　茯神　白茯苓

石菖蒲小者　遠志酒浸各半兩　乳香另研　朱砂水飛

棗仁温酒浸半日去殼紙上炒香各一錢半

右為末煉蜜丸桐子大每服一五十丸食後温酒送下日再服如不能飲者棗湯下此可常服

集驗秘方半夏丸 六一 治心風癲狂○張德明傳其内人失心狂數年服此藥而愈後再作服人參湯下丸而安

半夏（[illegible]） 麝香一錢研

水銀半兩 生薄荷一大握用水銀研如泥

右藥同薄荷泥更研千百下丸如芥子大每服十五丸金銀湯臨臥服一日再服

神應丹 二六二 治諸癇

辰砂佳者不拘多少

右研細豬心血和勻以蒸餅裹劑蒸熟就熱取出丸桐子大每服一丸人參湯下食後臨卧服

楊氏五癇神應丸 二六四 治癲癇潮發不問新久

白附子泡半兩 半夏湯洗二兩 南星 烏蛇酒浸

白礬生各一兩 全蝎炒二錢 蜈蚣半條 白殭蠶炒一兩半

麝香三字另研 皂角二兩捶碎用水半升揉汁去滓同白礬一處熬乾為度研

硃砂飛一錢半

右為細末生薑汁煮麪糊為丸桐子大每服三十丸生薑湯食後送下

局方牛黃清心丸 三六五 治心志不定神氣不寧驚恐癲狂語言謬妄虛煩少睡甚至棄衣登高踰垣上屋或小兒風痰上壅抽搐發熱或急慢驚風發搐目反口噤燥渴等證

白朮 麥門冬 黃芩各一兩 人參

神麴 蒲黃炒各二兩半 山藥七兩 炙甘草五兩

杏仁去皮尖雙仁炒黃另研 桔梗各一兩二錢 大豆黃卷炒 當歸

肉桂各一兩七錢 阿膠 白斂各七錢 白茯苓一兩二錢

川芎 防風 麝香 冰片各五錢

羚羊角一兩 犀角各二兩 雄黃八錢飛 乾薑炮七錢

大棗百枚蒸熟去皮研膏 金箔一千四百片內四百片為衣

右另研為末煉蜜與棗膏為丸每兩作十丸用金箔為衣每服一丸溫水化下

經驗牛黃丸 三六六 治癲狂風癇心風神不守舍時發無常仆地吐涎不自知覺

牛黃 珍珠 麝香各五分 朱砂

龍齒各另研 雄黃 琥珀各二錢 天門冬去心

麥門冬去心 人參 茯苓各八錢 水銀五分
防風 黃芩 知母 龍膽草
石菖蒲 白芍藥 全蝎 甘草各五錢
蜂房三錢 金箔 銀箔各七十片
右爲細末其和勻煉蜜和擣千杵丸如梧桐子大每服十五
丸食後臨卧新竹葉湯下

萬氏牛黃清心丸 三六七 方在小兒九四
治心熱神昏

錢氏牛黃丸 一六八 方在小兒九一
治小兒痰涎風癇

[集]著牛黃丸 三六九 方在小兒九三
治小兒驚癇痰涎壅盛

二味牛黃丸 三百七十 方在小兒九五
治小兒驚熱疳積

蘇合香丸 二七一 治中氣或卒暴氣逆心痛鬼魅惡氣等證
麝香 沉香 丁香 白檀香
香附 華撥 白朮 訶子煨去皮
硃砂水飛 青木香 烏犀角各二兩 [蓽]薩香
龍腦各一兩 安息香一兩另爲末用無灰酒一升熬膏
蘇合油二兩入安息香膏內
右爲細末用安息香膏煉蜜每兩作十丸熔黃蠟包裹爲[illegible]
每用溫水化服一丸或丸如梧桐子大每服四五丸

龍腦雞蘇丸 七二 治上焦之火除煩解勞安吐血衄血淸
五臟虛煩神志不定上而消渴淋漓下而血滯五淋血
崩等疾
麥冬四兩 甘草一兩半 龍腦薄荷葉一斤
阿膠炒 人參各二兩 黃芪炙一兩 生地六兩另爲末
木通 銀柴胡各二兩用滾湯浸一日夜絞取汁
右用好白蜜二斤先煎一兩沸却入地黃末不住手攪徐加
木通柴胡汁慢火熬成膏然後加前諸藥末和丸如豌豆大
每服二十丸隨證用引送下○如室女虛勞寒熱潮作用人
參柴胡湯下○一方如前有黃連一兩

九還金液丹 三七三 方在小兒八八
治男婦小兒中風驚風痰盛氣急

良方香橘湯 一七四 治七情內傷胸悶不快腹脹疼痛
香附炒 半夏製 橘紅各二錢 甘草炙一錢

水一鍾半生薑五片紅棗二枚煎八分食遠服

局方 分氣紫蘇飲 七十五 治腹脇疼痛氣促喘息

蘇葉 桔梗 桑白皮 草果仁

大腹皮 白茯苓 陳皮 炙甘草各一錢半

水一鍾半薑三片入鹽少許煎八分食前服

本事 枳實散 七十六 治男子兩脇疼痛

枳實一兩 白芍藥炒 雀腦芎 人參各半兩

右為細末薑棗湯調服二錢酒亦可食前日二服

濟生 推氣散 七十七 治右脇疼痛脹滿不食

片薑黃 枳殼麩炒 桂心各五錢 甘草炙二錢

右為細末每服二錢薑棗湯食遠調服

白朮丸 七十八 治息積病脇下滿悶喘息不安呼吸引痛不可鍼灸宜導引服此藥

白朮炒 枳實麩炒 官桂各一兩 人參二兩

陳皮 桔梗微炒 炙甘草各一兩

右為細末煉蜜丸如梧子大每服五七十丸不拘時溫酒送下日三服

景岳全書五十四卷終

景岳全書卷之五十五字集 古方八陣

會稽 張介賓 會卿著

瀛海 賈棠 青南訂

攻陣

仲景 大承氣湯 一 治陽明太陰傷寒譫語五六日不大便腹滿煩渴並少陰舌乾口燥潮熱脈實者○劉河間加甘草名三一承氣湯

大黃四兩 厚朴半斤 枳實五枚 芒硝三合

右以水一斗先煮厚朴二物取五升去滓內大黃煑取二升去滓內芒硝更上火微一兩沸分溫再服得下餘勿服

仲景 小承氣湯 二 治病在太陰無表證汗後潮熱狂言腹脹脈實六七日不大便喘滿者

即前大承氣湯減去芒硝

仲景 調胃承氣湯 三 治太陽陽明不惡寒反惡熱大便秘結日晡潮熱者○凡陽明病有一證右經者當解肌入腑者當攻下

大黃 芒硝 甘草各五錢此從近法

每服三五錢水一大盞煎七分溫服

仲景桃仁承氣湯 四　治傷寒蓄血小腹急大便黑而不通

桃仁十二枚去皮尖　官桂　甘草各一錢　芒硝一錢

大黃半兩或一兩此從近法

右㕮咀作一服或分二服水一大盞煎七分溫服

良方桃仁承氣湯 五　治瘀血小腹作痛大便不利或譫語口乾漱水不咽遍身黃色小便自利或血結胸中可近或寒熱昏迷其人如狂

桃仁半兩去皮尖　大黃炒一兩　甘草二錢　肉桂一錢

右薑水煎發日五更服

當歸承氣湯 六　治燥熱裏熱火鬱為病或皮膚枯燥或咽乾鼻乾或便溺結閟宜此方

當歸　大黃各四錢　甘草　芒硝各二錢

右㕮咀入薑煎服

仲景大柴胡湯 七　表證未除裏證又急汗下兼行用此

柴胡半斤　半夏半升　黃芩　芍藥各三兩

生薑五兩切　枳實四枚　大黃二兩　大棗十二枚劈

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎溫服一升日三服

劉氏六一順氣湯 八　以代大小承氣大柴胡大陷胸等湯之神藥也○此湯治傷寒熱邪傳裏大便結實口燥咽乾怕熱譫語揚衣狂走斑黃陽厥潮熱自汗胸腹滿硬臍腹疼痛等證效不盡述

大黃　枳實　黃芩　厚朴

柴胡　甘草　芍藥　芒硝

水煎假欲峻者大黃後入○凡傷寒過經及老弱或血氣兩虛之人或婦人產後有下證或有下後不解或表證尚未除而裏證又急不得不下者用此湯去芒硝下之則吉蓋恐硝性峻急故有此戒經云轉藥孰緊有芒硝者緊也今之醫不分當急下可少與宜微和胃氣之論一槩用大黃芒硝等投湯劑下之因致死者多矣○仲景云湯滌傷寒熱積皆用湯液切禁丸藥不可不知也

仲景大陷胸湯　治大結胸手不可按

大黃四錢　芒硝一錢　甘遂末三分此從近數

用水一鍾半先煎大黃至一鍾內芒硝煎一二沸去柤內甘遂末和勻服得利則止○此藥極峻必不得已而用之○原

方用大黃六兩芒硝一升甘遂末一錢水六升如前法煮〇二
升分二服得快利止後服

小陷胸湯十　方在寒陣十六

治小結胸正在心下按之則痛脉浮滑者

河間大黃湯十一　治瀉痢濕熱邪盛膿血稠黏裏急後重日夜
無度者

大黃一兩

右細剉好酒二大盞浸半日煎至一盞半去大黃分二服頓
服之痢止一服如未止再服以痢爲度服芍藥湯以和之痢
止再服黃芩湯和之以徹其毒

外科大黃湯十二　方在外科一六七

治腸癰小腹堅腫

金匱大黃甘草湯十三　治食已即吐〇按此湯必下焦閉實大
便秘結不通而格拒吐食者方可用之若因胃虛而食已即
吐者此則大非所宜用者不可誤認

大黃四兩　甘草一兩

右二味以水三升煮取一升分溫再服

金匱大黃硝石湯十四　治黃疸腹滿小便不利而赤自汗出表

和裏實者宜用之

大黃　黃栢　硝石各四兩　梔子十五枚

右四味以水六升煮取二升去滓內硝更煮取一升頓服

金匱梔子大黃湯十五　治酒疸心中懊憹或熱痛

梔子十四枚　大黃一兩　枳實五枚　豉一升

右用水六升煮取二升分溫三服

河間防風通聖散十六　治諸風潮搐手足瘛瘲小兒急驚便結
邪熱暴甚肌肉蠕動一切風熱瘡痢等疾

防風　川芎　當歸　芍藥

麻黃　連翹　薄荷葉　大黃

芒硝各五錢　石膏　黃芩　桔梗各一兩

滑石三兩　甘草二兩　荊芥　白朮

梔子各二錢半

右爲末每服二錢水一大鍾生薑三片煎六七分溫服〇澀
燥方各五分用水一鍾煎服〇痰嗽加半夏〇內熱加大黃
二錢〇破傷風加羌活全蝎各五分〇此方[illegible]
無芒硝者[illegible]

粘子甘草

雙解散 十七 方在痘疹四

治痘疹表裏俱實

牛黃雙解散 十八 方在外科二百九

治便濇熱壅及大小便秘

局方 涼膈散 十九 瀉上焦六經諸火

大黃 樸硝 甘草各一錢 連翹二錢

梔子 黃芩 薄荷各五分

水一鍾半加竹葉七片煎八分入蜜一匙和勻服

東垣 涼膈散 二十 方在痘疹八二

除痘疹內熱良方

海藏 黃龍湯 二十一 治熱邪傳裏胃有燥糞結實心下硬痛而下利純清水身熱譫語發渴此非內寒而利乃因湯藥而利也名曰熱結利證宜急下之身無熱者宜用此湯身有熱者宜六一順氣湯蓋有不識此證者但呼為漏底傷寒而用熱藥止之者是猶抱薪救火也誤人多矣

大黃 芒硝各一錢 枳實 厚朴

甘草 人參 當歸

水一鍾半生薑三片棗二枚煎服

良方 黃龍湯 二二 方在婦人八五

治妊婦感冒風寒熱入胞宮寒熱如瘧

錢氏 黃龍湯 二三 方在小兒一五

治小兒感冒發熱或寒熱往來

子和 玉燭散 二四 治血虛有滯或婦人經候不通腹脹作痛○此四物湯對調胃承氣湯也

當歸 川芎 芍藥 地黃

大黃 芒硝 甘草各等分

右㕮咀水煎服○甚者倍用大黃

四順清涼飲子 二五 治大人小兒血脈壅實臟腑生熱面赤煩渴睡臥不寧大便秘結

大黃 當歸 芍藥 甘草各等分

右㕮咀水煎服

元戎 四物湯 二六 治臟結秘澀

當歸 熟地黃 川芎 白芍藥

大黃煨 桃仁各等分

右用水煎或丸服亦可

仲景 抵當湯 二七 治傷寒熱在下焦少腹硬滿其人發狂小便

自利者，下血乃愈，以太陽隨經瘀熱在裏故也

水蛭三十熬 蝱蟲二十個熬去翅足 桃仁二十個去皮尖 大黃三兩酒浸

右四味為末，以水五升，煮取三升〇又抵當丸亦即此四味

仲景 十棗湯 二八 治懸飲內痛

芫花 醋拌經宿炒微黑勿焦

大戟 長流水煮半時晒乾

甘遂 麵裹煨 各等分

右為細末，先以水一鍾半煮大棗十枚至八分，去渣納藥末

強人一錢，弱人五分，平旦服之，不下，更加五分，次下，徐以糜

粥補之

潔古 三化湯 二九 治中風外有六經之形證，先以續命湯主之

內有便溺之阻格，此方主之

厚樸薑製 大黃 枳實 羌活 各等分

右㕮咀，每服一兩，水煎服，微利則止

選要 透膈湯 三十 治脾胃不和，中脘氣滯，胸膈滿悶，噎塞不通

脇肋脹痛，痰涎嘔逆，飲食不下

木香 白豆蔻 砂仁 檳榔

枳殼麩炒 厚樸薑汁炒 半夏製 青皮

橘紅 甘草 大黃 樸硝 各一錢

水一鍾半，薑三片，紅棗一枚，煎八分，食遠服

金匱 茵陳蒿湯 三一 治傷寒發黃及溫病發熱不食，大小便秘

或食即頭眩，足為穀疸

茵陳一錢 大黃四錢 山梔一錢

右作二服，每服水二鍾，煎八分，食遠溫服

河間 芍藥湯 三二 下血調氣。經曰：溲而便膿血，氣行而血止，行

血則便自愈，調氣則後重除

芍藥一兩 當歸 黃連 各五錢 木香

甘草炙 檳榔 各二錢 大黃三錢 官桂一錢半

黃芩五錢

右㕮咀，每服半兩，水二盞，煎一盞，食後溫服。如血痢則漸加大

黃，如汗後臟毒，加黃柏半兩，依前服。○愚按此湯乃河間之

心方，然惟真有實熱者可用，若假熱假實者，誤服則死

枳實大黃湯 三三 治[illegible]腳氣

羌活一錢半 當歸一錢 枳實五分 大黃酒煨一錢

水一鍾半，煎八分，食前溫服，以利為度

羌活導滯湯 三四 治風濕實滯腳氣

羌活　獨活各半兩　防已　當歸各三錢
枳實麩炒二錢　大黃酒煨兩
右每服五七錢水一鍾半煎至七分温服量虛實加減微利
則已
牛黃瀉心湯 三五　治心經實熱狂言妄語神志不安
牛黃另研一兩　冰片另研一分　朱砂另研二錢　大黃生一兩
右為細末和勻每服一二錢冷薑湯或新水調下
宣明三稜散 三六　治積聚癥瘕痃癖不散堅滿痞悶食不下
三稜　白朮炒各二兩　蓬朮　當歸各五錢

木香　檳榔各一錢
右為末每服二錢沸湯調下
三稜丸 三七　治血癥血瘕食積痰滯
蒼朮米泔浸炒　三稜醋浸各四兩　青皮　麥芽炒
半夏各一兩
右共用好醋一鍾煮乾焙乾為末麵糊丸如梧桐子大每服四十丸
淡醋湯下痰積薑湯下
三聖膏 三八　貼積聚癥塊
石灰十兩　官桂五錢為末　大黃一兩為末

右將石灰細篩過炒紅急用好醋熬成膏入大黃官桂末攪
勻以磁器收貯用白紙或柿漆紙攤貼患處火烘熨之
良方桃仁煎 三九　治血瘕
桃仁　大黃炒各一兩　虻蟲炒黑五錢　朴硝一兩
右為末以醇醋一鍾磁器中煮三分下前三味不住手攪煎
至可丸乃下朴硝丸如梧桐子大不吃晚食五更初温酒下五
丸日午下穢物如未見再服仍以調氣血藥補之○立齋曰
向在毗陵一婦人小便不通臍腹脹甚予診之曰此血瘕也
用前藥一服腹痛下瘀血血水卽愈此藥猛烈大峻氣血虛

者斟酌與之
川山甲散 四十　治癥痞瘀血心腹作痛
川山甲炒焦　鱉甲醋炙　赤芍藥　大黃炒
乾漆炒烟盡　桂心各一兩　川芎　芫花醋炒
歸尾各半兩　麝香一錢
右為末每服一錢酒調下
子和禹功散 四一　瀉水之劑
黑丑頭末四兩　茴香炒一兩　或加木香一兩
右為細末以生薑自然汁調一二錢臨臥服

和劑濟川散 四二 治一切痰飲十種水氣
甘遂麪裹煨 芒硝各二錢 郁李仁一錢 大黃
牽牛末各三錢
右為末滴水丸桐子大每服五十丸溫水下
稀涎散 四三 吐頑痰
牙皂炙去皮弦一錢 藜蘆五分
右為細末每服五分或一二錢漿水調下牙關不開者灌之
大異香散 四四 治積聚脹痛
三稜 蓬朮 青皮 陳皮
枳殼炒 藿香 香附 半夏麴
桔梗 益智各一錢半 炙甘草五分
右分二貼水二鍾薑三片棗一枚煎七分食遠服
經驗䟽金丸 四五 治一切火痰怪逆等證
白石膏微煅研細 大黃錦紋者俱酒浸日晒九蒸各一兩 黃芩同上
橘紅各兩半 連翹 川芎 桔梗
貝母各一兩 膽星 蘇州薄荷 香附各五錢
右為極細末煉蜜丸彈子大午後臨臥細嚼一丸忌酒麪炙煿濕熱物○按此方當去川芎大便效必更速

和劑通經散 四六 治婦人氣逆血閉
陳皮去白 當歸各一兩 甘遂以麪包勿令透水煮百沸取出用冷水浸過去麪焙乾一兩
右為細末每服三錢溫湯調下臨臥服
外臺苦楝湯 四七 治蚘虫
苦楝根東引不出土者刮去皮土取內白皮二兩水三碗煎一碗半去租以晚米三合煮糜粥空心先以炙肉一片嚼之引虫向上次吃藥粥一二口少頃又吃漸漸加至一碗其虫下盡而愈
宣明三花神祐丸 四八 治一切沉積痰飲變生諸病或氣血壅滿濕熱鬱結走注疼痛風痰脹滿等證○子和神祐丸用黑丑一兩無輕粉
黑丑取頭末二兩 大黃一兩 芫花醋浸炒 大戟醋浸炒
甘遂各五錢麪裹煨 輕粉一錢
右為細末滴水為丸小豆大初服五丸每服加五丸溫水下日三服以快利為度欲速下者宜八丸十丸或百餘丸○凡痞滿甚者以痰涎壅塞驟攻不開則轉加痛悶須漸進之初服止三丸每加二丸至快利即止

木香檳榔丸四九 殺下諸蟲

檳榔一兩 木香 鶴虱 貫衆

錫灰 乾漆燒烟盡 史君子各五錢 輕粉一錢

雷丸 巴豆仁各二錢半

麪糊丸麻子大每服二十丸五更粥飲下或煎苦楝石榴湯下

寶鑑木香檳榔丸五十 治一切氣滯心腹痞滿脇肋脹悶大小便澁秘不通

木香 檳榔 青皮去瓤 陳皮去白

枳殼麩炒 蓬朮煨切 黃連各一兩 黃柏去皮

香附炒 大黃炒各三兩 黑丑取頭末四兩

滴水為丸豌豆大每服三五十丸食遠薑湯送下以微利為度

遇仙丹五一 追蟲逐積消癖利痰萬病可除

黑丑頭末 檳榔各一斤 大黃半斤 三稜

莪朮醋炒各 木香二兩

右為末用大皂角去子打碎煎濃湯去滓煮麪糊為丸桐子大每服四五十丸以強弱為加減五更茶清下如不通再飲溫茶助之下蟲積惡物盡了白粥補之

備急丸五二 治胃中停滯寒冷之物心腹作痛如錐及脹滿下氣並卒暴百病中惡客忤口禁卒死皆治之○易老名獨行丸○脾胃論名備急大黃丸

巴霜 大黃 乾薑俱為末

右等分和勻煉蜜丸石臼內杵千餘下如泥丸如小豆大夜臥用溫水下一丸氣實者加一二丸如卒病不計時候服如卒死口禁亦斡口折齒灌之○司空裴秀亦作散用用其急也○孕婦忌用

和劑神保丸五三 治心膈痛腹痛血痛腎氣脇下痛大便不通氣噎宿食不消

木香 胡椒各二錢半 乾蝎七枚 巴豆十粒去皮心研

右為末湯浸蒸餅丸麻子大朱砂三錢為衣每服五丸用柿蒂湯或薑湯茶湯或木香等湯隨宜送下

寶鑑感應丸五四 治宿食積滯腹痛脇肋脹悶痰痛吐瀉

南木香 肉豆蔻 丁香各兩半 乾薑炮一兩

巴霜七十粒 百草霜二兩 杏仁一百四十粒去皮尖研

右先將前四味為末後入三味同研勻外用好黃蠟六兩溶

化以絹濾淨更用好酒一升於銀石器內煮蠟數沸傾出其蠟白淨聽用○凡春夏修合先用香油一兩銚內熬令香熟次下酒蠟四兩同化成汁就銚內乘熱拌和前藥成劑分作小鋌油紙裹旋旋丸服之○若秋冬須用香油一兩伍錢每服二十丸空心鹽湯下

大金花丸 五五 治中外諸熱淋秘溺血嗽血衄血頭痛骨蒸欬嗽肺痿

黃連　黃芩　黃栢　梔子

大黃各等分

右為細末滴水丸小豆大每服二三十丸涼水茶湯任下○本方去大黃倍加梔子名梔子金花丸

千金大硝石丸 五六 治痞積

硝石六兩　大黃八兩另研　人參　甘草各二兩

右為細末用好陳醋三升以磁器微火熬丸每入醋一升先入大黃不住手攪使微沸盡一刻又入一升再熬微乾又下一升並下餘藥再熬使可丸如鷄子黃大每服一丸白湯化下或丸如梧子大每服三五十丸服後當下如鷄肝或如米泔赤黑等物乃效下後忌風冷宜軟粥將息

東垣枳朮導滯丸 五七 治傷濕熱之物不得旋化而作痞滿悶亂不安

黃芩　茯苓　白朮　黃連各三錢

枳實麩炒　神麯炒各五錢　澤瀉二錢　大黃煨一兩

右為末湯浸蒸餅為丸食遠白湯下五十丸

秘方化滯丸 五八 理諸氣化滯積奪造化有通塞之功調陰陽有補瀉之妙久堅沉痼者磨之自消暴積留者導之自去○此與綿山房感應丸畧同但彼方猶有沉香檀香砂仁香附四味

南木香　丁香　青皮　橘紅

黃連各二錢半　莪朮煨　三稜各五錢　半夏麯三錢

上八味共為細末

巴豆　去殼滚湯泡去心膜用好醋浸少頃慢火熬至醋乾用六錢研細入前藥又研勻再入後烏梅膏巴豆若乾止用四錢伍分

烏梅肉　焙乾為末用五錢以米醋調畧清慢火熬成膏和入前藥

右和勻用白麪八錢調厚糊為丸蘿蔔子大每服五七丸壯

人下丸五更空心用陳皮湯下○不欲通者以津下○知所
積物取本汁冷下○停食飽悶枳殼湯下○因食吐不止以
津嚥下即止○婦人血氣痛當歸湯下○赤冷痢甘草湯下
○白痢冷乾薑湯下○心痛石菖蒲湯下○諸氣痛生薑陳
皮湯下○腸氣茴香酒下○若欲推蕩積滯枳殼湯下仍加
數丸未利再服利多不止飲冷水一二口即止此藥得熱即
行得冷即止小兒疳積量大小飲湯下妊娠勿服

化鐵丹歌五九

八麝十六豆　一豆管二椒　青陳各半兩
丁木不相饒　將來研作末　醋打麪糊調
丸如黍米大　日頭要堅牢　五分或三分
溫酒或兒當　任意作引下　是鐵也能消

陳米丸六十　治積聚去米麪五穀等積

陳倉米一兩　用新巴豆五枚去殼同米慢火炒巴豆焦
色去豆不用
陳皮　三稜煨　砂仁　麥芽各二錢
南木香一錢

右爲末醋糊丸綠豆大每服十五丸至二十丸食遠薑湯下

局方溫白丸六十一　治心腹積聚癥癖塊大如杯碗脇肋脹滿
嘔吐心下堅結傍攻兩脇如有所礙及一切諸風身體頑麻
三十六種遁尸疰忤十種水病痞塞心痛腹中一切諸疾但
服此藥無不除愈

川烏製一兩　皂角炙去皮弦　吳茱萸湯泡一宿炒　石菖蒲
柴胡　桔梗炒去蘆　厚樸薑汁製　紫菀
人參　黃連去鬚　茯苓　乾薑炮
肉桂　川椒去目炒　巴霜各五錢另研

右爲末入巴豆研勻蜜丸梧子大每服三丸薑湯下○按此
方與海藏萬病紫菀丸大同但彼多羌活獨活防風三味此
用巴霜二錢而群藥更倍隨證用引送下與此爲稍異也

潔古治法　肝積肥氣溫白丸加柴胡川芎○心積伏梁溫
白丸加菖蒲黃連桃仁○脾積痞氣溫白丸加吳茱萸乾薑
○肺積息奔溫白丸加人參紫菀○腎積奔豚溫白丸加丁
香茯苓遠志

陳氏溫白丸六二　方在小兒九十
驅風豁痰定驚

丹溪阿魏丸六三　治內積

阿魏醋浸作糊　楂子各一兩　黃連六錢　連翹五錢

右爲末阿魏糊丸桐子大每服二三十丸白湯送下

醫林阿魏丸 六四 治諸般積聚癥瘕痞塊
山查肉 南星皂角水浸 半夏 麥芽炒
神麯炒 黃連各一兩 連翹 阿魏醋浸
瓜蔞仁 貝母各五錢 風化硝 石鹼
蘿蔔子炒 胡黃連各一錢半
右為末薑湯浸蒸餅為丸桐子大每服五十丸食遠薑湯下
守病丸 六五
此藥名為守病 硃砂加上雄黃
硇砂輕粉要相當 去皮巴霜半兩

硇砂合濟有功 乳香五錢隨良
蠶丸一粒放毫光 取下多年積脹
局方勝紅丸 六六 治脾積氣滞胸膈滿悶氣促不安嘔吐清水
丈夫酒積婦人脾血積小兒食積並治
三稜 蓬朮各醋煮 青皮 陳皮
乾薑 良薑各一兩 香附炒一兩
右為末醋糊丸桐子大每服三四十丸薑湯下
御院助氣丸 六七 治三焦痞塞胸膈滿悶氣不流通蘊結成積
痃癖氣塊並皆治之

三稜炮 莪朮炮各二兩 青皮 橘紅
白朮各五錢 木香 檳榔 枳殼各三錢
右為末糊丸桐子大每服五十丸米湯下
試效方三黃丸 六八 治三焦積熱咽喉腫閉心膈煩燥小便赤澁
大便秘結
黃芩 黃連 大黃各等分
為末蜜丸桐子大每服四五十丸白湯送下或淡鹽湯亦可○
此方為湯即名瀉心湯
東垣雄黃聖餅子 六九 治一切酒食傷脾積聚滿悶等證
巴豆百枚去皮油 雄黃半兩 白麪十兩炒羅過

右二味為細末同麪和勻用新汲水攪和作餅如手大以水
煮之候浮於湯上看硬軟捏作小餅子每服五七餅加至十
餅十五餅嚼食一餅利一行二餅利二行食前茶酒任下
河間舟車丸 七十 治一切水濕蠱脹氣欲喘積氣血壅滿不得
宣通風熱鬱痞走注疼痛及婦人血逆氣滞等證
黑丑頭末四兩 甘遂麵裹煨 芫花 大戟俱醋炒各一兩
大黃二兩 青皮 陳皮 木香
檳榔各五錢 輕粉一錢 取虫加蕪荑半兩

右爲末水糊丸如小豆大空心溫水下初服五丸日三服以快利爲度服法如前三花神祐丸

子和導水丸七一

大黃 黃芩各二兩 滑石 黑丑頭末各四兩

加法 甘遂一兩去濕熱腹痛泄水濕腫滿久病則加○白芥子一兩去遍身走注疼痛宜加○蓬朮一兩退熱散腫毒止痛久毒宜加○郁李仁一兩散結滯通關節潤腸胃行滯氣通血脈宜加○樗根白皮一兩去腰腿沉重宜加

右爲細末滴水丸梧子大每服五十丸或加至百丸臨臥溫

水下

子和神芎丸七二 治心經積熱風痰壅滯頭目赤腫瘡瘍咽痛潤腸不利大小便秘一切風熱等證

大黃生 黃芩各二兩 黑丑頭末 滑石各四兩

黃連 川芎 薄荷葉各半兩

滴水丸桐子大每服五十丸食後溫水下○局方無黃連

丹溪小胃丹七三 上可去胸膈之痰下可利腸胃之痰

芫花醋拌炒 大戟 甘遂麵裹煨各半兩 大黃酒拌蒸一兩半

黃柏炒二兩

右爲細末粥丸麻子大每服一二十丸溫水下

清氣化痰丸七四

南星 半夏各八兩用皂角白礬生薑各二兩水十碗煮至五碗取湯浸星夏一日煮至無白點爲度曬乾聽用

橘紅 貝母各二兩 木香 沉香各半兩

蒼朮米泔浸炒四兩

右爲末曲汁糊丸淡鹽湯白湯任下

[illegible]清氣化痰丸七五 治上焦痰火壅盛咳嗽煩熱口渴胸中痞滿

南星製三兩 半夏製 黃連 黃芩各五兩

瓜蔞仁 杏仁去皮尖 茯苓各四兩 枳實炒

陳皮各六兩 甘草

右爲細末薑汁煮糊丸梧子大每服五十丸薑湯下

法製清氣化痰丸七六 順氣快脾化痰消食

南星去皮 半夏各四兩 用皂角白礬乾薑各四兩入水五碗煎至三碗却入南星半夏浸二日再煮至星夏無白點爲度曬乾加後藥

陳皮　青皮　蘇子炒　神麴炒
麥芽炒　蘿蔔子炒另研　杏仁去皮尖炒　葛根
山查　香附各二兩
右為末湯泡蒸餅丸梧子大每服五七十丸臨臥食後茶湯
下
礞石滾痰丸七七　治一切溼熱食積等疾兼實老痰○一方礞
石止用五錢外加白礬煎五錢乃能收斂則牙痰凝聚於一
處然後兩下所以其效
礞石硝煅金色一兩　大黃酒蒸　黃芩去朽者各半斤　沉香五錢

右為細末滴水為丸梧子大每服三五十丸量人强弱加減
○凡服滾痰丸之法必須臨臥就床用熟水一口許只送過
咽即便仰臥令藥徐徐而下服後須多半日勿飲食起坐必
使藥氣除逐上焦痰滯惡物過膈入腹然後動作方能中病
或病甚者須連進二三次或壯人病實者須多至百丸多服
無妨
朱砂滾涎丸七八　治五癇
朱砂　白礬生　硝石　赤石脂等分
右為細末研蒜膏為丸綠豆大每服三五十丸食後荊芥湯

下
竹瀝青礞石丸七九　消食積去濕痰重在風化硝
南星二兩切片用白礬末五錢水浸一日晒乾　半夏二兩湯泡切片以皂角水浸一日晒乾　黃芩薑汁炒　茯苓　枳實炒各一兩
礞石二兩煅研如粉以焰硝一兩同入小砂罐內瓦片蓋之鐵線縛定鹽泥固濟晒乾火煅紅候冷取出
法製硝同萊菔水煮化去萊菔綿濾令結復入臘月牛膽內風化之或只用風化硝一兩
右為末神麴糊丸梧子大每服三五十丸白湯下
又方
半夏二兩　白朮　礞石各一兩　黃芩五錢
茯苓　陳皮各七錢半　風化硝二錢

右為末丸同前
節齋化痰丸八十　潤燥開鬱降火消痰治老痰鬱痰結成粘塊凝滯喉間肺氣不清或吐咯難出皆因火邪炎上凝滯於心肺之分俱宜開鬱降火消痰緩而治之庶可效耳
天門冬去心　黃芩酒炒　海粉另研　瓜蔞仁另研
橘紅各一兩　連翹　香附淡鹽水浸炒　桔梗各五錢
青黛另研　芒硝另研各一錢
右為細末煉蜜入薑汁少許搗丸龍眼大噙嚥一丸清湯送

下或丸如綠豆大淡薑湯送下五六十丸○此等老痰大約飲酒人多有之酒氣上升為肺與胃脘皆受火邪故結而成痰此方天冬黃芩瀉肺火海石芒硝鹹以軟堅瓜蔞潤肺消痰香附連翹開鬱降火青黛去鬱火故不用辛燥等藥

醫林 辰砂化痰丸 八十一 治風化痰安神定志止嗽除煩

辰砂另研 明礬枯各半兩 南星炮一兩 半夏麴三兩

右為細末薑汁糊丸梧子大硃砂為衣每服二十丸食後薑湯下

控涎丹 八二 凡人忽患胸背手足腰胯疼痛牽引鉤痛時時走易不定不可忍者或手足冷痺氣脈不通是皆痰涎在心膈上下故為此證

甘遂去心 紫大戟去皮 白芥子真者各等分

右為末糊丸梧子大臨臥淡薑湯或溫水下五七丸至十丸痰猛者加之

醫林 烏巴丸 八三 治胸膈久為痰飲所害面色青白浮腫不思飲食遍身疼痛夜間氣喘不得睡往來寒熱手足冷痛不得轉側屢用痰藥吐之不下取之不出此是頑痰堅滯宜此藥利下之氣急不利再服

烏梅肉二兩 巴霜五錢去油

右用水二碗砂鍋內將烏梅肉煮爛候水稍乾入巴豆霜竹片攪如稠糊取出搗爛丸梧子大每服七丸九丸十丸十一丸或十五丸薑湯下不拘時

經驗 吐痰方 八四 治胸中有痰頭痛不欲食

用白礬一兩水二升煮一升入蜜半合更煮少時溫服須臾即吐如不吐再飲熱水一盞吐痰為效

人參利膈丸 八五 方在和陣一六六

治痰逆噎膈聖藥

和劑 木香丸 八六 治胸膈噎塞氣滯不行腸中水聲嘔噦痰逆不思飲食寬中和膈

黑丑炒香取頭末四兩 破故紙炒 蓽澄茄各四兩

木香二兩 檳榔用酸粟米飯裹濕紙包火煨令紙焦去飯四兩

右為末滴水為丸綠豆大每服三四十丸茶湯熟水任下

消痞核桃 八七

莪朮 三兩洗 當歸 酒洗 白芥子 巴豆仁 各四兩俱搗碎

皮硝 海粉各八兩 大核桃 百枚

右先以群藥入砂鍋內寬水煮一二沸後入大核桃重五錢

者百枚同煮一日夜以重一兩爲度取起晾乾先用好膏藥一個摻阿魏一錢麝香半分量痞大小貼住以熱手摩擦每空心服前桃一個三日後二個以至三個服完後須四物湯之類數貼即愈

熨痞方 八八

每用麝香二三分摻肉上 二次阿魏一二錢

三層芒硝一二兩鋪蓋於上

右先用蕎麥麪和成條量痞大小圍住鋪藥於內以青布蓋之隨燒熱磚四五塊輪流布上熨之覺腹中氣行寬快即是

痞消之兆以手摸熱摩之亦妙內須服調養氣血之藥

開結導飲丸 八九 方在和陣二七八

治飲食不消心下痞悶腿脚腫痛

局方犀角丸 九十 除三焦熱邪及痰涎壅滯腸胃燥澀大小便難

黃連去鬚 犀角鎊各十兩 人參兩 大黃八十兩

黑丑炒搗取頭末六十四兩

右爲細末煉蜜丸梧子大每服十五丸至二十丸臨臥湯下更量虛實加減

河間犀角丸 九一 治癲癇發作有時搐手搦足口吐痰涎不省人事暗倒屈伸

犀角末半兩 赤石脂三兩 樸硝二兩 白殭蠶

薄荷各一兩

右爲末麪糊丸梧子大每服二三十丸溫水下日三服不拘時如覺痰多即減其數忌油膩炙煿

麻仁丸 九二 治大便秘結胃實能食小便熱赤者

芝麻四兩研取汁 杏仁四兩去皮尖研如泥 大黃五兩 山梔十兩

右爲末煉蜜入麻汁和丸桐子大每服五十丸食前白湯下

仲景脾約丸 九三 此即仲景麻人丸仲景曰趺陽脈浮而濇浮則胃氣強濇則小便數浮濇相搏大便則難其脾爲約麻人丸主之〇亦名潤腸丸 治臟腑不和津液偏滲於膀胱以致小便利大便秘結者

大黃蒸 杏仁去皮尖炒 厚樸 麻仁各四兩

枳實二兩

煉蜜丸梧子大每服二十丸白滾湯下日三服漸加以和爲度

局方七宣丸 九四 治風氣結聚宿食不消心腹脹滿胸膈否塞

風痰壅盛及頭面大便秘澀小便時以脾胃氣滯不能飲
食○東垣云治在脉則澀在時則秋
柴胡 枳實 訶子肉 木香各五兩
炙甘草四兩 桃仁炒去皮尖六兩 大黃蒸十五兩
右為末煉蜜丸桐子大每服二十丸食遠米飲下漸加至四
五十丸以利為度覺病退止服
七聖丸九五 治風氣壅盛痰熱結搏心煩面赤咽乾口燥
肩背拘急胸脇脹滿腹脇否悶腰膝沉重大便閉結小便赤
澀○東垣曰治在脉則弦在時則春

木香 檳榔 川芎 肉桂
羌活各五錢 郁李仁泡去皮 大黃半生半熟各一兩
右末煉蜜丸小豆大每服十五丸至二十丸食後臨臥白湯
下
紅丸子九六 消食癖
胡椒一兩 阿魏一錢醋化 青皮炒三兩 莪朮
三稜醋煮一伏時各二兩
右為末另用陳倉米末同阿魏醋煮糊丸桐子大炒土朱為
衣每服七十丸薑湯下

追蟲丸九七 取一切蟲積
黑丑頭末 檳榔各八錢 雷丸醋炙 南木香各二錢
右為末用茵陳二兩大皂角苦楝皮各一兩煎濃汁丸綠豆
大壯大人每服四錢小人弱人或一錢五分量人虛實於五
更時用沙糖水吞下待追去惡毒蟲積二三次方以粥補之
化蟲散九八
雷丸二粒 檳榔二枚 鶴虱一錢 史君子七枚
輕粉少許
右為末分二服候晚刻以精豬肉一兩切成片用皂角漿浸

一宿至五更慢火炙熟乃以香油抹肉上候溫取前藥一服
摻肉上慢烘過食之至巳時蟲下了乃進飲食
萬應丸九九 下諸蟲
檳榔五兩 大黃半斤 黑丑頭末四兩 皂角不蛀者十條
苦楝根皮一斤
右先將苦楝皮皂角二味用水二大碗熬成膏子搜和前三
味為丸桐子大以沉香雷丸木香各一兩為衣先用沉香衣
後用雷丸木香衣每服三錢四更時用沙糖水送下
妙應丸百 一名剪紅丸○殺諸蟲

大黃　牽牛頭末　檳榔各一兩　雷丸
錫灰各五錢　大戟炒　鶴虱　使君子煨
茴香　貫衆各二錢半　輕粉少許　苦楝根一兩
右為細末用皂角煎膏丸服每服五六十丸隨弱強加減五
更初茶湯下如未通再喫溫茶助之下更積盡了白粥補之
運氣五瘟丹百一　治瘟疫火證
黃芩　黃柏　黃連　山梔
香附　紫蘇　甘草稍　大黃
右以前七味生為末用大黃三倍煎濃湯去滓和藥丸如雞

子大朱砂雄黃為衣貼以金箔每用一丸取泉水七碗浸化
可服七人前藥甲己年以甘草稍為君乙庚年黃芩為君丙
辛年黃柏為君丁壬年山梔為君戊癸年黃連為君為君者
多一倍也餘四味同香附紫蘇為臣者減半也
大青丸百一　治時行瘟病發熱上膈結熱
薄荷　梔子　黃芩　黃連
甘草各一錢　連翹六錢　大黃　玄明粉各八錢
右為細末以青蒿自然汁為丸綠豆大雄黃為衣每服五六
十丸白湯下若治雜病發熱者以朱砂或青黛為衣

硃砂丸百一　治卒時中惡卒死
硃砂研　附子炮去皮臍　雄黃明者各一兩　麝香一分另研
巴豆二十粒去油
右研勻煉蜜和擣為丸麻子大每服三丸不拘時粥飲下如
不利更加三丸至七丸以利為度
李氏八毒赤丸百四　治一切邪祟鬼疰服之即愈
雄黃　朱砂　礬石　附子炮
藜蘆　牡丹皮　巴豆各一兩　蜈蚣一條
右為末煉蜜丸如小豆大每服五七丸冷水送下無時○衛

生寶鑑云副使許可道宿驛中夜夢一婦人於脇下打一拳
遂痛不止往來寒熱不能食乃鬼擊也名醫錄云李子豫
八毒赤丸名為殺鬼杖子遂與藥三粒臥時服明日下清水
二斗而愈○又陳蹺吉子因晝臥水仙廟夢得一餅食之而
心腹疼痛有物焉　年諸治不效余診之問其始末因思此疾
既非外感又非內傷惟八毒赤丸頗為相當遂與五七丸下
清黃涎斗餘漸漸氣調後以別藥理之數月而愈
仲景瓜蒂散百五　治傷寒頭不痛寸脉微浮胸中痞鞕氣上衝
咽喉不得息者此為胸有寒也當吐之

瓜蒂 炒黃　赤小豆 等分

右二味各別搗篩爲散然後合之取一錢匕以香豉一合用熱湯七合煮作稀糜去滓取汁和散溫頓服之不吐者少少再加得快吐乃止諸亡血虚家不可與瓜蒂散

仲景 獨聖散 百六　吐積畜痰涎

甜瓜蒂 不拘多少微炒

爲細末每服一二錢韲汁調服脇痛加全蝎頭痛加鬱結者服吐之

茶調散 百七　吐除痰積

瓜蒂二錢　好茶一錢

右爲末每服二錢韲汁調服

陳氏 獨聖散 百八　方在外科五六

治瘡瘍氣血凝滯

良方 獨聖散 百九　方在婦人十八

治妊娠傷觸動胎腹痛下血

錢氏 獨聖散 百十　方在痘疹七八

治痘瘡倒靨陷伏

木通散 百十一　凡男子婦人脇肋苦痛

木通去節　青皮　蘿蔔子炒　茴香

川楝子 取肉用巴豆半兩同炒黃去巴豆各一兩　滑石另研

莪朮　木香各半兩

右爲細末每服三錢不拘時用葱白湯調下甚者不過三服

仲景 大黃附子湯 百十二　治大實內積脇下偏痛

大黃三兩　附子二枚炮　細辛二兩

右三味用水五升煮取二升分溫三服若強人煮取二升半分溫三服服後如人行四五里更進一服

金匱 外臺走馬湯 百十三　治中惡心痛腹脹大便不通

巴豆二枚去皮心熬　杏仁二枚

右二味以綿纏搥令碎熱湯二合捻取白汁飲之當下通治飛尸鬼擊病老小量用

景岳全書五十五卷終

會稽　張介賓　會卿著
瀛海　賈　棠　青南訂

散陣

仲景 麻黄湯一　治太陽經傷寒發熱無汗惡寒及身痛此峻逐陰邪之方也

麻黄　桂枝各三兩　甘草一兩　杏仁七十個

右四味以水九升先煮麻黄減二升去沫內諸藥煮取二升半去柤温服八合覆取微汗

麻黄加朮湯二　治風濕

即前方加白朮四兩

仲景 麻黄附子細辛湯三　治少陰傷寒始得之脉雖沉而反發熱者此陰分之表證也宜此汗之兼治寒氣厥逆頭痛脉沉細者

麻黄去節　細辛各二兩　附子一枚炮去皮切八片

右三味以水一斗先煮麻黄減二升去上沫內藥煮取三升去滓温服一升日三服

金匱 麻黄杏仁薏苡甘草湯四　治風濕一身盡痛發熱日晡劇者因汗出當風或久傷取冷所致

麻黄去節湯泡　薏仁各半兩　甘草炙一兩　杏仁十個去皮尖炒

右每服四錢水一盞半煮八分温服取微汗避風

仲景 麻黄附子甘草湯五　治少陰傷寒二三日無別證用此微發其汗兼治風濕通身浮腫

麻黄去節　甘草炙各二兩　附子一枚炮去皮

右三味以水七升先煮麻黄一兩沸去上沫內諸藥煮取三升去滓温服一升日三服

金匱 麻黄甘草湯六　治腰已上水腫者宜此汗之

麻黄半兩　甘草二錢半

右㕮咀用水二鍾先煮麻黄三四沸去沫入甘草再煎至八分食遠熱服取汗有人患氣喘積久不瘥遂成水腫服此[illegible]

仲景 大青龍湯七　治傷寒頭痛發熱無汗而煩燥

麻黄三錢　桂枝　生薑各一錢　杏仁五枚

甘草五分　大棗一枚此非古數　石膏半雞子大一塊

水一鍾半煎分二服

仲景 小青龍湯八　治傷寒表不解心下有水氣嘔噦而欬發熱

或渴或利或小水不利小腹滿而喘並治肺經受寒欬嗽喘
急宜服此以發散寒邪
麻黃去節　桂枝　芍藥　甘草
細辛　乾薑各三兩　半夏　五味各半斤
右八味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三
升溫服一升○按右方乃仲景古法今當隨證輕重酌宜用
之
仲景桂枝湯九　治太陽經傷風發熱自汗惡風
桂枝　芍藥　生薑各三兩　甘草二兩

大棗十二枚
右以水七升微火煮取三升去滓適寒溫服一升服已須臾
食熱稀粥一升餘以助藥力溫覆一時許令徧身微似有汗
者佳不可令如水流漓病必不除
桂枝加黃芪湯十　治黃疸脉浮者當以汗解之
即前桂枝湯加黃芪二兩
桂枝加大黃湯十一
即前桂枝湯內加大黃一兩
括蔞桂枝湯十二　治痙

即前桂枝湯加括蔞根二兩
仲景桂枝人參湯十三　治太陽傷寒表裏不解協熱下利者
桂枝去皮　炙甘草各四兩　白朮　人參
乾薑各三兩
右五味以水九升先煮四味取五升後內桂枝更煮取三升
溫服一升日再夜一服
仲景桂枝麻黃各半湯十四　治太陽傷寒如瘧狀發熱惡寒不
能得汗熱多寒少而身痒者
桂枝去皮　麻黃去節　芍藥　甘草炙

生薑切各一兩　大棗四枚　杏仁二十四個湯浸去皮尖
右七味以水五升先煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煮取一
升八合去滓溫服六合
桂枝附子湯十五　方在熱陣三十
治傷寒風濕身痛
桂枝甘草湯十六　方在熱陣四四
治過汗心悸
桂枝葛根湯十七　方在痘疹二七
解散寒邪

仲景柴胡桂枝湯十八　治傷寒發熱微惡寒支節煩疼微嘔心下支結外證未去者

柴胡四兩　桂枝去皮　人參　黄芩

芍藥　生薑各一兩半　甘草一兩炙　半夏二合半

大棗六枚擘

右九味以水七升煮取三升去滓溫服

仲景小柴胡湯十九　治邪在肝膽半表半裏之間寒熱往來或嘔或日晡發熱脇痛耳聾驚怒瘧疾等證

柴胡半斤　半夏半斤　人參　黄芩

生薑　甘草各三兩　大棗十二枚擘

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服○若胸中煩而不嘔去半夏人參加栝蔞實一枚○若渴者去半夏加人參合前成四兩半栝蔞根四兩○若腹中痛者去黄芩加芍藥三兩○若脇下痞鞕去大棗加牡蠣四兩○若心下悸小便不利者去黄芩加茯苓四兩○若不渴外有微熱者去人參加桂三兩溫覆取微汗愈○若欬者去人參大棗生薑加五味子半升乾薑二兩

按右方乃漢時古數也今方改用　柴胡二三錢　半夏

黄芩各一二錢　人參一二三錢　甘草五七分

右加薑棗水煎服

薛氏加味小柴胡湯二十　亦名柴胡梔子散○治乳母肝火發熱致兒為患及風熱生痰等證

即前方加丹皮梔子

良方加味小柴胡湯二一　治傷寒脇痛及少陽厥陰經瘧

即前方小柴胡湯加枳殼麩炒　牡蠣粉

加薑三片棗二枚水二鍾煎服

加減小柴胡湯二二　治脈弦寒熱腹中痛

即前小柴胡湯去黄芩加芍藥

加薑棗水煎服

柴胡石膏湯二三　治少陽陽明外感挾火頭痛口乾身熱惡寒拘急

柴胡一錢　石膏三錢　甘草一錢

右用薑水煎服○氣虛者加人參

大柴胡湯二四　方在攻陣七

治表證未除裏證又急汗下兼行宜此

柴芩湯二五　方在和陣二三三

治濕症一身盡痛

柴苓湯 二六　方在和陣一九二

治身熱煩渴泄瀉

加減柴苓湯 二七　方在和陣一九三

治諸疝和肝腎順氣除濕

四逆散 二八 仲景　治陽氣亢極血脈不通四肢厥逆在臂脛之下者若是陰證則上過於肘下過於膝以此爲辨乃不當用此也

柴胡　芍藥　甘草　枳殼 各等分

爲細末每服二錢米飲調下日三服○嗽加五味子乾薑各五分○悸者加桂五分○腹痛加附子一枚炮令拆○泄利下重者濃煎薤白湯調服

葛根湯 二九 仲景　治太陽傷寒項背強几几無汗惡風及太陽陽明合病下利者○此即桂枝湯加麻黃葛根也

葛根 四兩　麻黃 去節　生薑 各三兩　桂 去皮

芍藥　甘草 炙，各二兩　大棗 十二枚，劈

右七味㕮咀以水一斗先煮麻黃葛根減二升去沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝法將息及禁忌

升麻葛根湯 三十　治傷寒陽明經證目痛鼻乾不眠無汗惡寒發熱及小兒瘡疹疫癘等證

升麻　葛根　芍藥　甘草 各等分

水一鍾煎一鍾寒多熱服熱多溫服

柴葛解肌湯 三一　此槌法加減方○治足陽明證目痛鼻乾不眠頭疼眼眶痛脈微洪者

柴胡　乾葛　甘草　黃芩

芍藥　羌活　白芷　桔梗

水一鍾薑三片棗二枚槌法加石膏末一錢煎之熱服○本經無汗惡寒者去黃芩冬月加麻黃他時加蘇葉

葛根葱白湯 三二　治傷寒已汗未汗頭痛

葛根　芍藥　川芎　知母 各二錢

生薑 二錢　葱白 五寸

水二鍾煎一鍾服

連鬚葱白湯 三三　治傷寒已汗未汗頭痛如破

連鬚葱白 切，半斤　生薑 二兩

水三鍾煎一鍾半分二服

局方參蘇飲 二四 治四時感冒傷寒頭痛發熱惡寒無汗及傷
風欬嗽聲重涕唾稠粘潮熱往來此藥解肌寬中孕婦傷寒
痘疹並治
人參 蘇葉 乾葛 前胡
陳皮 枳殼 半夏 茯苓各八分
木香 桔梗 甘草各五分
水一鍾薑五片棗一枚煎八分熱服
加減參蘇飲 二五 方在痘疹二四
治痘疹初熱見點解利之藥

敗毒散 二六 亦名人參敗毒散○治四時傷寒瘟疫傷寒壯
熱風濕風眩項強身體疼痛不問老少皆可服或嶺南烟瘴
之地疫癘時行或處卑濕脚氣痿弱等證此藥不可缺日三
服以效為度
人參 茯苓 枳殼 甘草
川芎 羌活 獨活 前胡
柴胡 桔梗各等分
水一鍾生薑三片煎服或為細末沸湯點服
加味敗毒散 二七 方在外科四一

解利足三陽熱毒寒熱如瘧
荆防敗毒散 三八 方在痘疹三二
發散痘疹俱可用
局方五積散 三九 治感冒寒邪頭疼身痛項背拘急惡寒嘔吐
肚腹疼痛及寒濕客於經絡腰脚骨髓痠痛及痘瘡寒勝等
證
當歸 麻黃 蒼朮 陳皮各一錢
厚樸製 乾薑炮 芍藥 枳殼各八分
半夏炮 白芷各七分 桔梗 炙甘草
茯苓 肉桂 人參各五分 川芎四分
水二鍾薑三片葱白三莖煎八分不拘時服
又歌曰 痢後衝生脚痛風 局方五積自能攻
就中或却麻黃去 酒煮多多服見功

十神湯 四十 治時氣瘟疫感冒風寒發熱憎寒頭疼欬嗽無
汗此藥不拘陰陽兩感一切發散宜此
紫蘇 乾葛 升麻 芍藥各一錢
麻黃 川芎 甘草各八分 白芷
陳皮 香附各六分

水二鍾薑三片煎服

東垣升陽散火湯 四一　治胃虛血虛因寒邪鬱遏陽氣以致肌表俱熱如火捫之烙手此火鬱發之之劑也

升麻　葛根　羌活　獨活

芍藥　人參各五分　防風　炙甘草各三分

生甘草二分　柴胡八分

水一鍾半薑三片煎服忌生冷

升陽益胃湯 四二　方在和陣一五

治秋燥行令陽氣漸衰忌寒體倦

聖散子 四三　治一切山嵐瘴氣時行瘟疫傷寒風濕等疾有非常之功如李待詔所謂內寒外熱上實下虛者此藥尤效迨宋嘉祐中黃州民病疫癘大行得此藥痊活者不可勝紀蘇東坡撰文勒石以廣其傳聖散子之功益著徽州鄭尚書在金陵用此方治傷寒活人甚衆故知其大能發散寒濕驅除瘴瘧實有超凡之效也

蒼朮　防風　厚朴薑炒　豬苓

澤瀉　白芷　川芎　赤芍藥

藿香　柴胡各半兩　麻黃　升麻

羌活　獨活　枳殼　吳茱萸炮

細辛　藁本　茯苓　石菖蒲各七錢

肉豆蔻　良薑各八錢　甘草二兩半　大附子一枚

右爲粗末每服三錢水一鍾棗一枚煎八分稍熱服

易老九味羌活湯 四四　一名羌活沖和湯○治四時不正之氣感冒風寒憎寒壯熱頭疼身痛口渴人人相似者此方主之

羌活　防風　蒼朮各一錢　白芷

川芎　生地　黃芩　甘草各一錢

細辛七分

水二鍾薑三片棗一枚煎八分熱服取汗○有汗者去蒼朮加白朮渴者加葛根石膏

六神通解散 四五　方在寒陣十五

治發熱頭痛脈洪身熱無汗

河間消風百解散 四六　治四時傷寒頭痛發熱及風寒欬嗽鼻塞聲重或喘急

荊芥穗　麻黃　白芷　蒼朮

陳皮各一錢　甘草五分

水一鍾半加薑三片煎八分溫服欬嗽甚者加烏梅一個

局方消風散 十七　一名人參消風散○治風熱上攻頭目昏眩鼻塞聲重及皮膚頑麻癮疹搔癢等證

荊芥穗　炙甘草　人參　川芎

防風　羌活　薄荷　蟬蛻炒

殭蠶炒　茯苓各二錢　陳皮　厚朴各一錢

右爲末每服二三錢茶清調服瘡癬溫酒下

和劑消風散 四八　照前方但無荊芥防風薄荷甘草四味

一味消風散 四九　治皮膚搔癢不能忍。

蘇州薄荷葉　蟬蛻去頭足土各等分

右爲末食遠溫酒調下二錢。

大宣黃芩半夏湯 五十　專治寒包熱兼治表裏

黃芩酒炒　半夏　麻黃　紫蘇

桔梗　枳殼　杏仁　甘草等分

水二鍾薑三片棗二枚煎八分食遠服○天寒加桂枝

金匱續命湯 五一　治中風肢體不收口不能言冒昧不知痛處拘急不能轉側並治但伏不得臥欬逆上氣面目浮腫

麻黃去節　人參　當歸　石膏

桂枝　川芎　乾薑　甘草各一兩

杏仁四十枚去皮尖

右九味以水一斗煮取四升溫服一升當小汗薄覆脊憑几坐汗出則愈不汗更服無所禁忌勿當風

千金小續命湯 五二　通治八風五痺痿厥等證又於六經分別隨證加減用之

麻黃去節　人參去蘆　黃芩去腐　芍藥

甘草炙　川芎　防己　杏仁去皮尖炒

官桂各一兩　防風一兩半　附子炮去皮臍半兩

右㕮咀每服五錢用水一鍾半加薑五片棗一枚煎八分溫服○春夏加石膏知母黃芩秋冬加官桂附子芍藥可隨宜增減諸藥用

附雲岐子加減法　如精神恍惚加茯苓遠志○心煩多驚加犀角○骨節間煩疼有熱者去附子倍芍藥○骨間冷痛倍用桂枝附子○煩躁小便澀去附子倍芍藥入竹瀝一合煎○臟寒下痢去防己黃芩倍附子白朮一兩○熱痢減去附子○腳弱加牛膝石斛各一兩○身痛加秦艽一兩○腰痛加桃仁杜仲各半兩○失音加杏仁一兩○自汗者去麻

黃杏仁加白朮〇春加麻黃一兩〇夏加黃芩七錢〇秋加
當歸四兩〇冬加附子半兩

千金大續命湯 五三

即前方金匱續命湯去人參加黃芩荆瀝〇元戎方用竹
瀝

續命煮散 五四 補虛消風通經絡行氣血除痰癥疼痛

人參　熟地黃　當歸　川芎
芍藥　防風　荆芥　獨活
細辛　葛根　甘草　遠志
半夏各五錢　桂心七錢半

右每服一兩水二鍾生薑三片煎八分溫服〇汗多者加牡
蠣粉一錢半

寶鑑秦艽升麻湯 五五 治中風手足陽明經口眼喎斜則服拘
急惡風寒

升麻　葛根　甘草炙　芍藥
人參各半兩　秦艽　白芷　防風
桂枝各三錢

每服一兩水二鍾連鬚葱白頭三莖煎至一鍾食後稍熱服

避風寒臥得微汗即止

愈風湯 五六 治中風諸證當服此藥以行導諸經則大風悉
去縱有微邪只從此藥加減治之若初覺風動服此不致倒
仆此乃治未病之要藥也

羌活　甘草　防風　當歸
蔓荆子　川芎　細辛　黃芪
枳殼　人參　麻黃　白芷
甘菊　薄荷　枸杞子　知母
地骨皮　獨活　秦艽　黃芩
芍藥各三兩　蒼朮　生地黃各四兩　肉桂一兩

右㕮咀每服一兩水二鍾生薑三片煎七分空心臨臥服〇
空心一服吞下二丹丸謂之重劑臨臥一服吞下四白丹謂
之輕劑〇假令一氣之微汗用愈風湯三兩加麻黃一兩作
四服加生薑五七片空心服以粥投之得微汗則佳〇如一旬
之通利用愈風湯三兩加大黃一兩亦作四服每服加生薑
五七片臨臥煎服得利為度〇又潔古羌活愈風湯〇即同
前方加柴胡杜仲半夏厚朴防己白茯苓前胡熟地黃石膏
等九味共三十三味 亦治肝腎虛筋骨弱語言難精神昏

慎風濕內弱風熱體重或瘦而一肢偏枯或肥而半身不遂
心勞則百病生心靜則萬邪息此藥能安心養神調陰陽無
偏勝

景岳曰中風一證病在血分多屬肝經肝主風木故名中風奈何自唐宋名家以來竟以風字看重遂多用表散之藥不知凡病此者悉由內傷本無外感既無外感而治以發散是速其危耳若因其氣血留滯而少佐辛溫以通行經絡則可若認爲風邪而必用取汗以發散則不可倘其中亦或有兼表邪而病者則前方亦不可廢故擇其要者詳錄之亦以存古人之法耳

胃風湯 五七 治虛風能食牙關緊急手足瘈瘲胃風面腫

白芷一錢二分 升麻二錢 葛根 蒼朮
蔓荊子 當歸各一錢 甘草炙 柴胡
藁本 羌活 黃檗 草豆蔻
麻黃各五分

水二鍾薑三片棗二枚煎八分溫服

地黃散 五八 治中風四肢拘攣

乾地黃 甘草炙 麻黃去節各一兩

右㕮咀用酒三升水七升煎至四升去柤分作八服日進二服不拘時

東垣羌活附子湯 五九 治冬月犯寒腦痛齒亦痛名曰腦風

羌活 蒼朮各五分 製附子炮 麻黃
防風 白芷 殭蠶 黃檗各七分
升麻 甘草各二分 黃芪三分 佛耳草無寒嗽不用

水一鍾半煎八分溫服〇一方有細辛

寶鑑羌活附子湯 六十 方在熱陣三五

治呃逆

羌活勝風湯 六一 治兩眼眵多眊燥緊澁羞明赤脈貫睛頭痛鼻塞腫脹涕淚腦巔沉重眉骨痠疼外翳如雲霧絲縷秤星螺蓋

羌活 防風 荊芥穗 白芷
獨活 柴胡 薄荷葉 白朮
桔梗 前胡 枳殼 甘草
川芎 黃芩各五分

水二鍾煎一鍾熱服

聖惠川芎散 六二 治偏正頭風疼痛

川芎　羌活　細辛　香附
槐花　甘草炙　石膏各半兩　荊芥穗
薄荷　菊花　茵陳　防風各一兩
右為末每服二錢食後茶清調服　忌動風物
錢氏川芎散六三　治風熱頭痛不清及目病
川芎一分　羌活　防風　藁本
升麻　甘草各一錢　柴胡七分　黄芩炒
黄連各四錢　生地二錢
右為末每服一二錢茶清調下

局方川芎茶調散六四　治傷風上攻偏正頭痛鼻塞聲重
薄荷葉二兩　川芎　荊芥穗各一兩　羌活
白芷　甘草各五錢　細辛　防風各二錢半
右為細末每服二錢食後茶清調下
局方神朮散六五　治四時瘟疫傷寒發熱惡寒頭疼項強身痛
及傷風頭痛鼻塞聲重欬嗽
蒼朮　藁本　白芷　細辛
羌活　川芎　炙甘草各一錢
水一鍾半薑三片葱白二寸煎服

千金方天香散六六　治年久頭風不得愈者
南星製　半夏製　川烏去皮　白芷各二錢
右作一服水二鍾加生薑自然汁小半盞煎一盞食遠服
指迷芎芷散六七　治風寒頭痛
川芎　白芷　荊芥穗　軟石膏
右為末每服二錢食後沸湯調下
芎辛導痰湯六八　治痰厥頭痛
川芎　細辛　南星　橘紅
茯苓各錢半　半夏錢　枳實　甘草各錢

水一鍾半薑七片煎八分食後服
奇效上清散六九　治頭痛眉骨痛眼痛不可忍者
川芎　鬱金　芍藥　荊芥穗
芒硝各半兩　薄荷葉一錢　片腦半錢
右為細末每用一字鼻內搐之○一方有乳香沒藥各一錢
本事透頂散七十　治偏正頭風夾腦風並一切頭風不問年深
日近
細辛表白者三莖　瓜蒂七個　丁香三粒　糯米七粒
腦子　麝香各一豆大

右將膽礬另研極細却將前四味亦另研細末然後并研令勻用磁罐盛之謹閉罐口用時臨左右搐之一大豆許良久出涎則安

菊花散 七一 治風熱上攻頭疼不止

甘菊花 旋復花 防風 枳殻
羌活 蔓荆子 石膏 甘草各一錢

水一鍾半薑五片煎七分不拘時服

寶鑑 如聖散 七二 治眼目偏痛頭風

麻黃半兩燒灰 盆硝二錢半 麝香 腦子各少許

右為細末搐之

點頭散 七三 治偏正頭痛

川芎一兩 香附四兩炒去毛

右為細末每服二錢食後茶清調服

東垣 清空膏 七四 治偏正頭痛年深不愈及有疾風濕熱上壅損頭目及腦痛不止若除血虛頭痛者非此所宜

川芎五錢 柴胡七錢 黃連酒炒 防風
羌活各一兩 炙甘草一兩半 細挺子黃芩三兩一半酒洗一半炒

右為細末每服二錢匕熱茶調如膏抹在口內少用白湯送下臨臥○如苦頭痛每服加細辛二分○如太陰脉緩有痰名曰痰厥頭痛減羌活防風川芎甘草加半夏一兩五錢

愈風餅子 七五 治頭風疼痛

川烏半兩炒 川芎 甘菊 白芷
防風 細辛 天麻 羌活
荆芥 薄荷

右為細末水浸蒸餅為劑捏作餅子每服三五餅細嚼茶清任下不拘時

本事 治八般頭風 七六

草烏尖 細辛等分 黃丹少許

右為細末用葦管搐入鼻中

百一 都梁丸 七七 治風吹項背頭目昏眩腦痛及婦人胎前產後傷風頭痛

白芷大塊白者沸湯泡切

右為末煉蜜丸彈子大每用一丸細嚼荆芥點茶下

和劑 三拗湯 七八 治感冒風寒鼻塞聲重語音不出欬嗽喘急胸滿多痰

麻黃連節 杏仁連皮尖 生甘草

右㕮咀每服五錢薑三五片水煎食遠服○若傷寒感風欲取
汗解加桔梗荊芥名五拗湯治咽痛
局方 華蓋散 七九 治肺受風寒頭痛發熱欬嗽痰飲
麻黃去節 蘇子 桑白皮 杏仁去皮尖炒
赤茯苓 橘紅各一錢 甘草五分
水一鍾薑五片棗一枚煎八分食後服
沖和散 八十 治感冒風濕頭目不清鼻塞聲重倦怠欠伸出
淚
蒼朮四兩米泔浸炒 荊芥 甘草炙八錢
右爲末每服二錢

金沸草散 八一 治肺感寒邪鼻塞聲重欬嗽不已憎寒發熱
無汗惡風或熱壅膈間唾濁痰甚
旋覆花 麻黃 荊芥各錢 前胡
半夏 芍藥各八分 甘草炙五分
水二鍾薑三片棗一枚煎八分食遠服
門 旋覆花湯 八二 治風寒暑濕傷肺喘嗽大甚不得臥
旋覆花 前胡 甘草 茯苓
半夏麴 杏仁 麻黃 荊芥穗

五味子 赤芍藥
右每服五錢加薑棗水煎○有汗者勿服
良方 旋覆花湯 八三 治風痰嘔逆飲食不下頭目昏悶等證
旋覆花 枇杷葉 川芎 細辛
赤茯苓各一錢 前胡一錢半
右加薑棗水煎服
濟生 桑皮散 八四 治上焦熱壅欬嗽連聲面赤氣不得透
桑皮 柴胡 前胡 紫蘇
薄荷 枳殼 桔梗 赤茯苓

黃芩 炙甘草等分
右㕮咀每服七八錢水一鍾半煎七分食遠服
濟生 蘇陳九寶湯 八五 治老人小兒素有喘急遇寒暄不常發
則連綿不已欬嗽哮吼夜不得臥
麻黃 紫蘇 薄荷 桂枝
桑白皮 大腹皮 陳皮 杏仁
甘草各六分
水一鍾半薑三片烏梅一個煎七分服
局方 羌活散 八六 治風邪壅滯鼻塞聲重頭目昏眩遍身拘急

肢節煩痛天陰愈覺不安者

羌活　麻黃　防風　細辛

川芎　菊花　枳殼　蔓荆子

前胡　白茯苓　甘草　石膏

黃芩等分

水一鍾半薑三片煎服

羌活散八七　治風痺手足不仁

羌活　防巳　防風　棗仁

當歸　川芎各一兩　附子炮去皮臍　麻黃去根節

天麻各一兩　黃松節　薏仁各一兩　荆芥一握

右為細末每服二錢不拘時溫酒調下

得效芎芷香蘇散八八　散風消痰理脚氣

川芎　甘草二錢　蘇葉　乾葛

白茯苓　柴胡各半兩　半夏六錢　枳殼炒一錢

桔梗生二錢半　陳皮一錢半

每服三錢水一鍾薑三片棗一枚煎八分不拘時溫服

金匱越婢湯八九　治風水惡風一身悉腫脉浮不渴續自汗出

無大熱

麻黃一兩　石膏半斤　生薑三兩　甘草二兩

大棗十五枚

右五味以水六升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取三升分溫

三服○惡風者加附子一枚

風水加白朮四兩古今錄驗方所名越婢加朮湯

金匱越婢加半夏湯九十　治肺脹欬喘上氣目如脫狀脉浮大

者

麻黃六兩　石膏半斤　生薑三兩　甘草二兩

大棗十五枚　半夏半斤

右六味以水六升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取三升分溫

三服

當歸湯九一　治肺痺上氣閉塞胸中脇下支滿乍作乍止不

得飲食轉乾右緣下足冷痛

當歸二兩　防風去叉　黃芪各一兩　人參

細辛　黃芩去腐各一兩　桂心三兩　柴胡八兩

半夏湯炮五兩　杏仁去皮尖炒四十個　麻黃去根節不煮一二沸

右㕮咀每服五七錢水一鍾薑七片棗一枚煎七分不拘時

溫服日三夜一

羌活勝濕湯九 方在和陣一七八

治外傷濕氣一身盡痛

局方烏藥順氣散九二 治風氣攻注四肢骨節疼痛偏身頑麻頭項腰脚緊急拘急行步艱辛者宜先服此以疏氣道然後隨證用藥

烏藥 麻黄 白芷 川芎

桔梗 橘紅 枳殻麩炒 甘草炙

殭蠶炒各一兩 乾薑炮五錢

右每服五錢薑水煎服

通關散九四 方在因陣九八

搐鼻取嚏開通牙關

神效左經丸九五 治諸風寒濕痺麻木不仁肢體手足疼痛俱效

蒼术米泔浸 草烏去皮 葱白 乾薑各四兩

右四味搗爛裝入瓶內按實密封瓶口安於烟處三日取出晒乾入後藥○按此方當加當歸六兩更佳

金毛狗脊 藁本 白芷 破故紙酒浸炒乾

撫芎 小茴香炒 川山甲炮 牛膝酒浸各二兩

川烏炮 木瓜 白附子 虎脛骨酥炙

乳香炙 沒藥炙各一兩另研

右爲末酒糊丸小豆大每服三四十丸空心酒下

三因麻黄左經湯九六 治風寒暑濕四氣流注足太陽經腰足攣痺關節重痛憎寒發熱無汗惡寒或自汗惡風頭痛

麻黄去節 乾葛 細辛 防風

桂心 羌活 蒼术 防己酒拌

茯苓 炙甘草各一錢一分

水一鍾薑三片棗一枚煎八分食前服

三因半夏左經湯九七 治足少陽經爲四氣所乘以致發熱腰脇疼痛頭痛不食熱悶煩心腿痺緩縱

半夏製 乾葛 細辛 柴胡

防風 桂心 乾薑炮 白术

麥冬 黄芩 茯苓 炙甘草各一錢

水二鍾薑三片棗一枚煎八分食前服

三因大黄左經湯九八 治四氣流注足陽明經致腰脚腫痛不可行大小便秘或惡飲食喘滿自汗嘔吐腹痛

大黄煨 細辛 羌活 前胡

杏仁去皮尖炒　厚朴製　枳殼　黃芩
茯苓　炙甘草各一錢
水二鍾薑三片棗二枚煎八分食前服
千金第一麻黃湯九九　治惡風毒氣腳弱無力頑痺四肢不仁
失音不能言毒氣衝心有人病此者但一病相當即服此第
一方次服第二第三第四方
麻黃一兩　大棗十一枚　茯苓三兩　杏仁十枚
防風　當歸　白术　川芎
升麻　芍藥　黃芩　桂心

麥冬　甘草各二兩
右㕮咀以水九升清酒二升合煮取二升半分四服日三夜
一覆令小汗粉之莫令見風
千金第二獨活湯百
獨活四兩　熟地黃三兩　生薑五兩　葛根
桂心　甘草　芍藥　麻黃各二兩
右㕮咀以水八升清酒二升合煎取二升半分四服日三夜
一腳弱者特忌食瓠子蕺菜犯之則一世不愈
千金第三兼補厚朴湯百　并治諸氣咳嗽逆氣嘔吐

厚朴　川芎　桂心　熟地黃
芍藥　當歸　人參各二兩　黃芪
甘草各三兩　吳茱萸二升半夏七兩　生薑一斤
右㕮咀以水二斗煮豬蹄一具取汁一斗二升去上肥膩入
清酒三升合煮取三升分四服相去如人行二十里久更進
服
千金第四風引獨活湯百二　兼補方
獨活四兩　茯苓　甘草各三兩　升麻一兩半
人參　桂心　防風　芍藥

當歸　黃芪　乾薑　附子各一兩
大豆二升
右㕮咀以水九升清酒三升合煮取三升半分四服相去如人
行二十里久更進服
獨活湯百三　治腳氣陽虛寒勝經絡不行麻痺不用如神
獨活　麻黃去節　川芎　熟附子
牛膝　黃芪炙　人參　當歸
白芍藥　白茯苓　白术　杜仲炒
乾薑　肉桂　木香　甘草炙等分

右㕮咀每服五七錢水一鍾半薑三片棗一枚煎八分食前溫服

追毒湯 百四 治肝脾腎三經為風寒濕毒氣上攻陰陽不和四肢拘攣上氣喘滿小便秘澁心熱煩悶遍身浮腫脚弱不能行步

半夏湯泡七次 黄芪去蘆 甘草炙 當歸去蘆

人參去蘆 牛膝酒制 獨活去蘆 橘紅各一兩

熟地黄 枳實麩炒 芍藥 麻黄去節各二兩

桂心二兩

右㕮咀每服八錢水一鍾半生薑七片棗三枚煎八分食前溫服日三夜一

防風湯 百五 治風虛冷濕邪氣入臟狂言妄語精神錯亂及五臟風邪等症

防風 白朮 當歸酒浸 芍藥

肉桂 杏仁 川芎 白蘚皮

甘草炙各一錢 麻黄去節 茯苓 獨活各三錢

右分二服水一鍾薑三片煎七分食遠服

陽毒升麻湯 百六 治陽毒赤斑狂言吐膿血

升麻一錢半 犀角屑 射干 黄芩

人參 甘草各八分

水一盞半煎八分內犀角汁和勻服

栝蔞根湯 百七 治風溫大渴

栝蔞根 乾葛 防風 人參

甘草各一錢 石膏三錢

水一盞半煎八分服

再造散 百八 治傷寒頭痛發熱惡寒無汗用表藥而汗不出脉無力者此以陽虛不能作汗名曰無陽若醫不識此復用麻黄等藥及發迫取汗枉殺者多矣

人參 黄芪 川芎 甘草

熟附子 桂枝 細辛 羌活

防風 煨生薑 夏月熱甚或加石膏

水一鍾半棗二枚煎八分溫服

枳殼煮散 百九 本事 治悲哀煩惱傷肝兩脇骨疼筋脉緊急腰脚重滯筋急不能舉動此藥大治脇痛

枳殼麩炒四兩 細辛 川芎 桔梗

防風各二兩 葛根一兩半 甘草一兩

右咀每服七八錢水一鍾半薑棗同煎食前溫服
柴胡疏肝散 百十 治脇肋疼痛寒熱往來
陳皮 醋炒 柴胡 各二錢 川芎 枳殼 麩炒
芍藥 各一錢半 甘草 炙五分 香附 一錢半
水一鍾半煎八分食前服
本事 桂枝散 百十一 治因驚傷肝脇骨疼痛不已
枳殼 小者一兩 桂枝 半兩
右為細末每服二錢薑棗湯調下
河間 葛根湯 百十二 治寒邪在經脇下疼痛不可忍

葛根 桂枝 川芎 細辛
防風 各一錢 麻黃 枳殼 芍藥
人參 炙甘草 各八分
右咀水一鍾半薑三片煎八分食遠溫服
升麻湯 百十三 治無汗而喘小便不利煩渴發斑
升麻 蒼朮 麥門冬 麻黃 各一錢
黃芩 大青 各七分 石膏 一錢二 淡竹葉 十片
水二鍾煎八分溫服
仲景 柴胡桂枝乾薑湯 百十四 治傷寒五六日汗下後但頭汗
出往來寒熱心煩者邪未解也
柴胡 半斤 桂枝 三兩 乾薑 二兩 括蔞根 四兩
黃芩 三兩 牡蠣 熬二兩 甘草 炙二兩
右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升溫服一
升日三服初服微煩再服汗出便愈
景岳全書五十六卷終

會稽　張介賓　會卿著
瀛海　賈　棠　青南訂

寒陣

黄連解毒湯一　亦名解毒湯○治火熱狂躁煩心口乾舌燥熱之甚者及吐下後熱不解脉洪喘急等證

黄連　黄芩　黄栢　梔子各等分

右每服五錢水二鍾煎服

仲景白虎湯二　治傷寒脉浮滑此表有熱裏有邪宜用此以解內外之熱及一切中暑煩熱熱結斑黄狂躁大渴等證

石膏一斤碎　知母六兩　甘草二兩　糯米六合

右四味以水一斗煮米熟去滓溫服一升日三服○本方加蒼术即名蒼术白虎湯

仲景白虎加人參湯三　此即人參白虎湯○亦名化斑湯○仲景法即於前白虎湯內加人參三兩用治服桂枝湯大汗出後大煩渴不解脉洪大者○今近代止用人參二錢石膏五錢知母二錢甘草一錢粳米一撮以治赤斑口燥煩躁者熱脉虛等證○又河間名爲人參石膏湯用治膈消煩熱但分兩加倍於今方

活人白虎加桂枝湯四　治瘧但熱不寒及有汗者

知母　桂枝　甘草炙　粳米各一錢

石膏一兩

右咀水一鍾半煎八分溫服

仲景竹葉石膏湯五　治陽明汗多而渴鼻衄喜水水入即吐及暑熱煩躁等證

石膏一兩　竹葉二十片　半夏　甘草各二錢

麥冬　人參各一錢　粳米一撮　此係今方分兩非仲景舊法

水二鍾薑三片煎服○一方云石膏二錢人參一錢其他以遞減之用者當酌宜也

六味竹葉石膏湯六　治胃火盛而作渴

石膏倍用之　淡竹葉　桔梗　薄荷葉

木通　甘草各一錢

水煎服

竹葉黄芪湯七　治胃虛火盛作渴

淡竹葉一錢　人參　黄芪　生地黄

當歸　川芎　麥冬　芍藥

甘草　石膏（煅）　黃芩（炒，各一錢）

水煎服〇按此方之用當去川芎為善〇外科仍有半夏

宣明 桂苓甘露飲 八　治陽暑發熱煩躁水道不利等證

滑石（水飛，四兩）　石膏　寒水石　白朮（各二兩）

茯苓　澤瀉（各一兩）　肉桂　豬苓（各五錢）

右為末每服三錢溫湯調下

子和 桂苓甘露飲 九　治證同前脉虛而渴者當用此

滑石（一兩）　人參　白朮　茯苓

甘草　石膏　寒水石　乾葛

澤瀉（各一兩）　官桂　木香　藿香（各一錢）

右為末每服三錢白湯調下

金 甘露飲 十　治男婦小兒胃中客熱口舌生瘡咽喉腫痛牙齦腫爛時出膿血及脾胃受濕瘀熱在內或醉飽多勞濕熱相搏致生黃病身面皆黃或身熱而腫大小便不調

枇杷葉（去毛）　生地黃　熟地黃　天門冬

麥門冬　黃芩　石斛　茵陳

枳殼（各一錢）　炙甘草（五分）

右作一服水一鍾煎七分食後服〇本事方無麥冬茵陳有山豆根犀角屑治口齒證大有神效

三黃石膏湯 十一　治疫癘大熱而躁

石膏（生，三錢）　黃芩　黃柏　黃連（各二錢）

豆豉（半合）　麻黃（八分）　梔子（五枚，打碎）

水二盞煎一盞連進三四盞則愈

羌活升麻湯 十二　治暑月時行瘟熱病宜清熱解毒兼治內外者

羌活　升麻　葛根　人參

白芍藥　黃芩（各一錢）　黃連　石膏

甘草　生地黃　知母（各七分）

水二鍾薑三片棗一枚煎八分溫服

東垣 普濟消毒飲 十三　治疫癘憎寒壯熱頭面腫盛目不能開上喘咽喉不利口乾舌燥俗云大頭瘟病諸藥不效元泰和二年東垣製以濟人所活甚眾時人皆曰天方

黃芩（酒炒）　黃連（酒炒，各五錢）　人參（三錢）　橘紅

玄參　生甘草　桔梗　柴胡（各二錢）

薄荷葉　連翹　鼠粘子　板藍根

馬屁勃各一錢 白殭蠶炒 升麻各七分
右爲細末半用湯調時時服之半用蜜丸噙化服盡良愈○
或加防風 川芎 當歸 薄荷 細辛 水二鍾煎一鍾
食遠稍熱服○如大便鞕加酒蒸大黄一二錢以利之○或
熱腫甚者以砭鍼刺出其血

芩連消毒飲十四 治天行時疫大頭病發熱惡寒頸項腫脈
洪痰痺等證

柴胡 桔梗 羌活 防風
黄芩 黄連 連翹 枳殼

荆芥 白芷 川芎 射干
甘草

水一鍾半薑三片煎服○有痰者加竹瀝薑汁調服○如秘
結便鞕者先加大黄煎服利二三行後依本方加人參當歸
調理

河間六神通解散十五 治發熱頭痛脈洪身熱無汗○此法有
川芎羌活細辛三味

麻黄 甘草各一錢 黄芩 蒼朮各二錢
石膏 滑石各錢半 豆豉十粒

水二鍾加豉搗同煎一鍾溫服

仲景小陷胸湯十六 治小結胸正在心下按之則痛脈浮滑者

半夏三錢 黄連錢半 栝蔞仁一錢此非古數

右先以水二鍾煎栝蔞至一鍾半乃入二藥同煎至八分溫
服○原方用黄連一兩半夏半斤栝蔞實一枚水六升加法
煮二升分三服

雞子清飲十七 治熱病五六日壯熱之甚大便秘結狂言欲
走者

雞子二枚取清 芒硝細研 寒水石細研各二三錢

右先用新汲水一盞調藥末次下雞子清攪勻分二服○按
此法似不若以雪梨漿調二藥服之更妙

仲景黄連阿膠湯十八 治少陰傷寒二三日以上心中煩不得
臥

黄連四兩 黄芩一兩 芍藥二兩 阿膠三兩
雞子黄一枚

右以水五升先煮前三味取二升去滓內膠烊盡小冷內雞
子黄攪令相得溫服七合日三服

梔子仁湯十九 治發熱潮熱狂躁面赤咽痛

梔子　赤芍　大青　知母各一錢
升麻　柴胡　黃芩　石膏
杏仁　甘草各二錢　豆豉百粒
水煎溫服○一方無豆豉○又六味梔子仁湯在外科八一
仲景梔子豆豉湯 二十 治傷寒煩熱懊憹可得吐劑
梔子十四枚擘　香豉四合
右用水四升先煮梔子得二升半內豉再煮取一升半去滓分二服溫進一服得吐者止後服
仲景梔子厚朴湯 二十一 治傷寒下後餘邪未清心煩腹滿起臥不安者
梔子十四枚擘　厚朴四兩薑炙　枳實四兩炒
已上三味用水三升半煮取一升半去滓分二服溫進一服得吐止後服
仲景梔子乾薑湯 二二 治傷寒以丸藥大下之身熱不去微煩者若病人舊有微溏者不可用
梔子十四枚擘　乾薑二兩
右二味以水三升半煮取一升半去滓分二服溫進一服得吐者止後服

仲景梔子蘗皮湯 二三 治傷寒身黃發熱者
梔子十五枚　甘草一兩　黃蘗二兩
右三味以水四升煮取一升半去滓分溫再服
附瘟疫熱病 四
瘟疫八九日後已經汗下不退口渴咽乾欲飲水者以蚯蚓糞名六一泥不拘多少擂新汲水飲之○或用蠶沙亦可○其熱甚者用新青布以冷水浸過略搾乾置患人胸上以手按之良久布熱即易之須臾當汗出如水或作戰汗而解夏月極熱用此法他時不可用
消蘆丹麻湯 二五 方在外科九七
治時毒頭面紅腫
黃連香薷飲 二六 方在和陣一七二
治傷暑中熱
局方瀉心湯 二七 治心火
用川黃連去鬚為極細末每服二字或五分或一錢或湯或散臨臥服
仲景甘草瀉心湯 二八 亦名半夏瀉心湯○嘔而腸鳴心下痞者此方主之○此方辛入脾而散氣半夏乾薑之辛以散結

氣苦入心而泄熱黄連黄芩之苦以泄痞熱脾欲緩急食甘
以緩之人參甘草大棗之甘以緩之也

半夏半斤洗　黄連一兩　乾薑　黄芩

甘草炙　人參各三兩　大棗十二枚擘

右七味以水一斗煮取六升去滓再煮取三升温服一升日
三服

仲景生薑瀉心湯二九　治傷寒汗解之後胃中不和心下痞鞕
乾噫食臭脇下有水氣腹中雷鳴下利者

生薑四兩切　甘草炙　人參　黄芩各三兩

乾薑一兩　黄連一兩　半夏半斤洗　大棗十二枚擘

右八味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升温服一升日
三服○此方無生薑即名半夏瀉心湯

仲景大黄黄連瀉心湯三十　治太陽傷寒汗下後色微黄心下
痞按之濡其脉關上浮者

大黄二兩　黄連一兩

右二味以微沸湯二升漬之須臾絞去滓分温再服

仲景附子瀉心湯三十一　治傷寒汗下後心下痞而復惡寒汗出
者

大黄一兩　黄連　黄芩各二兩　附子一枚炮去皮破八片別煮
取汁

右前三味以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓内附子汁分温
再服

清心蓮子飲三十二　治熱在氣分口乾作渴小便淋濁或口舌
生瘡咽疼煩躁

黄芩　麥冬　地骨皮　車前子炒

甘草各錢半　人參　黄芪　石蓮子

柴胡　茯苓各一錢

右每服五錢水煎服

良方加味通心飲三十三　治諸疝肉熱腹痛及小便不利

木通　梔子仁　黄芩　瞿麥

連翹　枳殼　川楝子　甘草等分

右每服五錢水一鍾半燈心二十根車前草五莖煎七分
温服

清心湯三十四　治心受熱邪狂言叫罵動履失常

黄連　黄芩　梔子　連翹

薄荷　甘草　芒硝　大黄等分

水一鍾半竹葉二十片煎八分溫服

外科清心湯三五　方在外科八四

治瘡瘍腫痛發熱

局方 人參清肺湯二六　治肺胃虛熱欬嗽喘急坐臥不安年久

勞嗽唾血

人參　杏仁去皮尖炒　阿膠炒各一　罌粟殼蜜炒一錢半

炙甘草　桑白皮　知母　地骨皮

烏梅肉各五分

水二鍾棗一枚煎八分食遠服

人參平肺散二七　治心火尅肺金傳為欬嗽喘嘔痰涎壅盛

胸膈痞滿咽喉不利

人參　天冬　黃芩　地骨皮

陳皮　青皮　茯苓各八分　知母一錢

五味二十粒　甘草炙五分　桑白皮炒一錢半

水二鍾薑三片煎八分食遠服

黃芩清肺飲二八　治肺熱小便不利宜用此清之

梔子二錢　黃芩一錢

水煎服如不利加鹽豉二十粒

清肺湯三九　方在痘疹一四五

治麻疹欬嗽甚者

東垣 清肺飲子四十　方在和陣一百一

治邪熱在氣分渴而小便不利

錢氏 清肺飲四一　方在痘疹八七

治痘疹肺熱喘嗽

瀉白散四二　治肺火大腸火喘急等證

甘草一錢　桑白皮　地骨皮各二錢

右為末水調服

五味瀉白散四三　方在因陣一六

治眼目風熱翳膜外障

正傳 麥門冬湯四四　治病後火熱乘肺欬嗽有血胸脇脹滿上

氣喘急五心煩熱而渴

天冬　麥冬　桑白皮各七分　紫菀茸

貝母各六分　桔梗　甘草各五分　淡竹葉

生地一錢　五味九粒

水一鍾半棗一枚煎服

類方 麥門冬湯四五　治肺熱氣衰血焦髮落好怒唇口赤黃

麥門冬　遠志甘草各去心　人參　黄芩
生地黄　茯神　石膏煅各一兩　甘草炙半兩
右㕮咀每服一兩水煎服
萬氏 麥門冬湯 四八　方在痘疹一四二
治表邪麻疹火熱嗽甚
家秘 麥門冬飲 四七　治虛勞欬嗽午後欬多者是也
川芎　當歸　生地黄　白芍藥
麥門冬　黄耆　知母各一錢　桑白皮八分
五味子十五粒

水一鍾一片棗一枚煎八分食後服
麥門冬飲子 四八　治膈消胸滿心煩氣多血少津液不足
為消渴
麥門冬　生地黄　人參　五味子
甘草炙　茯神　天花粉　知母
乾葛等分
右㕮咀每服一兩竹葉十四片水煎服
二母散 四九　治肺熱欬嗽及疹後嗽甚者
貝母去心童便洗　知母等分　乾生薑一片

右水煎服〇或為末每服五分或一錢沸湯下
陳氏 二母散 五十　方在婦人八六
治產後熱血上攻欬嗽喘促
家秘 黄芩知母湯 五一　治夏月火嗽有痰面赤煩熱
黄芩　知母　桑白皮　杏仁
山梔　天花粉　貝母　桔梗
甘草等分
水二鍾煎八分食遠服
醫林 桑白皮湯 五二　治肺氣有餘火炎痰盛作喘

桑白皮　半夏　蘇子　杏仁
貝母　山梔　黄芩　黄連各八分
水二鍾薑三片煎八分溫服
海藏 紫菀散 五三　治嗽中有血虛勞久嗽肺痿
紫菀　阿膠　知母　貝母各一錢半
人參　甘草　茯苓　桔梗各一錢
五味子十二粒
水二鍾煎八分食後服
東垣 清胃散 五四　治醇酒厚味或補胃熱藥太過以致牙痛不

可恐牵引頭腦滿面發熱或齒齦潰爛喜冷惡熱此陽明之
火也宜用此方
生地錢半　升麻　當歸　丹皮各一錢
黃蓮錢半夏月倍之
水煎服
加味清胃散五五
即前方加犀角　連翹　甘草
秘驗清胃飲五六　治一切風熱濕痰牙痛床腫血出動搖
石膏　梔子　黃蓮　黃芩

當歸　生地　白芍　蒼术各一錢
青皮八分　細辛　藿香　荊芥穗各六分
升麻五分　丹皮　甘草各四分
水一鐘煎八分食後緩緩含伙之效
錢氏瀉黃散五七　治脾火
山梔一兩　石膏五錢　藿香七錢　防風四錢
甘草　錢
右咬咀蜜酒拌略炒香為細末每服二錢水一鐘煎清汁飲
和中湯五八　治虛火嘈雜

人參　白术　茯苓　陳皮
半夏各一錢　甘草五分　黃蓮薑炒錢半　大棗二枚
水一鐘半加粳米一撮煎八分溫服
薛氏柴胡清肝散五九　治肝膽三焦風熱瘡瘍或怒火憎寒發
熱或瘡瘍結於兩耳兩脇前後或胸乳小腹下及股足等證
柴胡　黃芩炒各錢半　山梔炒　川芎
人參各一錢　甘草五分　連翹　桔梗各八分
水一鐘半煎服
梔子清肝散六十　治肝膽三焦風熱耳內作痒或生瘡出水

或脇肋胸乳作痛寒熱往來
梔子　柴胡　丹皮各一錢　當歸
川芎　芍藥　牛旁子炒　茯苓各七分
白术　甘草各五分
右水煎服　一方無白术
原機芍藥清肝散六一　治眼多眵臊緊澀羞明赤脈貫睛臟腑
秘結
白术　川芎　防風　羌活
桔梗　滑石　石膏　芒硝各三分

黃芩　薄荷　荊芥　前胡
炙甘草　芍藥各二分半　柴胡　山梔
知母各二分　大黃四分
水煎食遠熱服
良方龍膽瀉肝湯六二　亦名龍膽湯　治肝經濕熱小便赤澁
或脇脹口苦寒熱凡肝經有餘之證宜服之
龍膽草酒拌　人參　天冬　麥冬
生甘草　黃連炒　山梔　知母各五分
黃芩七分　柴胡一錢　五味三分

水一鍾半煎服
七味龍膽瀉肝湯六三　治肝火內炎如前諸證
柴胡梢　澤瀉　車前子　木通
龍膽草　當歸　生地各等分
右㕮咀水二鍾煎一鍾空心稍熱服
薛氏加味龍膽瀉肝湯六四　治肝經濕熱或囊癰下疳便毒
小便澁滯或陰囊作痛小便短少
龍膽草酒拌炒　車前子炒　當歸尾　木通
澤瀉大人倍用　甘草　黃芩　生地
山梔大人倍用
右水煎○若治小兒子母同服
當歸六黃湯六五　治盜汗之聖藥
當歸　黃芪蜜炙各二錢　生地黃　熟地黃
黃連　黃芩　黃柏各一錢
水二鍾煎服
正氣湯六六　治陰分有火盜汗
黃柏炒　知母炒各二錢　炙甘草六分
水一鍾半煎八分食遠熱服

仲景芍藥甘草湯六七　治傷寒脈浮自汗出小便數心煩微惡
寒腳攣急足溫者
白芍藥　甘草炙各四兩
右二味以水三升煮取一升半去滓分溫再服
生地黃煎六八　治陰火盜汗
生地　當歸　黃芪炙　甘草炙
麻黃根　浮小麥　黃連　黃芩
黃蘗各一錢
水一鍾半煎八分食遠服

資鑑石膏散 六九 治陽明風熱頭痛

石膏 川芎 白芷 等分

右為細末每服四錢熱茶清調下

本事荆芥散 七十 治頭風

荆芥 石膏 煅等分

右為細末每服二錢薑三片連鬚葱白二寸水一鍾煎七分

食遠服

雙玉散 七一 治熱痰欬嗽喘急煩渴頭痛

石膏 寒水石 等分

右為極細末每服三錢人參湯或隨證用引調下

局方秘方茶調散 七二 治風熱上攻頭目昏痛及頭風熱痛不

可忍

小川芎 一兩 細芽茶 薄荷 各三錢 白芷 五錢

荆芥穗 四錢 片芩 二兩酒拌炒三次不可令焦

頭巔及腦痛加細辛藁本蔓荆子各三錢

右為細末每服二三錢用茶清調下

天花散 七三 治消渴

天花粉 生地黄 麥門冬 乾葛 各一錢

五味子 甘草 各一錢

右作二服水一鍾半粳米百粒煎八分食遠服

錢氏地骨皮散 七四 治壯熱作渴

地骨皮 茯苓 甘草 柴胡

人參 知母 半夏 等分

右㕮咀每服一兩水煎服

玉泉丸 七五 治煩熱口渴

人參 麥門冬 黄芪 蜜炙 茯苓

烏梅肉 焙 甘草 各一兩 天花粉 乾葛 各一兩半

右為末蜜丸彈子大每服一丸温湯嚼下

節齋清膈導痰湯 七六 治胃火厚味膈上熱痰喀吐不出欬唾

稠粘

前胡 貝母 各一錢 天花粉 瓜蔞仁

白茯苓 白术 各八分 桔梗 甘草

陳皮 各五分 石膏 枳實 各錢半

水一鍾半加竹葉二十片揉搦同煎八分食遠服

生鐵落飲 七七 治痰火熱升墜痰鎮心

生鐵落 四兩 入火燒赤沸碎上鎚之有花出如蘭如蛾紛紛

落地者是名鐵落用水二斗煮取一斗用以煎藥

石膏二兩　龍齒研　茯苓　防風去蘆各一兩半

玄參　秦艽各一兩

右㕮咀入鐵汁中煮取五升去柤入竹瀝一升和勻溫服二合無時每日約須五服

大連翹飲七八　治風熱熱毒大小便不利及小兒痘後餘毒皮膚生瘡或丹瘤等毒游走不止

連翹　山梔炒　黃芩　滑石

柴胡　荊芥　防風　甘草

當歸　赤芍　木通　瞿麥

蟬退各等分

右量大小水煎服

局方 犀角地黃湯七九　治勞心動火熱入血室吐血衄血發狂發黃及小兒瘡痘血熱等證○按此方治傷寒血燥血熱以致溫毒不解用此取汗最捷人所不知蓋以犀角之性氣銳能散仲景云如無犀角以升麻代之此二味可以通用其義蓋可知矣

生地四錢　芍藥　丹皮　犀角鎊各錢半

如欲取汗退熱必用尖生磨攪入之方妙

右㕮咀水一鍾半煎八分加犀角汁服○或入桃仁去皮尖七粒同煎以治血證

犀角地黃湯八十

即前方加黃連黃芩各一錢

拔萃 犀角地黃湯八一　治一切血熱失血三焦熱血便秘等證

犀角磨汁　生地二錢　黃連　黃芩各一錢

大黃三錢

水二鍾煎一鍾入犀角汁和勻溫服

外科 犀角地黃湯八二　方在外科四六

治胃火血熱妄行

良方 生地黃散八三　治血熱小便出血

生地黃二錢　黃芩炒五錢　阿膠炒　柏葉炒各一錢

右水煎服

生地黃飲子八四　治諸見血吐血衄血下血溺血皆屬熱證

生地　熟地　枸杞　黃芪

芍藥　天冬　甘草　地骨皮

黃芩各等分

右㕮每服七錢水一鍾煎八分食遠服如脉微身凉惡風者加桂五分吐血者多如此

茜根散 八五 治衄血不止心神煩悶

茜根　黄芩　阿膠炒珠　側栢葉

生地黄各二錢　甘草炙一錢

水一盞半薑三片煎七分食遠服

人參五味子湯 八六 方在外科一五三

治虚損肺痿等證

二神散 八七 治男婦吐血或血崩下血

陳槐花二兩炒焦　百草霜五錢

右爲細末每服三錢茅根煎湯調下○治下血宜空心服之

○舌上忽然腫破出血宜此糝之

四生丸 八八 良方 治吐血衄血陽乘於陰血熱妄行宜服此藥

生荷葉　生艾葉　生側栢葉　生地黄等分

右搗爛如鷄子大丸每服一丸水二盞煎一盞濾去柤服○陳日華云先公嘗游靈石寺見一僧嘔血明年到寺問嘔血者何如主僧云得服四生丸遂愈自得此方屢用有效愚意前證乃內熱暴患者宜用之若人病本元不足須補脾以資化源否則虚火上炎金反受尅獲生鮮矣

鱉甲地黄湯 八九 濟生 治虚勞煩熱怔忡羸瘦

鱉甲醋炙　熟地　人參　白术

當歸　麥門冬　茯苓　石斛

柴胡　秦艽各一錢　肉桂　甘草炙各六分

水二鍾薑五片烏梅一個煎七分不拘時服

黄芪鱉甲煎 九十 局方 治虚勞客熱肌肉消瘦煩熱心悸盜汗少食多渴欬嗽有血

黄芪蜜炙　鱉甲醋浸炙去裙　人參　知母

桑白皮　紫菀　桔梗　甘草炙各五分

地骨皮　秦艽　柴胡　生地

芍藥各七分　天門冬　白茯苓各八分　肉桂四分

水一鍾半煎八分食後温服

地黄膏 九一 滋陰降火凉血清肝退熱

鮮地黄以十斤爲則杵汁和衆藥汁同煎　當歸一斤　芍藥半斤

枸杞半斤　天門冬　麥門冬各八兩　川芎

丹皮各二兩　連肉四兩　知母　地骨皮各二兩

人參　甘草各一兩

右將衆藥用水二斗煎一斗去滓淨和生地黃汁同熬成膏服之

局方 秦艽扶羸湯 九二 治肺痿骨蒸勞嗽或寒熱往來聲啞自汗體虛怠惰

人參　秦艽　當歸　鱉甲 醋炙

紫菀茸　地骨皮　柴胡　甘草 各五分

水一鍾半薑五片大棗烏梅各一枚煎七分食遠服

退熱湯 九三 治虛勞煩熱口乾惡寒飲食不得

柴胡　龍膽草　青蒿　知母 炒

麥冬　甘草 各一錢

右用童便一鍾半葱白三寸薤白三莖桃柳枝各五寸同浸一宿平旦煎一鍾空心頓服至夜再服

良方 團魚丸 九四 治骨蒸勞嗽累效

貝母　前胡　知母　杏仁 各一兩

柴胡 半兩　團魚 二個

右藥與魚同煮熟取肉連汁食之將藥焙乾爲末再以團魚骨甲煮汁一盞和藥丸桐子大每服二三十丸煎黃芪六一湯空心送下病既安仍服黃芪六一湯調理

良方 地榆散 九五 治腸風熱證下血

地榆　黃芩　黃連　梔子

茜根　茯苓 等分

右㕮咀每服五錢入薤白五寸同煎食遠溫服

良方 四味地榆散 九六 一名潑火散○治中暑昏迷不省人事并治血痢

地榆　赤芍藥　黃連 去鬚　青皮 等分

右爲末每服三錢漿水調服或新汲水亦可○若治血痢以水煎服

本事 槐花散 九七 治腸風臟毒下血

槐花 炒　側柏葉 杵　荊芥穗　枳殼 麩炒

右各等分爲末每服二錢空心米飲調下或用煎湯亦名槐花湯

外科 槐花散 九八 方在外科一六九

治腸風藏毒下血

東垣 加減四物湯 九九 治腸風下血

當歸　川芎　生地　側栢葉 各八分

枳殼 麩炒　荊芥穗　槐花 炒　甘草 炙 各四分

地榆　條芩　防風各六分　烏梅三枚肥者
水二鍾薑三片煎八分空心溫服
(局方) 枳殼湯百　治大便腸風下血
枳殼二兩炒黃　黃蓮一兩同槐花四兩炒焦去花不用
水二鍾濃煎空心溫服
枳殼散百一　治便血或婦人經候不調手足煩熱胸膈不利
枳殼麸炒　半夏麹　赤芍藥　柴胡各一錢
黃芩一錢半
水一鍾薑三片棗一枚煎八分食遠服

(濟生) 小薊飲子百二　治下焦結熱溲血崩淋等證
生地四兩　小薊根　滑石　蒲黃炒
藕節　淡竹葉　山梔　炙甘草各五錢
右㕮咀每服五六錢水一鍾半煎八分空心溫服
(仲景) 黃蓮湯百三　治傷寒胸中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐者
黃蓮　甘草炙　乾薑　桂枝去皮各三兩
人參二兩　半夏半升　大棗十二枚
右七味以水一斗煮取六升去滓溫服一升日三服夜二服

黃蓮湯百四　治便後下血腹不痛名溫毒下血
黃蓮　當歸各二錢　甘草五分
水一鍾煎八分食後服
(仲景) 黃芩湯百五　治太陽與少陽合病自下利
黃芩三兩　炙甘草　芍藥各二兩　大棗十二枚
右四味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日再服夜一服
若嘔者加半夏半升生薑三兩
(外臺) 黃芩湯百六　方在和陣一九八
治乾嘔下利

(直指) 黃芩湯百七　治心肺蘊熱口瘡咽痛膈悶小便淋濁不利
黃芩　黃連　梔子　生地
麥冬　木通　澤瀉　甘草各等分
右每服一兩水一鍾半煎八分食前服
黃芪散百八　治熱痢下赤黶心腹煩熱攻痛
黃芪　當歸　龍骨各七錢半　生地黃五錢
黃蓮去鬚微炒一兩　黃蘗　黃芩　犀角屑
地榆各半兩
右爲細末每服三錢不拘時粥飲調下

河間黃芩芍藥湯 百九 治瀉痢腹痛或身熱燥後重脈洪數膿
血稠粘及陰虛內熱衄吐血者○此方即前仲景之黃芩湯
但分兩不同
黃芩 白芍各二錢 甘草一錢
水一鍾半煎八分溫服○腹痛甚者加桂二分膿血甚者加
當歸黃連各一錢○一方芍藥用六錢
局方木香化滯湯 百十 治痢下赤白腹中疞痛裏急後重多熱
多滯者宜之
木香 甘草各七分 人參 陳皮

黃連 澤瀉 檳榔各一錢 白朮
枳殼麩炒 厚朴 白芍藥 茯苓各錢半
水二鍾煎八分食前服
清熱滲濕湯 百十一 治濕熱浮腫肢節疼痛小水不利
黃蘗鹽水炒二錢 黃連 茯苓 澤瀉各一錢
蒼朮 白朮各錢半 甘草五分
水二鍾煎八分服○如單用滲濕去黃連黃蘗加橘皮乾薑
河間益元散 百十二 一名六一散○一名天水散○治中暑身
熱煩渴小水不利河間云治痢之聖藥分利陰陽去濕熱其

功大矣
粉甘草一兩 桂府滑石六兩
右為極細末每服二三錢新汲水調下○一方加辰砂三錢
名硃砂益元散○一方加牛黃治煩而不得眠
局方香連丸 百十三 治熱瀉痢疾赤白膿血腹熱侵脾裏急後
重
黃連淨十兩 切如豆粒用淨吳茱萸五兩二味用熱水拌和
入磁罐內置熱湯中頓一日同炒至黃連紫黃色為度
去茱萸不用

木香 每製淨黃連一兩每木香二錢半
右為末醋糊丸梧子大每服七十丸食前空心米飲下
良方六神丸 百十四 治食積兼熱赤白痢疾或腹痛不食或久
而不止
神麴炒 麥芽炒 茯苓 枳殼麩炒
木香煨 黃連炒各等分
右為末以神麴糊為丸梧子大每服五七十丸白湯送下
八正散 百十五 治心經蘊熱臟腑秘結小便赤澀淋閉不通
及血淋等證

車前子　木通　滑石飛　山梔

大黃煨　瞿麥　萹蓄　甘草各等分

右㕮咀每服五錢水二鐘燈心二十莖煎七分食前溫服

七正散百十六

車前子　赤茯苓　山梔仁　木通

龍膽草　萹蓄　生甘草稍

加燈心竹葉水煎服

五淋散百十七　治膀胱有熱水道不通淋澀不止臍腹急痛

或尿如豆汁或如砂石膏淋尿血並皆治之

茵陳　淡竹葉各一錢　木通　滑石

甘草半　梔子炒　赤芍藥　赤茯苓各二錢

水二鐘煎一鐘食前服

局方 薷苓湯百十八　治夏月暑瀉欲成痢者

香薷　黃連薑汁炒　厚樸薑炒　扁豆炒

猪苓　澤瀉　白朮　茯苓各等分

右咀每服五六錢水鐘半薑三片煎七分服

局方 太平丸百十九　治泄瀉

黃連一兩同吳茱萸炒去茱萸不用　芍藥炒一兩半

右為末老米糊丸服○同乾薑炒加阿膠一半為丸名駐車

丸

本事 火府丹百二十　治心經積熱小便淋澀黃瘦煩渴

生地黃二兩杵膏　木通　黃芩炒各一兩

右以三味為末加蜜丸梧子大每服五七十丸木通湯下○

許學士云一卒病渴日飲水斗許不食者三月心中煩悶時

在十月余謂心經有伏熱與火府丹數服越二日來謝云當

日三服渴止又三服飲食如故此本治淋用以治渴可謂通

變也

真珠粉丸一二一　治精滑白濁

黃栢　真蛤粉各一斤　真珠三兩一方代以青黛亦效

右為末水糊丸梧子大每服百丸空心溫酒下或加樗皮滑

石青黛俱妙

局方 導赤散一二二　治心火及小腸熱澀小便赤澀而渴

生地　木通　生甘草各等分

入竹葉二十片水煎服　一方加人參麥門冬

赤茯苓湯一二三　治膀胱實熱小便不通口乾咽腫不利

赤茯苓　猪苓　木通　車前子

瞿麥　葵子　黃芩　滑石

枳實　甘草各等分

水一鍾半薑三片煎八分食前服

濟生 葵子湯一二四　治膀胱實熱腹脹小便不通口舌乾燥

葵子微炒　猪苓　赤茯苓　枳實

瞿麥　木通　黃芩　車前子

滑石各一錢　甘草五分

右用水一鍾半薑煎空心服

牛膝湯一二五　治砂石淋澁

牛膝一合　麝香少許

右用水煎牛膝去滓入麝香服之○鄞縣耿夢得之內患淋下砂石剝剝有聲甚為苦楚一服而愈

三味牛膝湯一二六　治小便不通莖中痛及婦人血熱內結腹堅痛

牛膝根葉一握生用　當歸一兩　黃芩去朽心半兩

右㕮咀每服一兩用水一鍾半煎七分食遠服日三

海金沙散一二七　治膏淋

海金沙　滑石各一兩　甘草二錢半

右為細末每服二錢燈草湯空心調下

茵陳湯一二八　治黃疸發熱大小便澁

茵陳　梔子仁各二錢　赤茯苓　葶藶各一錢

枳實　甘草各五分

水一鍾半薑三片煎八分食前服

活人 茯苓滲濕湯一二九　治黃疸濕熱嘔吐口渴身目俱黃小便不利食少而熱

白茯苓　澤瀉　茵陳　青皮

陳皮　防己各五分　梔子　黃芩各八分

黃連　枳實各七分　蒼朮　白朮各一錢

右水煎服

東垣 當歸拈痛湯百三十　治濕熱為病肢節煩疼肩背沉重胸膈不利手足遍身流注疼痛熱腫等證

羌活　黃芩　炙甘草　茵陳各五錢

人參　苦參　升麻　乾葛

蒼朮各二錢　防風　歸身　白朮

知母　猪苓　澤瀉各一錢半

右㕮咀每服一兩水煎空心服臨睡再服

活人犀角散 一三一　治脚氣衝心煩喘悶亂頭痛口乾坐卧不得

犀角屑　枳殼麩炒　沉香各七錢半　檳榔

紫蘇莖葉　麥門冬　赤茯苓各一兩　木香

防風各半兩　石膏生用研二兩

右㕮咀每服八錢以水一鍾半煎八分去柤入淡竹瀝一合更煎一二沸不拘時溫服

東垣清燥湯 一三二　治六七月間濕熱成痿肺金受邪腰以下痿軟癱瘓不能動行走不止兩足欹側

柴胡　酒黃栢　黃連　麥冬各三分

生地　人參各錢　炙甘草　豬苓

白茯苓　橘紅　神麴　澤瀉各五分

白朮　蒼朮各八分　黃芪錢半　升麻三分

五味子九粒

右㕮咀每服半兩水二盞煎一盞稍熱空心服

蒼朮湯 一三三　治濕熱腰腿疼痛

蒼朮三錢　柴胡二錢　黃栢　防風各一錢

右用水煎空心服

丹溪二妙散 一三四　治濕熱在經筋骨疼痛如有氣加氣藥如血虛加補血藥如痛甚加薑汁熱辣服之

黃栢炒　蒼朮去皮炒制等分

右為末搗生薑煎滾湯調服〇此二物皆有雄壯之氣如氣實者加少酒佐之〇此即集要二神湯各二錢半用水煎空心服

一方以二妙為君加甘草　羗活各二錢　陳皮　芍藥各一錢

威靈仙酒炒五分為末服之佳

加味二妙丸 一三五　治兩足濕痺疼痛如火燎從兩足跗熱起漸至腰胯或麻痺痿軟皆是濕熱為病此方主之

歸尾　川牛膝　川萆薢　防己

龜板酥炙各一兩　蒼朮米泔浸炒四兩　黃栢二兩酒浸晒乾

右為細末麵糊為丸梧子大每服百丸空心薑鹽湯送下

丹溪蒼朮黃栢丸 一三六　治濕熱食積痰飲流注諸痛

蒼朮鹽水炒　黃栢鹽水炒　防己　南星

川芎　白芷　犀角　檳榔等分

右為末酒糊丸服〇血虛加牛膝龜板〇肥人加痰藥

丹溪虎脛骨丸 一三七　治兩足痿弱軟痛或如火焙從足踝下

上衝腿膝等證因熱所致者神驗

牛膝　歸尾各二兩　鹿板酥炙　虎脛骨酥炙

防巳各一兩　蒼朮米泔浸一宿　黄柏酒浸日曬各四兩

右為細末麪糊為丸梧子大每服百餘丸空心薑鹽湯送下

（一方加炮附子五錢）

河間苦參丸 一二八 治血虛風熱者凖

苦參取粉二兩　丹參炙　沙參　人參

防風去叉　五加皮　蒺藜炒去刺　烏蛇酒浸取肉

蔓荊子　龜板酥炙　虎骨酥炙　玄參各一兩

右為細末用不蛀皂角一斤剉碎以水三升挼取汁於無油鐵器熬成膏加煉蜜四兩和丸梧子大每服十五丸至二十丸食後良久夜臥共三服荊芥薄荷酒下

陳氏苦參丸 一二九 方在外科八八

治遍身搔痒癬疥瘡瘍

錢氏苦參丸 一四十 方在痘疹九九

治痘後瘡爛瘙痒疥癩

硃砂涼膈丸 一四一 治上焦虛熱肺脘咽膈有氣如烟搶上

黄連　山梔各一兩　人參　茯苓各半兩

硃砂三錢另研　冰片五分另研

右為細末煉蜜為丸梧子大硃砂為衣熟水送下五七丸日進三服食後

東垣硃砂安神丸 一四二 一名黄連安神丸（）治心神煩亂發熱怔忡不寐或寐中驚悸頭運多諸

生地　硃砂另研為衣　當歸各一錢　甘草五分

黄連一錢半

湯浸蒸餅為丸黍米大每服十五丸或一二十丸津液嚥之或食後用溫水涼水送下亦可

錢氏安神丸 一四三 治熱渴心悶脉實煩赤口燥

麥冬　馬牙硝　白茯苓　寒水石

山藥　甘草各五錢　硃砂一兩　龍腦一字

右為末煉蜜丸芡實大每服一丸沙糖水化下

秘旨安神丸 一四四 方在小兒七一

治心虛驚悸

十味安神丸 一四五 方在小兒七三

治虛驚

七味安神丸 一四六 方在小兒七二

治心熱多驚

集驗龍腦安神丸 一四七 治男婦小兒五積癲癇不論遠近發作無時但服此藥無不痊愈

龍腦 研　麝香 研　牛黃 各研三錢　犀角 屑

人參　茯神　麥冬　硃砂 各飛二兩

桑白皮 炒　地骨皮　甘草 各炙一兩　馬牙硝 二錢

金箔 三十五片

爲細末煉蜜丸彈子大金箔爲衣寒用熱水熱用涼水不拘時化下一丸小兒半丸如病二三年者日進三服若男婦虛

勞喘嗽發熱者用新汲水化下其喘滿痰嗽立止

治驚癇及痘中昏悶驚悸

萬氏龍腦安神丸 一四八 方在小兒七七

抑青丸 一四九 治肝火

黃連 薑汁炒

右單用一味爲末粥丸滾水下

錢氏抑青丸 一五〇 方在小兒九八

治肝熱急驚搐搦

瀉青丸 一五一 治肝膽火並小兒急驚發搐眼赤腫疼

龍膽草　當歸　川芎　防風

羌活　山梔　大黃 等分

煉蜜爲丸桐子大每服五十丸

瀉金丸 一五二 治肺火

用黃芩爲末滴水丸白湯下

瀉濕茱連丸 一五三 治濕熱吐酸

黃連 陳壁土同炒二兩　黃芩 一兩　陳皮　蒼朮 米泔浸

吳茱萸 煮少時浸半日曬乾各一兩

或加桔梗茯苓各一兩

右爲末神麴糊丸菉豆大每服二三十丸食後津液送下

左金丸 一五四 治肝火脇肋刺痛或發寒熱或頭目作痛淋秘泄瀉一切肝火等證

黃連 六兩炒　吳茱萸 一兩湯泡片時焙乾用

右爲末粥丸椒子大白朮陳皮煎湯下三四五十丸

大補丸 一五五 治陰火

黃栢 鹽酒炒褐色

米粥丸血虛四物湯送下氣虛四君子湯送下

大造丸 一五六 此方治陰虛血熱能使耳目聰明鬚髮烏黑

有奪造化之功故名大造亦治心風失志虛勞水腫等證

紫河車 一具以米泔洗淨少加酒蒸極爛搗膏以山藥末收焙乾用或洗淨即以新瓦上焙乾用 敗龜板 自死者酥炙一兩 黃蘗 鹽酒炒一兩半 杜仲 酥炙一兩半 牛膝 酒洗一兩二錢

天門冬 麥門冬 各一兩二錢 熟地 二兩半用砂仁末六錢茯苓二兩一塊同稀絹包入好酒煮之去茯苓不用 夏加五味子七錢

右除熟地黃另杵外共爲末用酒煮米糊同熟地膏搗丸桐子大或蜜丸亦可每服八九十丸空心臨臥鹽湯薑湯任下冬月酒下（婦人加當歸二兩去龜板○男子遺精白濁婦人帶下加牡蠣一兩半

丹溪 大補陰丸 一五七 降陰火補腎水

黃柏 鹽酒炒 知母 鹽酒炒各四兩 熟地 酒洗蒸搗爛 龜板 酥炙黃各六兩

右爲細末用猪脊髓蒸熟和煉蜜同搗爲丸桐子大每服五六十丸空心薑鹽酒送下

秘傳 大補天丸 一五八 治男婦虛損勞傷形體羸乏腰背疼痛遺精帶濁

紫河車 初胎者一具米泔洗淨入小砂罐內加水一碗煮沸候冷取起放竹籃中四圍用紙糊密烘乾爲末入群藥和勻 黃蘗 蜜炒 知母 乳炒 龜板 酥炙各三兩

懷熟地 五兩酒蒸搗 牛膝 酒洗 肉蓯蓉 酒洗 麥門冬

山藥 炒 虎脛骨 酥炙 黃芪 蜜炙 茯神 各兩半

杜仲 制 何首烏 制 人參 白芍藥 冬月一兩

枸杞 各二兩 生地 不見火酒洗搗 天門冬

當歸 酒洗 北五味 各一兩 冬加乾薑 半兩炒黑

右爲細末用猪脊髓三條蒸熟同煉蜜和搗爲丸桐子大每服八十丸空心淡鹽湯送下冬月酒下

大補地黃丸 一五九 治精血枯涸燥熱

黃蘗 鹽酒炒 熟地 酒蒸各四兩 當歸 酒洗 山藥 炒

枸杞 各三兩 知母 鹽酒炒 山茱萸 白芍藥 各二兩

生地 二兩半 肉蓯蓉 酒浸 玄參 各一兩半

右爲末煉蜜丸桐子大每服七八十丸空心淡鹽湯送下

丹溪 補陰丸 一六十 一名虎潛丸 降陰火滋腎水

黃柏 制 知母 制 熟地 酒洗各三兩 龜板 酥炙四兩

白芍 酒炒 當歸 牛膝 各二兩 虎脛骨 酥炙

瑣陽 酥炙 陳皮 各一兩半

右爲細末酒煮羯羊肉爲丸桐子大冬加乾薑半兩每服五六十丸鹽湯或酒下

節齋 補陰丸 一六一

黃柏　知母（俱酒炒）　龜板（酥炙，各三兩）　熟地（五兩）
瑣陽　枸杞　天冬　白芍（各二兩）
五味（一兩）　乾薑（五錢）
煉蜜入猪脊髓三條搗丸桐子大每服八九十丸空心淡鹽
湯送下冬月用酒

三補丸 一六二　治三焦火熱
黃連　黃芩　黃柏
滴水丸桐子大白湯送下或淡鹽湯亦可

東垣滋腎丸 一六三　降腎火桂與火邪同體此寒因熱用法也
凡不渴者病在下焦宜用之○良方云或腎虛足熱小便不
利肚腹腫脹皮膚脹裂眼睛突出此神劑也
黃柏（酒拌陰乾）　知母（同上，各二兩）　肉桂（二錢）
爲細末熟水爲丸白沸湯空心送下二百丸

加味虎潛丸 一六四　治諸虛不足腰腿疼痛行步無力壯元
氣滋腎水
熟地黃（八兩）　人參　黃芪（炙）　當歸
杜仲（酥炙）　牛膝（酒蒸）　瑣陽（酒洗）　龜板（酥炙）
兎絲子（制）　茯苓　破故紙（炒）　黃蘗（鹽水炒）

知母（酒炒）　虎骨（酥炙，各一兩）　山藥（炒）　枸杞子（各二兩）
右煉蜜加猪脊髓酒蒸搗同搗丸桐子大每服百餘丸空心
淡鹽湯或酒任下

加味坎離丸 一六五　生精養血升水降火
川黃柏（八兩）　分四分用酒鹽水人乳蜜水各浸二兩曬
乾炒褐色
熟地（八兩）　用茯苓四兩打碎砂仁二兩三味同入絹袋中
好酒二罈煮乾去茯苓砂仁止用地黃
知母（八兩，鹽酒浸炒）　白芍（酒浸日曬乾）　當歸　川芎（各四兩）
右爲末同鋪筲中日曬夜露三日爲度煉蜜丸桐子大每服
八九十丸空心鹽湯冬月溫酒任下

三才封髓丹 一六六　降心火益腎水
天門冬　熟地黃　人參（各五錢）　黃蘗（炒褐色，三兩）
砂仁（兩半）　甘草（炙，七錢）
右爲末麵糊丸桐子大每服五七十丸以肉蓯蓉五錢切片
酒浸一宿次日煎三四沸空心送下

當歸龍薈丸 一六七　治肝經實火大便秘結小便澀滯或胸
膈作痛陰囊腫脹凡肝經實火皆宜用之及一切躁擾狂越

驚悸不寧等證

當歸　龍膽草　梔子仁　黃連

黃栢　黃芩各一兩　蘆薈　大黃

青黛各五錢　木香二錢半　麝香五分另研

右為末神麯糊丸桐子大每服二三十丸薑湯白湯任下

蘆薈丸 一六八　治疳癖肌肉消瘦發熱潮熱飲食少思口乾作渴或肝火食積口鼻生瘡牙齦蝕爛等證

蘆薈　胡黃連　黃連炒焦　木香

白蕪荑炒　青皮各五錢　當歸　茯苓

陳皮各兩半　甘草炒七錢

右為末米糊丸桐子大每服七八十丸米湯下

人蘆薈丸 一六九　方在小兒百十五

治小兒肝脾疳積發熱

加减蘆薈丸 百七十　方在小兒百十六

治證同前

三聖丸 一七一　治嘈雜神效

白朮四兩炒　橘紅一兩　黃連炒五錢

右為細末神麯糊丸綠豆大每服五六十丸薑湯下

术連丸 一七二　治嘈雜

白朮土炒四兩　黃連一兩薑汁炒

右為末神麯糊丸黍米大每服百餘丸薑湯下

軟石膏丸 一七三　治嘈雜噯氣

軟石膏煅　半夏制　南星制　香附子炒

梔子仁炒各等分

右為細末米粥丸桐子大每服五七十丸薑湯下

地榆丸 一七四　治血痢下血極效

地榆微炒　當歸微炒　阿膠糯米炒　黃連去鬚

訶子取肉炒　木香晒乾　烏梅肉各半兩

右為細末煉蜜丸梧子大每服三五十丸空心或食前陳米飲吞下

槐角丸 一七五　治五種腸風下血並痔漏脫肛

槐角炒　黃芩　地榆　當歸

防風　枳殼麩炒

右等分為細末米酒麪糊丸桐子大每服五六十丸空心清米飲送下極效○一方有烏梅肉

御藥阿膠丸 一七六　治腸風下血

黃連　阿膠炒珠　赤茯苓等分

右將連茯爲末阿膠用酒放化和末衆手爲丸食前米湯送三五十丸或以其爲末糊丸亦可

聚金丸 一七七　治酒毒大腸積熱下血

黃芩　防風各二兩　黃連四兩半生半酒炒

右爲末醋糊丸梧子大每服七八十丸空心米飲下

臟連丸 一七八　治遠年近日腸風臟毒下血

大鷄爪黃連半斤　槐米一兩　枳殼一兩

防風　粉草　槐角　香附

牙皂　木香各五錢

右用陳倉米二合同香附一處爲末外藥共爲細末用豬大臟約長一尺洗淨裝入米附將定兩頭用水二大碗沙鍋炭火煮乾再添水慢火煮爛如泥取起和藥搗勻丸桐子大每空心米飲下七八十丸忌麵炙生冷煎炙之物一料病痊

古方　酒蒸黃連丸 一七九　治一切熱瀉便紅並伏暑發熱煩渴神效

黃連半斤用淨酒二升浸以瓦器置甑上蒸至爛取出

曬乾

右爲末滴水丸梧子大每服五十丸食前溫水下

黃連丸 百八十　治腸紅及血痢疼痔瘡

黃連　吳茱萸等分

右二味用滾湯同泡過卷一二日同炒揀開各另爲末米糊丸桐子大每服二三錢糞前紅服茱萸丸糞後紅服黃連丸俱酒下○此與左金丸稍同

豬臟丸 一八一　方在外科二三三

治大便痔漏下血

保和丸 八二　方在小兒三五

治飲食酒積停滯

四順清涼飲 一八三　方在攻陣二五

治臟腑血熱燥爲秘結

仲景白頭翁湯 一八四　治熱痢下重者

白頭翁二兩　黃連　黃檗　秦皮各三兩

右四味以水七升煮取二升去滓溫服一升不愈再服一升

景岳全書五十七卷終

會稽　張介賓　會卿著
瀛海　賈　棠　青南訂

熱陣

仲景理中丸　即名人參理中湯○治太陰即病自利不渴陰寒腹痛短氣欬嗽霍亂嘔吐飲食難化胸膈噎塞或瘧疾瘴氣瘟疫中氣虛損久不能愈或中虛生痰等症

人參　白朮炒　乾薑炒　炙甘草各三兩

右四味搗篩爲末蜜丸雞黃大以沸湯數合和一丸研碎溫服之日三四夜二服腹中未熱益至三四丸然不及湯湯法以四物依數切用水八升煮取三升去滓溫服一升日三服○原論加減去詳在霍亂門述古條中○按右方兩數乃漢時權度今後世所用惟每味數錢而甘草半之酌宜可也

附子理中湯二　治證如前而中氣虛寒腹痛甚者又或入房腹痛手足厥冷或食冷犯寒等症

即前方加制附子一二三錢隨宜用之其有實甚勢急者不妨生用或炮用亦可○外科附子理中湯有茯苓無甘草乾薑

附子理中丸三　治陰寒腎氣動者

即前附子理中湯去白朮煉蜜丸服

理中加丁香湯四　治中脘停寒喜辛物入口即吐即噦

即前理中湯加丁香十粒甚或兼痛者可加至一二錢○若以理中加木香即名木香理中湯

加味理中湯五　治脾肺俱虛欬嗽不已

人參　白朮　茯苓　炙甘草
陳皮　半夏　乾薑　細辛

北五味等分

右㕮咀每服二錢薑三片棗一枚煎七分食遠服

局方胡椒理中湯六　治肺胃虛寒氣不宣通欬嗽喘逆氣虛痞噎悶膈腹滿痛短氣不能飲食嘔吐痰水不止

白朮五兩　乾薑　炙甘草　胡椒
良薑　蓽撥　陳皮　細辛
款冬花去梗各四兩

右㕮咀每服五七錢水一鍾半煎七分食遠溫服○或煉蜜丸如梧子大每服三五十丸白湯鹽酒米飲任下無時每日二

服

選方 八味理中丸七　治脾胃虛寒飲食不化胸膈痞悶或嘔吐泄瀉

人參　乾薑炮各一兩　白朮四兩炒　白茯苓　麥芽炒二兩　甘草炙　神麴炒　砂仁炒各一兩半

右為細末煉蜜為丸每丸重一錢空心服一丸薑湯嚼下

枳實理中丸八　治傷寒寒實結胸

人參　白朮　茯苓　甘草　乾薑各一兩　枳實十六片

右為細末煉蜜丸雞子黃大每服一丸熱湯化下連進二三服

理中化痰丸九　治脾胃虛寒痰涎內停嘔吐少食或大便不實飲食難化欬唾痰涎此中氣虛弱不能統涎歸源也

人參　白朮炒　乾薑炮　茯苓各二兩　炙甘草一兩　半夏制三兩

薑湯煮麵糊丸桐子大每服四五十丸白湯送下

治中湯十　治脾胃不和嘔逆霍亂中滿虛痞或泄瀉○此即理中湯加青皮陳皮也

人參　白朮　乾薑炮　炙甘草　青皮　陳皮等分

右每服五錢水煎服如嘔加半夏

丁香溫中湯十一　治同前

即前治中湯加丁香去半夏

良方 溫胃湯十二　治憂思結聚脾肺氣凝元陽受損大腸與胃氣不平脹滿上衝飲食不下脉虛而緊濇

附子制　厚朴　當歸　白芍藥　人參　甘草炙　陳皮各一錢　乾薑炮一錢　川椒去合口炒出汗三分

水一鍾半薑三片煎一鍾食遠服

東垣 溫胃湯十三　治服寒藥多致脾胃虛弱胃脘痛

白豆蔻　人參　澤瀉各三分　益智　砂仁　厚朴　甘草　乾薑　薑黃各四分　黃芪　陳皮各七分

右為細末每服三錢水一盞煎至半盞食前溫服

仲景 四逆湯十四　又名通脉四逆湯○治傷寒陰症自利裏寒外熱脉沉身痛而厥

甘草炙二兩 乾薑炮一兩 附子一枚破八片生用

右㕮咀以水三升煮取一升二合分二次溫服其脈即出者愈○面色赤者加葱九莖○腹中痛者去葱加芍藥二兩○嘔者加生薑二兩○咽痛者加桔梗一兩○利止脈不出者加人參一兩

仲景 四逆加人參湯十五 治傷寒惡寒脈微而復利

即於前方內加人參一兩

仲景 四逆加豬膽汁湯十六 治傷寒吐下後汗出而厥四肢拘急脈微欲絕者

即於四逆湯內加入豬膽汁半合

仲景 茯苓四逆湯十七 治傷寒汗下後病仍不解煩躁者

茯苓六兩 人參一兩 甘草炙二兩 乾薑一兩半

附子一枚生用去皮切八片

右五味以水五升煮取三升去滓溫服七合日三服

茱萸四逆湯十八 治厥陰中寒小腹痛甚

吳茱萸湯泡 附子炮 乾薑各二錢 炙甘草一錢半

水一鍾半煎七分熱服

韓氏 茵陳四逆湯十九 治發黃脈沉細遲肢體逆冷腰已上自汗

茵陳二兩 炙甘草一兩 乾薑炮兩半 附子一個炮作八片

右分四貼水煎服

仲景 當歸四逆湯二十 治傷寒手足厥寒脈細欲絕者或下利脈大腸鳴者虛也及其人內有久虛者宜當歸四逆加吳茱萸生薑湯主之

當歸 桂枝 芍藥 細辛各三兩

甘草 通草各二兩 大棗二十五枚擘

右七味以水八升煮取三升去滓溫服一升日三服

四逆散二一 方在散陣二八

治陽邪亢熱血脈不通四肢厥逆

仲景 附子湯二二 治少陰病得之一二日口中和其背惡寒者當灸之附子湯主之并治少陰病身體痛手足寒骨節痛脈沉者

附子二枚去皮破八片 人參二兩 白朮四兩 芍藥

茯苓各三兩

右五味以水八升煮取三升去滓溫服一升日三服

三因 附子湯二三 治風寒濕痺骨節疼痛皮膚不仁肌肉重著

四肢痿縱

附子生　白芍藥　桂心　甘草

白茯苓　人參　乾薑各三兩　白朮一兩

右㕮咀每服四錢水煎服

生附湯二四　治寒濕腰痛

附子生用　白朮　茯苓　牛膝

厚朴　乾薑　炙甘草各二錢　蒼朮

杜仲薑炒各二錢

水二鍾生薑三片紅棗二枚煎八分食前服

參附湯一五　方在補陣三八

治元陽不足喘急呃逆嘔惡厥冷等證

仲景朮附湯一六　方在補陣四一

治中寒中氣不足逆冷痰盛口噤等證

芪附湯一七　方在補陣四四

治氣虛陽弱虛汗倦怠

濟生朮附湯一八　方在補陣四三

治寒濕腰冷重痛小便自利

金匱桂枝附子湯一九　治傷寒八九日風濕相搏身體疼煩不

能轉側不嘔不渴脈浮虛而濇者

桂枝四兩去皮　生薑三兩切　附子三枚炮去皮破八片　甘草二兩炙

大棗十二枚擘

右五味以水六升煮取二升去滓分溫三服

金匱白朮附子湯二十　治傷寒八九日風濕相搏身體疼煩不

能轉側不嘔不渴脈虛浮而濇若大便堅小便自利者去桂

枝此方主之

白朮二兩　附子一枚炮去皮　甘草炙一兩　生薑一兩半切

大棗六枚

右五味以水三升煮取一升去滓分溫三服一服覺身痺半

日許再服三服都盡其人如冒狀勿怪即是朮附並走皮中

逐水氣未得除故耳

金匱甘草附子湯二一　治風濕相搏骨節疼煩掣痛不得屈伸

近之則痛劇汗出短氣小便不利大便反快惡風不欲去衣

或身微腫者此主之

甘草炙　白朮各二兩　附子一枚炮去皮　桂枝四兩去皮

右四味以水六升煮取三升去滓溫服一升日三服初服得

微汗則解能食汗後復煩者服五合恐一升多者服六七合

為妙

良方 薑附湯 三二 治霍亂轉筋手足厥冷或吐逆身冷脉微急

用此藥救之 此即仲景乾薑附子湯

乾薑一兩 附子一個生用

右㕮咀每服半兩水煎 外科薑附湯有人參白朮

生薑附子湯 三三 治嶺南瘴癘內虛發熱或寒熱往來嘔痰

吐逆頭疼身痛或汗多煩躁引飲或自利小便赤兼主卒中

風

附子一枚如法製分四服

右每服水一鍾生薑十片煎六分微溫服

乾薑附子湯 三四 治瘴毒陰證發熱或煩躁手足冷鼻尖冷

身體重痛舌上胎生引飲煩渴或自利嘔吐汗出惡風

大附子一枚製分四服

右每服加炮乾薑二錢同煎溫服熱甚者冷服

寶鑑 羌活附子湯 三五 治呃逆

羌活 附子 乾薑炮 茴香各一錢

木香五分

水鍾半棗一枚煎服 三因方木香代丁香

仲景 芍藥甘草附子湯 三六 治發汗病不解反惡寒者虛故也

芍藥 甘草炙各三兩 附子一枚炮去皮切八片

上三味以水五升煮取一升五合去滓分溫服

活人 附子八味湯 三七 治氣虛中寒脚氣等症

附子炮去皮臍 人參 乾薑炮 芍藥

茯苓 甘草炙 桂心各二兩 白朮四兩

右每服五七錢水一鍾半煎七分食前溫服 又方去桂心

加乾熟地黃三兩

六物附子湯 三八 方在外科三五

治四氣流注太陰四肢骨節煩疼浮腫小水不利

小建中湯 三九 方在補陣二二

治虛勞裏急腹痛失精四肢痠疼咽乾口燥等症

局方 大建中湯 四十 方在補陣二四

治陽虛氣血不足腰脚筋骨疼痛

八味大建中湯 四一 方在補陣二五

治中氣不足厥逆嘔吐心急陰縮腹痛虛火等證

三建湯 四二 治元陽素虛寒邪外攻手足厥冷六脉沉微大

小便數滑凡中風潮涎不省人事傷寒陰證皆可用之

大附子　大川烏　天雄各製用二錢

右用水二鍾薑十片煎一鍾不拘時或溫服或冷服○自汗加桂浮小麥、氣逆加沉香○胃冷加丁香胡椒

仲景炙甘草湯四三　一名復脉湯　治傷寒脉結代心動悸

炙甘草四兩　生薑　桂枝去皮各三兩　人參

阿膠各二兩　生地黄一斤　麥冬去心半斤　麻子仁半斤

大棗十二枚劈

右九味以清酒七升水八升先煮八味取三升去滓內膠烊盡溫服一升日三服

仲景桂枝甘草湯四四　治發汗過多其人叉手自冒心心下悸欲得按者

桂枝四兩去皮　甘草二兩

右二味以水三升煮取一升去滓頓服

陶氏回陽返本湯四五　治陰盛格陽陰極發躁渴而面赤欲坐泥水中脉則無力或脉全微欲絶者○服後脉微出者生頓出者死

人參　製附子　炮薑　炙甘草

五味子　麥冬　陳皮　臘茶

面戴陽者下虛也加葱七莖黄連少許用澄清泥漿水一鍾煎之臨服入蜜五匙頓冷服之取汗為效

華陀救脫陽方四六　治寒中三陰口噤失音四肢强直攣急疼痛似乎中風及厥逆唇青囊縮無脉或卒倒厥脫陽等證

先急用葱白一握微搗碎炒熱用布包熨臍下以一包更替熨之甚者仍灸氣海關元二三十壯脉漸出手足漸溫乃可生也

次用附子一個重一兩者切八片白朮乾薑各五錢木香

二錢同用水二鍾煎一鍾候冷灌服須臾又進一服或煎服回陽等湯

仲景旋復代赭石湯四七　治傷寒若汗或吐下解後心下痞鞕噫氣不除者

旋復花　甘草炙各三兩　人參二兩　生薑五兩切

代赭石一兩　大棗十二枚擘　半夏半升洗

右七味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服

仲景厚朴生薑甘草半夏人參湯四八　治發汗後腹脹滿

厚朴去皮炙 生薑一斤切各半 半夏半斤洗 人參一兩
甘草二兩炙
右五味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日三服
簡易 十味剉散 四九 治中風血弱臂痛連及筋骨舉動艱難
附子三兩炮 當歸 黄芪炙 白芍藥各一兩
川芎 防風 白朮各兩半 肉桂一兩
熟地 茯苓各七錢半
右㕮咀每服五七錢水一鍾半薑八片棗三枚煎八分食後臨
臥服

和劑 芎朮湯 五十 治寒濕頭痛眩運痛極
川芎 附子生去皮臍 白朮各三錢 桂心去皮
甘草各一錢
水一鍾半生薑七片棗二枚煎八分食遠服
正元散 五二 治脉虛陽虛
紅豆炒 乾薑炮各三錢 人參 白朮
炙甘草 茯苓各二兩 附子炮去皮臍 川芎
山藥薑汁炒 烏藥 乾葛各一兩 川烏炮去皮臍
肉桂各五錢 黄芪炙一兩半 陳皮二錢

右㕮咀每服三錢水一鍾薑三片棗一枚入鹽少許煎服
金匱 生薑半夏湯 五三 治胸中似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦
徹心中憒憒然無奈者
半夏半斤 生薑汁一升
右二味以水三升煮半夏取二升內生薑汁煮取一升半小
冷分四服日三夜一服病止停後服
金匱 半夏乾薑散 五四 治乾嘔吐逆吐涎
半夏制 乾薑炮等分
右二味杵為散取方寸匕用漿水一升半煎取七合去柤頓

服之
仲景 甘草乾薑湯 五五 治少陰傷寒小便色白吐逆而渴動氣
因下反劇身雖有熱反倦及肺痿吐涎沫而不欬口不渴小
便數遺尿肺中冷上虛不能制下眩暈多涎唾等證○楊仁
齋曰治男女諸虛出血胃寒不能引氣歸元無以收約其血
者○良方名甘草湯治陰盛于陽寒而嘔血
甘草炙四兩 乾薑炮二兩
右㕮咀以水三升煮取一升五合分溫再服○仁齋曰等分每
服三錢食前煎服

橘皮乾薑湯 五六 治惡心嘔噦

人參 乾薑 肉桂各一錢 陳皮

通草各錢半 甘草五分

水一鍾半煎八分服

金匱 橘皮湯 五七 亦名生薑橘皮湯○治乾嘔噦若手足厥者

橘皮四兩 生薑半斤

右二味以水七升煮取三升溫服一升下咽即愈

萬氏 橘皮湯 五八 方在痘疹九二

行滯消痰止嘔吐

金匱 橘皮竹茹湯 五九 治噦逆

橘皮二斤 竹茹二升 生薑半斤 甘草五兩

人參一兩 大棗三十枚

右六味以水一斗煮取三升溫服一升日三服

小半夏湯 六十 方在和陣八

治嘔吐及心下有飲者

三因 丁香散 六一 治呃逆

丁香 柿蒂各一錢 炙甘草 良薑各五分

右為末熱湯點服二錢不拘時

丁香煮散 六二 治翻胃嘔逆

丁香 石蓮肉各十四枚 北棗七枚切碎 生薑七片

黃秫米半合洗

水一碗半同煮稀粥去藥啜粥

簡易 丁附散 六三 治反胃嘔逆粥食不下

大附子一枚坐於磚石上四面著火漸漸逼熱淬入生薑

汁中浸少頃如法再淬約盡薑汁半碗許為度去皮焙乾

為末

丁香二錢研

二味勻和每服二錢水一鍾粟米同煎七分服

楊氏 丁香茯苓湯 六四 治脾胃虛冷宿食留滯痞塞疼痛氣不

升降以致嘔吐涎沫或噁酸水不思飲食

半夏制 橘紅 茯苓各一兩 丁香

附子制 肉桂 砂仁各五錢 乾薑炮

木香各一兩

每服四錢水一鍾半薑七片棗一枚煎七分服

良方 丁香柿蒂散 六五 治吐利或病後胃中虛寒呃逆凡呃逆

至七八聲相連收氣不回者難治

丁香　柿蒂　炙甘草　良薑各五分
人參　半夏　陳皮　茯苓各一錢
生薑一錢
水二鍾煎熟服
寶鑑 丁香柿蒂散 六六　治呃逆嘔吐
丁香　柿蒂　青皮　陳皮各等分
水一鍾半薑五片煎服
嚴氏 柿蒂湯 六七　治胸滿呃逆不止
柿蒂　丁香各一錢

加生薑五片水煎服○家珍方有人參一味
百一 安脾散 六八　治胃氣先逆飲食過傷憂思蓄怨宿食痞積冷飲寒痰動搖脾胃不能消磨致成斯疾女人由血氣虛損男子皆由下元虛憊有食罷即吐有朝食暮吐暮食朝吐所吐酸臭與水皆是脾敗惟當速治遲則發煩渴大便秘水飲不得入口而危矣
南木香磨汁　橘紅　人參　白朮
草果麵煨　茯苓　甘草炙　丁香
胡椒各兩半　高良薑一兩用陳壁土三合以水二碗同煮乾切片

右㕮咀每服五錢水一鍾半入鹽少許煎七分食遠溫服或爲細末每服五錢用鹽米湯調下
三因 補脾湯 六九　治脾胃虛寒泄瀉腹滿氣逆嘔吐飲食不消
人參　白朮　茯苓　厚朴炒
陳皮各一錢　乾薑炒　甘草炙　草果
麥芽炒各八分
水一鍾半煎七分空心溫服
三因 養胃湯 七十　治脾胃虛寒嘔逆惡心腹脅脹疼腸鳴泄瀉
藿香　厚朴炒　半夏制　茯苓各錢半

草果　陳皮　人參　白朮炒各一錢
附子製八分　甘草炙五分
水一鍾半薑三片棗一枚煎七分食遠服
胃愛散 七一　治脾胃久虛中焦氣滯或冷逆上衝嘔吐惡心或胸膈疼痛不思飲食或泄瀉不止
人參　白朮　茯苓　黃芪炙各二錢
丁香　甘草炙各一錢　肉果一個煨　乾薑炒半兩
右用白米炒熟四兩同研爲末每服二三錢用薑湯或人參湯調服○或爲㕮咀每服五七錢加炒米一兩煎服亦可

東垣藿香安胃散七二　治脾胃虛弱不能進食嘔吐吞酸腹痛不能腐熟

藿香　人參　陳皮各一錢　丁香五分

生薑十片

水一鍾半煎七分食遠服

良方七味人參丸七一　治胃冷兼虛嘔逆不食服許則仁半夏丸不效可服此藥○方見和陣一三二

人參　白朮炒各五兩　厚朴薑制　北細辛各四兩

生薑　橘皮各三兩　桂心一兩

右為末煉蜜丸桐子大米飲下十丸漸加至二十丸

甘露湯七四　治反胃嘔吐不止飲食減少常服之快利胸膈調養脾胃進飲食○徐東皋曰常州一富人病反胃往京口甘露寺設水陸泊舟岸下夢一僧持湯一碗與之飲覺猶記其香味便覺胸膈少快早入寺知客供湯乃是夢中所飲者胸膈尤快遂求其方合數十服後疾遂痊名曰觀音應夢散予得之常以待賓易名曰甘露湯又在臨汀療一人愈甚勿忽之

乾餳糟頭炸者用六分　生薑用四分

右和勻搗爛作餅或焙或曬乾每十兩入炙甘草二兩同研為末每服二錢用沸湯入鹽少許調不拘時服

金匱茯苓澤瀉湯七五　治胃反吐而渴欲飲水者○外臺治消渴脈絕反胃者

茯苓半斤　澤瀉　生薑各四兩　甘草

桂枝各二兩　白朮三兩

右五味以水一斗煮取三升內澤瀉再煮取二升半溫服八合日三服

仲景茯苓甘草湯七六　治水飲停蓄心下甚者作悸作利

茯苓　桂枝各二兩　甘草炙一兩　生薑三兩

右四味以水四升煮取二升去滓分溫三服

草荳蔻湯七七　和中調氣治嘔吐

草荳蔻　藿香各五分　陳皮　枳殼各七分

白朮　山藥各一錢　桂心　丁香各二分

水一鍾半薑五片棗二枚粟米少許煎七分食前溫服

大順散七八　治冒暑伏熱引飲過多以致寒濕傷脾陰陽氣逆霍亂吐瀉藏府不調等症

乾薑　肉桂　杏仁各四兩　甘草三兩

右先將甘草微炒黃次入乾薑同炒令薑裂又入杏仁同炒令杏仁不作聲爲度却同肉桂研羅一處每用二三錢以水一鍾煎數沸溫服〇如煩躁者以井花水調服不拘時〇此方加附子即名附子大順散

四順附子湯 七九 治霍亂轉筋吐瀉手足逆冷六脉沉絶氣少不語身冷汗出

附子 生 白乾薑 炮 人參 甘草 炙各一兩

右㕮咀每服四五錢水鍾半煎七分食遠服

醫林 附子粳米湯 八十 治霍亂四逆多嘔少吐者

中附子 一枚炮 半夏 湯泡 乾薑 炒 甘草 炙各一錢

大棗 十枚 粳米 五合

右㕮咀每服八錢水鍾半煎米熟去粗服

冷香飲子 八一 治傷暑暍霍亂腹痛煩躁脉沉微或伏

附子 炮 陳皮 各一錢 草果 甘草 炙各錢半

水一鍾半薑十片煎八分井水頓冷服

集成 冷香湯 八二 治夏秋水濕恣食生冷陰陽相干遂成霍亂臍腹刺痛脇肋脹滿煩躁引飲無度或感疫癘熱脇肋脹不利或嘔或泄等症

良薑 白檀香 草荳蔻 麪包煨 附子 炮

炙甘草 各一錢 丁香 七粒

水一鍾半煎七分用井水浸冷於嘔吐時服之效或爲細末水調生麪糊丸如芡實大每服一丸新汲水磨下亦可

直指 木瓜湯 八三 治吐瀉不已轉筋擾亂

木瓜 一兩 茴香 微炒一錢半 吳茱萸 半兩湯泡 炙甘草 二錢

右㕮咀分二服加薑五片紫蘇十葉空腹煎服之〇良方有生薑二錢五分無茴香甘草名木瓜煎

三因 訶子散 八四 治老幼霍亂一服即效

訶子 炮去核 炙甘草 厚朴 薑製 乾薑 炮

神麴 炒 良薑 炒 茯苓 麥芽 炒

陳皮 草荳蔻 等分

右爲細末每服二錢當病發不可忍時用水煎入鹽少許服之

霍亂三方 八五 治霍亂瀉利不止轉筋入腹欲死者

用生薑三兩搗爛入酒一升煮三四沸頓服

一方凡霍亂吐痢不能服藥急用胡椒四十粒以飲吞之

一方凡霍亂吐瀉不止用艾一把水二升煮一升頓服之

千金霍亂方八十六　治霍亂乾嘔不止
以蘋葉煎一升服三次立愈
乾霍亂二方八十七　凡欲吐不吐欲下不下嘔惡不止者用之
乾霍亂
一方用鹽一兩生薑半兩擣同炒令色變以水一盞煎熱服
一方用丁香十四粒為末以熱湯一盞調服
苓桂朮甘湯八十八　治心下有痰飲胸脇支滿目眩
茯苓四兩　桂枝　白朮各三兩　甘草二兩
右用水六升煮取三升分三服小便即利

參朮湯八十九　治心下停飲怔忡
白薑　白朮　白茯苓　半夏麴各一錢
官桂二分　甘草五分
水一鍾半薑三枚煎服
韓氏溫中湯九十　凡病人兩手脈沉遲或緊是皆胃中寒也
若寸脈短少及力少於關尺者此陰盛陽虛也或胸膈滿悶
腹中脹滿身體拘急手足厥冷急宜溫之
丁皮　丁香各七分　厚朴　乾薑
陳皮　白朮各一錢

水鍾半加葱白荊芥穗同煎
東垣厚朴溫中湯九十一　治脾胃虛寒心腹脹滿或見疼痛
厚朴薑炒　橘紅　乾薑各一錢　茯苓
草豆蔻　木香　甘草各五分
水煎溫服
大正氣散九十二　方在和陣二十四
治風寒濕氣傷脾心腹脹悶有妨飲食
強中湯九十三　治生冷寒漿有傷脾胃遂成脹滿有妨飲食甚
則腹痛

人參　橘紅　青皮　丁香各二錢
白朮炒　附子炮去皮　草豆蔻　乾薑炮各一錢
厚朴薑汁炒　甘草炙各五分
水鍾半薑三片紅棗二枚煎七分不拘時服○嘔加半夏○
若傷麪食加萊菔子一錢
丁香強中丸九十四　治胃脘虛寒痰飲留滯痞塞不通氣不升降
○丹方溫中化痰丸即此方不用半夏
高良薑　乾薑炮　陳皮　青皮各一兩
半夏製　兩

右為細末生薑汁煮糊丸桐子大每服三十丸薑湯下

三生飲九五　此治中風乃行經治痰之劑斬關奪門之將必用人參駕馭其邪而補助真氣乃可用之否則恐反為害

生南星一兩　生川烏去皮半兩　生附子去皮半兩　木香二錢

每用一兩加人參一兩同煎服

嚴氏三生丸九六　治痰厥頭痛

南星　半夏　白附子等分

右為末薑汁浸蒸餅丸小豆大每服四十丸食後薑湯下

五生丸九七　治風癇

川烏頭　附子各生用去皮臍　南星生　半夏生

乾薑生各半兩

右為細末醋煮大豆汁作麪糊和丸桐子大每服五丸冷酒送下不拘時

局方溫中化痰丸九八　治停痰留飲

陳皮　青皮　良薑　乾薑等分

右為細末醋煮糊丸桐子大每服三十丸空心米飲送下

寶鑑溫胃化痰丸九九　治胸內有寒脾胃傷飲胸膈不快痰涎不已

半夏制三兩　白朮　陳皮　乾薑炮各一兩

右為末薑汁糊丸桐子大薑湯下二十丸

局方倍朮丸百　治五飲酒癖等證〇一曰留飲停水在心下〇二曰澼飲水在兩脇〇三曰痰飲水在胃中〇四曰溢飲水溢在膈〇五曰流飲水在腸間瀝瀝有聲皆由飲水過多或飲冷酒所致

白朮炒二兩　桂心　乾薑炒各一兩

右為末蜜丸每服二十丸溫米飲下加至三五十丸食前服

發明丁香半夏丸百一　治心下停飲冷痰

丁香　半夏制各一兩　人參　乾薑炮

細辛各五錢　檳榔三錢

右為細末薑汁糊丸桐子大每服三十丸薑湯下

局方丁香五套丸百二　治胃氣虛弱三焦痞塞不能宣行水穀故痰飲聚結嘔吐惡心脹滿不食

丁香　木香　青皮　橘紅各半兩

白朮　茯苓　良薑　乾薑各一兩

南星制　半夏制各二兩

右為末湯浸蒸餅丸桐子大每服七十丸溫湯下

三因復元丹 百三　治脾腎虛寒發為水腫四肢虛浮心腹堅脹
小便不通兩目下腫
附子炮二兩　南木香煨　茴香炒　川椒炒出汗
厚朴制　獨活　白朮炒　橘紅
吳茱萸炒　桂心各一兩　澤瀉一兩半　肉豆蔻煨
檳榔各半兩
右為末糊丸梧子大每服五十丸紫蘇湯不拘時送下
薛氏加減金匱腎氣丸 百四　方在補陣一二六
治脾腎陽虛不能制水為腫為脹

壽世實脾散 百五　治陰水發腫宜先實脾土
附子制　炮乾薑　厚朴　木香
大腹皮　草果仁　木瓜各錢半　甘草炙五分
水二鍾薑五片棗一枚煎七分不拘時服
嚴氏實脾散 百六
即前方加白朮茯苓
簡易腹脹方 百七
凡肚腹脹滿不能用藥者以獨蒜煨熟去皮綿裹納下部中
冷即易之○又治關格脹滿大小便不通亦用上法氣立通

○又方用生薑如指大一塊煨熟以綿裹乘熱納下部中冷
即易之
丁香止痛散 百八　治心痛不可忍
丁香半兩　良薑二兩　茴香炒　甘草各兩半
右為細末每服二錢不拘時沸湯點服
勝金散 百九　治卒心痛
桂枝　玄胡索炒　五靈脂　當歸各半兩
右為末煉蜜丸桐子大每服二十丸食前陳皮湯送下
良方鐵刷散 百十　治心脾積痛婦人血氣刺痛酒病惡心腸胃
洪瀉

良薑炒二兩　茴香炒七錢　蒼朮制　甘草炙各二兩八錢
右為末每服二錢空心薑鹽湯調下
局方蟠蔥散 百十一　治男婦脾胃虛冷滯氣不行攻刺心腹痛
連胸脇膀胱小腸寒疝氣疝及婦人血氣刺痛
蒼朮米泔浸切　炙甘草各八錢　三稜煨　蓬朮煨
茯苓　青皮各六錢　丁皮　砂仁去殼
檳榔各四錢　延胡索八錢　乾薑炒　肉桂各二錢
右每服五錢水一盞入連根蔥白一莖煎七分空心熱服或

為末用葱湯調服二三錢

寶鑑 沉香桂附丸 百十二 治中氣虛寒飲食不美陰盛陽虛藏府積冷心腹疼痛脇肋膨脹腹中雷鳴便利無度面色不澤手足厥冷及下焦陽虛疝氣疼痛不可忍腰屈不能伸喜熱熨稍緩等證

附子 炮去皮臍 川烏 制同 沉香 肉桂

乾薑 炮 良薑 炒 茴香 炒 吳茱萸 炮各一兩

右為末醋煮麵糊丸桐子大每服五七十丸食前米飲下日二服忌生冷

椒附丸 百十三 治小腸虛冷小腹痛小便頻而清白

椒紅 炒 附子 炮 龍骨 桑螵蛸 炙

山茱萸 鹿茸 酒蒸焙各等分

右為末酒糊丸桐子大每服六十丸空心鹽湯下

大沉香丸 百十四 治寒氣攻衝心腹刺痛亦治卒暴心痛

沉香 乾薑 炮 薑黃 桂心

檀香 各二兩 甘松 洗焙 白芷 天台烏藥

甘草 各半斤 香附 一斤 白豆蔻 三兩

右為末煉蜜和丸彈子大每服一丸細嚼生薑湯下不拘時

寶鑑 桂附二陳湯 百十五 治寒疾痰多熱少腰足厥冷

附子 炮 肉桂 半夏 制 白茯苓

陳皮 炙甘草

右㕮咀每服五六錢水一鍾半薑三片棗一枚煎服

扶陽助胃湯 百十六 羅謙甫治崔運使長男雲卿年二十五體肥養厚常食涼物寒藥以致秋間疼發復用水吞硇石等藥反增吐瀉中氣愈虛延至次年四月復因勞怒前證大作診其脈得弦細而微手足稍冷面色青黃食少痞悶嘔酸氣促汗出予思內經云中氣不足溲便為之變腸為之苦鳴下氣不足則為痿厥心悗又曰陽氣客于腸胃之間則卒然而痛非大熱之劑不能愈遂制此方

附子 炮去皮臍二錢 乾薑 炮錢半 草豆蔻 益智仁

揀參 甘草 炙 官桂 白芍藥 各一錢

吳茱萸 陳皮 白朮 各五分

右㕮咀水二盞棗二枚薑三片煎八分食前溫服二服後大勢去痛減半至秋灸中脘以助胃氣又灸氣海百餘壯生發元氣明年復灸三里二七壯亦助胃氣引氣下行仍慎加調攝一年而不復

五味沉附湯 百十七 治虛寒無陽胃弱乾嘔
熟附子 乾薑 炮各一錢 白朮 炙甘草 各錢半
沉香 五分
水盞半薑五片煎七分食前服

二味沉附湯 百十八 治痼冷上熱下寒腿足寒厥
沉香 磨汁 附子 制各一錢
水一鍾半生薑十片煎八分去柤入沉香汁放冷服此藥主上熱下寒○全集云沉水氣正鎮所沉香其味甘辛者爲美辛辣者生熟附子降氣散湯治陰毒冷痺只一服而回生起死氣可以奪化功

七棗湯 百十九 治瘴瘧或因感冒風寒或是五臟氣虛陰陽相搏寒多熱少或但寒不熱皆可服
大附子 一枚制分四服○又方用川烏代附子以水調陳壁土爲糊浸泡七次
水一鍾薑七片棗七枚煎七分 錙當發日早晨空心溫服仍喫棗子三五枚忌如常

冷湯 百二十 治瘴毒內寒外熱咽嗌間煩躁不解
人參 半兩 大附子 一隻 甘草 炙二寸 淡竹葉 十四片
大棗 五枚
水煎溫服或冷服○甚者宜倍用人參附子不可拘此常數

生薑煎 一二一 治瘧如瘧將寒壯熱
老生薑一大塊打破濕紙包煨熟
右用水一鍾煎半鍾熱服取微汗

芎附散 一二二 治五種痺痛腿臂間發作不定者
小川芎 附子 炮去皮 黃芪 防風
白朮 當歸 酒洗 熟地 桂心
甘草 柴胡 等分

水一鍾薑一片棗一枚煎八分空心服

朮參附滲濕湯 一二三 治坐臥濕地雨露所襲身重腳弱關節疼痛發熱惡寒小便不利大便溏泄
人參 白朮 茯苓 甘草
附子 炮 乾薑 炮 桂枝 芍藥 等分
水二鍾薑三片棗一枚煎八分不拘時服

七味滲濕湯 一二四 方在和陣一七四
治寒濕所傷身體重著小便赤澁大便溏泄

椒附散 一二五 治胸痹心背疼痛氣悶

烏頭　細辛　附子　羌活

川椒　桂心各一兩　川芎一兩一分

右爲末以少醋拌勻炒熱或用布裹微火炙令煖以熨痛上取汗乃止忌生冷如常服(一)按此方當用紙包裹貯香者佳附子似不必用

溫中法麴丸　一二六　治脾痺發欬嘔汁

法麴炒　枳實麩炒　白茯苓　吳茱萸湯泡炒

桂心　厚朴薑製　當歸　甘草炙各一兩

人參　麥冬　乾薑炮　細辛

附子炮　桔梗炒各　麥芽炒各五合

右爲細末煉蜜丸梧子大每服七十丸食前熱水下日三

丹溪龍虎丹　一二七　治走注疼痛或麻木不仁或半身疼痛

草烏　蒼朮　白芷各一兩

右爲末水拌發熱過再入乳香二錢當歸牛膝各半兩酒糊丸彈子大酒化下

活絡丹　一二八　方在和陣二七七

治中風手足不用日久不愈經絡中有濕痰死血者

一至丸　一二九　治老人虛弱腎氣虛損腹痛不可俯仰

附子炮去皮　桂心　杜仲炒　補骨脂炒各一兩

鹿角霜　鹿角膠　鹿茸酒炙　青鹽另研各半兩

右爲末酒煮糊丸梧子大每服七十丸空心用胡桃肉細嚼鹽湯或溫酒送下如畏熱藥者去附子加肉蓯蓉

三因腎著湯　一三十　治腎虛身重腰冷如坐水中不渴小便自利食飲如故腰下重痛如帶五千錢

茯苓　白朮各四兩　炙甘草　乾薑炮各二兩

右㕮咀每服四錢水煎空心冷服(一)一方用蒼朮二兩

(一)良方每服有杏仁五分治姙娠腳腫

韓氏茵陳附子湯　一三一　治發黃服四逆湯身冷汗不止者

附子二個各作八片　乾薑炮二兩半　茵陳一兩半

右用水煎分作三服

韓氏小茵陳湯　一三二　治發黃脈沉細遲肢及遍身冷

附子一個炮作八片　炙甘草一兩　茵陳二兩

右用水二升煮一升分作二服

韓氏茵陳橘皮湯　一三三　治身黃脈沉細數熱而手足寒喘嘔煩躁不渴者

茵陳　橘皮　生薑各一兩　白朮一錢半

半夏　茯苓各五錢
右用水四升煮取二升放溫分作四服
五膈散一二三四　方在和陣一五六
治五膈五噎
十膈散一二五　方在和陣一五八
治十般膈氣
五噎散一二六　方在和陣一五九
治諸氣結聚膈脘痞悶痰逆噁心飲食不進
良方白朮聖散子一二七　治一切瀉痢久不瘥并婦人產後痢

疾
白朮　砂仁　當歸　肉荳蔻
乾薑炮　陳皮　炙甘草　石榴皮
訶子　芍藥炒等分
右㕮咀每服五錢水一鍾半入乳香豆大煎八分食前服
仲景吳茱萸湯一二八　嘔而胸滿乾嘔吐涎沫頭痛及食穀欲
嘔者此方主之
吳茱萸一升　人參三兩　生薑六兩　大棗十枚擘
右四味以水五升煮取二升溫服七合日三服

良方吳茱萸湯一二九　治冒暑伏熱腹痛瀉痢或飲食過度霍
亂吐瀉或食冷冒寒或忍饑大怒或因舟車傷動胃氣令人
吐瀉並作轉筋逆冷等證遲則不救
吳茱萸　木瓜　食鹽各半兩
右同炒令焦先用磁瓶盛水三升煮百沸入藥煎至二升已
下傾一盞或冷或熱隨病人之便服之〇若卒無前藥止用
鹽一撮醋一盞同煎八分溫服或鹽梅鹹酸等物皆可用
吳茱萸散百四十　治腸痹寒濕內聚腹痛滿氣急大便飧泄
炮乾薑　炙甘草　吳茱萸　肉荳蔻麪裹煨
砂仁　神曲炒各一錢　白朮　厚朴薑製

陳皮各二錢　一方有良薑
右為末每服二錢空心米飲調下
海藏吳茱萸丸一四一　治下痢臟府不調脹滿腹痛水穀不化
怠惰嗜臥時時下痢乃陰濕證也
吳茱萸湯泡兩半　神麴炒五兩　白朮炒四兩　肉桂
乾薑炮各一兩半　川椒去目炒二兩
右為末糊丸梧子大米飲下三五十丸食前服
楊氏八味湯一四二　治脾胃虛寒氣滯不行心腹刺痛臟府虛

滑

人參　當歸　炮薑　吳茱萸湯泡七次

肉桂　丁香　木香　陳皮各一錢

右㕮咀水一鍾半煎七分溫服無時○按此湯味太剛烈當加炙甘草方妙

者

仲景 真武湯一四三　治少陰傷寒腹痛小便不利四肢沉重疼痛自下利者此為有水氣其人或欬或小便利或下利或嘔

茯苓　芍藥　生薑各三兩　白朮二兩

附子一枚炮去皮切八片

右五味以水八升煮取三升去滓溫服七合日三服○若欬者加五味子半升細辛乾薑各一兩○小便利者去茯苓○下利者去芍藥加乾薑二兩○嘔者去附子加生薑足前成半斤

良方 九寶丹一四四　調理脾胃止泄瀉

人參　白朮炒　茯苓　炙甘草

乾薑炮　木香　縮砂去土　訶子去核

肉豆蔻麵煨各一錢

水一鍾半加薑煎食遠服

生方 四柱散一四五　治本元氣虛真陽耗散臍腹冷痛泄瀉不止

人參　附子炮　白茯苓　木香各一兩

右㕮咀每服五七錢水一鍾半煨薑五片鹽少許食遠煎服○滑泄不止加肉豆蔻訶子名六柱散○治人有白朮無訶子

仲景 白通湯一四六　治少陰病下利

葱白四莖　乾薑一兩　附子一枚生用去皮破八片

右三味以水三升煮取一升去滓分溫再服

白通加豬膽汁湯即於前方加人尿五合豬膽汁一合治少陰下利無脈乾嘔而煩者服湯後脈暴出者死微續者生

仲景 桃花湯一四七　治少陰傷寒下利便膿血

赤石脂一斤半篩末半全用　乾薑一兩　粳米一升

右三味以水七升煮米令熟去滓溫服七合內所篩赤石脂細末方寸匕攪勻服之日三服若一服愈餘勿服

聖濟 漿水散一四八　治暴泄如水周身汗出一身盡冷脈微而弱氣少不能語者甚者加吐即為急證

半夏一兩制 附子制 炮薑 肉桂
甘草各五錢 良薑二錢半
右為末每服三錢漿水一鍾半煎至半鍾熱服
澹寮 附子茴香散 一四九 治氣虛積冷心腹絞痛泄瀉食少
人參 白朮 茯苓 炙甘草各七分
附子制 炮薑各五分 茴香 肉豆蔻各四分
木香三分 丁香五粒
水一鍾半煎七分食遠服
本事 五味子散 一百五十 治腎泄在侵晨及五更作瀉飲食不進

不時去後
五味子炒二兩 吳茱萸炒一錢
右為末每服二錢白湯調下為丸尤效
本事 二神丸 一五一 治脾胃虛寒不思飲食泄瀉不止
肉豆蔻生用二兩 破故紙炒四兩
右為末用大肥棗四十九枚入生薑片四兩同煮以棗爛為度去薑取棗肉搗藥為丸桐子大每服五六十丸白湯下
薛氏 四神丸 一五二 治脾腎虛寒大便不實飲食不思及泄痢腹痛等症

破故炒四兩 肉豆蔻麵煨 五味子各二兩 吳茱萸湯浸炒一兩
右為末用大棗百枚同薑八兩煮爛取肉搗丸桐子大每服七八十丸空心食前白湯下○按此丸不宜用棗但以薑汁煮麵糊為丸更佳
澹寮 四神丸 一五三 治脾腎泄清晨溏瀉
破故炒四兩 肉豆蔻二兩 木香半兩 小茴香炒一兩
右為末薑煮棗肉為丸桐子大白湯送下
醫林 四神丸 一五四 治寒疝脹痛不已
蓽澄茄 木香各半兩 吳茱萸半酒浸半醋浸 香附各一兩

右為末糊丸桐子大每服七八十丸空心鹽湯或乳香蔥湯任下
集要 四神丸 一五五 方在補陣百六十
治小便頻數不禁
五味子丸 一五六 治下元虛寒火不生土以致命門不暖關門不閉名曰腎泄亦名脾腎泄
人參 白朮炒 北五味子炒 破故炒各二兩
山藥炒 白茯苓各一兩半 吳茱萸湯泡炒 川巴戟去心炒
肉果麵煨各一兩 龍骨

右為末酒糊丸桐子大每服百餘丸食前白湯或米湯任下

得效 蓽撥丸 一五七 治滑泄中寒者宜之

蓽撥 川薑炮 丁香不見火 附子炮去皮臍

良薑 胡椒 吳茱萸湯泡炒 山茱萸

草豆蔻去皮各等分

煮棗肉丸桐子大每服五六十丸食前陳米飲下日二服

局方 肉豆蔻丸 一五八 治脾胃虛弱脹滿水穀不消臟腑滑泄

肉豆蔻麵煨 蒼朮制 乾薑炮 厚朴制

陳皮各四兩 炙甘草 茴香炒 肉桂

川烏炮去皮臍 訶子肉各二兩

右用湯浸蒸餅為丸梧子大每服七八十丸食前白滾湯下

陳氏 肉豆蔻丸 一五九 方在小兒五六

治腸滑瀉痢

濟生 訶梨勒丸 百六十 治大腸虛冷泄瀉不止腹脇引痛飲食不化

訶梨勒麵裹煨 附子炮 肉豆蔻麵裹煨 木香

吳茱萸湯泡炒 龍骨生用 白茯苓去皮 蓽撥各等分

右為細末生薑汁煮麵糊為丸梧子大每服七十丸空心米飲下

良方 厚朴丸 一六一 治寒中洞泄寒濕脹滿等證

厚朴炒 乾薑炒等分

右水拌炒為末水糊丸桐子大每服五十丸米飲下

百一 縮脾丸 一六二 治滑泄不禁

白朮炒 厚朴薑炒 赤石脂 肉豆蔻麵煨

乾薑炮 附子制 蓽撥 神麴炒各五錢

右為細末酒糊丸桐子大每服五七十丸空心米飲下

三因 桂香丸 一六三 治臟府虛寒為風寒所搏冷滑注下不禁危篤者累效

附子 肉豆蔻麵煨 白茯苓各一兩 桂心

乾薑炒 木香各半兩 丁香二錢半

右為末麵糊丸桐子大空心米飲下五七十丸

寶鑑 陳麴丸 一六四 磨積止瀉痢治腹中冷痛

陳麴一兩半 人參 白朮炒 當歸炒

乾薑 肉桂 甘草炙 厚朴制各半兩

右為細末煉蜜丸桐子大每服三五十丸溫酒或淡醋湯任下日二服

楊氏萆薢分清飲 一六五 治真元不足下焦虛寒或服寒涼剋
藥過多小便白濁頻數無度澄如膏糊等證
益智仁　川萆薢　石菖蒲　烏藥各等分
右㕮咀每服五六錢水一鍾入鹽一捻煎七分食前溫服○
一方加茯苓甘草
益智湯 一六六 治腎經虧損遺精白濁四肢煩倦時發蒸熱
等證
鹿茸酥炙　巴戟肉　枸杞子　熟地黃
蓯蓉酒浸　牛膝酒浸　附子炮去皮　桂心不見火

山茱萸　白芍藥　炙甘草　防風各等分
右每服二錢水一盞薑五分鹽少許同煎空心服
局方安腎丸 一六七 治腎經積冷下元衰憊目暗耳鳴四肢無
力夜夢遺精小便頻數臍腹撮痛食少體瘦神困健忘常服
壯元陽益腎水
肉桂去粗皮不見火　川烏炮去皮臍各一斤　白朮　山藥
茯苓　肉蓯蓉酒浸炙　巴戟去心　破故紙炒
萆薢　桃仁麩炒　石斛炙　白蒺藜炒去刺各三斤
右為末煉蜜丸桐子大每服三五十丸溫酒或鹽湯下空心
食前服○溫氣茴香湯下○三因安腎丸無茯苓肉桂二味
小安腎丸 一六八 治腎氣虛乏下元冷憊夜多漩溺體瘦神
倦腰膝沉重泄瀉腸鳴眼目昏暗牙齒蛀痛
川楝子一斤　用香附子川烏各一斤和鹽四兩水四升
同煮候乾去香附川烏不用取川楝切焙
小茴十一兩　熟地八兩　川椒四兩去目及閉口者微炒出汗
右為末酒糊丸桐子大每服二三十丸空心臨臥鹽湯或溫酒
任下
西蜀石刻安腎丸 一六九 治真氣虛憊腳膝軟弱夜夢遺精小

便滑數
附子制　肉桂　川烏制　川椒去目微炒出汗
兔絲制　巴戟制　破故酒炒　赤石脂煅
遠志制　茯神　茯苓　蒼朮米泔浸炒
山茱萸　杜仲制　石斛　胡蘆巴炒
柏子仁　韭子微炒　小茴酒炒　肉蓯蓉酒浸
川楝子酒蒸去核各二兩　鹿茸制一兩　青鹽四錢
山藥四兩作糊
右為末酒煮山藥糊丸桐子大每服七八十丸空心鹽湯或

白湯下

元戎 小巳寒丸 百七十 一名強中丸○治脾胃積冷中寒洞泄倦怠不思飲食進食止自汗厚腸胃○見肘後甚驗

艾葉四兩 蒼朮一兩炒 吳茱萸炒 陳皮炒各一兩

右用米醋二升浸一宿漉出曬乾再於原醋內拌勻炒令紫色焙乾為末稀糊丸桐子大每服三五十丸空心食前溫酒鹽湯米湯白湯任下

局方 大巳寒丸 一七一 治臟府虛寒心腹疞痛腸鳴泄瀉自利自汗米穀不化手足厥冷陰盛陽衰等證

蓽撥 肉桂各四兩 乾薑炮 良薑各六兩

水煮麪糊為丸桐子大每服二三十丸食前米飲下

元戎 大巳寒丸 一七二 治諸沉寒冷秘等證

吳茱萸 官桂 乾薑 良薑

烏頭 附子

右為末醋糊丸桐子大每服三五十丸米飲下空心食前日二服無所忌

海藏 巳寒丸 一七三 此丸不僭上而陽生於下○治陰證服四逆輩胸中發躁而渴者或數日大便秘小便赤澁服此丸上不燥大小便自利

肉桂 附子炮 烏頭炮 良薑

乾薑 芍藥 茴香各等分

右為末米糊丸桐子大空心溫水下五七十丸或八九十丸食前亦可酒煮糊丸亦可○海藏云巳寒上五味雖熱以芍藥茴香潤劑引而下之陰得陽而化故大小便自通如得春和之陽冰自消矣

十補丸 一七四 治腎臟虛冷面黑足寒耳聾膝軟小便不利等證

附子炮 五味各二兩 山藥 山茱萸

丹皮 桂心 鹿茸制 茯苓

澤瀉各一兩

煉蜜丸桐子大每服六七十丸鹽湯下

濟生 十補丸 一七五 治小腸寒疝

附子一大枚制 胡蘆巴 木香 巴戟天

川楝肉 玄胡索 官桂 蓽澄茄

大茴香 破故紙炒各一兩

右為末酒煮糯米粉糊為丸桐子大硃砂為衣空心酒下五

十九

神應散 一七六 治寒疝諸疝心腹痛不可忍散氣開鬱

玄胡索 胡椒 小茴香等分

右為末每服二錢酒調下

（金匱）當歸生薑羊肉湯 一七七 治寒疝腹中疝痛裹急者

當歸三兩 生薑五兩 羊肉一斤

右三味以水八升煮取三升溫服七合日三服若寒多者加生薑成一斤痛多而嘔者加橘皮二兩白术一兩加生薑者亦須加水五升煮取三升二合服之

（丹溪心法）小茴香丸 一七八 治諸疝痛

小茴香炒 破故紙炒 吳茱萸鹽炒各五錢 胡蘆巴七錢半

木香三錢半

右為末蘿蔔汁丸桐子大鹽湯下五七十丸

（百一選方）胡蘆巴丸 一七九 治小腸氣蟠腸氣奔豚疝氣偏墜陰腫小腹有形如卵上下來去痛不可忍或絞結繞臍攻刺嘔吐者

胡蘆巴炒一斤 大巴戟炒 川烏炮去皮各六兩 川楝子炒十八兩

茴香二十兩 吳茱萸湯浸七次炒十兩

右為末酒糊丸桐子大每服十五丸至二十丸空心溫酒下

（東垣）丁香楝實丸 百八十 治寒疝氣血留滯

當歸酒洗 附子炮 川楝肉 茴香各一兩

以上㕮咀用好酒三升同煮酒盡焙乾為末每藥末一兩入

沒藥 丁香 木香各五分 全蝎十三個 玄胡索五錢

右俱為末拌勻酒糊丸桐子大每服三五十丸加至百丸空心溫酒送下

苦楝丸 一八一 治奔豚小腹痛神效

川苦楝子 茴香各二兩 附子一兩炮去皮臍

右三味用酒二升同煮盡為度焙乾為末每藥末一兩入

玄胡索五錢 全蝎十八個炒 丁香十八粒

俱為末和勻酒糊丸桐子大溫酒下五十丸空心服○如痛甚煎當歸酒下

（良方）三層茴香丸 一八二 治腎與膀胱俱虛邪氣搏結不散遂成寒疝臍腹疼痛陰丸偏大膚囊壅腫有妨行步或瘙癢不止時出黃水浸成瘡瘍或長怪肉或外腎腫脹冷硬如石日以漸大須溫導陽氣漸退寒邪補虛消疝煖養腎經凡一應小腸氣寒疝之疾久新不過三料

第一料

舶上茴香　用鹽半兩同炒焦黃和鹽秤用一兩

連下共重四兩

川楝子　炮去核　沙參　洗　木香　各一兩

右為細末米糊丸桐子大每服二三十丸空心溫酒或鹽湯下日三服小病一料可安病深者一料纔盡便可用第二料

第二料

如前方加萆薢一兩　檳榔五錢

右六味共重五兩半依前糊丸服如前若未愈再服第三料

第三料

如前方加白茯苓四兩　附子炮去皮臍或五錢或一兩

右八味共重十兩丸服如前漸加至三四十丸凡小腸氣頻發及二十年者或大如栲栳者皆可消散神效

奪命丹　八二　治遠年近日小腸疝氣偏墜搐痛臍下脹痛以致悶亂及外腎腫硬日漸滋長陰間濕痒成瘡

吳茱萸一斤揀淨分四分用酒醋鹽湯童便各浸一宿焙乾

澤瀉淨片二兩酒浸一宿

右為末酒糊丸桐子大每服五十丸食前鹽酒或鹽湯下

良方奪命丹　一八四　方在婦人六五

治瘀血入胞脹滿難下

萬氏奪命丹　一八五　方在痘疹八二

治痘瘡倒靨併毒發癍

外科奪命丹　一八六　方在外科七七

治疔瘡發背惡毒惡證有奪命之功

局方二氣丹　一八七　治傷寒積冷小便不禁老人虛人尺脈微弱患此者

硫黃細研　肉桂各二錢　乾薑炮　朱砂研為衣各錢

附子炮半兩

右以麵糊丸桐子大每服一二十丸空心鹽湯下

局方半硫丸　一八八　治高年冷秘虛秘及痃癖冷氣○簡易曰此潤劑也

半夏　湯泡七次焙乾為末

硫黃　明淨者研極細用柳木槌子殺過

右等分以生薑自然汁打糊丸桐子大每服五七十丸用無灰酒或生薑湯任下

養正丹　一八九　治上盛下虛眩運此藥升降陰陽及救逆翻

胃霍亂吐瀉中風涎潮不省人事傷寒陰盛唇青自汗

硫黃為末　黑錫熔淨　水銀　硃砂研各一兩

右將錫鎔化入硫末漸入㪺攪為末再入水銀同擂如硬再於火上微煅又擂勻放冷研極細末糯米糊丸綠豆大每服三十丸空心鹽湯下

局方黑錫丹　百九十　治痰氣壅塞上盛下虛腎水虧竭心火炎盛或一應下虛陰寒頭痛等證及婦人血海久冷無子赤白帶下

黑錫去滓二兩同炒末　硫黃二兩　肉桂五錢　附子炮

木香　沉香　舶茴香　故紙

陽起石水飛　葫蘆巴酒炒　肉豆蔻麵裹煨　金鈴子蒸去皮核各一兩

右用新鐵銚將錫花開下硫黃末提起以木杵擂極細放地上退火毒同餘藥研一日至黑光色為度酒糊丸桐子大陰乾入布袋內擦令光瑩每服四十丸空心鹽湯下女人艾棗湯下

局方紅丸子　一九一　和脾胃消宿食去膨脹治大人小兒脾胃之證極有神效

京三棱水浸軟切片　蓬朮煨　青皮　橘紅各五斤

乾薑炮　胡椒各一斤

右為末用醋糊丸梧子大礬紅為衣每服三十丸食後薑湯送下○小兒臨時加減與服丸治飲食所傷中脘痞滿服之應手而愈○妊婦惡阻嘔吐全不納食百藥不治者惟此最妙可佐二陳湯服之但人疑其墮胎必不信服每易名用之時有神效但恐妊婦偶爾損動未免歸咎此藥是當酌而防之

椒囊法　九一　辟一切瘴疫時氣風寒時氣

紅川椒去閉口者

以絳紗囊貯椒兩許時常佩身傍近裏衣處則一切邪氣不能侵犯

椒紅丸　一九二　治元臟傷憊目暗耳聾服此百日覺身輕少睡足有力是其效也服及三年心智爽悟目明倍常面色紅悅髭髮光黑

川椒去目并合口者炒出汗取紅一斤　生地黃搗自然汁熬取濃汁一升

右將生地汁熬至稀稠得所和椒末搗丸梧子大每空心溫酒下三四十丸合藥時勿令婦人雞犬見○有詩曰其椒應五行其仁通六義欲知先有功夜間無夢寐四時去煩勞五

臟調元氣明目腰不疼身輕心健記功更有異能三年猶自秘固老返嬰童康强不思睡九蟲頓消亡三尸自逃避若能久餌之神仙應可冀

景岳全書卷五十八終

會稽　張介賓　會卿著
瀛海　賈　棠　青南

固陣

局方牡蠣散　一　治諸虛不足及大病後體虛津液不固常常自汗

黃芪蜜炙　麻黃根　牡蠣煅淬醋　各二錢半

水一鍾半加小麥百粒煎八分食遠溫服

牡蠣白朮散　治漏風證以飲酒中風汗多食則汗出如洗久而不治必成消渴

牡蠣煅一錢　白朮炒　防風各二錢

水二鍾煎八分食遠溫服

明宜白朮散　三　治虛風多汗食則汗出如洗少氣痿弱不治必為消渴證

白朮二兩　防風五兩　牡蠣煅六錢

右為末每服一錢溫水調下不拘時○如惡風倍白朮○如多汗面腫倍牡蠣○按此方惟與前方同而用法不同故并存

之

神效麥麪湯四　治心虛盜汗

麥麪（炒黃色）一錢　防風　白朮（炒）　牡蠣（煅醋淬）

黃芪（蜜炙）一錢半

水一鍾半棗二枚煎八分調服或妙香散極效在後十五

黃芪湯五　方在補陣四六

治自汗盜汗

聖惠寧肺散六　治新久欬嗽肺氣不通咯唾膿血自汗欬嗽常年不愈者服之立止并坐臥不安語言不出等證

烏梅肉七分　罌粟殼二錢去筋蜜炙

右為細末不拘時烏梅湯調下

總要安眠散七　治上欬嗽久而不止

款冬花　麥門冬　烏梅肉　佛耳草各四分

橘紅五分　炙甘草二分　粟殼蜜炙一錢

右為末水一鍾煎八分入黃蠟如棗核許煎化臨睡溫服

丹溪百藥煎八　劫嗽立止

百藥煎　訶子　荊芥穗等分

右為極細末蜜丸噙化

集成三妙湯九　治久嗽

烏梅肉三個　北棗三枚　粟殼蜜炙四個

水一鍾半煎七分食後服

九仙散十　治一切欬嗽不已

人參　款冬花　桔梗　桑白皮

五味子　阿膠　貝母　烏梅各五分

御米殼二錢蜜炙

水一鍾半薑一片棗一枚煎七分食遠服

劫嗽丸十一　治久嗽失氣失聲者宜此斂之新欬者不宜用也

訶子肉　百藥煎　荊芥穗等分

右為細末蜜丸噙化

五味子丸十二　劫欬嗽如神

五味子五錢　甘草二錢半　文蛤　風化硝各一錢

右為末煉蜜丸芡實大噙化

罌粟丸十三　治一切久嗽勞嗽一服即愈

罌粟殼新者一半去帶切焙乾　陳者一半泡去筋膜炒各一兩

右共爲末蜜丸彈子大臨睡嚼服一丸〇一方用罌粟子半斤淘淨焙乾炒黄爲末沙糖丸彈子大每服一丸臨臥綿包含化

統旨 潤腸丸十四 治欬嗽

訶子 五味子 五棓子 甘草等分

右爲末蜜丸噙化〇久嗽者加罌粟殼

良方 辰砂妙香散十五 治心氣不足精神恍惚虛煩少氣少睡夜多盜汗心虛遺精白濁服之安神鎮心

黄芪 山藥薑汁炒 茯苓 茯神

遠志各一兩甘草湯製 人參 炙甘草 桔梗各五錢

木香二錢 射香一錢研 硃砂三錢另研

右爲末每服二錢不拘時溫酒調下或用麥麪湯調下

局方 王荊公妙香散十六 安神秘精定心氣

人參 龍骨五色者 益智各一兩 白茯神

白茯苓 遠志製 甘草炙各五錢 硃砂飛二錢半

右爲末每服二錢空心臨臥溫酒調下

本事 金鎖丹十七 治夢泄遺精關鎖不固

舶茴 胡蘆巴 破故炒 白龍骨各一兩

木香兩半 胡桃肉二十個研膏 羊腎三對切開用鹽半兩擦炙熟搗膏

右爲末和二膏加酒浸蒸餅爲丸桐子大每服三五十丸空心鹽湯下

和劑 金鎖正元丹十八 治眞氣不足遺精盜汗目暗耳鳴吸吸短氣四肢痠倦一切虛損等症

補骨脂十兩酒炒 肉蓯蓉酒洗 紫巴戟去心 葫蘆巴炒各一斤

文蛤八兩 茯苓去皮六兩 龍骨二兩 硃砂三兩另研

右爲細末酒糊丸桐子大每服二十丸空心溫酒鹽湯任下

禹代 金鎖思仙丹十九 治男子嗜慾太過精血不固此澁以去脫之劑

蓮蕊 芡實 石蓮子各十兩 金櫻膏二斤

右以金櫻煎膏如餳入前三味藥末和丸桐子大空心鹽酒下三十丸服久精神完固大能延年平時服食忌葵菜車前子

[illegible]林 金鎖匙丹二十 治男婦精滑遺泄不禁夢與鬼交

茯苓 茯神各二錢 遠志制 龍骨煅各三錢

左股牡蠣煅四錢

右爲末酒糊丸桐子大每服四十丸空心鹽湯或酒下

玉鎖丹二一　治玉門不閉遺精日久如水之漏不能關束者

文蛤八兩　白茯苓二兩　白龍骨一兩

右為細末米糊丸梧子大每服七十丸空心淡鹽湯下臨睡更進一服極效

錫類玉鎖丹二二　治精氣虛滑遺泄不禁

龍骨　蓮花蕊　雞頭子　烏梅肉各等分

右為末用熟山藥去皮為膏和丸小豆大空心米湯下三十丸

經驗水陸二仙丹二三　治精脫腎虛夢遺白濁等證與補陰藥同用甚有奇效

金櫻膏一斤　用金櫻子不拘多少入粗麻布袋內擦去毛刺搗爛入缸以水沒頭浸一二宿濾去粗取汁以棉濾二三次却入銅鍋用桑柴文火熬成膏取起以磁瓶收貯聽用

芡實粉一斤

右二味和勻丸梧子大每服二三百丸空心淡鹽湯下

經驗金櫻丸二四　治夢遺精滑小便後遺瀝

金櫻子　芡實各一兩　龍骨煅　白蓮蕊各五錢

右為末糊丸梧子大每服八十丸空心鹽酒下

正傳經驗秘真丹二五　治腎虛遺精夢泄白濁等證

兎絲子制　韭子　破故紙炒　杜仲薑酒炒

乾薑炒各一兩　龍骨　牡蠣煅　山茱萸

赤石脂煅各五錢　遠志　覆盆子　巴戟肉

枸杞　山藥各七錢　鹿角膠炒一兩　柏子仁一兩

金櫻子取黃者去核熬膏用二兩　黃柏鹽酒炒七錢五分

右為細末煉蜜丸梧子大每服百丸空心鹽湯下

局方鎖精丸二六　治白濁白帶小便頻數

破故紙　青鹽　白茯苓　五味子炒等分

右為末酒糊丸梧子大每服三十丸空心溫酒下

一方用五倍子

東垣固真丸二七　治精滑久不愈

牡蠣不拘多少　用砂鍋內煅醋淬七遍為末

右以醋糊為丸梧子大每服五七十丸空心鹽湯下

良方固真散二八　治纔睡著即泄精此二味大能澁精固真氣煖下元

韭子一合　白龍骨一兩

右為細末每服二錢空心用酒調服
濟生固精丸 二九 治下元虛損白濁如脂或胞氣虛寒腰重少
力小便無度並效
牡蠣煅　兎絲子酒浸蒸炒　韭子炒　龍骨煅
北五味炒　白茯苓　桑螵蛸酒炙　白石脂煅各等分
右為細末酒糊丸桐子大每服七十丸空心鹽湯下
直指固精丸 三一 治腎虛有火精滑心神不安
黄柏酒炒　知母酒炒各一兩　牡蠣煅　龍骨煅
蓮蕊　芡實　山茱萸　遠志甘草製
茯苓各三錢

右為末山藥糊丸桐子大每服五十丸空心溫酒下
百一固元丹 三三 治元臟久虛遺精白濁五淋及小腸膀胱疝
氣婦人赤白帶下血崩便血等疾以小便頻利為效
好蒼朮刮淨米泔浸切片一斤　擇堅而小者佳惟茅山
者尤妙分作四分制之〇一分用小茴香食鹽各一兩同
炒〇一分用川椒補骨脂各一兩同炒〇一分用川烏頭
川練子肉各一兩同炒〇一分用醇醋老酒各半斤同煮
乾焙燥

右連炒諸藥同為末用酒煮糊丸桐子大每服三五十丸男
以溫酒女以醋湯空心下〇此高司法方也
御藥秘元丹 三二 治內虛裏寒自汗時出小便不禁
白龍骨三兩　訶子肉　砂仁各一兩　靈砂二兩
右為末煮糯米粥丸桐子大每服五十丸空心鹽酒下
韭子丸 三三 治虛勞寒脫滑精
韭子炒　車前子　天雄炮　兎絲子酒煮另搗
龍骨各一兩　鹿茸酥炙　乾薑炮　桑螵蛸炒各二錢
右為末煉蜜丸桐子大每服二三十丸空心黃芪湯下

三因家韭子丸 三四 治少長遺溺及男子虛劇陽氣衰敗小便
白濁夜夢遺精此藥補養元氣進美飲食〇按此方當除去
石斛倍用兎絲庶乎尤效
家韭子炒六兩　鹿茸酥炙四兩　肉蓯蓉酒浸　牛膝酒浸
熟地　當歸各二兩　兎絲子酒煮　巴戟肉各一兩半
杜仲炒　石斛　桂心　乾薑炮各一兩
酒糊丸桐子大每服五七十丸加至百餘丸食前溫酒鹽湯
任下〇凡小兒遺尿者多因胞寒亦稟受陽氣不足也〇作
小丸服之

小兔絲子丸 三五 治腎氣虛損目眩耳鳴四肢倦怠夜夢遺精

兔絲子 制五兩 石蓮肉 一兩 白茯苓 二兩 山藥 炒二兩分一半作糊

用山藥糊丸桐子大每服五十丸空心溫酒鹽湯任下〇一方有五味子一兩治小便多而不禁

局方 大兔絲子丸 三六 治腎氣虛損五勞七傷腳膝痠痛面色黎黑目眩耳鳴心忡氣短時有盜汗小便滑數

兔絲子 酒製 鹿茸 酥炙 肉桂 石龍肉 去土

附子 炮 澤瀉 各一兩 熟地 牛膝 酒浸一宿焙乾

山茱萸 杜仲 炒 茯苓 肉蓯蓉 酒浸切焙

續斷 石斛 防風 補骨脂 酒炒

蓽撥 巴戟肉 茴香 炒 沉香 各三兩

川芎 五味 桑螵蛸 覆盆子 各五錢

右為末酒煮麪糊丸桐子大每服三五十丸空心鹽湯溫酒任下

濟生 兔絲子丸 三七 治小便多致失禁

兔絲子 制 肉蓯蓉 酒浸各二兩 牡蠣 煅 附子 炮

五味子 鹿茸 酒炙各一兩 雞胜胵 炙乾五錢 桑螵蛸 酒炙五錢

右為末酒糊丸桐子大每服七十丸空心鹽湯溫酒任下

局方 茯兔丸 三八 治思慮太過心腎虛損真陽不固尿有餘瀝或小便白濁夢寐遺精等證

兔絲子 制五兩 白茯苓 三兩 石蓮肉 二兩

酒糊丸桐子大每服三五十丸空心鹽湯或米湯下〇一方有北五味子四兩兼治三消

豬肚丸 三九 治小便頻數

蓮子 一斤 以豬肚一個同煮一周日取出去皮心焙乾為末

舶茴香 破故紙 川楝子 母丁香 各一兩

右為末煉蜜丸桐子大每服五十丸空心溫酒送下

經驗豬肚丸 四十 止夢遺泄精進飲食健肢體此藥神應瘦者服之自肥莫測其理

白朮 麪炒五兩 苦參 白者三兩 牡蠣 左顧者煅研四兩

右為末用雄豬肚一具洗淨以磁罐煮極爛木石臼搗如泥和藥再加肚汁搗半日丸如小豆大每服四五十丸日進三服米飲送下久服自覺身肥而夢遺水止

良方 三仙丸 四一 治夢遺精滑

益智仁 一兩 烏藥 一兩 山藥 一兩炒

右爲末山藥煮糊丸梧子大每服七十丸空心茯苓湯送下

九龍丸 四十二 治腎虛精滑

金櫻子 枸杞 山茱萸 蓮鬚

蓮肉 當歸 熟地 芡實

白茯苓 各等分

右爲末酒糊丸梧子大每服五六十丸或酒或鹽湯下

小溫金散 四十三 治心腎虛熱小便赤白淋瀝或不時自汗等證

人參 蓮肉 去心 巴戟肉 益智

黃芪 蜜炙 麥冬 去心 赤茯苓 萆薢 酒浸炒

炙甘草 各一錢

燈心十莖棗一枚水煎服

仁齋 蓮子六一散 四十四 治心經虛熱赤濁

石蓮子 六兩 炙甘草 一兩

爲末每服三錢燈心湯調下

和劑 威喜丸 四十五 治心腸虛憊精滑白濁遺尿及婦人血海久冷淫帶夢泄等證

白茯苓 去皮四兩切塊同豬苓二錢五分同於磁器內煮二十餘沸取出曬乾不用豬苓

黃蠟 四兩

右以茯苓爲末熔黃蠟搜和爲丸如彈子大每空心細嚼滿口生津徐徐嚥服以小便清利爲效忌米醋惟糠醋可用尤忌氣怒動性

五子丸 四十六 治小便頻數時有白濁

菟絲子 酒蒸 家韭子 炒 益智 茴香 炒

蛇牀子 去皮炒

右各等分爲末酒糊丸梧子大每服七十丸米飲鹽湯任下

遠志丸 四十七 方在補陣百十四

治神魂恍惚夢泄遺精

本事 豬苓丸 四十八 此方以行爲止治濕熱滿小水頻數夢遺精滑

半夏 一兩 將半夏破如豆粒用豬苓爲末二兩先將一兩炒半夏色黃勿令焦出火毒取半夏爲末糊丸梧子大候乾用前豬苓末一半又同炒微裂入磁瓶內養之空心溫酒鹽湯下三四十丸常又服於未申間以溫酒

下

泄瀉經驗方 四九 治泄瀉飲食少進

用糯米一升水浸一宿瀝乾慢火炒令極熟磨細羅如飛麪加懷山藥一兩炒研末和米粉內每日清晨用半盞入白糖二匙川椒末少許將極滚湯調食其味甚佳且不飫人大有資補久服之其有精寒不能成孕者亦孕矣

固腸散 五十 治脾胃虛弱內寒注泄水穀不分下痢膿血赤少白多腸滑腹痛心腹脹滿食減力乏

陳米炒二兩 木香一錢 肉豆蔻生 罌粟殼蜜炙各二錢

乾薑炮 炙甘草各二錢半

右為末每服二錢水一鍾薑三片棗一枚煎七分不拘時溫服忌酒豬肉魚腥生冷

白朮聖散子 五一 方在熱陣一三七

治一切瀉痢久不瘥

東垣 肉豆蔻丸 五二 方在小兒五六

治瀉痢腸滑不止

醫林 固腸丸 五三 治瀉痢日夜無度

人參 附子制 阿膠炒 龍骨研

肉豆蔻麪煨 赤石脂煆淬 乾薑炒 木香各一兩

白朮炒 訶子肉各二兩 沉香五錢

右為末粳米糊丸桐子大每服七八十丸米飲下

局方 大斷下丸 五四 治臟府停寒下痢不已

乾薑炮 高良薑 細辛各兩半 附子制

牡蠣煅 龍骨研 赤石脂煅 肉豆蔻麪煨

訶子肉 枯礬 酸石榴皮醋浸一宿炙黃用各一兩

右為細末醋煮麪糊為丸桐子大每服五七十丸米飲送下

東垣 椿皮散 五五 治血痢及腸風下血神效

椿根白皮 枯白礬各二兩 槐角子四兩 炙甘草一兩

右為細末每服三錢米飲調下

桃花丸 五六 治腸胃虛弱冷氣乘之臍腹攪痛下痢腸滑不禁日夜無度○此即仲景桃花湯之法方見熱陣一四七

赤石脂煅醋淬 乾薑炮等分

右為末湯浸蒸餅丸梧子大每服百餘丸食前米飲下日三服○若痢久虛滑去積不已用蒼朮二兩防風五錢水一碗煎至半碗下此丸小便利則安

生地黃湯 五七　治熱痢便血崩淋不止

生地黃五錢　地榆七錢半　炙甘草二錢半

右㕮咀用水二鍾煎一鍾分空心日晚二服

香梅丸 五八　治腸風下血服之即止

烏梅肉　白芷　百藥煎燒存性 等分

右為末米糊丸桐子大每服五六十丸空心米湯下

勝金丸 五九　一名百藥散○治腸風下血溺血不止及臟毒便血

百藥煎三兩 生用一兩　炒焦一兩　燒存性一兩

右為末軟飯和丸或蜜丸桐子大每服五七十丸空心米飲下或人參湯下

濟生烏梅丸 六十　治大便下血如神

殭蠶炒一兩　烏梅肉一兩半

右為末醋糊丸桐子大每服四五十丸空心醋湯下

縮泉丸 六一　治脬氣不足小便頻多

烏藥　益智等分為末

酒煮山藥糊為丸桐子大每服五七十丸空心鹽湯下

四味肉蓯蓉丸 六二　治稟賦虛弱小便遺數不禁○此即集要四神丸補陣百六十

熟地六兩　五味子四兩　肉蓯蓉酒洗去甲八兩　菟絲子制一兩

酒煮山藥糊丸桐子大每服七八十丸空心鹽酒下

固脬丸 六三　治遺尿不覺小便不禁

菟絲子制二兩　茴香一兩　桑螵蛸炙　製附子各五錢

戎鹽一錢

右為末酒煮麵糊丸桐子大每服三十丸空心米飲下

牡蠣丸 六四　治小便不禁

牡蠣三兩　用磁器盛以鹽末一兩鋪底蓋面用炭火約

五斤燒半日取出研

赤石脂三兩　搗碎醋拌勻濕於鐵鍋內慢火炒乾研粉

右用酒糊丸桐子大每服五十丸空心鹽湯下

秘心 茴香益智丸 六五　治老人陽虛失禁及勞汗傷腎遺溺

小茴香鹽炒　益智仁炒　故紙酒炒　川烏炮

烏藥各一兩

右為末山藥糊丸桐子大每服八十丸鹽湯下

溺血方

文蛤炒為末

右以烏梅肉浸爛搗爲丸桐子大空心酒下五六十丸

景岳全書卷之五十九終

景岳全書卷之六十 宙集

因陣

古方八陣

會稽 張介賓 會卿著
瀛海 賈棠 青南訂

以下眼目方

原一 當歸補血湯 治男婦亡血過多以致睛珠疼痛不能視物羞明酸澁眼光無力眉骨太陽酸痛

當歸 熟地黃各二錢 白芍藥 牛膝

白朮 生地黃 天門冬各一錢 川芎

防風 炙甘草各五分

水二鍾煎八分食遠服○如惡心不進食者加生薑煎

益氣聰明湯二 治目中內障初起視覺昏花或水淡綠色或淡白色久則不睹漸變純白成見一物成二等症并治耳聾耳鳴

人參 黃芪各五錢 升麻 葛根

炙甘草各三錢 芍藥 黃柏各二錢 蔓荊子錢半

右每服四五錢水二鍾煎一鍾臨睡熱服五更再服

東垣 蔓荊子湯　治勞倦飲食不節內障眼病此方如神

蔓荊子二錢半　人參　黃芪各一兩　炙甘草八錢

黃柏酒拌炒四遍　白芍藥各三錢

右㕮咀每服四五錢水二盞煎一盞去柤臨臥溫服

益陰腎氣丸四　治足三陰虧損虛火上炎致目睛散大視物不的或昏花緊澁作痛羞明或卒見非常等證其功與六味還少丹同類

熟地自洗二兩　生地　歸尾酒洗　丹皮

五味　山藥　山茱萸　柴胡

茯苓　澤瀉各二錢半

煉蜜丸桐子大水飛硃砂為衣每服五七十丸空心淡鹽湯下

濟陰地黃丸五　治證同上

熟地倍用　山藥　山茱萸　當歸

枸杞　巴戟肉　麥冬　肉蓯蓉

五味子　甘菊花各等分

煉蜜丸桐子大每服七八十丸空心白湯下

神效黃芪湯六　方在補陣四九

治目緊縮小及羞明畏日視物不明

局方 明目地黃丸七　治男婦肝腎俱虛風邪所乘熱氣上攻瞖障目澁多淚

熟地黃　生地黃各一斤　牛膝三兩　石斛

枳殼　杏仁去皮尖炒　防風各四兩

煉蜜丸桐子大每服七八十丸食前鹽湯下

簡易 加減駐景丸八　治肝腎氣虛兩目昏暗視物不明

熟地　當歸各五兩　菟絲子八兩酒煮　枸杞

車前子炒　五味子各二兩　楮實子　川椒炒各一兩

右為末煉蜜丸桐子大每服七八十丸食前溫酒下

東垣 滋陰地黃丸九　治足三陰虧損虛火上炎致目睛散大視物不的或昏花緊澁作痛羞明兼眵多燥熱赤爛者〇一名乾熟地黃丸

熟地一兩　歸身酒洗　黃芩各半兩　天冬焙

甘草炙　枳殼　柴胡　五味子各三錢

人參　地骨各二錢　黃連三錢　生地酒洗一兩半

煉蜜丸桐子大每服百丸食前茶湯下日三服

謙甫 還睛散十　治瞖膜遮睛昏澁淚出瘀血努肉攀睛

川芎　龍膽草　草決明　石決明

荆芥穗　甘菊花　羌蔚子　楮實子

白茯苓各一兩　白蒺藜炒　木賊　甘草各七錢

川椒炒出汗一錢

右爲細末每服二錢食後茶清調下日三服忌一切雞魚厚味及蕎麥麪熱物

八味還睛散十一　治肝肺停留風熱翳膜遮睛痛澁眵淚

白蒺藜炒去刺　防風　甘草　木賊

山梔仁各七錢　草決明炒一兩　青葙子二錢半炒　蟬脫二錢

右爲細末每服二錢食後麥門冬湯調服

還睛丸十二　治男婦風毒上攻眼目腫痛怕日羞明多眵隱澁難開瞼眥紅爛瘀肉攀睛或暴赤痛甚又治偏正頭風頭痛皆有奇效

白术　兔絲子制　青葙子　防風

羌活　白蒺藜炒去刺　密蒙花　木賊

炙甘草等分

煉蜜丸彈子大每服一丸細嚼白湯送下空心食前日二服

正傳　祖傳固本還睛丸十三　治遠年一切目疾內外翳膜遮睛風弦爛眼及老人目眵多稠迎風冷淚見物昏花等症悉皆治之

天門冬酒浸一宿另研如泥　麥門冬　生地黃酒洗各

熟地黃酒洗各三兩　人參　白茯苓

乾山藥　枸杞各兩半　川牛膝酒洗

石斛酒洗　草決明微炒　杏仁去皮另研

枳殼麩炒黃　兔絲子酒浸煮　甘菊花用小金錢各一兩

羚羊角細剉取鎊末　烏犀角剉用　青葙子微炒

防風去蘆各八錢　五味子焙乾　炙甘草

黃連去鬚　白蒺藜取仁　川芎各七錢

右爲末蜜丸梧子大每服五七十丸鹽湯下

定志丸十四　方在補門百十七

治陽氣不足眼目不能近視

地芝丸十五　治目不能遠視但可近視或并不能乃陰氣不足也宜用此方

生地黃四兩　天冬　枳殼麩炒　甘菊花各二兩

煉蜜丸桐子大每服百丸茶清或溫酒下

東垣　助陽和血湯十六　治眼發之後猶有上熱白睛赤色隱澁

翳開而多眵淚等證

黃芪　當歸酒洗　柴胡　炙甘草

防風各五分　升麻七分　白芷二分　蔓荊子二分

水煎熱服

東垣芎辛散十七　治兩眼風熱晝夜隱澀難開羞明惡日視物昏暗赤腫而痛

細辛二分　芎藭　蔓荊子各五分　甘草

白芷各一錢　防風一錢半

右㕮咀水二盞煎一盞臨臥溫服

東垣明目細辛湯十八　治兩目發赤微痛羞明畏日怯風惡寒火多眵癮澀鼻塞涕唾稠粘大便微硬

細辛　麻黃　羌活　蔓荊子

防風　藁本　川芎　荊芥穗

白茯苓各一分　生地黃　當歸尾各八分　花椒七粒

水二鍾煎八分食後臨臥溫服

決明夜光散十九　治眼目夜昏雖有燈月亦不能視

石決明　夜明砂各二錢　猪肝一兩

右以藥為末乃將竹刀切肝為二片鋪藥於內合定用麻皮紮之以米泔水一碗用砂鍋煮至半碗臨臥連肝連汁俱服之

石斛夜光丸二十　治神水寬大昏如霧露眼前黑花視物成二火而光不收斂及內障瞳人淡白綠色

石斛酒洗五錢　人參　生地　熟地酒洗

麥門冬　天門冬　白茯苓　防風

草決明　黃連酒炒各一兩　羚羊角鎊　犀角鎊

川芎　炙甘草　枳殼麩炒　青葙子微炒

五味子炒　肉蓯蓉酒洗去鱗炙各五錢　牛膝酒洗

白蒺藜炒去刺　兔絲子製　家菊花　山藥

杏仁　枸杞各七錢

右為末煉蜜丸梧子大每服三五十丸溫酒鹽湯任下

東垣瀉熱黃連湯二十一　亦名黃連飲子○治眼暴發赤痛

黃連酒炒　黃芩酒炒　龍膽[illegible]　生地

柴胡各一錢　升麻五分

水煎於午前食後熱服

東垣黃芩黃連湯二十二　治兩眼血熱赤痛

黃芩　黃連　草龍膽俱各酒洗炒　生地酒洗

右等分㕮咀每用五錢水二盞煎一盞去粗熱服
東垣當歸龍膽湯二三　治眼中白翳
歸身　龍膽草酒洗　黃芩酒炒　黃柏酒炒
芍藥各八分　黃芪　黃連　甘草各五分
防風　羌活　升麻　柴胡
五味子　石膏各五分
水二盞煎一盞去粗入酒少許臨臥熱服忌言語
芍藥清肝散二四　方在寒陣六一
治赤脉貫睛眵多眊矂緊澁羞明臟腑秘結

蟬花散二五　治肝經風熱毒氣上攻眼目赤痛及一切內外
翳障
蟬蛻　甘菊花　穀精草　羌活
甘草炒　白蒺藜炒　草决明　梔子炒
防風　蜜蒙花　荊芥穗　木賊
川芎　蔓荆子　黃芩各等分
右為末每服二錢食後茶清調下
五味瀉白散二六　治風熱翳膜血筋一切肺熱外障
當歸　生地　芍藥　梔子
黃芩各等分
每服三五錢為散為湯任服
明目羊肝丸二七　治肝虛風熱冷淚赤濇內外障眼
黃連二兩　家菊花　龍膽草　石決明煅
人參　當歸　熟地　枸杞
麥冬　牛膝　青鹽　黃柏
柴胡　防風　羌活各八錢　肉桂四錢
羯羊肝一具焙乾為末
右為末煉蜜丸桐子大每服三四十丸溫湯下
黃連羊肝丸二八　治前證

單用黃連一味同羊肝供為末煉蜜丸服○濟生方用生羊
肝去筋膜同黃連搗丸桐子大每服五六十丸溫水下
黃連天花粉丸二九　治兩眼赤痛眵多眊燥緊澁羞明赤脉
貫睛臟腑秘結
黃連酒炒　天花粉　家菊花　川芎
薄荷葉　連翹各一兩　黃芩　梔子各四兩
黃柏酒炒六兩
右為細末滴水丸梧子大或用蜜丸每服五七十丸或百丸

食後臨睡茶湯下

局方蜜蒙花散 二十　治風氣攻注兩眼昏暗眵淚羞明并暴赤腫翳障

蜜蒙花　羌活　白蒺藜炒　木賊

石決明各一兩　甘菊三兩

右為末每服二錢食後茶清調下

春雪膏 二一　點赤眼

朴硝置豆腐上蒸之待流下者用磁器盛點之

玄明春雪膏 二二　治時氣熱眼

玄明粉半兩　月石三錢　冰片三分

右乳無聲磁罐密收用時點二大眥內

龍腦黃連膏 二三　點赤熱眼

龍腦一錢　黃連去毛淨酒炒八兩

先剉黃連令碎以水四碗貯砂鍋內入連煮至一大碗濾去滓入薄磁碗內重湯煮成膏半盞許以龍腦為引或用時旋入尤妙

立消膏 二四　治浮翳宿障霧膜遮睛

雪白鹽淨器中生研如塵

右以大燈草蘸鹽少許輕手指定浮翳點上凡一二次即沒亦不疼痛

黃連甘石散 二五　治眼眶破爛畏日羞明

爐甘石制一斤　黃連四兩　龍腦量加

先以黃連研極細同甘石再研供用細絹紗篩過收貯用時取一二兩加入龍腦用井花水調如稠糊臨睡抹敷破爛處

黃連人參膏 二六　治目赤痒痛

宜黃連　人參各五分或一錢

右切碎用水一小鍾同浸飯鍋蒸少頃取出冷定頻點眼角自愈或於臨用時研入冰片少許更妙〇一方但用人乳浸黃連頻點眥中抱朴子云治目中百病〇一方用黃連少加生白礬以人乳浸蒸點抹眼角大效

丹砂散 二七　點治諸眼昏眵此李時珍方也

硼砂　海螵蛸去皮　爐甘石上好者煅淬童便七次飛各一兩

硃砂五錢用光明不粘

右為極細末磁瓶收貯臨用少加冰片研點極妙

清涼膏 二八　治眼目赤腫不能開痛悶熱淚如雨

生南星　腦荷葉各半兩　荊芥　百藥煎如無即用文蛤
右各三錢爲末井水調成膏貼眼角上自然清涼
正傳光明丹 三九 治一切風熱上壅兩目赤腫澁痛爛弦風眼
及內外翳障
製甘石一兩　朱砂一錢　硼砂二錢　輕粉五分
冰片二分　麝香一分
以上用乳鉢研極細收貯爲君○如眼赤腫痛加乳香沒藥
各五分○內外皆障加珍珠五分胆礬二分○爛弦風眼加
銅綠五分黃丹五分○或以諸藥合一以治諸般眼疾各各

研爲細末并一處再研二日用磁器密收勿令泄氣點眼絕
妙
青火金鍼 四十 治頭風牙痛赤眼
火硝一兩　青黛一錢　腦荷　川芎各五分
右爲細末口噙冷水勿嚥用此藥吹鼻
赤火金鍼 四一 治赤眼頭風冷淚努肉耳鳴牙疼
火硝一兩　川芎　雄黃　乳香
沒藥　石膏各一錢
右爲細末每用一二分如前吹鼻三次愈

吹鼻六神散 四二 治眼目暴發赤腫熱淚昏澁及頭腦疼痛
焰硝提淨五錢　白芷　雄黃　乳香制
沒藥制　腦荷葉各一錢
右爲細末磁罐收貯左吹左右吹右先令病人口含水吹之
其氣上行須臾覺效頭痛吹法亦然或兩鼻皆吹之若久患
眼疾者不可吹
東垣點鹽法 四三 明目去昏翳大利老眼得補法之良
用海鹽二斤揀淨以百沸湯泡濾取清汁於銀石器內熬取
雪花白鹽磁器盛貯每早用一錢擦牙以水漱口用左右手

指互以口內鹽津細洗兩眼大小眥內閉目良久却用水洗
面能洞視千里明目堅齒極妙之法蘇東坡了鎖目赤不明
昏花老眼惟宜此法大效
洗爛弦風赤眼方 四四 一名萬金膏○此藥之效如神人家
所不可少無目病亦以施人價廉功倍濟人甚大
文蛤　黃連去毛淨　防風　荊芥穗各五錢
苦參四錢　銅綠五分
右爲極細末外以薄荷煎湯丸彈子大臨用時以熱水化開
乘熱洗眼日三次立愈神效○一方有當歸川芎各四錢

傳爛弦歌 四五

爛弦百藥煎爲奇　研細湯澄粗去之
熬作稀膏入輕粉　鹽湯洗了傳之宜

搜風散 四六　治風熱眼及腫痛

黃連　大黃　朴硝　黃丹 等分

右爲末以苦參煎湯少加煉過白蜜同調敷眼四弦甚妙

拜堂散 四七　傳風赤爛眼倒睫爛弦

五棓子不拘多少爲末蜜水調敷患處

湯泡散 四八　治肝盛風熱攻眼赤腫羞明漸生翳膜

杏仁　防風　黃連 去鬚　赤芍藥
歸尾 各半兩　銅青 二錢　薄荷葉 三錢

右剉散每用二四錢沸湯泡乘熱先熏後洗冷則再煖又洗每日二兩次○一方加白鹽少許閉目沃洗尤能散血

收淚散 四九　治風淚不止

海螵蛸 五分　冰片 少許　綠爐甘石 一錢

右乳極細末點大眥角淚即收上二藥以爍濕片腦以辛散

去星 五十

凡胡椒韮菜根楮葉蒲葉之類皆可杵爛爲丸用綿裹塞鼻中觸之過夜則星自下

眼目打傷青腫 五一

以生半夏爲末水調傳之即愈

明目第一方 五二　此方始於上陽子以授魯東門左丘明杜子夏左太冲凡此諸賢皆有目疾得此皆愈

夜省看書一　減思慮二　專內視三
簡外觀四　晨興遲五　夜眠早六

凡此六事熏以神火下以氣飲蘊於胸中納諸方寸修之一時長服不已非但明目亦可延年

以下耳病方

桂星散 五三　治風閉耳聾

官桂　川芎　當歸　石菖蒲
細辛　木通　木香　白蒺藜 炒去刺
麻黃 去節　甘草 炙各一錢　白芷梢　天南星 煨裂各錢半

水二鍾葱白二根紫蘇五葉薑五片煎八分食後服○一方加全蝎去毒一錢

類方 復元通氣散 五四　治諸氣閉澀耳聾及腹癰便癰瘡疽無頭者能止痛消腫

青皮　橘紅各四兩　甘草炙三兩　連翹一兩

右爲末熱酒調服一二錢

補腎丸五五　治腎虛耳聾

巴戟去心　乾薑炮　白芍藥　山茱萸

人參　黄芪　當歸　熟地黄

遠志制　肉蓯蓉酒洗　兎絲子制　蛇牀子

牡丹皮　附子炮　石斛　細辛

澤瀉　桂心　甘草各二兩　石菖蒲一兩

茯苓半兩　防風一兩半　羊腎二枚

右爲末將羊腎用酒煮研爛仍加酒煮麪糊丸桐子大每服

五七十丸空心鹽酒送下

聰明益氣湯五六　治腎虛耳聾

黄芪一錢　人參　炙甘草　當歸酒洗

白朮各五分　橘紅　菖蒲　防風

荆芥各三分　升麻　柴胡各二分

右水煎服

肉蓯蓉丸五七　方在補陣一五五

治腎虛耳聾

聤耳明礬散五八　治膿耳

枯礬　龍骨研各　黄丹飛各錢半　乾胭脂七分

射香少許

右爲細末先須以綿杖纏拭去膿汁用綿杖蘸藥引入耳中

如無乾胭脂即以濟寧油胭脂同枯礬拌擦如粉用之○又

紅玉散止枯礬乾胭脂射香三味等分用○一方單用枯礬

吹入即愈

聤耳流膿方五九

用菖蒲根水洗淨搗取汁先以綿杖將耳中膿水攪淨然

後將蒲汁灌入盡先數次全愈最妙者

白龍散六十　治小兒腎熱上衝於耳生膿作痛或因沐浴水

入耳中亦令作膿謂之停耳久而不愈則成聾

枯礬　黄丹　龍骨各五分　射香一分

右爲極細末先以綿杖子展盡耳內膿水用藥一字分摻兩

耳日二次勿令風入

百蟲入耳六一

用香油滴入耳中即出○本事方用白膠香燒烟薰耳中

蟲即出○一方用葱涕灌入活者即出○一法用生薑擦

猫尿其尿自出取尿滴入耳即出或以麻油滴耳則虫死
或以炒芝麻枕頭則虫亦出但不若猫尿之捷也

蜈蚣入耳 六二

用薑汁滴入或韮汁雞冠血滴入俱好

暴聾灸法 六三

用小蒼朮一塊長七分一頭削尖一頭截平將尖頭插入
耳內平頭上用筯頭大艾炷灸之輕者七壯重者十四壯
覺耳內有熱氣則效

又方 用蒼心梹榔一個將臍內剜一窩如錢眼大實以射

香在於患耳內上以艾炷灸之不過二三次即效

塞耳聾 六四

用大蒜一瓣一頭剜一坑子以好巴豆一粒去皮慢火炮
令極熟入在蒜內以新綿裹定塞耳中

龍腦膏 六五

龍腦一分 椒目五分 杏仁去皮二分

右件搗研勻綿裹棗核大塞耳中日二易之

杏仁膏 六六 治耳中汁出或痛或膿

右用杏仁炒令赤黑研成膏綿裹內耳中日三四度易之或
亂髮裹塞之亦妙

一方治耳卒痛或水出用杏仁炒焦爲末葱涎搜和爲丸以
綿裹塞耳又治耳聾有膿

通聖散 六七

穿山甲炙 螻蛄各五分 射香一分

右爲細末以葱涎和劑塞耳或用少綿裹塞之或用葱管盛
藥末塞耳中

通耳散 六八

磁石用活者如豆一塊 穿山甲燒存性爲末一字

右二味用新綿裹塞患耳內口中銜生鐵少許覺耳內如風
兩聲即愈

以下面鼻方

濟林 川芎散 六九 治風寒鼻塞

川芎 藁本 細辛 白芷

羌活 炙甘草各一兩 蒼朮米泔浸五兩

右㕮咀每服二錢水一盞薑三片葱白三寸煎服

濟生 辛夷散 七十 治肺虛爲四氣所干鼻內壅塞涕出不已或
氣不通不聞香臭

辛夷　川芎　細辛　白芷
升麻　防風　羌活　藁本
炙甘草　木通各等分　一方有蒼耳子減半
右爲末每服二錢食後茶清調下
溫肺散七一　治肺寒陽明鼻塞
升麻一　黃芪　丁香各一錢　羌活
葛根　炙甘草　防風各五分　麻黃不去節二錢
水二鍾葱白二莖煎八分食遠熱服
千金細辛膏七二　治鼻塞腦冷清涕常流

細辛　川芎　川椒　黑附子炮去皮臍
乾薑　吳茱萸各二錢半　桂心三錢　皂角屑錢半
右將諸藥用米醋浸過宿次用猪脂二兩熬油入前藥煎附
子色黃爲度以綿蘸藥塞鼻中
蒼耳散七三　治鼻流濁涕不止名曰鼻淵
蒼耳子炒二錢半　辛夷仁　薄荷葉各五錢　白芷一兩
右爲細末每服二錢葱湯或茶清食後調下
神愈散七四　治風熱在腦鼻流濁涕窒塞不通
細辛白芷與防風　羌活當歸半夏芎
桔梗陳皮茯苓輩　十般等分剉和同
三錢薄荷葱煎服　氣息調勻鼻貫通
醍醐散七五　治傷風鼻塞聲重
細辛半兩　川芎一兩　薄荷一兩半　川烏炮去皮臍
白芷　甘草各二兩
右爲細末每服一錢葱茶湯或薄荷湯下
良方防風湯七六　治鼻塞不聞香臭
防風　麻黃　官桂各半兩　升麻
木通各一兩　梔子七枚　石膏三兩
右㕮咀每服水一盞煎七分空心溫服

宣明防風湯七七　治鼻淵腦熱滲下濁涕不止久而不已必成
衄血之證
防風一兩半　人參　麥冬　炙甘草
川芎　黃芩各一兩
右爲細末每服二錢沸湯調服食後日三服
荊芥散七八　治肺風酒皶鼻赤疱
荊芥穗四兩　防風　杏仁去皮尖　白蒺藜炒去刺
殭蠶炒　炙甘草各一兩

右爲末毎服二錢食後茶清調下

正傳 腦漏秘方七九 祖傳經驗治鼻中時時流臭黄水甚者腦亦時痛俗名控腦砂有虫食腦中

用絲瓜藤近根三五尺許燒存性爲細末酒調服之即愈

簡易 黄白散八十 治鼻齆瘜肉鼻痔等症

白礬 雄黄 細辛 瓜蔕各等分

右爲細末以雄犬膽汁爲劑如棗核塞鼻中

細辛散八一 治鼻齆有瘜肉不聞香臭

北細辛 瓜蔕等分

右爲末綿裹如豆大塞鼻中

御藥 菖蒲散八二 治鼻内窒塞不通不得喘息

菖蒲 皂角等分

右爲細末毎用一錢綿裹塞鼻中仰臥片時

輕黄散八三 治鼻中瘜肉

輕粉 杏仁去皮尖各一錢 雄黄五錢 射香少許

右四味用乳鉢先研杏仁如泥後入雄射輕粉同研極細磁盒收蓋毎有患者不拘遠近於臥時用筯頭蘸米粒許點瘜肉上隔一日臥點一次半月見效

雄黄散八四 治鼻齆

雄黄五分 瓜蔕二個 綠礬一錢 射香少許

右爲末吹入鼻中

千金瘜肉方八五 一名瓜丁散

瓜蔕 華陰細辛等分

爲末綿包少許塞鼻中

簡易瘜肉方八六

用枯白礬爲末以綿胭脂裹塞鼻中數日肉隨落

白礬散八七 治肺風酒皶鼻等疾

白礬 硫黄 乳香各等分

爲末綿裹搽之○或用茄汁調敷患處更妙

二神散八八 治赤鼻久不瘥

大黄 朴硝等分

爲末津調塗鼻上

酒瘡鼻粉痣八九 亦名硫黄散

硫黄 輕粉各一錢 杏仁五分

右爲末用蜜酒調於臥時塗上早洗去效○或用津唾調搽更妙○又方只以銅綠爲末晚時切生薑蘸搽之

點痣去斑九十

用石灰水調一碗如稠糊揀好糯米粒全者半置灰中半露於外經一宿灰中米色變如水晶若或面或手有黑痣黑靨及紋刺者先須鍼頭微微撥破置少許水晶者於其上經半日許靨痣之汗自出乃可去藥且勿著水二三日則愈

面鼻雀斑九十一　此連子衛衛方

白芷　甘菊花各三錢去梗　白果二十個　紅棗十五個

珠兒粉五錢　猪胰一個

右爲末研細餘俱搗爛拌勻外以蜜拌酒釀頓化入前藥蒸過每晚搽面早先去

面瘡二方九十二

面上暴生瘡　用生杏仁搗爛以雞子清調如煎餅至夜洗面敷之旦洗去數十次愈

指甲抓破面　用生薑自然汁調輕粉傅破處無痕

止鼻衄血九十三

龍骨爲細末吹入鼻中少許即止凡九竅出血者用此皆能治之

止鼻衄歌九十四

石榴花瓣可以塞　蘿蔔藕汁可以滴

火煆龍骨可以吹　水煎茅花可以喫

又將頭髮蘚可以塞　車前草汁可以滴

火燒蓮房可以吹　水調鍋煤可以喫

鼻衄蒸法九十五　治衄如湧只不止者

用草紙摺十餘層井花水濕透分髮貼頂心中以熱熨斗熨之微熱不妨久之即止

鼻塞不通葱熨法九十六

但用葱頭以繩束成一把去根頭實處切成寸長一餅先以熨斗將葱一面令病人置頂心顖會穴處乃以熨斗或火從上熨之候鼻內作葱氣乃住未通再作餅熨之○其有嬰兒傷風鼻塞不能吮乳者但用大南星爲末以生薑自然汁和作薄餅用兩掌合煖貼顖上片時即通

硝石散九十七　治風邪犯腦患頭痛不可忍不問年歲

硝石　人中白等分　冰片少許

右爲極細末用一字吹入鼻中

通關散九十八　治卒然牙關緊急腰背反張藥不能嚥或時

喉癰腫鼻塞氣閉等證

細辛 如無真者不用亦可 薄荷葉 牙皂角 等分

右為細末以紙撚少許入鼻內候得噴嚏口開隨進湯藥○

聖惠搐鼻法止用二味無薄荷

陳氏通關散 九九 方在痘疹八五

通心經降心火利小便良方

擦牙通關散 一百 方在小兒八四

治風搐關竅不通痰塞中脘留滯百節

以下口舌方

良方玄參散 百一 治滿口并舌生瘡連齒斷爛痛

玄參 黃芩 黃柏 梔子仁

大黃 前胡 獨活 犀角屑

麥冬 升麻 炙甘草 各等分

右為㕮咀每服五錢水一鍾半煎七分不拘時溫服

玄參升麻湯 百二 方在外科四八

治口舌生瘡重舌木舌腮頰咽喉腫痛斑疹瘡瘍

清涼飲子 百三 治上焦積熱口舌咽鼻乾燥

黃芩 黃連 各二錢 薄荷 玄參 一

當歸 芍藥 各錢半 甘草 一錢

水二鍾煎八分不拘時服○大便秘結加大黃二錢

清熱化痰湯 百四 治上焦有熱痰盛作渴口舌腫痛

貝母 天花 枳實 桔梗 各一錢

黃芩 黃連 各錢二分 玄參 升麻 各七分

甘草 五分

水煎服

甘露飲 百五 方在寒陣十

治口舌生瘡咽喉腫痛牙齦潰爛

龍膽瀉肝湯 百六 方在寒陣六三

治肝火內炙上為喉口熱瘡下為小便濇痛等症

五福化毒丹 百七 方在外科七六

治咽喉牙口瘡毒腫腫

良方冰蘗丸 百八 治舌瘡口瘡

薄荷葉 蘇州 黃柏 各等分 硼砂 半之 冰片 一分

右為末生蜜丸彈子大每服一丸噙化

上清丸 百九 治口舌生瘡咽喉腫痛止嗽清音寬膈化痰極效

砂仁　桔梗各一錢　月石二錢　冰片一分
甘草　玄明粉　訶子各一錢　百藥煎八錢
蘇州薄荷葉一兩六錢
為極細末煉蜜丸芡實大臨睡含化一丸○或為小丸茶清
送下
硼砂丸百十　治口瘡舌瘡
寒水石一兩　牙硝四錢　硼砂二錢　冰片
射香各一分
甘草膏和丸麻子大不時含化一丸津嚥

良方聖金散百十一　治舌上出血不止
黃藥子一兩　青黛一錢
右為細末每服一錢食後新汲水調下日二服
金花煎百十二　治舌上出血如簪孔
黃檗三兩　黃連五錢　梔子二十枚
右㕮咀以水二升浸一宿煮三沸去滓頓服○一方用酒浸煮
飛礬散百十三　治木舌腫脹大滿口若不急治即殺人
白礬飛　百草霜等分
右為細末醋糊茄汁然汁調服若日嚥灌之妙

寸金散百十四　治心經煩熱動血妄行舌上出血不止
新蒲黃三錢　新白麪三錢　牛黃五分研　腦荷五分研
右研勻每服一錢生藕汁調服食後亦可摻舌上
黃檗散百十五　治血出血不止名曰舌衄
黃檗不拘多少蜜塗慢火炙焦為末
右每服二錢溫米飲調下
舌上出血百十六　重出
升麻黃連丸百十七　治多食肥甘口臭穢惡
升麻半兩　黃連　黃芩酒炒　生薑
檀香　甘草各二錢　青皮半兩

右為細末湯泡蒸餅丸彈子大每服一丸不拘時細嚼白湯
下
丁香丸百十八　治口臭穢
丁香二錢　川芎二錢　白芷五分　炙甘草一錢
右為末煉蜜丸彈子大綿裹一丸噙化
應手散百十九　治傷寒舌出寸餘連日不收
梅花冰片
為末摻舌上應手而收重者須用一錢方收

陰陽散百二十　亦名赴筵散○治口瘡效

黃連一兩　乾薑炒黑三錢

為細末乾摻口瘡上涎出即愈

外科陰陽散一二一　方在外科一二三

治瘡偏半陰半陽者

綠雲散一二二　治口瘡爛臭久不愈

黃蘗蜜炙　青黛等分

右為細末臨臥用少許摻舌藏津妙

細辛黃蘗散一二三　治口舌瘡

黃蘗　細辛等分

右為末傳之或摻舌上吐涎水再傳須旋合之

白蠶黃蘗散一二四　治口糜

黃蘗蜜炙　白殭蠶直者新瓦上焙乾斷絲

右為細末用少許敷瘡上吐涎

蓬砂散一二五　治口瘡

蓬砂　青黛　龍腦薄荷　石膏煆各等分

右為極細末每用少許臨臥傳口中

黃連朴硝散一二六　治口瘡絕妙

黃連　朴硝　白礬各五錢　薄荷葉一兩

右為粗末用臘月黃牛膽將藥入膽內風前掛兩月取下如

遇口瘡旋將藥研細敷之去其熱涎即愈

柳華散一二七　治熱毒口瘡

黃柏炒　蒲黃　青黛真者　人中白煆

右等分為末敷之

摻口瘡一二八

天竺黃　月石等分　冰片少許

為末摻之

碧雪一二九　治一切熱壅口舌生瘡舌強腮腫咽喉腫痛等

症

蒲黃　青黛　硼砂　焰硝

甘草等分

右為細末每用少許摻舌上細細嚥下或欲涼水送下頻用

之效或用砂糖丸芡實大每服一丸噙化下咽妙

絳雪百三十　治口舌瘡咽喉腫痛

硼砂一錢　硃砂三錢　馬牙硝　寒水石飛各二錢

冰片半字

右爲細末每用一字摻舌上嚥亦不妨喉痛者吹入咽中

孫眞人口瘡方 一三一

單用朴硝含之甚良

皂角散 一三二 治重舌喉痺

皂角不蛀者四五挺去皮核炙焦 荊芥穗二錢

右爲細末以米醋調塗腫處

千金口臭方 一三三 亦治舌上出血如簪孔

用香薷一把以水一斗煮取三升稍稍含漱嚥之

聖惠口齒方 一三四 治口臭穢及齒齗腫痛

用北細辛一兩煮取濃汁熱漱冷即吐之立效

以下齒牙方

東垣神功丸 一三五 治多食肉人口臭不可近牙齒疳蝕牙齗肉脫血出幷治血崩血痢腸風下血及逆氣上行等證

黃連酒洗 砂仁各五錢 生地 甘草各二錢

當歸 木香 藿香葉 升麻

蘭葉各一錢無亦可

右爲末以湯浸蒸餅和丸綠豆大每服百丸或二百丸白湯食遠服

東垣清胃散 一三六 方在寒陣五四

治齒齦潰爛喜冷惡熱

秘驗清胃飲 一三七 方在寒陣五六

治一切風熱牙床腫痛出血動搖

三因安腎丸 一三八 治腎虛牙齒腫痛

此與前方安腎丸同但少肉桂茯苓二味方在熱陣一六七

直指立效散 一三九 治牙痛不可忍痛連頭腦項背微惡寒飲大惡熱飲

防風一錢 升麻七分 炙甘草 細辛葉各三分

草龍膽酒洗四分

右用水一鍾煎五分去滓以匙抄在口中㵽痛處少時立止如多惡熱飲更加草龍胆一錢此法不定宜隨寒熱多少臨時加減○若惡風作痛須去草龍胆加草豆蔻黃連各五分累用得效

細辛煎 百四十 治牙齒腫痛不可忍及口氣臭

用北細辛一味煎濃汁乘熱含漱良久吐之極妙

蟾酥散 一四一 治熱毒上攻宣露出血牙齦腫痛不可忍

屋遊 此即瓦上青苔不拘多少洗淨

右用水煎湯浴去消入鹽一撮頻頻嗽之

御藥院丁香散 一四一 治牙齒痛

丁香　蓽撥　蝎稍　大椒

右等分為末每用少許擦於患處

聖惠芫花散 一四三 治風蟲諸牙痛

芫花　細辛　川椒　蘄艾

小麥　細茶等分

右咀水一鍾煎七分溫漱之日三四次吐涎出即愈

如神散 一四四 治風牙蟲牙攻蛀疼痛牙齒動搖連頰浮腫

川椒炒出汗　蜂房炙

右等分為細末每用一錢水煎數沸熱漱即止

赴筵散 一四五 治風蟲牙痛

良薑　草烏　細辛　荊芥穗

右等分為末擦牙有涎吐之

蟾酥膏 一四六 治風蛀諸牙疼痛

蟾酥少許　巴豆去油研如泥　杏仁燒焦

右共研如泥以綿裹如粟米大若蛀牙塞入蛀處風牙塞牙縫中吐涎盡愈

蟲牙痛 一四七

蒼耳　艾　小麥　花椒

芫花　黑豆

煎熬屢效之即愈

韭子湯 一四八 治蟲牙

用韭菜子一撮以碗足盛之用火燒烟外用小竹梗將下截劈為四開以紙糊如喇叭樣引烟薰其蛀齒〇如下牙蛀者以韭子煎濃湯漱之蟲自出

端竹堂方 一四九 治蟲牙疼痛不已

用天仙子不拘多少燒烟以竹筒抵牙引烟薰之其蟲即死

巴豆丸 一百五十 治蟲牙疼痛蝕孔空虛

巴豆一枚　花椒五十粒細研

右為極細末飯丸黍米大綿包塞蛀孔

藜蘆散 一五一 治蟲牙疼痛

用藜蘆為末塞牙孔中勿令嚥汁有涎吐之大有神效

北棗丹 一五二 治走馬牙疳

用北棗去核每個內入信一厘燒存性研細每以些小傅

患處

青金散 一五三 治走馬牙疳蝕損唇舌腐臭牙落其效如神

銅綠 砒霜等分

右為細末每用些少傅患處

三仙散 一五四 治走馬牙疳一時腐爛即死

銅綠二分 射香一分 婦人溺桶中垢白者火煅一錢

右為極細末傅齒上不可太多

射礬散 一五五 治走馬牙疳危惡證候

射香少許 胆礬一錢 銅綠半兩 白礬生用五分

右為細末傅牙患處

神授丹 一五六 治牙疳

枯礬七分 白鹽灰一分 射香一分

為末以竹管吹瘡上

黃連散 一五七 治齒斷間出血喫食不得

黃連 白龍骨 馬牙硝各一錢 枯礬五分

冰片半分

右為細末每用少許傅牙根下

雄黃射香散 一五八 治牙斷腫爛出血

雄黃一錢半 銅綠 輕粉 黃連

黃丹各一錢 血竭 枯礬各五分 射香一分

右為細末研勻每用些少傅患處

齒縫出血 一五九

右用紙撚子蘸乾蟾酥少許于血出處按之立止

固齒雄鼠骨散 百六十 治腎水不足牙齒浮動脫落或縫中疼痛出血或但動不痛者

雄鼠骨 當歸 沒石子 熟地

榆皮 青鹽 細辛等分

右為細末用綿紙裹條按牙床上縫中則永固不落矣

秘方雄鼠骨散 一六一 治牙落可以重生

雄鼠骨一具 生打活雄鼠一個剝去皮雜用鹽水浸一時於炭火上炙肉自脫落取骨炙燥入後藥內同研為末

香附 白芷 川芎 桑葉晒乾

地骨皮 川椒 蒲公英 青鹽

川槿皮 旱蓮草

右為末擦牙百日後出風齒無不效

良方荆槐散 一六二 治牙宜出血疼痛不止

荆芥穗　槐花

右等分為末擦牙患處

石膏升麻散 一六三　治陽明風熱流注齒牙腫痛出血化為膿汁等證

石膏　羊脛骨灰　地骨皮　升麻

右等分為末每用少許擦牙齒根上○或加麝香少許更妙

薑黃散 一六四　治牙疼不可忍

薑黃　白芷　細辛等分

右為粗末擦患處須臾吐涎以鹽湯漱口面赤腫者去薑黃加川芎其腫立消

濟生香鹽散 一六五　牢牙去風

大香附炒焦黑三兩　青鹽一兩半

右為末如常擦牙乃蔵冤先生良方

和劑牙宣散 一六六

良薑　胡椒　華撥　細辛

乳香　射香　雄黃　青鹽研　下四味各另

右等分為細末先以溫水漱淨牙後以藥末擦患處追出涎沫吐之漱十餘次痛立止忌油鹽二日

槐鹽散 一六七　治食甘甜過多牙痛

食鹽　青鹽　槐枝一斤切斷用水九碗煎一碗聽用

右將二鹽先炒乾乃入槐枝湯煮乾取起為末用鉛盒盛擦牙固齒最妙

椒鹽散 一六八　治牙痛用清涼藥不效或反甚者宜從此以治

川椒　青鹽　華撥　薄荷

荆芥穗　細辛　樟腦

右為末擦痛牙處或煎湯漱之亦可

追風牢牙散 一六九　駐顏補腎牢牙固齒

細辛　青鹽各七錢　當歸酒洗　川芎各一兩

右為末每用少許清晨擦牙滿口放良久連藥嚥下或先以溫水漱口淨然後擦而嚥之亦可

蕭氏青白散 一七〇　治一切牙疼固齒

青鹽二兩　食鹽　川椒煎汁各四兩

右以椒汁拌鹽炒乾為末擦牙永無齒疾以漱水洗面目亦無疾此藥極妙

御前白牙散 一七一

石膏研 四两另 大香附 四两 白芷 七錢半 甘松

三奈 藿香 沉香 川芎

零陵香 各二錢 細辛 防風 各一两

右爲細末先以温水漱口次擦之妙

東垣 白牙散 一七二

升麻 一錢 羊脛骨灰 二錢 軟石膏 三錢 白芷 七分

麝香 少許

右爲細末先以温水漱口次擦之妙

道藏經方 一七三 治牙齒動搖血出不止

用白蒺藜不拘多少搗爲細末每日擦牙及患處最妙

取牙不犯手 一七四

草烏 蓽撥 各錢半 川椒 細辛 各三錢

右爲細末每用少許點在患牙内外一時其牙自落

以下咽喉方

局方 甘桔湯 一七五 治一切風熱上壅咽喉腫痛○錢氏方用

甘草二錢 苦梗一錢

甘草 二錢 桔梗 四錢

水二鍾煎八分食後服○此方加荆芥穗二三錢三因方即名荆芥湯尤效

拔萃 甘桔湯 一七六 治熱肺咽痺

甘草 桔梗 薄荷 連翹

黄芩 各等分

水二鍾加竹葉煎服○一方有山梔子

加味甘桔湯 一七七 方在痘疹九十

治咽喉腫痛

醫林 訶子甘桔湯 一七八 治火盛失音

訶子 四個半生半煨 桔梗 一两五錢半生半炒 甘草 二寸半生半炙

右㕮咀分二服每服水一鍾童便一鍾煎八分食後温服

清咽利膈散 一七九 治咽喉腫痛痰涎壅盛

防風 金銀花 荆芥 薄荷

桔梗 黄芩 黄連 各錢半 山梔

連翹 玄參 大黄 朴硝

牛蒡子 炒研 甘草 各七分

水二鍾煎一鍾食遠服

消梨飲 一八十 治喉痺

單用消梨汁頻頻飲之或將梨削浸凉水中頻頻飲之尤

妙此物大解熱毒○或南方少梨之處但擇好蘿蔔搾汁

加玄明粉徐飲大效

醫林 透天一塊冰 一八一 治一切風熱咽痺口舌生瘡頭目不

清痰涎壅盛

黃連二錢 腦荷 月石 檳榔

蒲黃 甘草各一錢 荊芥穗 黃柏各五分

冰片半分或一分 白砂糖半兩

右爲細末煉蜜爲丸芡實大每服一丸噙化

蘢花丸 一八二 治纏喉風聲不出

蘢花 薄荷葉蘇州者

右等分爲細末煉蜜丸彈子大每服一丸臨睡噙化

醫林 杏仁煎 一八三 治欬嗽暴重聲音不出

杏仁泡去皮尖研如泥 薑汁 砂糖各一小盞

木通 桑白皮去皮炒 貝母 紫菀茸

北五味各 石菖蒲 款冬花各半兩

右將後七味爲咀用水五升煎半去滓入杏蜜薑糖四味合

和微火煎取一升半每服三合兩日夜服之

門 蜜附子 一八四 治腎與膀胱俱虛不通及臟寒閉塞等證

用大附子一枚去皮臍切作大片用蜜塗炙令黃含口中

嚥津甘味盡再塗蜜炙用或易之○或用炮附子以唾津

調塗足心（一方用肉桂合之）

牛黃益金散 一八五 治腦火炎上傷肺咽喉生瘡破爛

黃柏 爲末用蜜丸炙數次以熱爲度另研爲極細末

白硼砂 白礬飛各一錢 牛黃三分

右用蜜調如稀糊塗敷患處或丸如龍眼大含化嚥之○按

此方必加冰片半分方妙

秘方 三黃丸 一八六 治喉痺極佳

大黃 黃連 黃芩各一兩 黃藥子

白藥子各七錢半 黃柏 山豆根 苦參各三錢

月石 京墨各錢半 射香少許 冰片五分

右爲末豬膽調和內蒸一次臨後入片射研砂爲丸豆大噙

化一丸津嚥日夜常噙勿脫藥味方妙

人參平補湯 一八七 治腎虛聲啞不出

人參 川芎 當歸 熟地黃

白芍藥 白茯苓 兔絲子制 杜仲制

北五味子 白朮 巴戟去心 半夏麯

橘紅各半兩 牛膝酒洗 破故紙炒 益智仁
葫蘆巴炒 炙甘草各一錢半 石菖蒲一錢半
右㕮咀每服五錢薑五片棗二枚煎七分吞山藥丸百餘粒○
凡五鼓後腎氣開時不得欬唾言語再進上藥則功效勝常
百合丸一八八 治肺燥失聲不語
百合 百藥煎 杏仁去皮尖 訶子
薏苡仁等分
右為末雞子清和丸彈子大臨臥噙化或用蜜丸亦妙
秘方竹衣麥門冬湯一八九 治一切勞瘵痰嗽聲啞不出難治

者服之神效
竹衣此即竹內衣膜鮮者一錢 竹茹彈子大一丸即金竹青皮也須取之
竹瀝 麥冬 甘草 橘紅各五分
白茯苓 桔梗各一錢 杏仁七粒去皮尖打
右㕮咀水一鍾半加竹葉十四片煎七分入竹瀝一盃和勻服
射干丸一九〇 治懸雍腫痛咽喉不利
射干 炙甘草各一兩 川升麻 川大黃
木別仁各二錢半 杏仁去皮尖雙仁麩炒微黃半兩
右為細末煉蜜丸小彈子大常含一丸津嚥

鐵笛丸一九一 治氣鬱動火失音不語者神效
薄荷葉四兩 連翹 桔梗 甘草各二兩半
訶子煨 大黃酒蒸 砂仁各一兩 川芎一兩半
百藥煎二兩
右為細末雞子清和丸彈子大臨臥噙化一丸或煉蜜丸亦
可
雄黃解毒丸一九二 治急喉風雙蛾腫痛湯藥不下
雄黃飛 鬱金各一兩 巴豆十四枚
右為末醋糊丸綠豆大熱茶清下七丸吐出頑涎即甦未吐

再服大效如口噤以物斡開灌之下咽無有不活者○如小
兒驚熱痰涎壅塞或二丸三丸量大小與之○一法以此丸
三粒用醋磨化灌之其痰立出尤妙
玉鑰匙一九三 治風熱喉痺及纏喉風
焰硝一兩半 硼砂半兩 白殭蠶一錢 冰片一字
右為細末每用五分以竹管吹入喉中立愈○一此方加雄黃
二錢何名金鑰匙
二聖散一九四 治纏喉風急喉痺
膽礬二錢半 白殭蠶炒半兩

為細末用少許吹入喉中
秘方奪命散 一九五 治急喉風
白礬 枯 殭蠶 炒 月石 皂角 炙焦各等分
為細末每用少許吹喉中痰出即愈
馬牙硝散 一九六 治喉痺及傷寒熱後咽痛閉塞不通毒氣
上衝
馬牙硝細研每服一錢綿裹含嚥津以通為度
燒鹽散 一九七 治喉中懸癰垂長咽中妨礙
燒鹽 枯礬 各等分

右和勻研細以筯頭蘸點即消
寶鑑開關散 一九八 治喉風氣息不通
白殭蠶 炒去絲嘴 枯白礬 等分
右為細末每服二三錢生薑蜜水調下細細飲之
七寶散 一九九 治喉閉及纏喉風
殭蠶 直者十個 硼砂 雄黃 全蝎 十個全者去毒
明礬 牙皂 一挺去皮弦各一錢 膽礬 五分
右為細末每用一字吹入喉中即愈
破關丹 二百 治乳蛾喉閉纏喉風等證

硼砂末 五錢 霜梅肉 同搗爛
右二味和勻丸芡實大每服一丸噙化嚥下內服荆防敗毒
散
通氣散 二百一 方在外科八十
治時毒腫甚咽喉不利取嚏以泄其毒
以下諸毒方
紫金錠 二百二 一名神仙太乙丹〇一名玉樞丹〇一名萬
病解毒丹〇解除一切中毒積毒蟲毒蠱毒菌蕈砒石死牛
死馬河豚等毒及時行瘟疫山嵐瘴氣喉閉喉風顛邪鬼氣
狂亂迷死牙關緊急小兒急驚等證凡行兵興役之處尤不
可無

文蛤 搥碎洗焙淨末三兩
山慈菇 去皮淨末二兩
千金子 去油取霜一兩
紅芽大戟 去蘆洗焙為末一兩五錢
麝香 另研三錢
右用糯米煮濃飲為丸分作四十錠每服半錠用井花水或
薄荷湯磨服利一二次用粥止之若治癰疽惡毒湯火蛇蟲

犬獸所傷以東流水磨服幷救急處〇如治扁邪鬼氣鬼疰
攣急疼痛須煖酒磨服○凡修合時日須用端午七夕重陽
或天德月德日於淨室焚香修制凡奇怪之病屢用如神效
驗不可盡述醫家大家皆不可一日無之

解毒丸 二百二 治誤食毒草或中蠱毒并百物毒救人於
必死

板藍根 洗淨曬乾四兩 貫眾 去毛一兩 青黛 研 生甘草 各一兩

右爲末煉蜜丸梧子大另以青黛爲衣如稍覺精神恍惚即
是誤中諸毒急取十五丸嚼爛用新汲水送下即解或用水

浸蒸餅丸尤佳

藍根散 二百三 解毒藥熱藥諸毒

藍根 一錢 蘆根 剉一握 綠豆 一錢研 淡豉 一合研

右先將二根以水一碗煎至七分去滓次入後藥和勻分三
服或一二服利下惡物不用再服

白扁豆飲 二百四 解諸毒入腹及砒毒

用白扁豆不拘多少爲細末入青黛等分細研再入甘草
末少許巴豆一枚去殼不去油別研爲細末取一半入藥
內外以砂糖一大塊用水化開和藥共成一大盞飲之毒

隨利去後却服五苓散之類

八毒赤丸 二百六 方在攻陣百四

治一切邪祟鬼疰等毒

飲食中毒 二百七

凡中飲食毒而覺煩熱脹滿者急用苦參二兩苦酒一升
半煮半沸時頓飲之吐食出即瘥○或以水煮亦得○或
用犀角湯亦可解

中酒毒 二百八 飲酒中毒者經日不醒是也謂之中酒

黑豆一升煮汁溫服一盞不過三盞即愈

解麵毒 二百九

只以蘿蔔生啖之或擣汁服之麥麪大熱蘿蔔能解其性
或用大蒜嚼食之亦善[illegible]

解一切食毒 二百十 解一切飲食之毒及飲酒不知中何毒
卒急無藥可解者

薺苨 生甘草 各二兩

右剉細以水五盞同煎取二盞停冷去滓分二服○一方加
蜜少許同煎服之解一切毒

諸魚中毒 二百十一

凡食魚後中毒物煩亂者川陳皮濃煎汁服之即解

河豚毒二一二

五棓子　白礬等分

右為細末水調服之〇一方凡中河豚魚毒一時困殆倉卒無藥急以清油多灌之使毒物吐出即愈

解河豚魚㫖及食狗肉不消脹滿毒二一三

蘆柴根解者搗汁飲之乾者煎汁溫飲之

解食鱔魚雞鱉蝦蟆自死禽獸等毒二一四

豆豉一合新汲水煎濃頓溫服之可解

中蟹毒二一五

凡食蟹中毒用紫蘇葉濃煮汁飲之或用紫蘇子搗汁飲之亦良或搗藕汁或搗蒜汁飲之俱可解或用冬瓜汁或食冬瓜亦可

食牛馬中毒二一六

粉草擂無灰酒服當吐瀉若渴者不可飲水飲水必死〇一方淡豆豉擂人乳服之即解

食雞子毒二一七

好醋飲之即愈未愈再服

食斑鳩毒二一八

葛粉一合水調服可解葛湯調服亦解

解花椒毒二一九　凡有服川椒氣閉欲絕者

冷水飲之解地漿水更妙

解諸菜毒二二〇

食後多腹脹者是毒也以醋解之

解蕈毒二二一

忍冬藤生啖之愈或煎濃汁飲之〇崇寧間蘇州天平山白雲寺僧五人行山間得蕈一叢甚大摘而食之發吐三

人急採鴛鴦草生啖之即愈二人不甘吐至死此即忍冬藤亦名金銀花亦名鴛鴦藤也

解巴豆毒二二二　其證口乾兩臉赤五心熱下利不止

乾薑炮　黃連微炒各等分

右為細末每服二錢水調下如人行五里許再服〇又方煮綠豆湯冷服之即愈〇一方黃連甘草煎汁冷飲之〇一方芭蕉根葉搗汁飲之利止而安

解砒毒二二三　凡中砒毒者其人煩燥如狂心腹絞痛頭眩嘔吐面色青黑四肢逆冷六脉洪數飲食中得者為易愈若

一空心酒醋服者難救
以地漿水頓服若吐出又服所謂洗淨腹中毒令惡地上
漿是也○其法掘地成坑以水灌注攪成混水飲之謂之
地漿
又方　解砒毒最良此爲第一
用生綠豆半升搗爛入新汲水擂和去柤取汁飲之
又方　用新鮮羊血乘熱飲之亦可解○一方用甘草汁同
藍汁飲之即愈
鉤吻毒二二四

鉤吻生池傍與芹菜相似無他異惟莖有毛以此別之誤食
殺人解之之法用薺苨八兩水六升煮取二升分溫二服此草即胡
蔓也　一方用杜湯效
解附子等藥毒二二五
凡服附子酒多而覺頭腫身裂血流或見內熱諸證急用綠
豆黑豆各煎服或搗汁飲之或濃煎二豆湯常飲食之○凡服
散風藥亦多以致口燥亦可以醋灌之或濃煎甘草同生薑
自然汁頻飲之○一方大豆汁餳糖漿湯並能解附子毒○
一方用田螺搗碎調水飲之

解烏頭草烏毒二二六
甘草煎濃湯服之○或米醋調沙糖俱可解
解半夏毒二二七
生薑搗汁飲之有中此毒口不能言倒地將死者速用薑
汁灌之須臾自甦
解斑蝥芫青毒二二八
豬脂油和大豆汁飲之
解藜蘆毒二二九
雄黃爲末溫酒調服一錢○一方煮葱汁服

解雄黃毒二三十
漢防己煎湯飲之○有用雄黃搽瘡或薰瘡致瘡受毒者
防己煎湯洗數次愈
解杏仁毒二三一
藍子研水服則解
解服丹毒二三二
地漿服之爲上○一方用蚌肉食之良
解中藥箭毒二三三　交廣黎人以焦銅作箭中人破皮即死
糞清飲之並解惡處以糞塗洗之

解蠱滷毒 二二四

凡婦女有服鹽滷垂危者急取活鴨或雞斬去頭將頸塞口中以熱血灌之可解若滷多者必數隻方足盡收其鹹毒

解漆毒 二二五

一州牧以生漆塗囚眼囚卽盲過一村叟見而憐之語之曰汝急尋蟹搗碎取汁滴眼內漆當隨汁流散瘡亦愈矣如其言覓得一小蟹用之目睛果愈略無損○或成紅斑爛瘡取生蟹黃塗之不數次卽愈○一方用杉木煎汁洗之

以下蟲毒方

解虎傷毒 二二六

蔴油一碗飲之卽無妨仍用葛根湯洗傷處綿拭乾香油塗之再以青布作條燃火入竹筒中放烟薰傷處口渴者沙糖調水飲之

蛇毒 二二七

凡被蛇齒甲爪鐵刺傷處出血用雄黃等藥敷之仍須中留一孔使毒氣得泄乃內服解毒等藥○凡傷處兩頭俱用繩扎緊庶不致毒氣內攻流布經絡

一方治毒蛇咬傷急取一二七搗爛塗之毒卽消散神妙無比

一方治蛇蟲傷毒用五靈脂雄黃等分爲末每服二錢酒調服仍敷瘡留口如乾燥須以油潤之

凡居山野陰濕之處毒用雄黃如桐子大一丸燒烟以薰衣袍被褥之類則毒不敢侵百邪皆遠避矣

一凡蛇入七竅急以艾灸蛇尾又法以刀破蛇尾少許入川椒數粒以紙封之蛇自出卽用雄黃硃砂末煎人參湯調灌之或食蒜飲酒內毒卽解

一山居人被蛇傷急用溺洗咬處拭乾以艾灸之立效又方用獨頭大蒜切片置患處以艾於蒜上灸之每三壯換蒜

多灸爲妙凡被毒蛇所傷皆效

肘後方 用小蒜搗汁服渣敷傷處

雄黃辟蛇毒 二三八

南海地多蛇而廣府尤甚某侍郎爲帥聞雄黃能禁制此毒乃買數百兩分貯絹囊掛於寢室四隅經月餘一日臥觸外常有黑汁從上滴下臭甚使人穿承塵窺之則巨蟒橫其上死腐矣於是盡令撤去障蔽蛇死者長丈許大如柱傍又得十數條皆蟠蚪成窠并他屋內所驅放者合數百條官舍清寧

風犬傷人 一二三九

急於無風處吮出瘀血如或無血則以針刺出血用小便洗淨外用香油調雄黃少加麝香敷之○一凡遇惡犬咬傷如倉卒無藥即以百草霜麻油調敷或用葱搗爛貼之牛糞敷之或蚯蚓糞汁之或口嚼杏仁爛付之皆能救急如少延緩恐毒氣入經爲害○一方拔去頂上紅髮急令人吮去惡血以艾灸傷處五七壯甚者灸百壯神效○一方用米泔水洗淨沙糖敷之○一方用杏仁炒黑搗成膏貼之

避犬法 二百四十

瑣碎錄云凡行道遇惡犬卽以左手大拇指掐寅上吹氣一口輪至戌上掐之犬卽退伏

糯米散 治風犬傷人

大斑蝥二十一個去頭足翅

右用糯米一撮先將斑蝥七個入米內慢火炒勿令焦去蝥又入七個炒令焦色變又去之再入七個炒米出亦煙爲度去蝥不用只將米研爲末分二分冷水入香油少許空心調下一服須臾又進一服以二便利下惡物爲度若腹痛急以青靛調涼水解之或先用黃連甘草煎湯待冷服之不可食熱物或用涼水調益元散解之甚妙甚者終身禁食犬肉每見食犬肉而復作者不救又見單服斑蝥而死者亦有之蓋斑蝥毒之尤者雖曰以毒攻毒惟少用之茲用糯米以奪其氣尤宜預備青靛黃連以解其毒而況單服斑蝥者豈有不死

錢氏定風散 二百四十二 治諸犬傷毒

南星生用 防風等分

右爲末凡被犬咬先以口含漿水吮洗傷處或小便鹽湯俱可洗淨用綿拭乾方上藥永卽不發○或用制過南星一二錢爲末以童便調下亦可治破傷風

諸犬咬蛇傷灸法 四一

凡猘犬蛇蝎蜈蚣諸傷痛極危急或因傷受風而牙關緊急腰背反張不省人事者速切蒜片或搗爛罨傷處隔蒜灸之或一二十壯或四五十壯無不應手而愈取效多矣故本草謂蒜味辛烈有解毒之功夫積在腸胃尚爲難療況四肢受患則經絡遠隔不易及故古人有淋洗灸刺等法正爲通經逐邪導引氣血而設也

解毒散 二百四十 一名國老飲○治蠱毒及一切蛇虫惡獸所

傷重者毒氣入腹則眼黑口噤手足強直此藥平易不傷元氣大有神效不可以易而忽之也 [illegible]

明礬　甘草各一兩

右為末每服二錢不拘時冷水調下亦可敷患處

治馬咬傷 二四五 毒氣入心則危

用馬齒莧搗爛煎湯服外以敷于嚙傷患處

蜈蚣毒 二四六

以鹽擦咬處或鹽湯洗傷處痛即止○用後蝎螫方最妙已試○一方用吳茱萸嚼爛擦之或取井底泥傅之

解誤吞蜈蚣方 二四七

昔有婦用火筒吹火不知內有蜈蚣向火一吹蜈蚣驚竄人口不覺下喉求救人無措手適有人云取小雞一隻斷喉取血頻飲之復灌以香油取吐蜈蚣隨出

蝎螫毒 二四八

用半夏白礬等分為末以醋和敷傷處 前蜈蚣傷無白礬亦可 ○又蝎怕蝸牛蛇怕雄黃徐本齋云親見蝎螫腫痛用膽礬擦之立消可見南方人家不可無雄黃北方人家不可無膽礬此制蝎第一藥也

解蜂螫毒 二四九

以小便洗擦拭乾以香油塗之○或以雄黃末擦之○或以蝎螫方治之

治鼠咬毒 二五〇

貓毛燒存性入麝香少許香油調敷傷處則不害

治誤吞水蛭 二五一

昔一人夜間飲水誤吞水蛭入腹經停日久復生水蛭食人肝血腹痛不可忍面目黃瘦全不進食不治必死方用田中泥一塊小死魚三枚同豬脂溶搗勻再用巴豆十粒去油同

魚脂四味搗勻丸如綠豆大用田中冷水吞下大人五七丸小兒三丸須臾瀉下水蛭盡却用八珍湯調理

中蚯蚓毒 二五二

石灰泡熱水涼洗患處久浸之則愈○小兒多受蚯蚓毒則陰腫及囊俱腫如水泡用鴨血塗之或以鴨口含少時則消○一方用鹽湯溫洗之即效

治蠶咬毒 二五三 蠶咬人毒入肉中令人發寒熱

苧葉搗敷之汁塗之今治蠶家以苧近蠶則蠶不生發也

解蜘蛛咬毒 二五四

蘸汁調胡粉敷瘡口或用清油搽之內飲羊乳

本草云蜘蛛咬人令人一身生絲惟羊乳飲之可解貞元十年崔員外從質云目擊有人被蜘蛛咬腹大如孕其家棄之乞食於道一僧遇之教飲羊乳未幾日而平

本事 神授散 二五五 治傳屍勞瘵血氣未甚虛損者不必多方只以此藥早服則蟲自不能為患無有不愈者此方得之河南郡王府濟世之功不可盡述

川椒 二斤去合口者略炒出汗

右為細末空心米飲調服二錢或酒煮米粉糊為丸桐子大

每服三十丸以漸增至五六十丸或用酒送

解射工溪毒 二五六 葱白散 治溪澗中射工蟲專射行人形影人中其毒則病如瘧狀或若傷寒俗云沙發中之深者死急用後方治之

葱白 一握切 豉 半升 葛根 二兩 升麻 七錢半

右判如豆大每服四錢以水一盞煎一盞去滓不拘時溫服移時再服

千金 雄黃兌散 二五七 治時氣病䘌下部生蟲

雄黃 半兩 桃仁 一兩 青葙子 黃連

苦參 各三兩

右五味為末綿裹如棗核大內下部亦可用棗汁服方寸匕日三

千金 治大孔蟲癢方 二五八

用大棗蒸爛為膏以水銀和捻長三寸許綿裹內大孔中過宿明旦蟲皆出但水銀損腸宜慎之○愚按此方水銀不必生用但如治頭虱法燒烟以棗肉拌之用必更妙

○頭瘡生蟲方在新因五三

雄麝散 二五九 治五種蠱毒

明雄黃 麝香 各一字另研

用生羊肺一指大以刀切開安藥在內吞下

醫林 丹砂丸 二百六十 治蠱毒

雄黃 朱砂 各另研 藜蘆 略炒 鬼臼

巴豆霜 各二錢半

右為末煉蜜丸桐子大每服二丸空心甘湯下當利惡物並蠱毒如煩悶以鴨血為羹食之

良方 七寶丸 二六一 治蠱毒

敗鼓皮 蚕退紙 刺蝟皮 各燒存性 五倍子 炒

續隨子　朱砂另研　雄黄另研等分
右爲細末糯米粥丸小豆大每服七丸空心白水下
蜜髓煎　二六二　治中蠱令人腹内堅痛面目青黄病變無常
真蜜一碗　猪骨髓五兩研
右同煎熟分作十服日三服即差
歸魂散　二六三　凡初中蠱毒在膈上者當用此藥吐之
白礬　建茶各一兩
右二味爲細末每服五錢新汲水調下頓服之一時久當吐
毒出若此藥入口其味甘甜並不覺苦味者即其證也

麥麵散　二六四　治中蠱毒吐血
用小麥麵二合分爲三服以冷水調下半日服盡當下蠱
即安
挖生蠱毒簡易方　二六五
一方明礬芽茶等分爲末水調三錢
一方青藍汁頻頻服半合則蠱
一方石榴皮煎汁飲之當吐出活蟲而愈
以下雜方
嗽烟筒　二六六　治一切久寒款嗽遇冬便作

款冬蒂　鵝管石　雄黄　艾葉各等分
右爲末鋪艾上用紙捲筒燒烟吸入口内吞下即嚥茶水一
口壓之自效　一方有佛耳草無艾葉用紙捲成條每切一
節約長三五分許焚爐中吸烟嚥之
熏寶烟筒　二六七　治一切寒喘款嗽
真蟾　雄黄各　佛耳草　款冬蕊各一錢
艾葉一分
先將蟾酥化塗紙上次以艾鋪之將上味細研勻摻捲成筒
用火點一頭吸烟吞之清茶送下

七寶美髯丹　二六八　補腎元烏鬚髮延年益壽
何首烏赤白各一斤　川牛膝半斤
將何首烏先用米泔水浸一日以竹刀刮去粗皮切作
大片用黑豆鋪甑中一層却鋪何首烏一層再鋪豆一
層却鋪牛膝一層又豆一層重重相間面上鋪豆蓋之
蒸以豆熟爲度取起曬乾次日如前換豆再蒸如此七
次去豆用
破故紙十斤洗淨用黑芝麻同炒以芝麻熟爲度去芝麻
白茯苓十斤用人乳浸　赤茯苓十斤用黑牛乳浸蒸熟

當歸身半斤酒洗　枸杞子半斤去枝梗者

右共爲末煉蜜丸龍眼大每日空心嚼二三丸溫酒米湯鹽湯俱可送下○製藥勿犯鐵器○按此即七珍至寶丹少兔絲子一味

北京烏鬚方 二六九　兩京各處烏鬚者惟此方頗好用之雖未至簡妙然不損鬚傷肉村用得法者可黑一月

五棓子　擇川中之大者打作碎粒分粗細爲二先將粗者於鍋內用文火炒成糊次入細者同炒初將大黑烟起取出不住手炒將冷又上火炒則黃烟起又取出炒

將冷再上火炒則青黃白烟間出即可住火先以氈青布一大片浸濕將棓子傾在布上包成一團用脚踏成餅上用濕泥一担窨一夜色如烏羽爲妙磁器收貯聽用

紅銅花　用細紅銅絲炭火煆醋中淬之不拘遍數以化盡爲度去醋取銅花曬乾

皂礬　明礬各二分　沒石子　食鹽各二分

砂淨一分

右每次急時旋配旋用以制棓子二錢爲則加銅花四分餘

皆一二分和勻作一服研細以濃茶汁或燒酒用磁鍾調如稀糊坐湯中煮之看鍾內綠氣生面爲佳先用皂角湯洗鬚淨拭乾以抿刷塗上用皮紙搭濕包之或以青布蘸囊之過夜次早溫水洗之如不潤用胡桃油撚指潤之一二連染二夜其黑如漆亦妙

擦牙烏鬚方 二百七十　先期而擦者永久不白

青鹽一斤　嫩槐枝葉一斤八兩　黑鉛一斤四兩　沒石子尖者七錢

右將黑鉛青鹽入鍋內槐枝攪炒俱成灰炭取起將沒石子研細末和入用磁罐盛之每日早晚以藥擦牙漱水吐掌上

擦鬚鬚久久自然潤黑

便易擦牙方 二七一

用五棓子大者一百個裝食鹽　斤鋪在鍋內大火燒過存性爲末每日擦之久則鬚髮皆黑

丹溪疝氣神方 二七二　其痛甚至氣上衝如有物築塞心臟欲死手足冷者二三服除根

陳皮　荔枝核爲末炒焦黃　硫黃火中溶化即投水中去毒研細各等分

右爲末飯丸桐子大每服十四五丸酒下其疼立止若疼甚不能支持略加五六丸再不可多也

神仙六子丸 二七三 男子三十歲後服此藥一歲二單製服不息永不白鬚髮四十以上或見微白及少年髮黃不潤者服此百日自然漆黑其效如神

兔絲子 制　金鈴子　覆盆子　五味子

枸杞子　蛇床子 各一兩　何首烏 酒浸蒸極熟焙　牛膝 酒浸蒸

熟地 酒蒸焙　地骨皮 各一兩　舶上茴香 鹽炒　川木瓜 各一兩

右十二味爲細末用浸兔絲酒作糊爲丸梧子大每服五七十丸食前溫酒或白湯送下〇一方加人參白朮白茯苓各一兩尤有神效服此大忌三白

疝氣 一七四 方重

四製川楝子丸 一七五 治疝氣一切下部之病悉皆治之凡腫痛縮小雖多年亦可除根

川楝子 淨肉一斤分四分內一分用鹽一兩茴香一合同炒黃色去鹽香不用外三分一分用巴豆四十九個一分用斑蝥四十九個一分用巴戟一兩仍各加麥麩合同炒黃色俱去麩藥不用

木香 一兩　破故紙 一兩炒

右爲末酒糊丸梧子大每服五七十丸鹽湯送下甚者日進二三服或空心或食前

木香導氣丸 二七六 治男子小腸氣肚疼一切氣積下元虛冷脾胃不和並宜服之有效

木香　丁香　乳香　香附

川楝子肉　大茴香　破故紙　葫蘆巴 炒

甘草 炙 一錢 各二兩　杜仲 炒半兩

右爲細末酒糊丸梧子大每服三五十丸加至七八十丸用溫酒或鹽湯食前送下日進二三服

去鈴丸 二七七 治疝消鈴

用大茴香一升以老生薑二斤取自然汁浸茴香一宿以薑汁滲盡爲度入好青鹽二兩同炒赤取出焙乾爲末用無灰酒浸蒸餅爲丸梧子大空心食前酒下二三十丸或米飲亦可〇此方實脾疏肝所以治疝多效非如常法之迅伐故爲妙也

事後中寒腹痛方 二七八

凡房事後中寒厥冷嘔惡腹痛者用蔥薑搗爛炒熱罨臍之暖少頃出汗即愈〇如腹痛甚者以葱白頭搗爛炒熱攤臍上以艾灸之或熨之亦可得頭久有汗其痛即止

濕痢陰先作痛二七九

蘄艾　紫蘇葉炒熟　乾川椒炒熟各二兩

右三味拌勻乘熱用絹袋盛夾襯下勿令走氣冷即易之

熏熨脫肛方二百八十　治氣痔脫肛

枳殻麸炒　防風去叉各一兩　枯礬二錢半

右㕮咀用水三碗煎至二碗乘熱熏之仍以軟帛蘸湯熨之通手即淋洗

熏洗脫肛法二八一

用赤皮葱韭菜二味各帶根者煎湯入大楓子防風末各

數錢乘熱熏洗立收上○一方用五棓子煎湯洗以赤石脂末摻上托入或脫長者以兩床相並中空尺許以磁瓶盛湯令病人仰臥浸瓶中逐日易之收盡爲度○又澁腸散方在小兒五四

參朮芎歸湯二八二　治瀉痢產育氣虛脫肛脉濡而弦者

人參　白朮　川芎　當歸

黃芪酒炒　山藥炒　白芍藥　白茯苓

升麻　炙甘草

右生薑水煎服○按此方若治泄痢虛滑脫肛仍須加製附子肉豆蔻方效

涼血清腸散二八三　治大腸血熱脫肛

生地黃　當歸　芍藥各錢半　黃芩

黃連　防風　荊芥　升麻各一錢

香附　川芎　甘草各五分

水一鍾半煎服

縮砂散二八四　治大腸伏熱脫肛紅腫

縮砂仁　黃連　木賊等分

右爲細末每服二錢空心米飲調下

訶子人參湯二八五　治證同前

訶子煨去核　人參　白茯苓　白朮

炙甘草　蓮肉　升麻　柴胡等分

水一鍾半加生薑煎服

澁腸散二八六　治久痢大腸滑脫

訶子　赤石脂　龍骨等分

右爲末以臘茶少許和藥摻腸頭上用絹帛揉入○又方用鼈頭煆存性入枯礬少許如上揉入

蟠龍散二八七　治陽證脫肛腫痛

地龍焙乾一兩　風化硝二兩

右爲末每用一二錢肛門濕則乾摻燥則清油調搽先以見腫消荆芥生葱煮水候温洗輕輕拭乾然後敷藥

伏龍肝散一八八　治陰症脱肛

伏龍肝一兩　鼈頭骨五錢　百藥煎二錢半

右爲末每用一二錢濃煎紫蘇湯候温洗過以清麻油調藥傅如前法

獨蒜通便方一八九　治小便不通

獨蒜一枚　梔子二七枚　鹽花少許

右搗爛攤紙上貼臍良久即通未通塗陰囊上立通

小便不通經驗方一百九十

以朴硝爲末每服二錢空心煎茴香湯下○又方用蚯蚓杵以冷水攪過濾服半碗立通大解熱疾不知人事欲死服之甚效

小水不通熨法一九一

用葱二斤慢火炒香熟以絹帕裹更替熨臍下即通或用鹽炒熱熨之冷則再易須臾即通

雞内金散一九二　治氣虚溺尿

用雄雞膍胵并腸燒爲末温酒調服

狐腋氣五方一九三　治陰汗騷臭兩腋下臭不可與人同行

枯白礬　密陀僧　黄丹半各二錢　麝香五分

右於乳缽内研細以醋於手心内調藥搽腋下經兩時許即以香白芷煎湯洗之一日用一次

又治腋氣神效方

密陀僧四兩　枯白礬二兩　輕粉三錢

右爲細末頻搽兩腋擦至半月見效半年全愈

又腋氣方

用熱蒸餅一枚擘作兩片摻密陀僧細末一錢許急挾在腋下略睡少時候冷棄之如一腋有病只用一半蒸元方平生若此疾來紹興得此方用一次遂絶根本

又腋氣方

單用枯礬爲極細末以絹袋盛之常以撲於腋下不過一度即愈一方以唾調傅之

又腋氣方

先剃去腋毛令淨用白定粉水調搽傳患處至六七日後清晨看腋下有一點黑如針孔大者以筆點定即用小艾

灼灸七壯灸過或有濁氣攻心作痛者當用後藥下之
丁香　青木香　檳榔　檀香
射香　大黃
右煎服以下為度
腳汗牡蠣散二九四　治腳汗除穢氣
牡蠣煅　枯白礬　密陀僧　黃丹等分
右為細末每用少許乾摻腳指縫中即收
燥囊牡蠣散二九五　治陰囊濕痒搔之則汗水流珠用此極
效

牡蠣醋煅一兩　雄黃一錢　枯礬　硫黃
苦參　蛇牀子各一錢
右為細末先用蒼朮椒鹽煎湯洗濕處後用此藥摻之
熏洗陰囊法二九六　治一切陰囊濕痒
陳茶一撮　蒼朮二錢　花椒　蛇床子
白礬各一錢　蒼耳草量入　炒鹽一兩　朴硝二錢
右用水四碗先將前五味煎湯去柤乃入後三味泡化先熏
後洗一四次絕痒
梅蘇丸二九七

龍腦薄荷　粉草　冰糖各四兩　烏梅肉二兩
白檀香　紫蘇葉各一兩
右為極細末以熟棗肉搗丸芡實大勿用鐵器
冰梅丸二九八
龍腦薄荷二兩　白糖　柿霜各四兩　烏梅肉
桔梗各五錢　兒茶三錢　甘草一錢　冰片一分
右為極細末煉蜜丸龍眼核大
龍腦上清丸二九九
烏梅肉　腦荷各四兩　白檀香　蘇葉

兒茶　硼砂　沙糖各二兩　冰糖
柿霜各八兩　乾葛　粉草各一兩　冰片三分
右為極細末蜜丸櫻桃大
上清丸三百　佳方
腦荷一兩　雨茶　白硼砂七錢　烏梅肉
貝母　訶子各二錢　冰片三分
煉蜜丸
辟邪丹三百一　方在痘疹百三十
辟一切穢惡邪氣

福建香茶餅三百二　能辟一切瘴氣時疫傷寒穢氣不時噙口中邪氣不入

沉香　白檀各一兩　兒茶二兩　粉草五錢

麝香五分　冰片三分

右爲極細末糯米調飲湯爲丸黍米大噙化

香髮木樨油

採桂花半開者去莖蒂令淨每花二升用真麻油一斤輕手拌勻納磁瓶中用油紙緊封器口坐釜中湯煮一餉時起頓燥處十日後撥出用麻布濾絞清油封閉緊密收之愈久愈香○或用菜子油亦可

玉容散三百四　治面生黑黯雀斑

甘松　三奈　茅香各半兩　白芷

白芨　白斂　白殭蠶　白附子

天花粉　綠豆粉各一兩　防風　零陵香

藁本各一錢　肥皂一錠去皮弦

右爲細末每早晚蘸末洗面

硫黃膏三百五　治面部生瘡或鼻赤風刺粉刺

硫黃　白芷　天花粉　水粉各半錢

全蝎一枚　蟬蛻五個　芫青七個去頭足

右爲細末用麻油黃蠟約多寡却合面油熬勻離火方入前末藥和勻每於臨臥時洗面淨以少許塗面勿近眼數日間腫處自平赤鼻亦消如退風刺一夕見效

全書卷六十終

會稽　張介賓　會卿著
瀛海　賈　棠　青南訂

婦人

安胎飲一　治妊娠五七個月用數服可保全産

人參　白朮　當歸　熟地
川芎　白芍藥　陳皮　甘草炙
紫蘇　炙黃芩各一錢

右用盞水煎服○一方有砂仁

安胎散二　治妊娠卒然腰痛下血

熟地　艾葉　白芍炒　川芎
黃芪炒　阿膠炒　當歸　甘草炙
地榆各一錢

右加薑棗水煎服

泰山磐石散三　治婦人血氣兩虛或肥而不實或瘦而血熱或脾肝素虛倦怠少食屢有墮胎之患此方平和兼養脾胃氣血覺有熱者倍黃芩少用砂仁覺胃弱者多用砂仁少加

黃芩更宜戒慾事惱怒遠酒醋辛熱之物可永保無墮○徐東皋曰婦人凡懷胎二三個月慣要墮落名曰小産此由體弱氣血兩虛藏府火多血分受熱以致然也醫家又謂安胎多用艾附砂仁熱補尤增禍患而速其墮矣殊不知血氣清和無火煎爍則胎自安而固氣虛則提不住血熱則溢妄行欲其不墮得乎香附雖云快氣開鬱多用則損正氣砂仁快脾氣多用亦耗真氣況香燥之性氣血兩傷求以安胎適又損胎而反墮也今惟太山磐石散千金保孕丸二方能奪化工之妙百發百效萬無一失甫故表而出之以爲好生君子共知也

人參　黃芪　當歸　川續斷
黃芩各一錢　川芎　白芍藥　熟地各八分
白朮二錢　炙甘草　砂仁各五分　糯米一撮

水一鍾半煎七分食遠服但覺有孕三五日常用一服四月之後方無慮也

地黃當歸湯四　一名內補丸○治妊娠衝任脈虛補血安胎

熟地二兩　當歸一兩

右每服五錢水煎服○爲丸法以當歸炒爲末熟地蒸搗膏

和丸桐子大每服百餘丸溫酒或滾湯下○許學士曰大率妊娠惟在抑陽助陰然胎前藥最惡陰陽雜亂致生他病惟枳殼湯所以抑陽四物湯所以助陰耳然枳殼湯其味多寒若單服恐致胎寒腹痛更以內補丸佐之則陽不致強陰不致弱陰陽調和有益胎嗣此前人未嘗論及也

良方 當歸湯 五 治胎動煩燥或生理不順唇口青黑手足厥冷

當歸 人參各一錢 三 阿膠炒 甘草炒各一錢

連根葱白一握

右水四碗煎四味至半去滓下葱再煎一碗分二服

良方 阿膠散 六 或頓仆或因毒藥胎動不安或腰痛腹痛上搶短氣

阿膠 艾葉 當歸 熟地

川芎 白芍 黃芪 炙甘草等分

右每服四錢薑棗水煎

良方 膠艾湯 七 治妊娠頓仆胎動不安腰腹疼痛或胎上搶或去血腹痛○又金匱膠艾湯在後九十三

阿膠炒一兩 艾葉數莖

右二味以水五升煮取二升分三服

七味阿膠散 八 治胎動腹痛

阿膠炒 白茯苓 白朮炒 川芎

當歸 陳皮各一錢 甘草炒一分

右薑棗水煎服

良方 黃芪湯 九 治氣虛胎動腹痛下水

糯米一合 黃芪炒 川芎各一兩

右水煎分三服

良方 鉤藤湯 十 治妊娠胎動腹痛面青冷汗氣欲絕

鉤藤鉤 當歸 茯神 桑寄生

人參各一錢 苦梗錢半

右水煎服○如有煩熱加石膏

良方 白朮散 十一 治妊娠傷寒內熱等證

白朮 黃芩炒各二錢

右用薑棗水煎服○若陰證者不可用

良方 三味白朮湯 十二 治妊娠內熱心痛

白朮四錢 赤芍藥三錢 黃芩炒二錢

右水煎服○忌桃李雀肉

良方 四味白朮湯 十三 治妊娠胃虛惡阻吐水甚至十餘日漿

粥不入

白朮炒一錢 人參五分 甘草炒 丁香各二分

右薑水煎服

全生白朮散十四 治妊娠面目虛浮四肢腫如水氣名曰胎腫

白朮一兩 生薑皮 大腹皮 陳皮

白茯苓各半兩

右為末每服二錢米飲下○如未應佐以人參甘草

探胎飲十五 婦人經水不來三月疑似用此驗之

川芎不拘多少為末不見火

空心煎艾湯調下方寸匕覺腹中動則有胎也臍之下動者乃血瘕也不動者血凝也病也

當歸芍藥湯十六 治妊娠心腹急痛或去血過多而眩運

當歸 白芍藥炒 白朮炒 茯苓

澤瀉各一錢 川芎二錢

右水煎服

益母地黃湯十七 治妊娠跌墜腹痛下血

生地 益母草各二錢 當歸 黃芪炒各一錢

右薑水煎服

良方 獨聖散十八 治妊娠有所傷觸激動胎元腹痛下血極效

砂仁不拘多少帶皮同炒勿令焦黑取仁為末

右用熱酒調服二五分或一錢○此物有安胎導滯易產之功實妊婦之要藥也

良方 安胎寄生湯十九 治妊娠下血或胎不安或腰腹作痛

桑寄生 白朮 茯苓各五分 甘草一錢

右水煎服

二黃散二十 治胎漏下血或內熱晡熱或頭痛頭暈或煩躁

作渴或脇肋脹痛等證

生地 熟地

右為末每服三錢煎白朮枳殼湯下

四聖散二十一 治漏胎下血

條芩 白朮 砂仁 阿膠炒各等分

右為細末每服二錢艾湯調下○一方有芍藥無阿膠○按此方若改為湯砂仁用當減半

良方 續斷湯二十二 治妊娠下血尿血

當歸 生地黃各一兩 續斷 赤芍藥各半兩

右為末每服二錢空心用葱白煎湯調下

枳殼湯 二三 治胎漏下血或因事下血亦進食和中并治惡阻

枳殼炒 黄芩炙各半兩 白朮炒一兩

右為末每服一錢白湯調下○前四證若因脾胃虛弱宜用補中益氣湯加五味○若因脾胃虛陷宜用前湯倍加升麻柴胡○若因晡熱內熱宜用逍遙散

滑胎枳殼散 二四 此方能令胎瘦產易○湖陽公主每產累日不下南山道人進此方

粉草炒一兩 商州枳殼麩炒二兩

右為末每服一錢空心沸湯調日三服凡孕六七月宜服之○溫隱居方加當歸廣木香各等分○或加香附一兩亦可

枳殼散 二五 方在寒陣百一

治婦人血熱氣滯經候不調

千金鯉魚湯 二六 治妊娠腹脹胎中有水氣遍身浮腫小便不利或胎死腹中皆效

當歸 芍藥各一錢 白朮一錢 茯苓一錢半

橘紅五分 鯉魚一尾不拘大小

右作一服將鯉魚去鱗臟白水煮熟去魚用汁鍾半入葯加生薑五片煎一鍾空心服當見胎水下如水未盡胎死腹中脹悶未除再制一服水盡脹消乃已

竹葉湯 二七 治妊娠心驚膽怯煩悶不安名曰子煩○一方有當歸防風梔子仁

白茯苓 麥門冬 黄芩各三兩

右每服四錢竹葉五片水煎服○若因血虛煩熱宜兼用四物○若因中氣虛弱宜兼用四君

紫蘇飲 治妊娠失調胎氣不安上攻作痛名曰子懸或

臨產氣結不下等證

大腹皮 川芎 白芍藥 陳皮

蘇葉 當歸各一兩 人參 甘草各半兩

右每服一兩薑葱水煎服○一方有香附無人參○若肝脾氣血虛而有火不安宜兼逍遙散○若脾氣虛弱而不安宜用四君芎歸

安榮散 二九 治妊娠小便澀少遂成淋瀝名曰子淋甚妙

麥門冬 通草 滑石 當歸

燈心 甘草 人參 細辛等分

右水煎服○一方人參細辛加倍爲末每服二錢麥冬湯調
服○若因肺經鬱熱宜用黃芩清肺飲○若因脊梁肉味宜
用清胃散○若因肝經濕熱宜用加味逍遙散
天仙藤散二二　治妊娠三月之後足指發腫漸至腿膝飲食
不甘狀似水氣或腳指間出黃水名曰子氣
天仙藤洗略炒　香附炒　陳皮　甘草
烏藥等分
右每服五錢加生薑木瓜各三片紫蘇三葉水煎食前日
進三服○若因脾胃虛弱宜兼六君子○中氣下陷須用補

中益氣湯
羚羊角散二三　治妊娠中風頭項強直筋脈攣急言語蹇澀
痰涎不利不省人事名曰子癇
羚羊角鎊　川獨活　棗仁　五加皮
薏苡仁炒　防風　當歸　川芎
茯神　杏仁去皮尖各五分　炙甘草　木香各一分
右加薑五片水煎服○若因肝經風熱或怒火所致須用加
味逍遙散
人參橘皮湯二一　治妊娠脾胃虛弱氣滯惡阻嘔吐痰水飲

食少進益胃和中○一名參橘散
人參　陳皮　麥門冬　白朮各一錢
厚朴制　白茯苓各五分　炙甘草三分
右加炙竹茹一塊薑水煎溫服○若因中脘停痰宜用二陳
枳殼○若因飲食停滯宜用六君加枳殼○若因脾胃虛宜
用異功散
竹茹湯二二　治孕婦嘔吐不止惡心少食服此止嘔清痰
竹茹彈子大一丸　陳皮　半夏　茯苓各錢半
生薑二錢

水鍾半粳米一撮煎七分溫服忌羊肉雞魚麵食
半夏茯苓湯二四　治妊娠脾胃虛弱飲食不化嘔吐不止
半夏泡炒黃　陳皮　砂仁炒各一錢　白茯苓二錢
甘草炒五分
右用薑棗烏梅水煎服一二劑後用茯苓丸在二九
烏附湯二五　治孕婦惡心阻食養胃調和元氣
烏藥　香附制　白朮土炒　陳皮各一錢
人參　炙甘草各八分
水鍾半薑三片煎七分服○吐甚者加丁香砂仁各七粒

千金保孕丸 三十六 治妊婦腰背痛善於小産服此可免墮胎之患○此即良方杜仲丸但彼等分用

杜仲 四兩同糯米炒去絲 川續斷 二兩酒洗

右爲末山藥糊丸桐子大每服八九十丸空心米飲下忌酒醋惱怒

一母丸 三十七 一名知母丸○治妊娠血熱頓仆胎動不安或欲墮産

知母 炒爲末

右搗棗肉爲丸彈子大每服一丸人參湯嚼送或丸桐子大

每服三四十丸白湯下或嚼嚥之

束胎丸 三十八 懷胎七八個月恐胎氣展大難産用此扶母氣束兒胎易産然必胎氣強盛者乃可服

條黃芩 酒炒勿太熟冬月一兩夏月半兩 白朮 三兩 陳皮 二兩

白茯苓 七錢半

右爲末粥糊丸桐子大每服五十丸白湯下

茯苓丸 三十九 治妊娠煩悶頭暈聞食吐逆或胸腹痞悶

赤茯苓 人參 桂心 乾薑 炮

半夏 泡洗炒黃 橘紅 各一兩 白朮 炒 甘草 炒

枳殼 麩炒各二兩

右爲末蜜丸桐子大每服五十丸米飲下日三服○右原方仍有葛根二兩似非所宜也用者當酌之

達生散 四十 妊娠臨月服十餘劑則易産或加砂仁枳殼如兼別證以意增減○詩云誕彌厥月先生如達註曰先生首生也達小羊也羊子易生故以此名之

人參 白朮 當歸 白芍

陳皮 紫蘇 各一錢 炙甘草 二錢 大腹皮 酒洗晒乾 二錢

水一鍾半煎服○一方無當歸白芍白朮

佛手散 四十一 一名芎歸湯亦名當歸湯○治産後去血過多煩暈不省并一切胎氣不安亦下死胎

川芎 二錢 當歸 三五錢

右㕮咀每用半兩水煎服○若腹疼加桂○若腹痛自汗頭眩少氣加羊肉若不應用八珍湯○若用下胎當爲末以酒調服

錢氏生化湯 四十二 此錢氏世傳治婦人者

當歸 五錢 川芎 二錢 甘草 炙五分 焦薑 三分

桃仁 十粒去皮尖雙仁 熟地 三錢

右㕮咀水二鍾棗二枚煎八分溫服○一方無熟地　附加減法○凡胎衣不下或血冷氣閉血枯氣弱等證連服生化湯二三劑即下或用此送益母丸一丸即下益母草行血養血性善走而不傷人者也○一凡婦人無論胎前產後皆宜此藥○一凡血暈虛暈加荆芥穗六七分○一凡產婦氣虛氣脫倦怠無力加人參黃芪○一凡陽虛厥逆加附子肉桂○一脈虛煩渴加麥冬五味○一氣壅有痰加陳皮竹瀝○一血虛血燥便結加麻仁杏仁蓯蓉○一多汗不眠加茯神棗仁黃芪上體多汗加麻黃根下體多汗加漢防已○一煩熱加丹皮地骨皮○一口噤如風反張痰凝者加荆芥防風各二四分○一惡露未盡身發寒熱頭痛脇脹其小腹必然脹痛加紅花丹皮肉桂各三四分玄胡一錢○一內傷飲食加山查陳皮砂仁或神曲麥芽○一外傷寒濕或加蒼术白术○一血積食積胃有燥糞臍腹脹痛加大黃一錢○一產後下血不止或如屋漏水沉黑不紅或斷或來或如水或有塊淋瀝不休此氣血大虛之候不可誤用寒涼其脉浮脫者可加附子此諸陽分藥否則無救矣○佛手散單用當歸二錢川芎一錢此即其變方也

會稽錢氏世傳曰嘗論產證本爲血虛陰亡陽孤氣亦俱病如大補則氣血陡生倘失調則諸邪易襲四物避芍藥之寒四物得薑桃之妙氣毋耗散法兼補虛食必扶脾勿專消導熱不可用芩連恐致宿穢凝滯寒不宜用桂附反招新血流崩三陽見表證之多似可汗也用麻黃則重竭其陽三陰見裏證之劇似可下也用承氣則大涸其血耳聾脇痛乃腎虛惡露之停休用柴胡譫語汗多乃元弱似邪之證毋同胃實厥由陽氣之衰難分寒熱非大補不能回陽痙由陰血之虧豈論剛柔非滋營胡以潤絡潮熱似瘧以瘧治則遷延神亂

如邪以邪論則立困總屬大虛須從峻補去血多而大便燥蓯蓉加於生化非潤腸和氣之能通患汗出而小便難六君倍用參芪必生津助液之可利加參生化頻服救產後之危活命長生調攝須產前加意

當歸川芎湯四三　治小產後瘀血心腹疼痛或發熱惡寒

當歸　熟地黃　白芍藥炒　玄胡索炒
川芎　桃仁　紅花　香附
青皮炒　澤蘭　牡丹皮

右水煎入童便酒各小半○若以手按腹愈痛此是瘀血爲

思宜用此藥或失笑散消之○若按之反不痛此是血虛宜用四物參苓白术○若痛而作嘔此是胃虛宜用六君子○若或作瀉此是脾虛宜用六君子送二神丸

加味芎歸湯 四四 治分娩交骨不開或五七日不下垂死者

生男女婦人髮 一握燒存性 自死龜殼 一個或占過者亦可酥炙

川芎 當歸 各一兩

右爲每用一兩水煎服良久不問生死胎自下

當歸黃芪湯 四五 方在補陣九八

治妊娠下痢腹痛

芎歸補中湯 四六 治氣血虛半產

川芎 當歸 黃芪 炙 白术 炒

人參 芍藥 炒 杜仲 炒 艾葉

阿膠 炒 五味子 杵炒各一錢 甘草 炙五分

右每服五錢水煎服○若脾氣虛弱須用補中益氣湯○若氣虛有火宜用安胎飲

保生無憂散 四七 臨產服之補其血順其氣以胞胎肥厚根蒂堅牢者皆可使之易產又治小產瘀血腹痛

當歸 川芎 白芍 乳香

枳殼 南木香 血餘

右等分每服二三錢水煎日二服○若胞衣既破其血已涸或元氣困憊急用八珍湯斤許水數碗煎熟時飲救之飲盡再制亦有得生

人參黃芪湯 四八 治小產氣虛血下不止

人參 黃芪 炒 當歸 白术 炒

白芍 炒 艾葉 各一錢 阿膠 炒二錢

右作一劑水煎服

良方牛膝散 四九 治胎衣不下腹中脹痛急服此藥腐化而下

緩則不久

牛膝 川芎 朴硝 蒲黃 各二兩

當歸 兩半 桂心 半兩

右每服五錢薑三片加生地黃一錢水煎服

局方黑神散 五十 一名烏金散 華佗方名肉桂散○治產後惡露不盡胎衣不下血氣攻心腹痛不止及治腎陰虛血不守舍吐衄等證

黑豆 二兩炒 當歸 去蘆酒洗 熟地 蒲黃

白芍 甘草 炙 乾薑 炮 肉桂 各一兩

右為末每服二錢童便酒各半盞服○良方黑神散有炮附
子半兩無蒲黃
簡易 黑神散五一 方在和陣二一
治一切失血
經驗滑石散五二 治產難凡水下胎乾胎滯不生用此最效
滑石一兩 白蜜 香油各半盞
右將油蜜慢火熬熟二三四沸掠去沫調滑石末頃服外以油
調於產婦臍腹上下摩之立效
難產方五三

令產婦以自己髮稍含於口中惡心即下亦治胎衣不下
良方 桂心散五四 治妊娠因病胎不能安者可下之
桂心 瓜蔞 牛膝 瞿麥各五分或一錢
當歸錢氏一錢
右水煎
桂香散五五 治胎死腹中不下
桂心三錢 麝香五分
右為末作一服酒調下
下胎小品方五六

用麥糵一升搗碎水二升煮一升服之即下神效○按麥糵
能損氣破血如此故凡脾胃虛弱及飲食不化者不宜用明
矣○又方用牛膝一兩酒一鍾煎七分作一服即下
崔氏 下胎方五七 并下死胎俱效
天花粉四兩 肉桂 牛膝 豆豉各二兩
右㕮咀用水七碗煎二碗半分三服每服後一時許又進一服
扶羸小品方五八 虛弱人欲下胎宜用此
人參 粉草 川芎 肉桂
乾薑 桃仁 黃芩 蟹爪

右等分每服一兩水二鍾煎八分空心服未動再服
下死胎五九 凡胎死腹中其舌多見青黑口中甚穢而喘脹
中不動極覺陰冷重墜者是
用平胃散一兩以黃酒河水各一鍾煎至一鍾入朴硝二
五錢再煎三五沸溫服其死胎即化水而出萬不失一○
又方單用朴硝末二三錢以熱酒和熱童便調服立出或用
佛手散以酒調服亦妙
千金 去胎方六十
大麴五升

漬酒一斗煮二三沸去滓分五服隔宿勿食旦再服其胎如
糜母無所苦千金不傳
良方 硫黃散六十二 治產後陽氣虛寒玉門不閉
硫黃　烏賊骨　五味子
右為末摻患處日三易
硫黃湯六十三 治產後玉門不歛陰戸突出
硫黃二錢　兔絲子　吳茱萸各一錢　蛇床子一錢半
右研勻用水一鍾煎湯頻洗自收
良方 益母丸六十四 一名返魂丹○治婦人赤白帶惡露時下不
止及治婦人胎前產後經中諸般奇病無所不療本草云此
草胎前無滯產後無虛故名益母
益母草一斤 名充蔚子一名野天麻方梗對節生葉
葉類火麻四五月間開紫花是白花者非
右於五月採取晒乾連根莖葉勿犯鐵器磨為細末煉蜜丸
如彈子大每服一丸用熱酒和童便化下或隨證用湯引送
下○一方以此為末每服二錢或酒或童便或隨證用引服
之○一方凡產時倉卒未合只用生益母草搗汁入蜜少許
服之其效甚大○益母膏方依前採取搗爛以布濾取濃

汁用砂鍋文武火熬成膏如黑砂糖色為度入磁罐收貯每
服二三匙酒便調下或於合宜湯藥中加一匙服之尤妙
良方 奪命丹六十五 治瘀血入胞脹滿難下急服此藥血即消衣
自下○按此方頗有迴生丹之功用下死胎必效須用當歸
方
附子炮去皮臍 乾漆碎之炒烟盡 牡丹皮各一兩
右為細末另用大黃末一兩以好醋一升同熬成膏和前藥
丸梧子大溫酒吞五七丸○一方有當歸一兩
迴生丹六十六 治婦人產後諸疾污穢未淨及一切實邪疼痛
死胎瘀血衝逆等證
大黃膏法 用蒼朮二兩河水五碗煎至二三碗去柤聽用
紅花三兩炒黃色用好酒一大壺煮十餘滾去柤聽用
黑豆三升煮熟存汁三碗去豆去皮晒乾為末但聽用
大黃一斤為末用好醋入碗熬成膏次下紅花酒蒼朮湯
黑豆汁攪勻又熬成膏從內取盛候用將鍋焦焙乾為末
同豆皮末俱入之
人參　白朮　青皮　木瓜各一錢
當歸　川芎　元胡　蒼朮

香附童便炒 蒲黃 赤茯苓 桃仁泥
熟地各一兩 牛膝 三稜 山茱萸
五靈脂 地榆 甘草 羌活
陳皮 白芍各五錢 良薑四錢 烏藥二兩半
木香 乳香 沒藥各一錢
右為末用前大黃膏為丸彈子大金箔為衣不拘時隨證擇
用湯引送下一九

斷產灸法 六七 一傳方欲絕產者灸臍下二寸三分陰動脈
中三壯 此當自臍中至骨際拆作五寸約之

千金 斷產方 又六七
四物湯一劑 芸薹子一撮即油菜子 紅花
水鍾半煎八分經後空心服則不受胎

斷產小品方 六八 斷產墮胎有驗
故蠶退紙方一尺
右燒為末空心酒調服終身不受孕

丹溪 斷子法 六九
用白麪麴一升無灰酒五升作糊煮至二升半濾去滓分作
三服候經至前一日晚五更及天明各吃一服經即不一無不字
行終身無子矣

仲景 羊肉湯 七十 治產婦腹中疞痛虛痛自汗不足虛弱甚者
及寒月生產寒氣入於子門手不可犯臍下脹滿此產後之
寒疝也并治寒疝腹中痛及脇痛裏急者
精羊肉一斤 當歸三兩 生薑五兩
右用水八升煮取三升加葱椒鹽溫服七合日三服○若寒
多者加生薑成一斤○痛多而嘔者加橘皮二兩白朮一兩

良方 羊肉湯 七一 治產婦衝虛寒邪內乘以致腹痛或頭眩臍
脇肋痛

精羊肉四兩 當歸 川芎各半兩 生薑一兩
右以水十盞煎至四盞分四次空心服

良方 黃雌雞湯 七二 治產後虛羸腹痛
當歸 白朮炒 熟地黃 黃芪炒
桂心各半兩 小黃雌雞一隻去頭足腸翅細切
右先用水七碗煮雞至三碗每用汁一碗藥四錢煎日三服

母雞湯 七三 治產後蓐勞虛汗不止
人參 黃芪 白朮 白茯苓
麻黃根 牡蠣煆各三錢

右用母鷄一隻去毛雜用水六七碗同藥煮至二碗任意服之

豬腰湯七四　治產後蓐勞寒熱如瘧自汗無力欬嗽頭痛腹痛俱效

豬腰 一對　當歸　白芍藥 酒炒各一兩

右以藥二味用水三碗煎至二碗去滓將豬腰切如骰子塊同晚米一合香豉一錢如常煮稀粥空心日服一次神效○或加人參更妙

四神散七五　治產後血虛或瘀血腹痛

當歸 一錢　川芎　芍藥 炒各一錢　炮薑 五分

右水煎服

太嚴蜜湯七六　治產後陽氣虛寒心腹作痛不食嘔吐四肢厥逆

生地　當歸　芍藥 炒　乾薑

吳茱萸　桂心　獨活　甘草 炒

小草 各一兩　細辛 半兩

右每服半兩水煎服

良方 人參湯七七　治產後諸虛不足發熱盜汗內熱晡熱等證

○此即參歸湯亦名洞參散

人參　當歸 等分

右爲末先以豬腰子一枚切片糯米半合葱白二莖入水二碗煎八分再入藥二錢煎服

白茯苓散七八　治產後蓐勞頭目肢體疼痛寒熱如瘧

白茯苓 一兩　人參　當歸　黃芪

川芎　白芍藥 炒　熟地　桂心 各半兩

豬腰 一對

右以水三盞入豬腰并薑棗各一事煎二盞去粗入前藥半兩煎一盞服

良方 七珍散七九　治產後不語

人參　石菖蒲　生地　川芎 各一兩

細辛 七錢　防風　朱砂 另研各半兩

右爲末每服一錢薄荷湯調服

良方 趁痛散八十　治產後骨節疼痛發熱頭重四肢不舉

牛膝 酒炒　甘草 炒　薤白 各一兩　當歸

白朮 炒　黃芪 炒　桂心　獨活 加薑各半兩

右每服半兩水煎

補脬飲八一 治產後傷動脬破不能小便而淋瀝

生黃絲絹一尺剪碎 白牡丹皮根

白及各一錢俱爲末

用水一碗同煮至絹爛如餳空心頓服服時不得作聲作聲

則不效

止汗散八二 良方

牡蠣煅粉半兩 小麥麩八兩炒黃爲細末

右每服一二錢用豬肉汁調服

麻黃根湯八三 良方 治產後虛汗不止身熱發渴驚悸不安

麻黃根 人參 黃芪炒 當歸

牡蠣煅粉 甘草

右每服四五錢水煎服

二味參术飲八四 治產後瘀血入肺欬嗽喘急

人參一兩 蘇木二兩

右作一劑水煎服○若既愈當用六君子以補脾胃○若口

鼻黑氣起宜急用此藥加附子五錢亦有得生者

黃龍湯八五 良方 治妊婦寒熱頭疼嘿嘿不食脇痛嘔痰及產

後經後外感風寒熱入胞宮寒熱如瘧等證○按此即小柴

胡湯之去半夏也

柴胡二錢 黃芩炒 人參 甘草各一錢

右用水煎服

二母散八六 陳氏 治產後熱血上攻留於肺經欬嗽喘促

知母 貝母 人參 桃仁

杏仁俱去皮尖 白茯苓

右等分每服五錢薑水煎服

豬蹄湯八七 治氣血不足乳汁不下

用八物湯加黃芪漏蘆陳皮木通先以豬蹄煮汁二碗煎藥

服之○或加天花粉

又方 用豬蹄一副通草二兩川芎一兩甘草一錢川山甲

十四片炒將豬蹄洗切入水六碗同藥煎煮約至三碗加葱

鹽料取汁飲之忌冷物要喫羹湯助其氣血乳汁自下是

月不可失盜時用葱湯洗乳爲佳

涌泉散八八 良方 下乳忌食鹽椒辛辣飲食

王不留行 瞿麥 麥門冬 龍骨各二錢

右用豬蹄汁一碗酒一杯煎服以木梳於乳上梳下

玉露散 八九　治產後乳脈不行身体壯熱頭目昏痛大便澁滯

人參　白茯苓　當歸　炙甘草各五分

桔梗　川芎　白芷各一錢　芍藥七分

右水煎食後服〇如熱甚大便秘結加大黃三五分炒用

良方 漏蘆湯

治婦人肥盛歷氣壅結乳少

漏蘆二兩　蛇退一條　土瓜根

右共為末酒調下二錢

括蔞散 九一　治吹乳腫痛

括蔞一個　乳香二錢

右用酒煎服〇外用南星為末以温湯調塗

滑氏 補肝散 九二　治肝腎二經氣血虧損脇脹作痛或脇脹頭暈寒熱發熱或徧身作痛經候不調

熟地　白术炒各一兩　棗仁炒　獨活各四兩

當歸　川芎　黄芪炒　山葯

五味子炒杵　山茱萸肉　木瓜各半兩

右㕮咀每服五錢棗水煎服

金匱 膠艾湯 九三　治勞傷血氣衝任虛損月水過多淋瀝不止

阿膠炒　川芎　炙甘草各二兩　艾葉

當歸各兩半　白芍　熟地各二兩

右㕮咀每服五錢水煎服〇一方加地榆黄芪一名安胎散

集驗 加味八珍湯 九四　治婦人思慮過傷飲食日減氣血兩虛月經不調夜夢交感或出盜汗寢成勞損

人參　白术　茯苓　當歸

生地各一錢　炙甘草　川芎　芍藥

軟柴胡　黄芪各五分　香附制　丹皮各八分

水鍾半大棗一枚煎七分食前服

集驗 調衛養榮湯 九五　治婦人室女一切月經不調或先或後或絶閉不通憎寒壯熱口苦無味欬嗽躁煩頭眩潮熱勞怯者

當歸　生地　麥冬　沙參

陳皮　白术各一錢　牡丹皮　地骨皮各八分

柴胡稍　桔梗各五分　穀芽一錢　甘草四分

右加蓮子蓖棗水煎服〇痰中見血加側栢葉〇煩躁口乾加炒山梔倍麥門冬〇脇下脹疼加青皮川芎〇胸膈滿悶

加黃連薑炒枳實去麥冬地骨皮○夜出盜汗加黃連黃芪
去柴胡桔梗○大便秘結加桃仁倍當歸○欬嗽不已加瓜
蔞仁阿膠○小水不利加木通茯苓

良方 當歸散九六　治經水妄行不止及產後氣血虛弱惡露內
停憎寒發熱宜服此去之

當歸酒洗　川芎　白芍炒　白朮炒
黃芩炒各半兩　山茱萸肉一兩半

右爲末每服二錢酒調日三服○一方無山茱萸○氣虛者
去芩加桂心一兩

良方 丹參散九七　良方云丹參一味其治頗類四物湯能破宿血
補新血安生胎落死胎止崩中帶下調經下產後惡血兼治
冷熱勞腰脊痛骨節煩疼

丹參酒洗去土晾乾切

右爲細末每服二錢溫酒調下○經脈不調食前服○冷熱
勞不拘時服

玄胡當歸散九八　亦名延胡索散○治血積小腹疼痛或因氣
逆月經不行肚腹作痛

當歸　赤芍藥　劉寄奴　沒藥、

枳殼麩炒　玄胡索炒等分

右爲末每服一錢熱酒調下

牛膝散九九　治月水不利臍腹作痛或小腹引腰氣攻胸膈

當歸酒浸　牛膝酒炒　赤芍藥　桂心
桃仁去皮尖　玄胡索炒　牡丹皮各一兩　木香三錢

右爲末每服一錢溫酒調下或每服五七錢水煎服

良方 交加散百　治經脈不調腹中撮痛或結聚癥瘕產後中風
○又交加散方在和陣二五二

生地一斤取汁　生薑十二兩取汁

右以地黃汁炒薑粗渣汁炒地黃粗乾爲末每服三錢溫酒
調服○加芍藥玄胡當歸蒲黃桂心各一兩沒藥紅花各五
錢尤效

蒲黃散百一　治瘀血凝滯肚腹刺痛或腹脹發熱等證

蒲黃　當歸酒拌各二錢　蓬朮醋炒　紅花
桂心　川芎　玄胡索炒　丹皮各五分

右水酒各半煎服

琥珀散百二　治心膈迷悶肚腹撮痛月信不通等疾

烏藥二兩　當歸酒洗　蓬朮醋製各一兩

右為末每服二錢溫酒調服
溫經湯 百三 治寒氣客於血室以致血氣凝滯臍腹作痛其脈
沉緊
人參 牛膝酒炒 甘草炒各一錢 當歸
川芎 芍藥 牡丹皮 蓬朮醋炒
桂心各五分
右水煎服
經驗失笑散 百四 治婦人心痛氣刺不可忍及產後兒枕蓄血惡
血上攻疼痛并治小腸氣痛

五靈脂淨者 蒲黃等分俱炒
右為末每服二三錢用酒煎熱服○一方用好醋一杓熬成
膏再入水一鍾煎至七分熱服○一方用醋糊和丸龍眼大
每服一丸以童便和水各半鍾煎七分溫服○按此方若用
以止痛蒲黃宜減半若用止血則宜等分或靈脂減半亦可
澤蘭湯 百五 治勞傷經閉
澤蘭葉二錢 當歸 芍藥炒各一錢 甘草炙五分
用水煎服
當歸沒藥丸 百六 治血瘀作痛及血風筋攣骨痺手足麻木

疼痛
當歸 五靈脂炒各一兩 沒藥五錢
右為末醋糊丸桐子大每服三十丸薑湯下
艾附丸 百七 治久積虛冷月候不調腹中急痛赤白帶下渾
身寒熱胎氣多滯不固
香附米半斤醋煮焙乾為末
右以醋糊為丸桐子大每服三四十丸米飲下
柏子仁丸 百八 治血虛有火月經耗損漸至不通日漸羸瘦
而生潮熱慎勿以毒藥通之宜柏子仁丸或前澤蘭湯主之

柏子仁炒研 牛膝酒拌 卷柏各半兩 澤蘭葉
續斷各二兩 熟地黃三兩酒拌蒸爛研膏
右為末入地黃膏加煉蜜丸桐子大每服百餘丸空心米飲
下
烏賊魚骨丸 百九 此即內經治血枯方
烏賊魚骨去甲四兩 藘茹一兩即茜根
右為末以雀卵搗丸小豆大每服五丸或十丸鮑魚煎湯下
以飯壓之○鮑魚即今之淡乾魚也
增損四物湯 百十 治脾虛不攝血去不止

人參　當歸　芍藥炒　川芎
乾薑炒各一兩　甘草炙四錢
右每服四錢水煎服
奇效四物湯百十　治肝經虛熱血沸騰而崩久不止
當歸酒洗　熟地　白芍　川芎
阿膠炒　艾葉炒　黃芩
右每服四錢水煎
良方加減四物湯百十一　治婦人血積
當歸　川芎　芍藥　熟地
廣茂　三稜　肉桂　乾漆炒烟盡各等分

右㕮咀每服五七錢水鍾半煎七分食遠服
四物二連湯百十三　治婦人血虛發熱或口舌生瘡或晝安
夜熱
當歸　川芎　芍藥　熟地
胡黃連　宜黃連各一錢
右作一劑水煎服
人參當歸湯百十四　治去血過多內熱短氣頭痛悶亂骨節
作痛或虛煩咽燥

人參　當歸　生地　桂心
麥冬　白芍藥各等分
右用粳米一合竹葉十片水二鍾煎一鍾去米入藥五錢棗
一枚煎服或剉煎之亦可虛甚者加熟地黃
良方一味防風散百十五　治肝經有風以致血得風而流不歸
經者
用防風去蘆為末每服二錢白湯調服○一名獨聖散每服
二錢空心食前用酒煮白麪清飲調下極效
龍骨散百十六　治血崩不止
龍骨煅　當歸　香附炒各一兩　棕毛灰五錢

右為細末每服四錢空心米湯調下忌油膩雞魚炙煿物
如聖散百十七　治血崩二服全愈
棕櫚灰　烏梅肉　乾薑俱燒存性為末各等分
右每服二錢空心烏梅湯調服○一方單用棕皮半燒半生
為末每空心服二錢亦妙
槐榆散百十八　治血崩及腸風下血
槐花　地榆等分炒焦
右二味用酒煎飲之

七灰散 一一九 治血崩神效
蓮蓬殼 壁浆殼 騾蹄殼 益母草
旱蓮草 棕毛莢 藕節 各等分俱燒存性爲末
空心酒煎湯調下三錢〇一秘方用槐花子以銅鍋炒黑爲
末黄酒調下二三錢二兩次即止并治崩漏小產血不止
棕灰散 一二〇 方存和陣二一五
治大腸下血及崩漏失血
柏葉散 一二一 治元氣虚弱崩中漏血年久不愈亦治白帶
柏葉炒 當歸 生地 續斷

川芎 龜甲炙 禹餘糧各一兩半 阿膠炒五錢
鱉甲炙兩半 赤石脂煅 牡蠣煅 地榆
艾葉炒 鹿茸炙各五錢
右爲末每服二錢粥飲調下
子芩散 一二二 一名黄芩散〇治壯熱崩中下血是陽乘陰
分故經血泛溢宜清其化方
條黄芩不拘多少爲細末
右燒秤錘淬酒食前調下三四錢〇一方有乾薑白芷〇一
方以木耳黄芩等分爲丸俱效

良方防風黄芩丸 一二三 治肝經風熱以致血崩便血尿血等
證
條芩炒焦 防風等分
右爲末酒糊丸桐子大每服三五十丸食遠或食前米飲或
温酒送下
劫勞湯 一二四 治勞嗽發熱盜汗體瘦唾中有血或成肺痿
〇此救本也非劫勞也能用此者庶可望生此外恐非佳劑
矣
白芍藥炒一錢 人參 黄芪炒 當歸

熟地 甘草炙 白茯苓 五味子碎炒
阿膠炒 半夏制各五分 此上乃其原方倘有不足用者仍宜加倍
右加棗水煎日三服〇鄉人楊元鼎女及笄病此甚危百藥
無效偶遇名醫得此方服三十餘劑遂愈不發
驗歸神湯 一二五 治婦人夢交盜汗心神恍惚四肢乏力飲
食少進
人參 白术 白茯苓 歸身各一錢
棗仁 陳皮各八分 圓眼肉七枚 甘草
羚羊角 琥珀末各五分

右件羊琥珀一味不煎餘藥煎湯去粗入二末和勻食前服

白芷散 一一六 治下元虛冷赤白帶下或經行不止等證

白芷一兩 海螵蛸二枚煆 胎髮一團煆

右爲末每服二錢溫酒調下

簡易白芍藥散 一一七 治婦人赤白帶下臍腹疼痛如神

白芍二兩炒 乾薑半兩炒

右爲細末每服二錢空心溫米湯調下晚又進一服十日見效

克應丸 一一八 治婦人赤白帶下

熟地 赤芍各二兩 當歸二兩 赤石脂煆醋淬

龍骨 牡蠣煆醋淬 茯苓 丹皮

艾葉製 川芎各一兩

右爲末醋糊丸桐子大每服五十丸空心白湯送下

良方 滑石散 一一九 治熱淋

滑石五分研 通草 車前子 葵子各四分

右爲末以漿水調服

芍藥散 一二十 治婦人血滯腰脇痛

白芍藥 玄胡炒 肉桂各一兩 香附米二兩醋一升鹽半兩

同煮乾

右爲細末每服二錢不拘時白湯調下

良方 通氣散 一二一 治腎虛腰痛神效

破故紙酒炒爲末

右每服二錢先嚼胡桃肉半箇空心以溫酒送下

四製香附丸 一二二 調經養血順氣受孕

香附米一斤分四製酒醋鹽童便米泔各浸一宿焙乾用 當歸酒洗

熟地酒洗 白芍藥 川芎各四兩 澤蘭葉

白朮 陳皮各三兩 黃蘗酒炒 甘草酒炒各一兩

右爲末酒糊丸桐子大每服七十丸空心白湯送下

婦人 女金丹 一二三 此韓飛霞方也一名不換金丹○內加熟地黃一兩即名勝金丹○治婦人久虛無子及產前產後一切病患此藥能安胎催生妊娠臨月服五七丸產時無痛婦人子宮寒冷無孕如服月餘男女自至又治下子不遂帶濁血崩及產後腹痛吐逆子死腹中氣滿煩悶脊痛作痛月水不通中風口噤痢疾消渴敗血上衝咳嗽寒熱血淋血泄見鬼迷悶產後傷寒虛煩勞瘦凡婦人諸疾不問久近並宜服之兼治男子下虛無力等證

人參　白朮炒　茯苓　炙甘草
當歸　川芎　白芍　白薇酒洗
丹皮　白芷　藁本　肉桂
玄胡　沒藥另研　赤石脂另研各一兩
香附醋浸三日炒十五兩

右共十八味為末，煉蜜丸彈子大，以磁瓶收貯封固，每服一丸，空心溫酒化下，食乾物壓之，服至四十九丸為一劑，以癸水調平受妊為度。妊中三五日服一丸，產後二三日服一丸，醋湯下亦妙。

琥珀丸 一二四　治婦人或老或少，或產前產後百病，及療三十六種諸病，七疝八瘕，心腹刺痛，卒中癱瘓，半身不遂，八風十二痺，手足痠疼，乳中結核，結毒，懷胎驚動，傷犯不安，死胎不下，並治。

琥珀　硃砂各另研　沉香　阿膠炒珠
附子制　川芎　肉桂　五味子
石斛各五錢　牛膝酒浸　當歸　肉蓯蓉酒洗焙
人參　熟地　續斷　木香
沒藥各一兩

一方有牛黃　珍珠　乳香　玄胡索各一兩，共二十一味。

右煉蜜為丸，彈子大，每服一丸，空心食前午後溫酒化開服。○凡服法，或薑湯，或米湯，或酒，或燈草湯，或附子湯，用引皆可下。若傷寒中風角弓反張，用麻黃湯發汗，溫酒引送下。○孕婦臨月宜一日一服，至產順利，不覺疼痛。○凡婦人服至五服十服之後，日倍飲食，其功有不盡述，服者當自覺也。

延年益嗣丹 一二五　滋補元氣，益精黑髮。○按此方即還元丹也，但製法分兩不同，宜參酌用之，方在補陣一三九。

人參　天門冬酒浸去心　麥門冬同上各三兩　熟地黃酒蒸搗
生地黃各二兩　白茯苓酒浸曬乾　地骨皮酒浸各五兩　何首烏鮮者半斤

右將何首烏去皮，切片如棋子，用米泔水浸軟，竹刀切，外用砂鍋入黑羊肉一斤、黑豆三合，量著水，上用篾篩，篩上放首烏，煮而蒸之，以肉爛為度，鍋蓋須密，勿令泄氣，取起曬乾為末，煉蜜丸梧子大，每服七八十丸，空心溫酒送下。

續嗣降生丹 一二六　治婦人五臟虛損，子宮冷憊，不能成孕。○并治男子精寒不固，陽事衰弱，白濁夢泄，婦人帶下寒熱，諸虛百損，盜汗短氣，無不感應。○此方乃還陽居士求嗣保生篇所載，云東京焦員外三世無嗣，後遇一神僧，憫其故曰

無嗣者有之一祖宗積德自身無德行二夫妻年命恐犯禁忌
三精血不守交合無度焦公曰治之有道乎曰有先修德後
修身三年之後到宮山令名童賜以方藥名種嗣降生丹依
方服之後不及一十年子孫數人皆貴顯○此方無怪誕燥
伐之品且溫且固凡血海虛寒者服之必能但溫力有餘補
力不足倘益以人參白朮熟地川芎炙甘草各一兩則八珍
全而溫補資育之功當非淺也因命名曰加味種嗣降生丹
當歸酒洗　杜仲酒炒　茯神　益智仁
龍骨煅　桂心　吳茱萸制　乾薑半生半熟

全書卷六十一　古方　婦人

川椒去目　白烏藥各酒　白芍藥酒炒　川牛膝酒洗
半夏制　防風　秦艽　石菖蒲去毛
北細辛　桔梗各五錢　附子一枚重一兩者酵下作一竅入朱砂一錢溼麪裹煨熟取出朱砂留為衣
牡蠣大片者以童便浸四十九日每五日一換取出用硫黃一兩研末酒和塗之用皮紙糊實米醋浸濕外以鹽泥厚固之候乾用炭火煅通紅為末每料止用二兩餘可收貯再用
右為末以酒煮糯米糊為丸梧子大以前朱砂為衣每服三
五十丸漸至七八十九丸空心滾白湯或鹽湯溫酒下
河車種玉丸
紫河車一具　只要母氣壯盛厚大新鮮者但去胞內瘀
血不必挑去筋紅血脈以米泔水洗淨用布絞乾石臼
內生杵如糊用山藥末四五兩收乾捻為薄餅八九個
於砂鍋內焙乾以香如肉脯為妙
大熟地酒洗烘乾八兩　枸杞五兩烘乾　白茯苓人乳拌曬二次　歸身酒洗
人參　兔絲制　阿膠蛤粉炒各四兩　丹皮酒洗
白薇酒洗各二兩　沉香一兩　桂心　山茱萸
香附米用酒醋水三件各半碗浸三日曬十晝烘各二兩　大川芎酒浸切片曬乾二兩
右煉蜜和丸梧子大每服百餘丸空心或酒或白湯鹽湯任
下○如帶濁多者加赤白石脂各二兩須以清米泔飛過用

全書卷六十一　古方　婦人

○服藥後忌生蘿卜生藕葱蒜綠豆粉之類
八珍益母丸一二八　治血氣兩虛脾胃並弱飲食少思四肢
無力月經不調或腰痠腹脹或斷或續赤白帶下身作寒熱
閒不獲效服一月之後即可受胎虛甚者用藥一斤必能受
子
人參　白朮土炒　茯苓　川芎各一兩
當歸酒洗　熟地酒洗各二兩　炙甘草五錢　芍藥醋炒一兩
益母草四兩五六月採取止用上半截帶葉者不見鐵器磨為末
右為末煉蜜丸彈子大空心蜜湯或酒下一丸或為小丸亦

可○脾胃虛實多滯者加砂仁一兩薑汁炒○腹中脹悶者
加山查肉一兩俊上蒸熟○多鬱者加香附一兩酒製○此
徐思鶴醫統方又一方名八珍益母十全丸於前方内用益
母草八兩外加沉香四錢○思鶴曰資益坤元補養氣血除
淋帶壯形體胎前和氣産後補虛實婦人之聖劑超古今之
神方有室家者不可不知也予哂斯世之醫惟集古方香附
勝金丹爲女人開鬱調經之要藥殊不審古今虛實之異古
人氣實故可用香附開導香附味辛性燥但能開破而已多
用之大耗氣血虛者愈虛病者愈甚而於滋補何有哉今世

十婦九虛非補不可再用香附以耗之寢成怯弱之證是辨
之不早則危殆而難産矣○婦人經脈不調或氣血兩虛而
身體素弱者宜服此以調養之○經不通者服一料即通不
調者一月即調○素不孕者服一月即孕○胎前常用一服
則胎固而安○産後用一服以童便酒化開調下則無壅滯
血運之侯○多服之補虛活血凡治産後諸病極穩○若急
欲取效以酒調化服

烏鷄丸一百二十九　治婦人羸弱血虛有熱經水不調崩漏帶下
骨蒸不能成胎等疾

烏骨白毛公雞一隻重二斤半許者閉殺之去毛𦚾外用
艾葉四兩青蒿四兩切碎納一半在鷄肚内以小酒罈
一個入鷄并所剩蒿艾用童便和水灌令没雞二寸許
煮絶乾取出去骨餘俱同搗如薄餅焙乾爲細末聽用
南香附一斤去毛淨分四分用米泔童便酒醋各浸一分春秋
一二日夏一日冬四日取出晒乾略炒

人參　熟地　當歸酒洗　生地
川芎　白芍各二兩　黄芪　白术
川牛膝　柴胡　知母　丹皮各一兩

鱉甲醋炙三兩　白茯苓二兩半　秦艽一兩半　黄連炒
地骨皮　貝母　玄胡索　乾薑炮焦各一兩
右俱爲末用酒醋各半煮糊爲丸桐子大每服五六十丸漸
加至百丸温酒米飲任下忌煎炒辛辣等物及莧菜

又烏雞丸一百四十
熟地　當歸　白术　山藥
山茱萸　棗肉　柿餅　蓮肉各四兩
黄芪蜜炙三兩　鹿角膠　狗脊　杜仲
枸杞　蓮鬚　香附　阿膠

川芎各二兩　烏葯一兩半

右葯製淨用烏骨雞一隻悶殺之乾去毛去雜連骨椎碎用酒醋各半同葯煮熟去骨焙乾共為末即將餘汁少入麪打糊為丸任意用引送下

滑氏烏雞丸　四一

人參　懷生　懷熟　青蒿子去梗

香附四制　鱉甲各三兩　白朮　棗仁肉

枸杞　麥冬　雲苓　地骨皮去骨

丹皮去骨　白芍各二兩　歸身二兩半　川芎

甘草各一兩

右先將諸藥備完聽用乃取絲毛烏骨白公雞一隻約重一斤許者撲倒去毛粃頭足腸雜不用將雞切作四塊先以鱉甲鋪銅鍋底次入雞約以免焦糊漸漸加童便約至斗許煮至極爛撈起晒乾為末將鱉甲去淨并雞骨俱以原汁醮炙至乾為末同前藥煉蜜為丸桐子大每空心用滾湯送下百餘丸

秘方烏雞煎丸　四二　治婦人百病血氣虛勞赤白帶下

人參　官桂　地骨皮各二兩　茯苓三兩

黃芪蜜炙　當歸各六兩　生地　熟地

香附各四兩

右將烏骨白雞一隻男用雌女用雄籠住將黃芪末和炒麪丸如芡實喂雞二七日將雞縊死乾撏去毛并腸雜令淨槌碎其骨入前藥於腹內縫密用酒醋各一瓶煮一宿取去骨焙乾為末用前汁打麪糊丸桐子大每服五六十丸空心鹽湯下

萬病丸　四三　治月經瘀閉臍腹作痛及產後癥瘕等病

乾漆炒烟出青白為度　牛膝酒洗焙各一兩

右為末生地黃汁一升用砂鍋慢火熬膏丸桐子大每服二十丸空心米飲下

以下通用方

四君子湯　四四　方在補陣一

治脾肺氣虛諸證

六君子湯　四五　方在補陣五

治脾胃虛弱嘔吐吞酸等證

五味異功散　四六　方在補陣四

治脾胃虛寒飲食少思等證

補中益氣湯 一四七 方在補陣三一
治勞倦傷脾外感不解寒熱瘧痢氣虛不能補血等證
四物湯 一四八 方在補陣八
治一切血虛勞弱之病
八珍湯 一四九 方在補陣十九
治氣血兩虛調和陰陽
十全大補湯 百五十 方在補陣二十
治氣血俱虛補救元陽
歸脾湯 一五一 方在補陣三三

治心脾虛損
人參理中湯 一五二
溫中補脾胃虛寒諸證
逍遙散 一五三 方在補陣九三
治肝脾血虛鬱怒傷肝等證
加味逍遙散 一五四 方在補陣九四
治肝脾血虛發熱等證
七味白朮散 一五五 方在小兒七
治虛熱作渴

六味地黃丸 一五六 方在補陣一二一
壯水制火之劑
八味地黃丸 一五七 方在補陣一二二
治命門火衰之劑
四神丸 一五八 方在熱陣一五二
治脾腎虛寒泄瀉
五積散 一五九 方在散陣三九
治感冒寒邪
參蘇飲 百六十 方在散陣三四

治四時傷寒感冒
人參敗毒散 一六一 方在散陣三六
治四時傷寒瘟疫
當歸六黃湯 一六二 方在寒陣六五
治血熱陰虛盜汗
柴胡清肝散 一六三 方在寒陣五九
治肝膽風熱瘡瘍怒火寒熱
梔子清肝散 一六四 方在寒陣六十
治肝膽三焦風熱

八正散一六五　方在寒陣百十五
治臟府秘結小便赤澁
五苓散一六六　方在和陣一八二
治小便不利
犀角地黃湯一六七　方在寒陣七九
治心火動血及斑黃瘡疹
導赤散一六八　方在寒陣一二三
治心火及小腸熱秘淋澁
桃仁承氣湯一六九　方在攻陣五

治瘀血小腹作痛其人如狂
玉燭散百七十　方在攻陣二四
治血虛有滯經閉不通
腎著湯一七一　方在熱陣百三十
治腎虛身重腰冷
舒筋湯一七二　方在和陣七七
治產後血滯作痛
交加散一七三　方在和陣一五二
治產後口吐涎沫不省人事

加味小柴胡湯一七四　方在散陣二十
治乳母肝火發熱
[illegible]家蘇煎一七五　方在補陣六六
補虛調肺止欬嗽
柴胡石膏湯　方在散陣二三
治小陽陽明外感挾火發熱頭痛
都梁丸一七七　方在散陣七七
治胎前產後傷風頭痛
瓜子仁湯一七八　方在外科一六四

治產後瘀血腸癰腹中疼痛
了和通經散一七九　方在攻陣四六
治氣逆經閉
二神散百八十　方在寒陣八七
治吐血血崩下血
小薊飲子　方在寒陣百一
治下焦結熱溲血崩淋
[illegible]愈風湯　方在和陣二一七
治一切失血及產後搐搦

鎖精丸 一八三 方在固陣二六

治白濁白帶

青娥丸 一八四 方在補陣一四五

治腎虛腰痛

獨參湯 一八五 方在補陣三六

治諸氣虛脫

奪命散 一八六 方在補陣二七

治陽不傷氣暴脫煩燥發渴

全書卷之六十一終

會稽 張介賓 會卿著

瀛海 賈棠 青南訂

小兒

一 補脾湯 治小兒久病面黃肌瘦咬牙目劄頭髮稀少是病所致

人參 白朮各一錢 白芍藥酒炒 白茯苓各八分

川芎 陳皮各六分 炙甘草 黃芪蜜炙

當歸各四分

右每服二三錢薑水煎

調中湯 二 治傷乳食瀉後脾胃虛寒吐瀉

人參 茯苓 乾薑炒 藿香

白朮 甘草炙 木香 丁香

香附炒去毛 砂仁等分

右水煎食前服

調中丸 三 治脾胃虛寒吐瀉

人參 白朮炒 甘草炒各五錢 乾薑炮四錢

右爲末蜜丸菉豆大每服二三十丸白湯下○薛按云前二
方乃本經自病之藥即人參理中丸也若腎水侮土而虛寒
者當加半夏茯苓陳皮或嘔吐更加藿香泄瀉加木香
人參理中丸四 治中氣虛熱
人參 白术炒 炙甘草等分
右爲末薑汁糊丸菉豆大每服二三十丸白湯下
前方
觀音散五 治內傷嘔逆吐瀉不進飲食漸至羸瘦
人參一兩 神麴炒 茯苓 炙甘草
綿黃芪 白术炒 白扁豆炒 木香各一錢

石蓮肉去心錢半
右爲末每服一二錢入藿香三葉薑棗水煎服
助胃膏六 治脾胃虛寒吐瀉飲食不化等證
人參 白术炒 茯苓 甘草炙
丁香各五錢 山藥一兩炒 砂仁四十個 木香三錢
白豆蔻十四個 肉豆蔻煨四個 一方無木香名香砂助胃膏
右爲末蜜丸芡實大每服十丸米飲化下
錢氏七味白术散七 一名人參白术散○治虛熱而渴
人參 白术 白茯苓 炙甘草

藿香 木香各一錢 乾葛二錢
右爲末每服三錢水煎溫服如欲水多多服之爲妙○按此
方治小兒虛熱而渴如無氣滯吐瀉等證則當減去木香藿
香以避燥而耗氣
白术散八 方在和陣三十
治自汗盜汗極效
太和餅九
人參 白术 白茯苓各五錢 山藥炒四錢
木香 炙甘草各二錢 肉果煨一個 白豆蔻十四個

砂仁十四個 山查肉一兩 史君子肉六十個
煉蜜搗和爲小餅量兒大小與服○或再對證加減藥味用
之
團參散十 治心虛血熱自汗盜汗
人參 當歸等分
右爲末用豮猪心一個切三片每服二錢以猪心一片煎湯
調服或用水煎服亦可
止汗散十一 一名敗蒲散○治睡而自汗
故蒲扇燒存性

右為末每服一錢溫湯調下

調元散十二　治小兒元氣虛弱不乳吐乳多啼

人參　白朮　陳皮　厚朴制

香附各一錢　炙甘草　藿香各五分

右每服一二錢薑棗煎服

平和飲子十三　治小兒變蒸於三月後每二月進一服可免

百病白日內宜服

人參一錢半　白茯苓一錢　炙甘草五分　升麻二分

右㕮咀水半盞煎三分不時服○弱者加白朮一錢

調氣散十四　治變蒸吐瀉不乳多啼欲發慢驚

人參　陳皮　木香　藿香

香附　炙甘草各一錢

右為末每服一錢薑棗水煎服

錢氏當歸散十五　治夜啼不乳

人參　當歸　白芍藥各二錢半　炙甘草錢二分

桔梗　陳皮各一錢

右每服一二錢水煎灌之

撮要當歸散十六　治變蒸有寒無熱

當歸一錢　人參　炙甘草　木香

官桂各一錢

右每服一二錢薑棗水煎

人參黃連散十七　治心經蘊熱夜啼

人參錢半　黃連錢半炒　炙甘草五分　竹葉二十片

右薑水煎服

無擇燈花散十八　治心躁夜啼

燈花二三顆

右研細用燈草煎湯調塗口中乳汁送下日三服一法用燈

花塗乳上令兒吮之○如無燈花用燈草燒灰加辰砂少許

亦妙○一法用燈花七枚鷺砂一字辰砂少許蜜調塗唇上

立安

寶鑑天麻散十九　治小兒急慢驚風發熱抽搐痰涎壅盛或脾

土虛弱肝木乘侮吐瀉不食嗜臥困倦

半夏七錢　天麻二錢半　甘草炙　白茯苓

白朮各三錢

右為末每服一二錢薑棗湯調服

湯氏異功散二十　止渴消暑生津補脾胃

猪苓　澤瀉各二錢　人參　白朮
茯苓各五錢　陳皮二錢半　朱砂一錢
右爲末蜜丸芡實大每服一丸燈心竹葉湯化下

柴胡散　一　治變蒸骨熱心煩啼叫不已
人參　炙甘草　麥冬各二錢　龍膽草酒炒黑
防風各一錢　柴胡五分
右每服二三錢水煎

柴苓散　二　治壯熱來去
柴胡　赤茯苓　人參　麥冬
甘草各半兩　黃芩一兩
右每服二三錢入小麥二十粒青竹葉三片水煎服

惺惺散　三　治小兒傷寒時氣風熱頭痛目澀多睡痰壅欬嗽喘急或瘡疹已出未出疑似之間
人參　白朮炒　茯苓　甘草
北細辛　川芎　桔梗炒各等分
右爲末每服一錢入薄荷五葉水煎服〇一方有防風天花粉

星蘇散　四　治驚風口噤不語

南星略炮切
右每服五七分紫蘇五葉薑四片水煎入猪膽少許溫服

錢氏黃龍散　五　治發熱不退或往來寒熱
柴胡五錢　赤芍藥二錢　黃芩炒　甘草炙各二錢
右每服二三錢薑棗水煎

人參羌活散　六　治傷風發熱
人參　羌活　川芎　白茯苓
柴胡　前胡　獨活　桔梗
枳殼　地骨皮　天麻各等分　炙甘草減半
右用生薑薄荷水煎〇治驚熱加蟬蛻

牛黃散　七　治温熱壯熱或寒熱往來
牛黃研　甘草各半兩　柴胡　梔子酒炒
龍膽草酒炒　黃芩炒各二錢半
右爲末每服五七分以金銀薄荷湯調下

錢氏生犀散　八　治心經風熱
犀角鎊三錢　柴胡　葛根　赤芍藥
地骨皮各一兩　甘草五錢
右爲末每服一二錢水煎

二黃犀角散二九 治濕熱心神不安火腑秘結

犀角屑 大黃酒浸蒸 鈎藤鈎 梔子仁

甘草 黃芩等分

右為末每服五七分熱湯調下量兒加減

柴胡飲子三十 解肌熱蒸熱積熱或汗後餘熱脈洪實弦數

大便堅實者

柴胡 人參各五分 黃芩 芍藥各七分

當歸一錢 甘草四分 大黃八分

右每服一二錢水煎○按此方用藥頗善但大便如常者勿

得輕用大黃

地骨皮散三一 治虛熱壯熱

地骨皮 知母 人參 柴胡

茯苓 半夏 甘草等分

右薑水煎有驚熱加蟬退天麻黃芩

天麻定喘飲三二 治喘嗽驚風

天麻 防風 羌活 白朮

甘草炒 人參 桔梗 川芎

半夏麯等分

右每服二三錢水煎服

補肺散三三 一名阿膠散○治肺虛惡心喘急久患欬嗽有

痰

阿膠兩半炒 鼠粘子炒 馬兜鈴各半兩 杏仁七粒

糯米一兩 甘草三錢

右每服二三錢水煎服

錢氏阿膠散三四 治小兒肺病欬嗽喘急或欬而哽氣喉中有

聲

阿膠一兩蛤粉炒 鼠粘子炒香二錢半 炙甘草一錢 馬兜鈴半兩炒

杏仁七個去皮尖 糯米一兩

右每服一二錢水煎

丹溪保和丸三五 治飲食酒積停滯胸膈痞滿腹脹

神麯炒 陳皮 半夏 茯苓各一兩

山查肉蒸晒二兩 連翹 蘿蔔子炒各五錢

右為末粥丸綠豆大○一方尚有炒麥芽一兩黃連五錢

大安丸三六 治證同前

即前保和丸加白朮二兩

楊氏消食丸三七 治乳食過多胃氣不能消化

砂仁　陳皮　神麴炒　麥芽炒
三稜　蓬朮各半兩　香附炒一兩
右爲末麪糊丸麻子大白湯送下量兒加減
消乳丸三八　治嘔吐消乳食脈沉者傷食不化也
香附炒　砂仁　陳皮　神麴炒
炙甘草　麥芽炒等分
右爲末米糊丸黍米大每服二十丸薑湯下
白餅子三九　治傷食腹中有癖嘔吐肚疼先用此藥一服推
下食積然後調治不可服冷藥

滑石　輕粉　半夏湯泡焙　南星各一錢
巴豆二十四粒去皮膜用水一升煮乾研爛
右爲末糯米飯丸綠豆大捻作餅每服二三餅煎葱白湯或
紫蘇湯下忌熱物量兒加減
薛曰凡用此方及利驚丸紫霜丸三味牛黃丸褊銀丸之類
乃斬關奪門起死回生之重劑也必審形病俱實方可施之
恐至失手會在友掌經云邪之所湊其氣必虛留而不去其
病乃實故病氣實而形氣則虛也東垣先生云形病俱實
者皆瀉不當補形病俱虛者當補不當瀉治者審焉

宣風散四十　治濕痰去積滯通秘結攻黑陷裏實以代百祥
丸牛李膏
檳榔二个　陳皮　甘草各五錢　牽牛四兩半生半炒取頭末一兩
右爲末每一錢量大小增減與服白湯調下○一方有大黃
木香連前三味前成後加牽牛末調服
人參養胃湯四一　治外感風寒内傷生冷寒熱如瘧或嘔逆
惡心
人參　厚朴薑制　蒼朮炒　半夏制
草果仁　藿香　茯苓各五錢　橘紅二錢半

炙甘草二錢
右每服二三錢薑三片烏梅一個水煎
人參安胃散四二　治脾胃虛弱傷熱乳食嘔吐瀉痢
人參一錢　黃芪二錢　生甘草　炙甘草各五分
白芍藥酒炒七分　白茯苓四分　陳皮三分　黃連炒二分
右每服二三錢水煎
生附四君湯四三　治吐瀉不思乳食凡虛冷病宜先與數服
以正胃氣

人參　白术　茯苓　炙甘草
附子　木香　橘紅等分
右爲末每服一二錢薑棗水煎服
[illegible]　治胃虛吐瀉脈中吐舌搖頭咂乳額上汗流
[illegible]面黃令兒飢飲
人參　藿香　木香　沉香
陳皮　神麴炒　麥芽炒各等分　丁香
右每服四五錢薑十片紫蘇十葉棗三枚水煎每服半盞○
令母食後捏去舊乳方服卧少時却與兒飲按小兒不能飲

藥者凡用補瀉諸劑皆宜此法
銀白散 四五　治胃虛吐瀉
糯米炒一兩　扁豆蒸二兩　白术炒一兩　炙甘草二錢
丁香　藿香各二錢
右爲末紫蘇米飲調下○徧搐方加炮白附子全蝎木香石
蓮子薑术煎
朱君散 四六　治吐瀉後而爲驚爲瀉及糞青者
人參　白术　茯苓　炙甘草
鈎藤鈎　朱砂各一錢　麝香半分　燈心一團

右爲末每服一錢白湯調下
三順散 四七　治中暑霍亂吐瀉煩悶燥渴小便赤澀便血肚
疼
白术　炙甘草　茯苓　豬苓
澤瀉　乾薑炮　肉桂　杏仁去皮尖炒各等分
右爲末每服五七分不拘時水調下或用水煎服
香朴散 四八　治積冷嘔吐
藿香葉　厚朴薑汁炒　陳皮各七錢　半夏湯泡七次一兩
炙甘草一錢

右每服二錢薑棗水煎○瀉甚者加木香肉荳蔻
沉香散 四九　順胃氣止嘔吐
茯苓二錢　沉香　丁香　木香
藿香　厚朴　炙甘草各一錢
右爲末每服一字米飲湯調服
玉露散 五十　治傷熱吐瀉
石膏煅　寒水石各五錢　甘草一錢半
右爲末每服五分白湯調下
六神散 五一　治腸胃虛冷口出氣冷或泄瀉不乳腹痛曲腰

四肢厥冷

人參　白朮炒　山藥炒各五錢　炙甘草二錢

白茯苓　白扁豆炒各一兩

右爲末每服二三錢薑棗水煎

香橘餅五二　治傷冷積瀉

木香　青皮各一錢　陳皮二錢半　厚朴

神麯炒　麥芽炒各半兩

右爲末蜜和爲餅每服一枚米飲調下

錢氏黃芩湯五三　治挾熱下痢頭痛胸滿大渴或寒熱脇痛脉

洪大而實者

黃芩一兩半　芍藥　甘草炒各一兩

右每服一二錢薑水煎○如嘔加半夏二錢

澁腸散五四　治小兒久痢腸頭脫出

訶子炮　赤石脂　龍骨各等分

右爲末臘茶少許和藥摻腸頭上絹帛揉入

破故紙散五五　治膀胱虛冷夜間遺尿或小水不禁

破故紙炒

右爲末每服一錢熱湯調下

陳氏肉豆蔻丸五六　治瀉痢水穀或淡黃或白不能止者

肉豆蔻　訶子肉　白龍骨各半兩　木香

砂仁各二錢　赤石脂　枯白礬各七錢半

右爲細末麪糊爲丸黍米大周歲兒每服二五十丸三歲兒服百丸溫米飲下瀉甚者煎木香散或異功散送下不止多服○薛按前方治陽氣虛寒腸滑之澁劑益腎之大便若因腎氣不固而致前證者宜用木香散送四神丸如不應急前六君子湯送四神丸補之益豆蔻丸澁滯之功多補益之功少也

寧神湯五七　治心虛火盛熱躁驚搐等證

人參　當歸身　生地　麥冬各一錢

山梔仁　黃連炒　炙甘草各一錢　石菖蒲二分

辰砂入二分

右加燈心半錢水一盞煎七分調辰砂攪勻食後溫服

當歸養心湯五八　治心虛驚悸

歸身　麥冬　生地酒洗　人參

炙甘草　升麻少用

水一鍾半加燈草一團煎七分食遠服

養心湯 五九 治心血虛怯驚惕或驚悸怔忡盜汗無寐發熱煩躁

人參 黃芪 遠志 當歸

川芎 棗仁 五味子 栢子仁

肉桂 白茯苓 茯神 半夏麴各二錢

炙甘草四錢

右每服二三錢薑棗水煎

茯神湯 六十 治膽氣虛寒頭痛目眩心神恐懼或是驚癇

人參 黃芪炒 棗仁炒 熟地

白芍炒 栢子仁炒 五味子炒 茯神各一兩

桂心 甘草炒各五錢

右每服二三錢水煎

清神湯 六一 治驚癇心虛血熱

犀角鎊屑 遠志薑汁炒 白鮮皮 石菖蒲

人參 甘草等分

右為末每服五七分麥門冬煎湯調服

酸棗仁湯 六二 治心肺虛熱煩躁驚啼痘疹血熱血燥等證

棗仁 炙甘草 人參 生地

麥冬 當歸身 梔子仁等分

右加燈心水一盞煎六分溫服

黑附子湯 六三 治慢脾風四肢厥冷

附子三錢炒去皮 木香 人參各一錢半 白附子一錢

炙甘草五分

右為散每服二錢薑五片水煎○若手足既溫即止後服

鉤藤散 六四 治吐利脾胃氣虛慢驚生風

鉤藤鉤 人參 天麻 蝎尾去毒

防風 蟬殼各半兩 麻黃 殭蠶炒

炙甘草 川芎各二錢半 射香五分

右㕮咀每服二三錢水煎服○虛寒加附子一錢

薛按慢驚之症多屬脾胃虧損所致前方乃辛溫散表之藥而無調補之功須審用之

鉤藤飲子 六五 治小兒一切驚風潮搐目視昏迷

鈎藤鈎 防風 獨活 天竺黃

羌活各一錢 麻黃 升麻 甘草

[illegible]各二錢 川芎三錢 蟬退五个去頭足

右每服二三錢薑棗水煎服○薛立齋曰按右方若外感風寒形證俱實者宜用之若形氣虛而病氣實者宜用惺惺散如鈎藤麻黄若外邪少而形病俱虛者宜異功散

參鈎藤飲六六 治小兒臟寒夜啼陰極發躁

鈎藤鈎 茯神 茯苓 當歸

川芎 木香各一錢 甘草五分

右每服一錢薑棗水煎服○撮要方有芍藥一錢○若心經有熱臉紅便赤去木香加朱砂末一錢木通湯下

薛氏抑肝散六七 治肝經虛熱發搐或發熱咬牙或驚悸寒熱或木乘土而嘔吐痰涎腹脹少食睡臥不安

軟柴胡 甘草各五分 川芎八分 當歸

白朮炒 茯苓 鈎藤鈎各一錢

右水煎子母同服○以蜜丸名抑青丸

大青膏六八 治傷風痰熱發搐

天麻 青黛各一錢 白附子煨 烏蛇酒浸取肉焙

蝎尾各五分 天竺黄 麝香各一字

右為末生蜜丸豆大每用半粒薄荷湯化下

地黄清肺飲六九 治肺熱疳䘌穿孔或生瘜肉或鼻外生瘡

桑白皮炒半兩 柴胡 前胡 赤茯苓

防風 黄芩 當歸 天門冬

連翹 桔梗 生地 甘草炙各二錢

每服五七錢水煎服次用化䘌丸

甘草湯七十 治撮口

甘草生用一錢

右水煎以綿球蘸吮令出痰涎却以豬乳點入口中即瘥

秘旨安神丸七一 治心血虛而睡中驚悸或受驚嚇而作

人參 棗仁 茯神 半夏各一錢

當歸 芍藥炒 橘紅各七分 五味子五粒杵

炙甘草三分

右為末薑汁糊丸芡實大每服一丸生薑湯下

七味安神丸七二 治心經痰熱驚悸

黄連 當歸身 麥門冬 白茯苓

甘草各半兩 硃砂飛一兩 冰片二分半

右為末湯浸蒸餅和豬心血搗丸黍米大每服十丸燈心湯下

十味安神丸七三 治驚

人參　茯神　麥門冬　山藥各二錢
片腦一分　龍齒二錢　朱砂　甘草
寒水石各五分　金薄二片
右為末蜜丸雞豆大燈心湯調下　一方有馬牙硝
硃砂安神丸七四　方在寒陣一四二
清心火養血安神
錢氏安神丸七五　方在寒陣一四三
除火邪熱湯清心化痰
安神鎮驚丸七六　驚退後調理安心神養氣血和平預防之

劑也
天竺黃另研　人參　南星薑製　茯神各五錢
當歸　棗仁炒　麥冬　生地
芍藥炒各二錢　黃連薑汁炒　薄荷　木通
山梔炒　硃砂另研　牛黃另研　龍骨煅各二錢
青黛一錢另研
右為末蜜丸綠豆大每服二五丸量兒大小加減淡薑湯送
下
萬氏龍腦安神丸七七　治驚痰及痘中悸悶譫妄良方

大辰砂一錢飛　牛黃一分　龍腦半分
右研細末取豶豬心血小豬尾尖血和丸如綠豆大每服一
丸或二三丸新汲水化下或燈心湯紫草湯俱可下
鎮心丸七八　治急驚化痰鎮心
朱砂　龍齒　牛黃各一錢　鐵粉
人參　茯苓　防風　琥珀各二錢
全蝎七枚焙
右為末蜜丸桐子大每服一二丸薄荷湯送下
金箔鎮心丸七九　治風壅痰熱心神不寧驚悸煩渴唇焦頰

赤夜臥不安譫語狂妄
金箔十二貼為衣　朱砂一兩飛　人參　白茯苓
甘草各半兩　山藥一兩半　牙硝一錢半　麝香五分
片腦一分
右為末煉蜜丸每一錢作十丸以金箔為衣每服一丸薄荷
湯化下或含化亦可
辰砂膏八十　治眼閉口噤啼聲不出吮乳不得口吐白沫
辰砂三錢　硼砂　馬牙硝各一錢半　玄明粉
全蝎　真珠各一錢　麝香一分

右爲末每服一豆許煎驚薄荷湯下潮熱甘草湯下月內者用乳汁調塗乳頭令吮之

琥珀散八一　治急慢驚風涎潮昏冒驚搐目瞪內釣腹痛或驚癇斯發

琥珀　牛黃　膽星此當倍用　白附子
天麻　殭蠶炒去絲嘴　代赭石　全蝎
蟬退　乳香各一錢　朱砂一錢半

右爲末每服一三分白湯調下

千金龍膽湯八一　治月內臍風撮口四肢驚掣發熱吐乳及客件鬼氣驚癇加人參當歸

龍膽草炒黑　釣藤鉤　柴胡　黃芩炒
芍藥炒　桔梗　茯苓　甘草
大黃煨各二錢半　蜣螂二枚去翅足

右爲末每服一二錢水煎量兒加減

梅花飲八二　治五藏積熱喉中有痰面色赤白鼻流清涕氣逆喘急目赤欬嗽或因驚夜啼

硼砂　馬牙硝　芒硝　辰砂各一錢
人參一錢　甘草五分　片腦半分　射香一分

右爲末磁器收貯每服半匙麥冬湯調服或薄荷湯亦可

擦牙通關散八四　治風搐閉竅不通痰塞中脘留滯百節

南星一錢　射香一字　牙皂一錢燒存性　僵蚕一錢
赤脚蜈蚣一條

右爲末薑汁蘸藥少許擦牙或調服一二三匙涎自出

陳氏抱龍丸八五　治風痰壅盛或發熱欬嗽或發驚搐等證

膽星九製四兩　天竺黃一兩　雄黃　朱砂各五錢
射香五分另研或減半亦可

右爲細末用大甘草一斤煮極濃汁搗丸每兩作二十丸陰乾用薄荷湯或燈草湯下一二丸○此方加牛黃四錢即名牛黃抱龍丸加琥珀即名琥珀抱龍丸

至聖保命丹八六　治胎驚內釣肚腹緊硬啼叫不安乃急驚風眼目上視手足抽搐不省人事

全蝎十四個去毒　防風一二錢　炮南星　白附子
蟬脫　僵蚕去絲嘴炒　天麻　朱砂各一錢
射香五分　金箔

右爲末米糊和每兩作四十丸每服一丸白湯化下有熱者以南星易炮星○此方去天麻加琥珀捏成錠以薄荷湯磨

服即名保生錠子亦名太乙保生丹治慢驚尚有陽證者

定命丹 八七 治天釣撮口通利痰熱

全蝎 七枚 天麻 南星 炮 白附子 各二錢半

朱砂 青黛 各一錢半 輕粉 射香 各五分

片腦 一字

右為末米糊丸綠豆大每服一二丸荊芥薄荷湯下可先研半丸吹入鼻中

九還金液丹 八八 此藥有斡旋造化之功專治男婦痰盛氣急中風不語口眼歪斜左癱右瘓牙關緊急及小兒急驚風

手足抽搐不省人事痰多氣急等證功效不可盡述

胆星 九制者二兩 朱砂 飛一兩 生牛黃 五錢 殭蚕 五錢炒

牙皂 去皮絃炒三錢 冰 射 各五分

小麥麵炒熟煉蜜和勻搗丸芡實大金箔為衣黃蠟匱収藏

〇如大人牙關緊急先以通關散開其竅隨用淡薑湯化下一二丸〇若治小兒用薄荷湯化下一丸

膽星天竺丸 八九 治小兒痰涎上壅喘嗽不休

膽星 一兩 天竺黃 二錢 半夏 薑制 白附子 湯泡去皮臍各五錢

天麻 防風 各一錢 辰砂 一錢飛

右為末甘草湯為丸芡實大每服一丸空心薄荷湯或淡薑湯下

陳氏溫白丸 九十 驅風豁痰定驚

人參 防風 白附子 生用 真殭蚕 炒

全蝎 焙各一錢 南星 湯泡七次 天麻 各二錢

右用末水糊丸梧子大每服一五丸薑湯下

粉紅丸 九一 治小兒心虛因驚動痰涎不利或發熱痰嗽等證

天竺黃 五錢 天南星 朱砂 各一錢半 冰

胭脂 各一錢

右以牛膽汁和丸芡實大每服一丸砂糖湯下

錢氏牛黃丸 九二 治風癇因汗出風邪乘虛而入痰涎迷悶手足搐掣

牛膽南星 全蝎 焙 蟬脫 各二錢 防風

白附子 生用 天麻 殭蚕 炒各一錢半 射香 五字

右為末棗肉和丸加水銀半錢同研細丸綠豆大每服一二丸荊芥生薑湯下

衛生牛黃丸 九三 治小兒驚風中風五癇天吊客忤潮熱痰涎

蠻盛等證

白花蛇酒浸 白附子 川烏 全蝎

天麻 薄荷 雄黃各五錢 朱砂三錢

牛黃 射香各一錢 水片五分

右各另研爲極細末和勻用麻黃煎酒搗丸芡實大每服一丸薄荷湯下

萬氏牛黃清心丸九四 治心熱神昏

黃連生半兩 黃芩 山梔仁各三錢 鬱金二錢

辰砂一錢半 牛黃二分半

右爲細末臘雪調麪糊丸如黍米大每服七八丸燈心湯下

三味牛黃丸九五 治驚熱消疳積

雄黃水飛 牽牛各一錢 天竺黃二錢

右爲末麪糊丸粟米大每服五七丸薄荷水下

涼驚丸九六 治驚疳熱搐睛赤潮熱痰涎牙關緊急

龍膽草炒焦 防風 青黛各三錢 鈎藤鈎二錢

黃連炒五錢 龍腦一錢 牛黃 射香各一分

右爲末麪糊丸粟米大每服十丸煎金銀花湯下

利驚丸九七 治急驚

天竺黃二錢 輕粉 青黛各一錢 黑牽牛炒五錢

一方無天竺黃

右爲末煉蜜丸豌豆大每歲一丸薄荷水化下

錢氏抑青丸九八 治肝熱急驚搐搦

羌活 川芎 當歸 防風

龍膽草等分

右爲末煉蜜丸芡實大每服一二丸竹葉湯入砂糖化下○

此方於大黃梔子仁即名瀉青丸

化痰丸九九 治驚搐喉內痰響者暫用

膽星 半夏制 礞石制 枳實各二兩

射香三分

右爲末薑汁糊丸綠豆大朱砂爲衣薑湯研化量送

比金丸 治驚癇先用此藥

人參 遠志薑制取肉炒 白茯苓 南星

川芎 石菖蒲細蜜者 天麻 朱砂

青黛 琥珀各一錢 射香一字

右爲末蜜丸桐子大每服一二丸金銀薄荷湯下

虎睛丸百一 治驚癇邪氣入心

虎睛 細研　遠志 薑汁浸　犀角 鎊屑　石菖蒲
大黃 濕紙包煨　麥冬 等分　蟬蛻 去足翅炒三枚
右為末米糊丸梧子大每服一二丸竹葉煎湯或金銀薄荷湯下

五癇丸 百一　一名五色丸　治五癇
朱砂　真珠 各五錢　雄黃 一兩　水銀 二錢半
黑鉛 三兩同水銀熬成砂
右為末煉蜜丸麻子大每服三四丸煎金銀薄荷湯下

斷癇丹 百二　治五癇瘥後復發證候多端連綿不除者

黃芪 蜜炙　鉤藤鉤　細辛　炙甘草 各半兩
蛇蛻 二寸酒炙　蟬蛻 四個　牛黃 一錢另研
右為末煮棗肉丸麻子大煎人參湯下每服數丸量兒加減

消風丸 百四　治風癇先宜此藥
膽星 二錢　羌活　獨活　防風
天麻　人參　荊芥　川芎
細辛 各一錢
右為末蜜丸桐子大每服一丸薄荷紫蘇湯調化下

妙聖丹 百五　治食癇因驚而停食吐乳寒熱大便酸臭是也
赭石 煅醋淬二錢半　巴霜 三分　硃砂　雄黃
蝎梢 各一錢　輕粉　射香 各一字　杏仁 微炒一錢
右為末蒸棗肉丸梧子大每服一丸木賊草煎湯送下

硃銀丸 百六　治驚癇胸熱風涎壅盛腹脹喘促實滯者
巴豆　水銀 各五錢　京墨 八錢火燒醋淬　黑鉛 二錢半水銀煎
射香 五分另研
右為末陳米粥丸綠豆大每服二三丸煎薄荷湯下

薛氏紫河車丸 百七　治癲癇
紫河車 一具肥大者　人參　當歸 一兩酌用為末

右將河車生研爛入二藥為丸桐子大每服五七十丸日進三服人乳化下○按此方凡先天不足後天虧敗者俱可隨宜增用藥物照此制服無不可也然河車必用酒頭蒸熟方善蓋薛氏之意用其生氣但生者腥臊恐不利於胃故且此物既離本體尚何生氣之有亦不過取其應求之性味為血氣之資而已蓋人之血氣本皆熟物之所養成故飲食之類凡生用熟用其補瀉有甚相遠者豈熟之即無益而生之果無礙耶余故因熟之為宜

人參芪湯 百八　治小兒脾弱發熱作渴少食大便不調髮黃

脫落面黑鼻下生瘡能乳嚼土等證
蕪荑　山梔各五分　當歸　白朮
茯苓各四分　柴胡　麻黃　羌活各三分
防風　黃連　黃柏　炙甘草各二分
右作一劑水煎服
生熟地黃湯百九　治瘡眼閉合不開
生地黃　熟地黃各半兩　川芎　赤茯苓
枳殼　杏仁去皮　川黃連　半夏麯
天麻　地骨皮　炙甘草各二錢半
右每服二三錢黑豆十五粒薑水煎服
蘭香散百十　治鼻疳赤爛
蘭香葉燒灰二錢　銅青　輕粉各五分
右為末乾貼
四味肥兒丸百十一　治小兒食積五疳目生雲翳牙根腐爛
口舌生瘡發熱體瘦肚大筋青髮稀成穗或白禿瘡疥小便
澄白等證
蕪荑炒　神麯炒　麥芽炒　黃連各等分
右為末豬膽汁丸黍米大每服二三十丸木通煎湯下

六味肥兒丸百十二　消疳化虫退熱
黃連　陳皮　川楝子去核炒　神麯炒
麥蘗炒各一兩　白蕪荑半兩
右為末糊丸麻子大每服一二十丸空心米飲吞下
薛氏曰前方又治脾疳飲食少思肌肉消瘦肚大頸細髮稀
成穗項間結核發熱作渴大便酸臭嗜食泥土或口鼻頭瘡
肚見青筋嚙齒便白五疳用此丸加乾蟾一兩尤妙
七味肥兒丸百十三　治小兒食積五疳頸項結核髮稀成穗
發熱作渴消瘦等證
黃連炒　神麯炒　木香各一兩半　檳榔二十個
史君子酒浸　麥芽炒各四兩　肉豆蔻麵煨二兩
麪糊丸麻子大每服三五十丸米飲下頁久用五味異功散
一服以助胃氣
蘆薈肥兒丸百十四　治疳熱
蘆薈　龍膽草酒洗　木香　人參
史君子肉　蝦蟆酥炙去頭足腸十隻　麥芽炒各二錢　檳榔
黃連去鬚炒　白蕪荑各一錢　胡黃連五錢
右為細末豬膽汁為丸黍米大每服五六十丸米飲下

大蘆薈丸 百十五　一名丸蘇蘆薈丸○治小兒肝脾疳積發熱體瘦熱渴大便不調或瘰癧結核耳內生瘡牙齦蝕爛目生雲翳等證

胡黃連　黃連　蘆薈　白蕪荑炒
白雷丸破開赤者不用　木香　青皮　鶴虱草微炒各一兩
射香一錢另研

右為末蒸餅糊丸麻子大每服一錢空心白湯送下○立齋曰內青皮以龍膽草代之射香不用尤效

加減蘆薈丸 百十六　治證同前尤治小兒疳積腹脹

蘆薈真者五錢　宣黃連去鬚　胡黃連　枳實
青皮各一錢半　青黛　木香　山查肉各二錢
麥芽炒二錢　射一分　乾蝦蟆一隻酥炙

右為細末湯浸蒸餅為丸綠豆大每服七八分量兒大小與之○按此方加史君子肉三錢治濕熱生虫亦佳

當歸龍薈丸 百十七　方在寒陣一六七
治肝經實火大便秘結

良方蘆薈丸 百十八　方在寒陣一六八
治疳癖發熱等證

龍膽丸 百十九　治腦疳腦熱瘡

龍膽草　升麻　苦楝根皮焙　赤茯苓
防風　蘆薈　油髮灰各二錢　青黛
黃連各三錢

右為末豬膽汁浸米糕丸麻子大薄荷湯下仍以蘆薈末吹入鼻內

木香丸 百二十　治疳痢

黃連三錢　木香　紫厚朴製　夜明砂隔紙炒各二錢
訶子肉炒一錢

右為末飯丸麻子大乾艾生薑煎湯食前下

黃連丸 百二十一　治疳勞

黃連牛膽汁浸一宿　石蓮子　瓜蔞根　杏仁去皮尖
烏梅肉各二錢

右為末牛膽汁浸糕丸麻子大煎烏梅薑蜜湯下

胡黃連丸 百二十二　治熱疳

胡黃連　黃連各半兩　朱砂一錢

右為末填入豬膽內以線扎懸掛銚中淡漿水煮數沸取出研蘆薈射香各二錢入之飯和丸麻子大每服一二十丸米

飲下

蟾蜍丸 一二三 治小兒頭目結核面色痿黃飲食不甘腹大發熱名曰無辜疳證一服虛熱退二服煩渴止三服瀉痢愈

蟾蜍一枚 夏月溝渠深土中取腹大不跳不鳴者其身多癩者佳

右將糞蛆一杓置桶中以尿浸之却將蟾蜍跌死投與蛆食一晝夜用布袋盛蛆置急流中一宿取出瓦上焙乾爲末入麝香一字粳米飯丸麻子大每服二三十丸米飲下其效如神

天麻丸 一二四 治肝風疳眼

天麻 青黛 黃連 五靈脂

夜明砂微炒 川芎 蘆薈各二錢 龍膽草

防風 蟬退去足各一錢半 全蝎二枚焙 乾蟾頭炙焦一錢

射香

右爲末豬膽汁浸米糕丸麻子大每服十丸薄荷湯下

五靈脂丸 一二五 治脾疳食疳

白豆蔻 麥芽炒 五靈脂 砂仁

莪朮煨 青皮 橘紅 使君子焙各二錢

蝦蟆炙焦二錢

右爲末米糊丸麻子大每服以十丸米湯下

如聖丸 一二六 治疳熱泄瀉

白蕪荑炒 川黃連 胡黃連各二兩半 使君子肉一兩

麝香五分另研 乾蝦蟆五個酒煮杵膏

右爲末以蝦蟆膏杵丸麻子大每服一二十丸煎人參湯下

○薛按疳之爲患乃肝脾虛熱津液乾涸之證前方乃專於治疳清熱之劑若脾胃虛弱者當佐以六君子湯調補脾胃使邪氣退康可收全功也

橘子丸 一二七 治疳腫脹

蘿蔔子一兩微炒 陳皮 青皮炒 檳榔

五靈脂 莪朮煨 黑牽牛頭末炒 赤茯苓

木香二錢半

右爲末麵糊丸綠豆大每服十五丸紫蘇湯下

消積丸 一二八 治食積大便酸臭發熱

丁香九個 砂仁十二個 烏梅肉三個 巴豆二粒去皮心膜

右爲末麵糊丸黍米大每服五七丸溫水下

塌氣丸 一二九 治肚腹虛脹

胡椒一兩　蝎尾五錢去毒

右爲末麵糊丸粟米大每服一二十丸陳米飲下

紫霜丸一二十　治驚積及變蒸發熱不解或食癇先寒後熱

或乳哺失節宿滯不化腹痛便結

代赭石煅醋焠七次　赤石脂各一兩　杏仁五十個　巴豆三十枚去心膜油

右先將巴豆杏仁研成膏入代赭石脂研勻湯浸蒸餅丸粟

米大每服三五丸米飲送下

化𧏾丸一二一

黃連五錢　蜀椒去閉口者炒出汗　苦楝根白皮各二錢

右爲末用烏梅肥者七個艾湯浸去核搗爛和丸艾湯量兒

大小送下

下虫丸一二二　治疳蛔諸虫

苦楝根皮新白者酒浸焙　綠包貫衆　雞心檳榔

桃仁浸去皮焙　蕪荑焙　木香各二錢　鶴虱炒一錢

輕粉五分　乾蝦蟆三錢炙焦　史君子五十取肉煨

右爲末麵糊丸麻子大每服一二十丸天明清肉汁下〇一

方內加當歸川連各二錢五分

史君子丸一二三　治五疳蛔虫脾胃不和心腹膨脹時復作

痛不食漸瘦

史君子肉一兩　厚朴制　橘紅　白芍藥

甘草炒　川芎各一錢

右爲末蜜丸皂角子大每服一丸陳米飲化下

白玉散一二四　治丹瘤

白土二錢半　寒水石五錢

右爲末米醋或新水調塗

以下通用方

四君子湯一二五　方在補陣一

治脾肺氣虛諸證

六君子湯一二六　方在補陣五

治脾胃虛弱嘔吐等證

五味異功散一二七　方在補陣四

治脾胃虛寒飲食少思等證

四物湯一二八　方在補陣八

治一切血虛等證

八珍湯一二九　方在補陣十九

治氣血兩虛

十全大補湯 百四十 方在補陣二十
治氣血俱虛大補元氣
獨參湯 一四一 方在補陣三六
治氣虛氣脫挽回元陽
歸脾湯 一四二 方在補陣三三
治心脾虛損
參术湯 一四三 方在補陣四一
治氣虛泄瀉嘔吐等證
參术膏 一四四 方在補陣四十

治中氣虛弱諸藥不應者
參芪散 一四五 方在補陣五四
治睡中汗出
參附湯 一四六 方在補陣三八
治真陽虛極喘急呃逆
參苓白术散 一四七 方在補陣五五
治脾胃虛弱食少吐瀉
理中湯 一四八 方在熱陣一
治上中二焦虛寒諸證

生脈散 一四九 方在補陣五七
治熱傷元氣止渴消煩定欬嗽喘促
五福飲 百五十 方在新補六
補五藏虛損
五君子煎 一五一 方在新熱六
治脾胃虛寒嘔吐泄瀉
理陰煎 一五二 方在新熱三
治脾腎虛寒諸證
溫胃飲 一五三 方在新熱五

治中寒嘔吐吞酸泄瀉少食
養中煎 一五四 方在新熱四
治中氣虛寒嘔泄
參薑飲 一五五 方在新熱八
治脾肺胃氣虛寒嘔吐欬嗽
六味回陽飲 一五六 方在新熱二
治陰陽將脫等證
六味異功煎 一五七 方在新熱七
治脾胃虛寒吐瀉兼滯者

六味丸 一五八 方在補陣一二一
壯水補腎
八味丸 一五九 方在補陣一二二
益火補陽
胃關煎 百六十 方在新熱九
治脾腎虛寒瀉痢
佐關煎 一六一 方在新熱十
治生冷傷脾瀉痢
五德丸 一六二 方在新熱十八
治脾腎寒滯一切瀉痢飱泄

二陳湯 一六三 方在和陣一
和脾消痰
芍藥枳朮丸 一六四 方在新和十六
健脾消積止腹痛除脹滿
枳朮丸 一六五 方在和陣七九
健脾胃消食積
大和中飲 一六六 方在新和七
治飲食留滯

小和中飲 一六七 方在新和八
治胸膈脹滿脾胃不和
四順清涼飲 一六八 方在攻陣二五
治血熱瘀滯秘結
青州白丸子 一六九 方在和陣百十二
治風痰嘔吐牙關緊急
瀉青丸 百七十 方在寒陣一五一
治肝火急驚目赤
掃虫煎 一七一 方在新和十四
治諸虫上攻胸腹作痛

全書卷六十二終

會稽　張介賓　會卿著
瀛海　賈　棠　青南訂

痘疹

保元湯一　治痘瘡氣虛　略名

人參二三錢　炙甘草一錢　肉桂五七分　黃芪二三錢灌膿時酒炒回漿時蜜炙

水一鍾半加糯米一撮煎服○此藥煎熟或加人乳好酒各半盞和服更妙酌宜用之○頭額不起加川芎三五分○面部加升麻二四分○胸腹加桔梗三四分○腰膝加牛膝四分○四肢不起加桂枝○嘔惡加丁香三四分○元氣虛寒加大附子七八分或一錢

調元湯　按此即保元湯無肉桂者名為調元湯即東垣之黃芪湯也東垣用為小兒治驚之劑魏桂巖用以治痘多效因美之名保元湯也蓋小兒元氣未充最易傷殘用此保全誠幼科王道之妙方但能因此廓充則凡氣分血分虛寒虛陷等症皆可隨症加減用之無不可奏神效也

內補湯三　治痘瘡中虛等症

人參　黃芪　當歸　白术
川芎　甘草　茯苓　陳皮
厚朴

右等分水煎服

托裏散四　治痘毒元氣虛弱或妄行尅伐不能潰散用之未成自消已成自潰并治癰毒內虛不能起發

人參　黃芪炒各一錢　當歸酒洗　白术
熟地　芍藥炒　茯苓各一錢半　炙甘草五分

右每用二三錢水煎服○外科樞要方有陳皮一錢半無甘草

解毒內托散五　治痘癰

金銀花　黃芪　當歸　赤芍藥
防風　甘草節　荊芥　連翹
木通

右水煎入酒少許服

陳氏托裏消毒散六　治痘毒氣血虛弱不能起發腐潰收斂或發寒熱肌肉不生

人參　黃芪炒　當歸酒洗　川芎

芍藥炒　白朮炒　茯苓　陳皮各一錢

金銀花　連翹　白芷各七分　炙甘草五分

右每服三五錢水煎服○外科方無陳皮

參芪內托散七　治痘瘡裏虛發癢或不潰膿或爲倒靨及瘡癰膿毒不化膿潰作痛等證

人參　黃芪蜜炙　當歸　川芎

厚朴薑製　防風　桔梗炒　白芷

紫草　官桂　木香　甘草等分

入糯米一撮水煎服○色淡白者去防風紫草白芷多加糯米○一方有芍藥

參芪四聖散八　治痘瘡已出至六七日不起發不成膿

人參　黃芪炒　白朮炒　當歸

川芎　芍藥炒　茯苓各五分　紫草

防風　木通各二分

右用水煎服

陳氏四聖散九　治痘瘡出不快及倒靨因內實者

紫草茸　木通　炙甘草　枳殼麩炒

黃芪等分

右每服二錢加糯米一百粒水煎待米熟溫服

加味四聖散十　治痘瘡黑陷倒陷

人參　黃芪炙　川芎　甘草

紫草　木通　木香等分　蟬蛻十個

右加糯米百粒水一盞煎服

如聖湯十一　治痘瘡盛不起

芍藥　升麻　乾葛各一錢　甘草

紫草　木通各三五分

水一鍾薑一片煎七分溫服不拘時

人參固肌湯十二　治痘瘡發表太過致肌肉不密或痘痂久粘者

人參　黃芪　當歸酒洗　甘草

蟬蛻去土等分

水一鍾入糯米一撮煎服

人參透肌散十三　治痘瘡虛而有熱雖出快而不齊隱於肌膚間者

人參　紫草如無以紅花代之　白朮　當歸

芍藥　茯苓　甘草　木通

蟬退　糯米等分

右每服二錢水一盞煎半盞徐服之

十宣散十四　一名托裏十補散○調氣補血內托瘡毒五日後必用之方也亦治癰疽

人參　黃芪　當歸各二錢　川芎

防風　桔梗　白芷　甘草炙

厚朴各一錢　桂心三分

右爲細末每服一錢或二錢木香湯下

芎歸湯十五　亦名活血散○大能養營起痘

當歸倍用　川芎

右爲細末每服一錢紅花湯調服

活血散十六　治痘疹血虛血熱已出未盡煩躁不寧腹痛

白芍藥酒炒

右爲末每服一匙糯米湯調下或荔枝湯亦可○此方對四君子湯加歸芪名參歸活血散

當歸活血散十七　治痘色淡白

當歸酒洗　赤芍酒炒　川芎　紫草

紅花各五錢　木香二錢　血竭一錢

右爲末每五歲者服一錢十歲已上服二錢酒下

養血化斑湯十八　治白疹白痘

當歸身　人參　生地　紅花

蟬蛻等分

水一盞生薑一片煎六分溫服無時

人參胃愛散十九　治痘疹已發未發吐瀉不止不思飲食等證

人參　茯苓　甘草　丁香

藿香　紫蘇　木瓜　糯米

右每服三錢薑棗水煎

二仙散二十　治痘瘡寒戰咬牙腹痛口氣冷陰盛陽衰嘔吐泄瀉雜發等證

丁香九粒　乾薑炒一錢

右爲細末每服五七分白湯送下被蓋片時令脾胃溫煖陰返陽回則痘變潤澤出大小加減與之

陳氏木香散二十一　又名十一味異功散○治小兒痘疹虛寒多滯者宜此

木香　丁香　大腹皮　人參
桂心　炙甘草　半夏製　訶黎勒
赤茯苓　青皮　前胡等分
右每服二三錢薑水煎
薛按曰前方治痘瘡已出未愈之間其瘡不光澤不起發不紅活五七日內泄瀉作渴或肚腹作脹氣促作喘或身雖熱而腹脹足指冷或驚悸或寒戰咬牙或欲靨不靨瘡不結痂或靨後腹脹泄瀉作渴此皆脾胃虛弱津液衰少急用此藥治之若誤認為實熱用寒涼之劑及飲蜜水生冷瓜果之類必不治

陳氏十二味異功散二三　治元氣虛寒小兒痘疹色白寒戰咬牙泄瀉喘嗽等證
人參　丁香　木香　肉豆蔻
陳皮　厚朴各二錢半　白朮　茯苓
官桂各二錢　當歸三錢半　製附子　半夏各錢半
右咀每服二三錢薑棗水煎服〇愚按陳氏此上二方溫性有餘補性不足用治寒證則可用治虛證則不及也用者更當詳酌

陳氏人參麥門冬散二一　治痘瘡微渴
麥門冬一兩　人參　炙甘草　白朮
陳皮　厚朴薑製各五錢
右每服三四錢水一大盞煎至六分徐徐溫服量兒增減
薛氏曰前方治痘瘡熱毒氣虛宜用之若胃氣虛作渴宜人參白朮散
柴胡麥門冬散二四　治痘瘡壯熱經日不止更無他證者
柴胡二錢半　龍膽草一錢　麥門冬三錢　甘草炙
人參　玄參各錢半

右㕮咀每服二錢水一大盞煎至六分不拘時徐徐溫服量大小加減
按此方解表之功居六清火之功居四養營退熱此方最宜
升均湯二五　治痘瘡已出不勻或吐瀉發熱作渴
升麻　乾葛　人參　白朮炒
芍藥炒　茯苓　甘草　紫草如無紅花代之
右每服二五錢薑水煎
升麻葛根湯二六　亦名升麻湯〇解發痘毒之良方
升麻　葛根　芍藥　甘草等分

右㕮咀水一盞煎七分溫服無時

萬氏曰古人治痘以升麻葛根湯為主後世好奇多立方法然過多而治愈難矣苟能通變則痘疹諸證皆可增減用之不特發表解肌而已今以葛根湯為主治痘瘡在增損法於後○初發熱瘡表加柴胡羌活白芷桔梗防風○口乾渴內熱也加栝蔞根花粉麥門冬○自利加條實黃芩○嘔吐加半夏生薑○腹中痛加木香青皮枳殼山查肉○腰痛加獨活北細辛○頭痛加羌活蔓荊子○驚搐加木通生地黃燈心○小便少加木通車前瞿麥○大便秘加大黃○咽

喉加山豆根玄參生地黃○發熱三四日熱甚不減須解其熱加大力子連翹紫草○痘不出加防風蟬蛻荊芥穗紅花子○目赤加龍膽草密蒙花柴胡○痘出太稠密加人參當歸木香紫草大力子防風桔梗○咽痛加桔梗連翹○痘乾或帶紫或太赤者血熱也加當歸稍生地黃紅花地骨皮牡丹皮○痘平陷灰白色氣虛也加人參白朮防風木香官桂○手足痘不起脾胃不足也加人參黃芪防風官桂○泄瀉者裏虛也加人參白朮訶子白茯苓○痘不著痂者濕也加黃芪防風官桂白芷

愚謂前方乃胃經發表之劑萬氏增減之法大意已悉但此方性味清涼純於疎泄必陽明多實多熱者乃宜用之然小兒氣血體質大都虛弱平和者十居七八故凡痘瘡初起乍見發熱即藥若質和平者當以平劑為善若遽用清涼未免傷其胃氣今用解散未免虛其表氣一者受傷變患有不可測矣故余制柴歸飲為治痘之先有所當酌宜用之若治麻疹則多為火證此方乃所宜也

蘇葛湯　一七　初熱未見點發表之劑暫用之分兩宜酌見大小以為增減

蘇葉一錢　葛根一錢　甘草一錢　白芍藥一錢半

連鬚葱白三根生薑三片水一鍾半煎七分熱服○原方有陳皮砂仁各五分此惟氣滯腹痛者宜用之否則不必

連翹升麻湯　一八　散毒清火

連翹一錢　升麻　葛根　桔梗

甘草各七分　白芍藥五分　薄荷少許

右加淡竹葉燈草水一鍾半煎一盞溫服無時

柴胡橘皮湯　一九

柴胡　橘皮　人參　半夏

茯苓 黄芩等分

右加竹茹一團水一盞煎七分温服不拘時

人參敗毒散三十 方在散陣三六

治時發疫疹

荆防敗毒散三一 亦名消風敗毒散○發散痘疹俱可用及

時氣風毒邪熱

柴胡 荆芥穗 防風 羌活

獨活 前胡 川芎 枳殼

人參 甘草 桔梗 茯苓等分

右切細加薄荷葉水一盞煎七分去滓温服

柴葛敗毒散 疑似傷寒以此解散

柴胡 乾葛 人參 羌活

防風 荆芥 桔梗 蘇葉

甘草

右用生薑三片水煎服

參蘇飲三三 方在散陣三四

治傷風欬嗽傷寒痘疹

加減參蘇飲三四 初熱見點解利之藥但表邪未達而元氣

强壯者宜暫用之或前後感冒風寒俱可暫用

蘇葉錢 乾葛錢半 前胡八分 陳皮七分

枳殼六分 桔梗 甘草各五分

水一鍾半加生薑三片煎服

麻黄甘草湯三五 冬月痘瘡燥發表實者宜用之

麻黄一錢 生甘草五分

水煎服

柴葛桂枝湯三六 表散痘熱

柴胡 乾葛 桂枝 防風

甘草 人參 白芍藥

水一盞加生薑三片煎七分温服

桂枝葛根湯三七 解散寒邪

桂枝 葛根 升麻 赤芍藥

防風 甘草各一錢

右加生薑三片淡豆豉一錢水一鍾煎七分温服無時

十味羌活散三八 此仍熱見點解利之劑若小兒身壯力强者可用蘇葛以行表其次者宜此和解疎利之藥若虚而宜補者必當兼顧元氣不得單用此類

羌活　前胡　防風各一錢　荊芥
獨活各八分　細辛　白芷各三分　柴胡
炙甘草　蟬退各四分
水一鍾半加薄荷三葉煎五分不拘時服○發搐久熱壅盛不
退者調入制過珠砂末服之神效

十三味羌活散 二九　解熱散毒治風熱欲作痘疹者
羌活　獨活　防風　桔梗
荊芥　柴胡　前胡　地骨皮
炙甘草　蟬退　川芎　天花粉
天麻等分

右為細末每服二三錢水一盞入薄荷葉三片煎四分溫服

羌活湯 四十　解發痘瘡兼治肝熱驚狂
羌活　川芎　防風　山梔仁
龍膽草　當歸等分　甘草減半　淡竹葉
薄荷葉
水煎溫服無時

雙解散 四一　痘疹表裏俱實者非此不解
防風　川芎　當歸　連翹

芍藥　薄荷　大黃各五分　石膏
桔梗　黃芩各八分　荊芥穗　白朮
桂枝各二分　滑石二錢四分　甘草一錢
水二鍾加生薑三片煎一鍾溫服無時○此即防風通聖散
減去麻黃芒硝梔子外加桂枝也

柴胡散子 四二　治痘瘡表裏俱實良方
柴胡　防風　當歸　人參
白芍藥　甘草　黃芩　滑石
大黃等分

右加生薑一片水煎服

桂枝大黃湯 四三　治腹痛大便不通良方
桂枝　白芍各二錢半　甘草五分　大黃一錢半
右剉細加生薑一片水一鍾半煎八分食前溫服

防風芍藥甘草湯 四四　解痘毒及陽明經痘出不快
防風　芍藥　甘草等分
右每服二三錢水煎服

荊芥防風甘草湯 四五　解痘毒及大腸經痘出不快
荊芥　防風　甘草等分

右每服二三錢水煎

蟬退膏 四六　治痘瘡虛陷不起

蟬退　當歸　川芎　甘草

升麻　防風　荆芥穗等分　加人參

白芍藥

右爲末煉蜜丸芡實大每服一丸薄荷湯下

消毒散　亦名消毒飲○治痘瘡六七日間身壯熱不大

便其脉緊盛者用此藥微利之

荆芥穗　炙甘草各一兩　牛旁子四兩炒

右爲粗散每服二三錢水一盞煎七分不拘時徐徐服

四味消毒飲 四八　治痘瘡熱盛毒氣壅遏無問前後皆可服

人參　炙甘草　黄連　牛旁子等分

右爲粗末每服一錢加薑一片水一盞煎四分去滓溫服不

拘時

六味消毒飲 四九　解痘毒

牛旁子　連翹　甘草　綠升麻

紫草　山豆根等分

水一盞煎七分溫服不拘時

消毒化斑湯 五十　消風散毒清眼目咽喉

升麻　柴胡　桔梗　甘草

連翹　龍膽草　牛旁子　防風

蟬蛻　密蒙花

水一鍾半加淡竹葉十片煎服

解毒湯 五一　治一切熱毒腫痛或風熱搔痒

黄連　金銀花　連翹

右水煎服

真人解毒湯 五二　治痘毒

忍冬花半斤　甘草節一兩　木通　防風

荆芥　連翹各一錢

右分作三劑用水酒各一鍾煎服以腫消痘出爲度

葛根解毒湯 五三　解痘毒止渴異方

葛根　升麻減半　生地黄　麥門冬

天花粉等分　甘草減半

右取糯米泔水一盞煎七分入芦根自然汁一合服之

實表解毒湯 五四

人參　黄芪　當歸梢　生地黄

甘草　白芍藥　柴胡　升麻
酒片芩　玄參　地骨皮
右入薄荷葉少許淡竹葉十片水煎服
溯源解毒湯 五五　解胎毒之良方
當歸身　川芎　生地黃　白芍藥
人參　生甘草　黃連　連翹
陳皮　木通等分
水一盞加淡竹葉十片煎半盞溫服無時
陳氏解毒防風湯 五六　治痘瘡毒氣熾盛

防風　黃芩　地骨皮　白芍藥炒
荊芥　牛蒡子
右銼服四五錢水煎服或爲末白湯調下○外科解毒防風
湯方見本門六二
化毒湯 五七　治痘未出腹痛者
白芍藥　炙甘草各一錢　木香　青皮
枳殼各七分　山查肉　連翹　肉桂各五分
水一盞煎七分溫服不拘時
消風化毒湯 五八
防風　黃耆　桂枝　荊芥穗
升麻　白芍　牛蒡子等分　甘草減半
右加薄荷葉七片水一盞煎七分溫服無時
涼血化毒湯 五九　治痘瘡初出頭焦黑
歸尾　赤芍藥　生地黃　木通
連翹　牛蒡子　紅花　紫草
桔梗　山豆根
右水煎服○或加童便一小盞亦可
犀角化毒丸 六十　治諸積熱及痘疹後餘毒生瘡口舌牙齦

疼痛等證
犀角銼　生地黃　當歸　防風
荊芥穗各一兩　牛蒡子炒杵　赤芍藥　連翹
桔梗各七錢　薄荷　黃芩炒　甘草各五錢
右爲末煉蜜丸芡實大每服一丸薄荷湯下
五福化毒丹 六一　治痘瘡及痘後頭面生瘡眼目腫痛
生地黃　天門冬　麥門冬　玄參
熟地黃各兩　甘草　甜硝各二兩　青黛一兩半
右爲末煉蜜丸芡實大每服一丸白湯或薄荷湯化下

列科 五福化毒丹 六一 方在外科七六

治一切熱毒瘡癤

犀角散 治痘瘡癰毒時毒熱盛煩躁多渴小便赤澁或赤斑

犀角 鎊 甘草 炙各半兩 防風 黃芩 各一兩

右為粗末每服二錢水一小盞煎五分溫服無時

紫草化毒散 六四 解實熱毒發痘

紫草 升麻 炙甘草 等分 糯米 五十粒

水煎服

紫草散 六五 治痘疹黑陷氣血虛弱瘡疹不起

紫草 黃芪 炙 炙甘草 糯米 各錢半

右水煎服

紫草飲 六六 治痘瘡黑陷不起

紫草 當歸 芍藥 甘草

麻黃 等分

水一盞煎不拘時服

紫草飲子 六七 治倒靨腹脹大小便秘

紫草 人參 枳殼 山查

木通 穿山甲 炒上 蟬蛻 等分

水一盞煎五分作三四次溫服

紫草快斑湯 六八 一名紫草湯 治痘疹血氣不足或血熱不能起發色不紅活不灌膿等證

紫草 人參 白朮 當歸

川芎 芍藥 茯苓 甘草

木通 等分 糯米

右每服三五錢水煎

紫草木香湯 六九 治痘瘡裏虛痒塌黑陷悶亂

紫草 木香 人參 白朮

茯苓 甘草 炙 糯米

右每服三錢水煎

紫草木通湯 七十 治痘疹出不快

紫草 人參 茯苓 木通

甘草 減半 糯米 等分

右每服二三錢水煎服

紫草膏 七一 紅紫黑陷者暫用之

紫草茸 白附子 麻黃 去節湯泡去黃沫曬乾用 甘草 炙各半兩

殭蠶炒　全蝎炒各八個

右為細末用白蜜一兩好酒半盞先將紫草煎熬成膏旋入各藥丸皂子大每服一丸紫草煎湯化下就用補药調理〇如治驚搐以金薄為衣薄荷湯下

紅綿散七二　亦名天麻散〇治痘疹身有大熱而赤氣粗無汗而表未散者可服之此藥以麻黃天麻發表為工有汗者不可服盖腠理已開不可再發汗也若有汗而熱則當以惺惺散為和解之劑故仲景之治表證有宜發汗者有宜和解者有宜調和營衛者若有汗而熱者則和解為宜虛而熱者

則調和營衛為宜如和中散寒之類是也

麻黃去節　天麻　荊芥　炙甘草各二錢

全蝎全者七枚

右為末每服一錢以水半盞薄荷葉二片入酒四五滴煎三三沸帶熱服之如疹未出再進一服次又一服即傷風寒證服亦無妨

快斑湯七三　治起發遲

人參五分　當歸　防風　木通各一錢

甘草八分　木香　紫草　蟬蛻各二分

水一盞煎七分溫服不拘時

快斑越婢湯七四　治痘瘡手足不起發

黃芪炙　白芍藥　桂枝　防風

炙甘草

右加生薑一片棗一枚水煎服

快透散七五　治痘出不快

紫草　蟬蛻　木通　芍藥

炙甘草各等分

右每服二錢水煎

王海藏先生云身後出不快足太陽經也用荊芥甘草防風湯身前出不快手陽明經也用升麻葛根湯四肢出不快足陽明經也用防風芍藥甘草湯此皆解毒升發之藥也不可不知

鼠粘子湯七六　治痘稠身熱毒盛服此以防青乾黑陷并治斑疹稠密

牛蒡子炒　歸身　黃芪　炙甘草

柴胡　黃芩酒炒　連翹　地骨皮

右等分水煎熱退則止服

射干鼠粘子湯七七　治痘瘡壯熱大便堅實或口舌生瘡咽喉腫痛皆餘毒所致

鼠粘子四兩炒杵　甘草炙　升麻　射干各一兩

右每服三錢水一大盞煎六分徐徐溫服

薛氏曰前方若痘疹初出發熱欬嗽痛根窠赤盛或咽喉口舌生瘡作渴引飲者宜用若因胃氣虛弱發熱而致前症者宜人參麥門冬散

錢氏獨聖散七八　治痘瘡倒靨陷伏

用川山甲取前足嘴上者燒存性為末每服四五分以木香

湯入少酒服之或紫草湯亦可

無價散七九　治一切痘瘡倒陷焦黑危急之症

人牙　猪牙　狗牙　猫牙

右以炭火燒去烟存性等分為末每服二三分熱酒調下○如癢痛寒戰泄瀉煎異功散調下○一方人牙散只用人牙燒去烟存性為末酒調服

三麻餅八十　治初發熱用以表汗解毒稀痘神效

辰砂　揀上好明淨無砂石者以絹袋盛之用麻黃升麻紫草茘枝殼同煮一日夜研細仍用前湯飛過晒乾再研極細用真蟾酥另調作餅子

麻黃　去節湯泡過晒乾為極細末亦用蟾酥另調作餅

紫草　研極細亦用蟾酥另調作餅

蟾酥　於端午日捉蟾取酥搓前三餅每餅加射香少許微炒

右方如遇痘疹小兒發熱之初即　歲者將三餅各取半分熱酒化下蓋覆出汗如不能飲酒用敗毒散煎湯化下更好○若痘已出滿頂紅紫色為熱毒之盛宜煎紫草紅花湯或化毒湯將辰砂紫草二餅調下少許以解之但痘出之

後不可服麻黃餅也蓋辰砂能解毒紫草涼心火制熱亦能發痘解毒麻黃能發表發痘蟾酥能點臟腑中毒氣從毛竅中作臭汗而出此門冬誠解毒稀痘之神方也

周氏奪命丹八一　治風邪倒陷及痘毒入裏

辰砂　揀墻壁鏡面者以白紗袋盛之用升麻麻黃紫草連翹四味同入砂罐以新汲水桑柴火煮一晝夜取出將砂研細仍將煮砂藥汁去滓熬取末待乾再用二錢

麻黃連根節酒煮　蟬蛻洗去土足　分　紫草　兩洗五　紅花子五分

穿山甲加分　真蟾酥一分

右共研細末用臘酒杵丸分作千粒周歲者半丸二歲者一丸服此三丸熱酒化服厚蓋取汗汗出痘隨出也擇天醫生炁日修合　此方與二酥餅功同

萬氏奪命丹八二　治倒陷解發痘毒

麻黃蜜酒炒　升麻各五錢　山豆根　紅花子

大力子　連翹各二錢半　蟬蛻　紫草

人中黃各三錢

右研細末酒窩和丸辰砂為衣薄荷葉煎湯下

東垣涼膈散八三　解痘疹裹熱良方

黃芩　連翹為君　甘草　梔子

薄荷　桔梗　竹葉

右水煎服

退火丹八四　治痘中狂妄神方

滑石　硃砂飛各一錢　冰片三厘

共為細末冷水調一分服待睡少時神安氣寧痘轉紅活矣

陳氏通關散八五　通心經降心火利小便良方

山梔仁　大黃炒各一錢　木通　甘草炙

車前子炒　赤茯苓　人參　瞿麥

滑石各三分　扁蓄炒五分

右用水一盞燈草十根煎半盞溫服

玄參地黃湯八六　治痘疹衄血

玄參　生地黃　牡丹皮　梔子仁各錢半

甘草　升麻各半錢　白芍藥一錢　蒲黃炒五分

水一鍾煎七分溫服○愚謂此方宜去升麻以塞上衝之源勿謂但屬陽明邸宜用升麻也

萬氏清肺飲八七　治肺熱喘嗽聲啞

麥門冬　桔梗各一錢　荆芥穗　天花粉

知母各一錢　石菖蒲　訶子仁各八分

右水煎服○此當與清肺湯參用方在後一四五

導赤通氣散八八　治心痛聲不揚者

木通　生地黃　人參　麥門冬

當歸身　石菖蒲　甘草

右加燈心水煎服

甘桔清金散八九　治肺熱咽痛聲不清

桔梗一兩　甘草　連翹各半兩　訶子皮一錢

牛蒡子炒一錢

右為細末每服一錢薄荷葉少許同煎服

加味甘桔湯九十　咽喉腫痛暫用

桔梗八分　甘草錢二分　牛蒡子　射干各六分

防風　玄參各四分

水一鍾煎服或加生薑一片○熱甚者加黃芩去防風亦可

大如聖飲子九一　治瘡疹痘毒攻咽嗌腫痛熱渴或成腫毒

不消等證

桔梗　甘草　鼠粘子炒各一兩　麥門冬五錢

右每服二錢水煎

薛氏橘皮湯九二　行滯消痰止嘔吐

橘皮半去白炒二錢　半夏一錢　白茯苓錢半

右加生薑三片水一盞煎七分溫服

勻氣散九三　行氣化滯

木香　青皮各五錢　山查肉二錢半

右為末每服一錢甘草湯調服

前胡枳殼湯九四　治痰實壯熱胸中煩悶大便堅實臥則喘急

前胡一兩　枳殼　赤茯苓　甘草炙

大黃各半兩

右㕮咀每服三五錢水一大盞煎至六分不拘時溫服此方宜量大小加減如身溫脉微及瀉者不可服

薛氏曰前症若屬脾胃實熱氣壅致大便秘結小便赤澀煩渴飲冷身熱脉實者宜用之以疏通內臟使邪無壅滯則痘瘡出而易愈也

當歸丸九五　治便堅三五日不通者

當歸半兩　紫草二錢　黃連錢半炒　炙甘草一錢

大黃一錢半

右以當歸紫草熬成膏下三味研為細末以膏和為丸如胡椒大三歲以下兒服十丸七八歲兒二十丸食前清米飲下漸加之以和為度

百祥丸九六　治痘瘡紫黑乾陷熱毒便秘裏實等症紅芽大戟不拘多少用漿水煮極軟去骨日中晒乾復內原汁中煮汁盡焙乾研末水丸粟米大每服一二十丸研赤芝麻湯下

棗變百祥丸九七　治同前而稍緩可代百祥丸

紅芽大戟去骨一兩　青州棗肉二十個

右用水一碗同煎至水盡為度去大戟不用將棗焙乾可和

作劑或搗爛為丸從少至多以木香湯送服至利為度

拔毒散 九八 治痘毒發癰

大黃 當歸梢各一兩 白芷 沉香

木香各半兩 穿山甲七片，土炒焦

右為細末看虛實大小加減長流水煎湯調服

錢氏苦參丸 九九 治痘後潰爛瘡毒疥癩

苦參一兩 白蒺藜 何首烏 牛蒡子

荊芥穗各半兩

右為末酒調麵糊為丸竹葉湯下○外科苦參丸見本門八

八

稀痘方 百

用老鼠去皮取肉水煮熟量兒大小與食數次出痘甚稀未食葷時與食尤效屢試屢驗

稀痘酒 百一 最能散毒稀痘

麻黃去節 紫草各一兩

右二味細切布囊盛之浸無灰酒一小壜泥封固凡遇天行小兒發熱時與半杯或一杯量兒大小服之出微汗為佳

三豆湯 百二 痘發時預服之

大黑豆 赤小豆 綠豆等分，淘淨

右用甘草浸水去渣以甘草水煮豆熟為度逐日空心任意飲其汁自然出少○此方冬月煮熟令兒常食豆尤妙

絲瓜湯 百三 解痘毒○一方無山查

絲瓜 升麻 芍藥酒炒 生甘草

山查 黑豆 赤小豆 犀角鎊，等分

右為粗散每服三錢水一大盞煎至六分不拘時徐徐溫服量大小加減

辰砂散 百四 預解痘毒

好辰砂飛，一錢 老絲瓜近蒂三寸，連子燒灰存性，此物發痘瘡最妙

右研末蜜水調服多者可少少者可無或以紫草甘草湯調服尤佳

保嬰丹 百五 稀痘

纏豆藤或黃豆或綠豆梗上纏繞細紅藤是也，於八月生時採取陰乾聽用，一兩

防風 荊芥穗 牛蒡子炒 紫草茸去梗，酒洗，一兩

新升麻鹽水炒 甘草去皮，各五錢 天竺黃 蟬蛻去頭足，各一錢

牛黃一錢 赤小豆 黑豆 綠豆各二十粒，累炒勿焦

好硃砂用麻黃紫草荔枝殼升麻同煮過復以此汁飛過

右另用紫草二兩入水二碗煎存至少半碗入沙糖一小鍾
將前各藥爲細末同紫草膏丸如李核大朗以硃砂爲衣於
未痘之先濃煎甘草湯磨服一丸大者二丸若已發熱用
生黃湯磨服蓋被睡而出之多者可少少者可無大有神效
一方無紫草膏仍有經霜老絲瓜一筒連蔕五寸燒存
性同用

洗肝明目散 百六 治痘後目疾

當歸 羌活 柴胡 密蒙花
川芎 防風 木賊 山梔仁

龍膽草 各等分
右爲末每服一錢淡沙糖水調服

洗肝散 百七 翳膜遮睛皆用

歸尾 錢二分 防風 八分 大黃 八分 羌活
川芎 薄荷 各四分 梔子 錢半 甘草 二分
水一鍾薑一片煎服熱盛便秘加芩柏

羊肝散 百八 治痘毒入眼或毒氣衝入眼

密蒙花 二錢 青葙子 決明子 車前子 炒各一錢
右爲末用羊肝一大葉薄批摻上濕紙裹煨熟空心食之

蒺藜散 百九 治痘毒入眼腫痛

白蒺藜 穀精草 防風 羌活
海蛤粉 等分
右爲細末每服一錢溫水調服即退

蟬菊散 百十 治痘疹入目或病後生翳障

蟬退 去足翅 白菊花 等分
每服一二三錢水八分加蜜少許煎四分食後溫服

秦皮散 百十一 治大人小兒風毒赤眼痛癢澁皺淚羞明

秦皮 滑石 黃連 等分

湯泡溫洗日二三次

通神散 百十二 治痘瘡入眼生翳膜

白菊花 穀精草 綠豆皮
右爲末每服一錢用柿餅一個米泔水一盞同煎候水乾只
喫柿餅每日三五次不拘十七日效

金氏黃栢膏 百十三 用此護眼可免痘毒入目

黃栢 一兩 綠豆末 一兩 生甘草 一兩
右爲細末以麻油調成膏用塗耳前眼角目下四五遍若早
塗之出痘必稀若既患眼塗之必減

痘疔散 百十四

雄黃一錢　紫草三錢

右爲細末胭脂汁調用銀簪脚挑破黑痘入藥在內此下二方皆治痘疔之良方也

四聖丹 百十五　治黑疔

牛黃 一錢一分　兒茶 一錢七分　珠砂 八分　珍珠 二分

右爲極細末以綿胭脂汁或油胭脂調勻先用銀針挑破黑疔拭去惡血乃點藥疔上

四聖散 百十六　治痘不起發變黑而痛者痘疔也亦名鬼痘

綠豆 四十九粒　豌豆 四十九粒 各燒存性　珍珠 一分　油頭髮 燒存性 一分

右爲細末用胭脂水調先以簪脚撥開黑痘以此塗之

神效隔蒜灸法 百十七　治痘疔毒氣熾盛使諸痘不能起發已起發者不能貫膿已貫膿者不能收靨或大痛或麻木痛者灸至不痛不痛者灸至痛其毒隨火而散其法用大蒜頭切三分厚安痘疔上用小艾炷於蒜上灸之每五壯易蒜再灸若紫血出後腫痛不止尤當用灸治者審之○愚在京師嘗見治痘疔者俱以線鍼挑破出毒血諸痘隨即貫膿若挑破不痛不出血者難治若用此法灸之即知痛更用鍼挑破紫血出諸痘自貫亦有生者

胡荽酒 百十八　辟穢氣使痘疹出快

用胡荽一把以好酒二盞煎一兩沸令乳母每含一兩口噴兒遍身勿噴頭面仍於房中須燒胡荽香以辟除穢氣能使痘疹出快前並胡荽懸房門上最妙○或用棗炙之亦開胃聚香尤能開胃氣進飲食解毒氣○按此酒惟未出之前及初報之時宜用之若起脹之後則宜避酒氣亦忌發散皆不可用也

茵陳薰法

用茵陳研末以棗膏和丸如鷄子大晒乾用烈火燒烟薰之

水楊湯 百十九　治倒陷之良方

水楊即忍冬藤也春冬用枝秋夏用枝葉生水邊細葉紅梗枝上有圓果滿果有白鬚散出切斷用長流水一大釜煎六七沸先將三分之一置浴盆內以手試其溫可仍先服煎藥然後浴洗漸漸添湯以痘起發光壯爲度不拘次數洗畢照視若累累然起處暈暈有絲此漿影也如漿不滿宜再浴之若弱者只浴頭面手足亦可此則不厭多洗洗後如無起

爭乃氣血敗而津液枯多不可治

傳茶葉方 一二一 鋪床薦用

茶葉要多揀去粗梗入水煮取起再揀去梗濕鋪於床上

用草紙隔層令兒臥上一夜則膿水皆乾

髓膏 一二二 治痘瘡不靨及痂瘡不落者塗之即落

猪骨髓 白蜜

右二味以火熬一二沸退涼用鷄翎掃上即落

白花膏 一二三 治痘瘡癢起作痛或瘡痂欲落不落者

白蜜不拘多少略用湯和時時以鵝翎潤瘡處瘡痂亦易落

無瘢

蕎麥散 一二四 治痘瘡潰爛以此傅之

蕎麥一味磨取細麪如痘瘡破者以此敷之潰爛者以此遍撲

之須袋盛撲或以此襯臥尤佳

胭脂汁 一二五 治黑痘之良方

先用升麻一味煎濃湯去滓却用綿胭脂浸於湯內揉出紅

汁就以本綿蘸湯於瘡上拭而塗之

收靨散 一二六 治痘瘡擦成瘡膿血淋漓謂之斑爛用蓋

屋益墻爛草多年者佳或曠野白爛者尤佳爲末摻之〇

或氣血虛熱不愈而遍身患者須多摻席鋪上令兒坐卧其

上其瘡即愈

白龍散 一二七 治爛痘及抓破者

用乾黃牛糞在風露中多久者火煅成灰取中心白者爲末

以薄絹囊盛於瘡上撲之

救苦滅瘢散 一二八 治爛痘以此傅面如誤抓破者用之傅

貼最良

密陀僧 滑石各二兩 白芷半兩

右爲細末濕則乾摻之或用好蜜調傅

滅瘢散 一二九 治痘後面瘡以此傅之

密陀僧 白附子 白殭蠶 白芷

鷹矢白等分

右研極細末以水調搽面黙神效

辟邪丹 百三十 用燒於房中能辟一切穢惡邪氣

蒼朮以黃連代之更妙 乳香 降眞香 甘松

北細辛 芸香各等分

右爲末水丸如豆大每焚一丸薰之良久又焚一丸不可太

多只可略有香氣使之不斷可也

砭法 一二一 治丹瘤

用細磁器擊碎取鋒銛者以筯一根劈開頭夾定用線縛住兩指輕撚筯梢令磁鋒正對患處懸高寸許另用一筯輕擊筯頭令毒血遇刺而出即可解散

蜞鍼法 治痘癰及丹瘤

用水蛭大者五六根放腫毒頭上吮去惡血可以消丹瘤決癰腫

雄黃散 一二三 治痘後牙齦生瘡蝕爛

雄黃一錢 銅綠二錢

右為末乾摻之

綿繭散 一二四 治痘瘡餘毒肢體關節生瘡蝕爛膿水不絕

出蛾綿繭不拘多少 生白礬入繭內以炭火煆枯

右為細末乾貼瘡口內○此總治瘡毒膿水淋漓收斂之外劑

搽牙散 一二五 治痘後餘毒攻牙牛疳一日偶進一分急用此搽之

銅綠 雄黃 五棓子 枯礬

胡黃連 北細辛 烏梅同褐子包固火煆存性

右等分為末搽之

吹口丹 一二六 治疳

黃連 青黛 兒茶 片腦

右等分為末吹之

生肌散 一二七 痘後癰毒不收口用之神效

枯礬三錢 海螵蛸 赤石脂各煆二錢 龍骨煆

黃丹飛炒 乳香出汗 沒藥出汗各一錢 血竭五分

輕粉 麝各二分

為細末摻瘡口內外以太乙膏貼之

馬鳴散 一二八 治走馬疳良方

人中白溺缸底者良白垽也以物刮取新瓦盆內火煆如白鹽乃佳半兩 五棓子生者一錢

馬鳴退即蠶退紙也火燒過一錢半 枯白礬二錢同用五棓子一錢入礬於內煆枯者

右為極細末先以濃米泔水浸洗瘡口以此傅之

以下麻疹方

升麻湯 一二九○解散麻疹

升麻去鬚 葛根去皮各一錢 芍藥酒炒二錢 炙甘草一錢

水一盞煎五分食遠稍熱服量人大小加減

予按此方即升麻葛根湯也麻疹之證多屬陽明火毒凡欲解表散邪但表實邪盛者最宜用此然愚謂以柴胡代升麻用之更妙若血氣稍虛而邪有未解者惟柴歸飲爲最妥

升麻透斑湯 百四十 治疹瘡初見紅點一日至三日

升麻 枳殼麩炒各五分 柴胡錢半 桔梗

前胡各一錢 乾葛 川芎 茯苓各七分

陳皮 半夏 甘草各四分

右加生薑一片水一鍾煎五分作十餘次徐徐服之

葛根麥門冬散 一四一 治小兒熱毒斑疹頭痛壯熱心神煩悶

葛根三錢 麥門冬四錢 人參 川升麻

茯苓 甘草各一錢 石膏半兩 赤芍藥一錢

右㕮咀每服三錢水一大盞煎至六分不拘時徐徐溫服仍量兒大小增減

薛氏曰前方足陽明胃經之藥也外除表邪內清胃火兼補元氣若非發熱作渴表裏有熱者不可用若表裏俱虛而發熱作渴者宜用人參麥門冬散

萬氏麥門冬湯 一四一 治表邪內熱欬嗽甚者○此即前方去人參者但分兩稍異耳

麥門冬 葛根去皮各一錢 升麻去鬚四分 赤芍藥酒炒

茯苓各六分 炙甘草四分 石膏煆一錢半

右水煎服

萬氏柴胡四物湯 一四二 治疹後餘熱

柴胡 當歸身 川芎 生地黃

白芍藥 人參 麥門冬 知母

淡竹葉 黃芩 地骨皮

右剉細水一盞煎七分不拘時溫服

生地黃散 一四四 治小兒疵疹身熱口乾欬嗽心煩者

生地黃半兩 麥門冬七錢 款冬花 陳皮

杏仁各三錢 炙甘草二錢半

右每服三五錢水一大盞煎六分不拘時徐徐溫服量人小

加減

清肺湯 一四五 治斑疹欬嗽甚者或一母散或麥門冬湯

桔梗去蘆 片芩 貝母各七分 防風去蘆

炙甘草各四分 知母七分

右水一鍾煎五分入搗碎蘇子五分再煎溫服

清肺消毒湯 一四六 治疹瘡收完不思飲食身乾無滯
防風 枳殼各五分 連翹 前胡
黃芩 桔梗一錢 荊芥 炙甘草
右水一鍾煎至五六分作十餘次徐服之
門冬清肺湯 一四七 治疹後欬嗽不止
天門冬去心 麥門冬去心 款冬花 知母
貝母去心 桔梗 牛蒡子 地骨皮
杏仁去皮尖 馬兜鈴 甘草等分
水一鍾半煎七分食後溫服
清肺消毒化痰湯 一四八 治疹後喘嗽聲音不清不思飲食
眼目不清唇口乾燥
牛蒡子 防風 荊芥穗 貝母各五分
連翹 黃芩 前胡 茯苓各七分
桔梗 枳殼各一錢 甘草三分
右水一鍾煎五分作十餘次徐服之
清金降火湯 一四九 治疹後肺熱聲啞欬喘
當歸 白芍藥酒炒 生地黃酒洗 瓜蔞仁
白茯苓 陳皮 貝母去心 甘草

麥門冬 桑白皮 黃芩酒炒 山梔炒
玄參 杏仁去皮尖 桔梗 天門冬
黃連炒 石膏
右等分加薑一片水煎服
二母散 百五十 方在寒陣四丸
治肺熱欬嗽及疹後嗽甚者
透斑和中湯 一五一 治疹發一三日泄瀉
升麻 乾葛 豬苓 澤瀉
陳皮 半夏 川芎 茯苓各七分
前胡 桔梗各一錢 柴胡錢半 甘草三分
右加生薑三片水一鍾煎至五分作數次徐服之
解毒化滯湯 五 治疹後喫食太早咬指甲撕口唇撥眼
毛看手咬人等證
防風 荊芥 枳殼 神麯炒
麥芽炒各五分 連翹 黃芩 茯苓
前胡各七分 桔梗一錢 山楂 甘草各三分
右水一鍾煎五分作十餘次徐徐服之
大青湯 一五三 解斑疹大毒良方

生地黄　石膏　玄參　地骨皮
知母　木通　甘草　青黛
荊芥穗各等分
右水一盞加淡竹葉十二片煎七分溫服無時
羚羊角散 一五四 治小兒斑疹後餘毒不解上攻眼目羞明
生翳眵淚俱多紅赤腫閉
羚羊角鎊　黃芪　黃芩　草決明
車前子　升麻　防風　大黃
芒硝等分
水一盞煎半盞稍熱服

羌菊散 一五五 治痘疹熱毒上攻眼目生翳并暴赤羞明
羌活　甘菊花　蟬蛻　蛇蛻
防風　穀精草　木賊　甘草
白蒺藜　山梔子　大黃　黃連
沙苑蒺藜等分
右為末每服一錢清米湯調下
以下通用方
人參理中湯 一五六 方在熱陣一
治脾胃虛寒諸證
六物煎 一五七 方在新因二十
治痘疹血氣不足隨證加減用
六氣煎 一五八 方在新因二一
治痘瘡氣虛痒塌倒陷
九味異功煎 一五九 方在新因二二
治痘瘡虛陷寒戰咬牙虛寒諸證
柴歸飲 百六十 方在新因十五
治痘疹初起托散妙劑

柴葛煎 一六一 方在新因十八
治痘疹表裏俱熱散毒養陰
疎邪飲 一六二 方在新因十六
治痘疹初起表邪強實者
五積散 一六三 方在散陣三九
溫散寒邪
四順清涼飲 一六四
治血脈壅熱大便秘結
涼血養榮煎 一六五

治痘瘡血虛血熱地紅熱渴

搜毒煎 一六六　方在新因十九

解痘疹熱毒斑紫黑乾枯

犀角地黃湯 一六七　方在寒陣七九

治痘疹血熱諸證

御景黃芩湯 一六八　方在寒陣百五

治熱利

透邪煎　方在新因二三

治痘疹初熱未出者宜此蘇表達邪

化斑湯 百七十　方在寒陣三

治陽明熱渴化斑除煩

小柴胡湯 一七一　方在散陣十九

散肝膽經表邪往來寒熱

益元散 一七二　方在寒陣百十二

解煩熱止渴利小水

四苓散 一七三　方在和陣一八七

利小水去濕滯

導赤散 一七四　方在寒陣一二三

降心火及小腸熱證

全書卷六十三終

會稽　張介賓　會卿著
瀛海　賈　棠　青南訂

外科

仙方活命飲　一　治一切瘡瘍未成膿者內消已成膿者即潰此止痛消毒之聖藥也

川山甲蛤粉炒黃　白芷　防風　天花粉
赤芍藥　歸尾　乳香　沒藥
貝母　皂刺　甘草各錢　金銀花
陳皮各一錢

酒一碗煎數沸溫服

托裏消毒散　二　治癰疽元氣虛弱或行攻伐不能潰散服之未成即消已成即潰腐肉即去新肉即生若腐肉既潰而新肉不能收斂屬氣虛者四君子湯爲主屬血虛者四物湯爲主氣血俱虛者十全大補湯爲主並忌寒涼消毒之劑

人參隨證增減　黃芪鹽水拌炒　當歸　川芎
芍藥炒　白朮炒　茯苓各一錢　金銀花
白芷各七分　甘草　連翹各五分

右水煎服○陳氏托裏消毒散內多陳皮方在痘瘡○

秘方托裏散　三　治一切瘡毒始終常服不致內陷

瓜蔞大者一個杵　當歸酒拌　黃芪鹽水炒　白芍藥
甘草各一兩半　熟地　天花粉　金銀花
皂刺炒各一兩

右每用藥五兩以無灰酒五茶鍾入磁器內厚紙封口再用油紙重封置湯鍋內蓋煮至藥香取出分服直至瘡愈○立齋曰此方藥品平易消毒之功甚大且不動臟腑不傷血氣

不問陰陽腫潰屢用屢效眞仙方也常治發背腦疽毒盛者更用隔蒜灸之若脉沉實大小便秘者先用疏通而後用此其功甚捷若火毒已退不作膿或不潰者更宜托裏散而不斂及膿清者用峻補

神功托裏散　四　一名金銀花散○治癰疽發背腸癰乳癰及一切腫毒或焮痛憎寒壯熱

金銀花　黃芪　當歸　甘草等分

右用酒水各一鍾煎至一鍾分病上下食前食後服之少頃再服一劑柤敷患處不問老少虛實皆可服若爲末酒調服

尤妙

參芪托裏散五　治瘡瘍氣血俱虛不能起發或腐潰不能收斂及惡寒發熱者

人參氣虛多用之　黃芪炒　白朮炒　當歸

熟地　芍藥酒炒　茯苓　陳皮各一錢

右水煎服

參芪內托散六　方在痘疹七

治癰疽腫毒不化及潰後作痛

托裏養營湯七　治瘰癧流注及一切癰疽不足之證不作膿或不潰或潰後發熱或惡寒肌肉消瘦飲食不思睡臥不寧

盜汗不止

人參　黃芪炙　當歸酒拌　川芎

芍藥炒　白朮炒各一錢　熟地一錢　五味子炒研

麥冬　甘草各五分

水二鍾薑三片棗一枚煎七分食遠服

托裏黃芪湯八　治癰疽氣虛作渴甚效

黃芪鹽炒八錢　甘草　天花粉各一錢

水二鍾煎八分溫服之，加人參一錢亦可○若氣血俱虛膿血大泄而作渴或兼發熱者宜用托裏養營湯

內補黃芪湯九　治癰毒內虛毒不起化及潰後諸虛迭見

黃芪炙　麥冬各一兩　人參　熟地

茯苓　甘草炙各七分　白芍藥　當歸

川芎　遠志　官桂各五分

右每服一兩薑水煎服

托裏當歸湯十　治潰瘍氣血俱虛或病熱內熱寒熱往來或婦人諸瘡經候不調小便頻數大便不實等證但瘡瘍氣血虛而發熱者皆宜服之久服亦收斂瘡口

人參　黃芪　當歸　熟地

川芎　芍藥各一錢　柴胡　甘草各五分

右水煎服

托裏健中湯十一　治瘡瘍元氣素虛或因涼藥傷胃飲食少思或作嘔瀉等證

人參　白朮　茯苓各二錢　半夏

炮薑各一錢　黃芪一錢半　炙甘草五分　肉桂二分

右薑棗水煎服

托裏溫中湯十二　治瘡瘍膿潰元氣虛寒或因尅伐胃氣脫

陷腸鳴腹痛大便溏泄神思昏憒此與變内陷緩則不治

附子 炮去皮臍二錢 乾薑 炒一錢 益志 丁香

羌活 沉香 木香 茴香

陳皮 各錢 炙甘草 二錢

右薑水煎服

托裏益中湯 十三 治中氣虛弱飲食少思或瘡不消散或潰而不斂

人參 白朮 茯苓 炮薑

陳皮 半夏 各一錢 木香 炙甘草 各五分

右薑棗水煎服

托裏溫經湯 十四 治瘡瘍寒覆皮毛鬱遏經絡不得伸越熱伏營中聚結赤腫作痛惡寒發熱或痛引肢體若頭面腫痛焮甚仍宜砭之

麻黃 升麻 防風 乾葛

白芷 人參 當歸 芍藥

甘草 蒼朮 各一錢

右水一鍾煎一鍾服臥煖處得汗乃散○或加柴胡

托裏益黃湯 十五 治脾土虛寒水反侮土以致飲食少思或嘔吐泄瀉等證

人參 白朮 茯苓 陳皮

半夏 各一錢 炮薑 丁香 炙甘草 各五分

右薑棗水煎服

托裏清中湯 十六 治脾胃虛弱痰氣不清飲食少思等證

人參 白朮 茯苓 陳皮 各一錢

半夏 八分 桔梗 七分 甘草 五分

右薑棗水煎服

托裏抑青湯 十七 治肝木侮脾脾土虛弱以致飲食少思或

胸膈不利等證

人參 白朮 茯苓 半夏

陳皮 各一錢 芍藥 柴胡 甘草 各五分

右薑棗水煎服

托裏榮衛湯 十八 治瘡瘍外無焮腫內便調和乃邪在經絡也宜用此藥

人參 黃芪 當歸 甘草 炙

紅花 柴胡 連翹 蒼朮 米泔浸炒

羌活 防風 黃芩 各一錢 桂枝 七分

右酒水煎服

托裏越鞠湯 十九 治六鬱所傷脾胃虛弱飲食少思等證

人參 白朮各一錢 陳皮 半夏各一錢

山梔 川芎 香附 蒼朮各七分

炙甘草五分

右薑棗水煎服

定痛托裏散 二十 治瘡瘍血虛疼痛之聖藥也

粟殼去蒂炒二錢 當歸酒拌 白芍藥炒 川芎各一錢半

乳香 沒藥 肉桂各一錢

右薑棗水煎服

內托復煎散 二十一 治瘡瘍腫在外其脈多浮邪勝必侵於內宜用此托之

人參 白朮炒 當歸 黃芪鹽水炒

芍藥炒 茯苓 甘草炙 地骨皮

肉桂 防己酒炒 黃芩各一錢 防風二錢

右先以蒼朮一升水五升煎去朮入藥再煎至二升終日飲之

內托羌活湯 二十二 治臀癰堅硬腫痛兩尺脈緊無力

羌活 黃栢各錢 防風 當歸尾

藁本 肉桂各一錢 連翹 蒼朮米泔浸炒

陳皮各五分 黃芪一錢半鹽水炒

右水酒各一鍾煎八分食前服

內塞散 二十三 治陰虛陽邪湊於患處或潰而不斂或風寒襲於患處血氣不能運行久不能愈遂成漏證

附子童便浸炮 肉桂去皮 赤小豆 炙甘草

黃芪鹽水炒 當歸酒拌 茯苓 白芷

桔梗炒 川芎 人參 遠志去骨

厚朴各一兩制 防風四錢

右為末每服二錢空心溫酒下或酒糊丸鹽湯下或煉蜜為丸亦可

中和湯 二十四 治瘡屬半陰半陽似潰非潰似腫非腫此因元氣虛弱失於補托所致

人參 陳皮各二錢 黃芪 白朮

當歸 白芷各一錢半 茯苓 川芎

皂角刺炒 乳香 沒藥 金銀花

甘草節各一錢

右水酒各半煎服

神效酒煎散 一百五　治一切癰瘍能托毒散毒其效如神

人參　沒藥 另研　當歸尾 各一兩　甘草 一錢

括蔞 一個半 生半炒

右以酒三碗煎二碗分四服○或以爲末酒糊丸桐子大每服五十丸用酒下善消毒活血

人參黃芪湯 一六　治潰瘍飲食少思無睡發熱

人參　白朮　蒼朮　麥冬

陳皮　當歸　升麻 各五分　黃芪 一錢

黃栢 炒四分

右水煎服

黃芪人參湯 一七　治潰瘍虛熱無睡少食或穢氣所觸作痛

黃芪 鹽水炒二錢　人參　白朮　蒼朮 米泔浸炒

當歸 酒拌　麥門冬　五味子 炒碎各一錢　甘草 炙

升麻　神麯 炒　陳皮 各五分　黃栢 酒炒二分

水二鍾薑三片棗一枚煎服

黃芪建中湯 一八　治托癰疽諸毒

黃芪 蜜炙　肉桂 各三兩　甘草 炙二兩　白芍藥 六兩

右每服一兩薑棗水煎服

參朮補脾湯 一九　治肺癰脾氣虧損久欬吐膿或中滿不食必服此藥補脾土以生肺金否則不治

人參　白朮 各二錢　黃芪 二錢半　茯苓

當歸　陳皮 各一錢　麥冬 七分　北五味 四分

桔梗 六分　炙甘草 五分

右薑棗水煎服

參芪補肺湯 二十　治肺證欬喘短氣或腎水不足虛火上炎痰涎壅盛或吐膿血發熱作渴小便短澁

人參　黃芪　白朮　當歸

陳皮　茯苓 各一錢　山藥　山茱萸 各二錢

五味子　炙甘草 各五分　熟地黃 一錢半　麥門冬

牡丹皮 各八分

右薑棗水煎服

益氣養營湯 二一　治懷抱抑鬱或氣血損傷四肢頸項等處患腫不問軟硬赤白腫痛或日晡發熱或潰而不歛

人參　黃芪 鹽水炒　當歸　川芎

熟地　芍藥 炒　貝母　香附

茯苓　陳皮各一錢　白朮二錢　柴胡六分

甘草　桔梗各五分

右薑水煎服○口乾加五味子麥門冬往來寒熱加軟柴胡地骨皮膿清加人參黃芪膿多加川芎當歸膿不止加人參黃芪當歸肌肉遲生加白斂官桂

補陰八珍湯三二　治瘰癧等瘡足三陰虛者

人參　白朮　茯苓　甘草

當歸　川芎　熟地　芍藥

黃柏酒炒　知母酒炒各七分

右水煎服

參朮薑附湯三三　治瘡瘍潰後或誤行汗下或膿血出多失於補托以致上氣喘急自汗盜汗氣短頭暈泄瀉

人參　附子炮去皮臍各一兩　乾薑炮　白朮各五錢

右作二劑水煎服

附子理中湯三四　治瘡瘍脾胃虛寒或誤行攻伐手足厥冷飲食不入或腸鳴腹痛嘔逆吐瀉

附子　人參　白茯苓　白芍藥各三錢

白朮四錢

右水煎服

六物附子湯三五　治四氣流注於足太陰經骨節煩疼四肢拘急自汗短氣小便不利或手足浮腫

附子制　防己　桂枝各四錢　炙甘草二錢

白朮　茯苓各三錢

右作二劑水一鍾半薑三片煎一鍾食遠服

附子八物湯三六　治瘡瘍陽氣脫陷嘔吐畏寒泄瀉厥逆

附子炮　乾薑炮　芍藥炒　人參

炙甘草　茯苓各一錢　肉桂一錢　白朮二錢

右水煎食遠服

四物湯三七　治脾腎虛寒瘡瘍綻陷或潰後元氣不斂痛不腐潰或腹痛泄瀉嘔吐厥逆及陽氣脫陷等證

人參　白朮　黃芪各一錢　乾薑炮

附子炮　甘草炙　陳皮　當歸各二錢

柴胡　升麻各五分

右酒水煎服如不應倍加薑附

薛氏加減八味丸三八　治瘡瘍痊後及將痊口乾渴甚或舌上生黃或未患先渴此皆腎水枯涸不能上潤以致心火上炎

水火不能相濟故煩躁作渴小便頻數或白濁陰痿飲食不多肌膚漸消或腿腫脚先瘦服此以降心火滋腎水則諸證頓止及治口舌生瘡不絕

熟地八兩酒蒸搗膏　山茱萸酒浸杵膏　山藥各四兩　澤瀉蒸焙
白茯苓　牡丹皮各三兩　桂心一兩　北五味四兩半炒

右為細末入二膏加煉蜜少許丸桐子大每服六七十丸五更初言語前或空心用鹽湯送下　此即陳氏加減八味丸也　方在補陣一二三

加味地黃丸一九　治肝腎陰虛瘡瘍或耳內癢痛出水或眼昏痰氣喘嗽或作渴發熱小便赤澁等證

熟地　山藥　山茱萸　白茯苓
澤瀉　牡丹皮　柴胡　北五味各為末等分

右將地黃搗碎酒拌濕蒸爛杵膏入諸藥和勻加煉蜜為丸桐子大每服百丸空心白湯送下如不應用加減八味丸

當歸川芎散四十　治手足少陽經血虛瘡證或風熱耳內癢痛生瘡出水或頭目不清寒熱少食或婦女經水不調胸膈不利脇腹痞痛

當歸　川芎　柴胡　白朮

芍藥各一錢　山梔炒一錢二分　牡丹皮　茯苓各八分
蔓荊子　甘草各五分

右水煎服

加味敗毒散四一　治足三陽經熱毒流於脚根焮赤腫痛寒熱如瘧自汗短氣大小便不利或無汗惡寒表裏邪實者宜之

羌活　獨活　前胡　柴胡
桔梗　人參　茯苓　枳殼
甘草　川芎　大黃　蒼朮各一錢

水二鍾薑三片煎服

九味羌活湯四二　方在散陣四四
治瘡瘍風熱惡寒或頭痛或遍身作痛或拘急不利及頭痛惡寒脊強脉浮緊

加味羌活湯四三　即前湯加金銀花連翹用解瘡毒

白芷胃風湯四四　治手足陽明經氣虛風熱面目麻木或牙關緊急眼目瞤動

白芷　升麻各一錢半　葛根　蒼朮米泔炒各八分

炙甘草　當歸各一錢半　肉豆蔻　黄柏炒
柴胡　藁本　羌活　麻黄去節各四分
蔓荊子　殭蚕各三分
右水煎服
葛根牛蒡湯 四五 治時毒腫痛而便利調和者
葛根　管仲　甘草　豆豉
牛蒡子半生半炒各二錢
右水煎服
犀角地黄湯 四六 治胃火血熱妄行吐衄或大便下血

犀角鎊末　生地　牡丹皮　芍藥各一錢半
黄芩炒　升麻各一錢
右水煎熟入犀角末服
犀角升麻湯 四七 治時毒或風熱頭面腫痛或咽喉不利或鬢疽顋腮等證
犀角鎊　升麻　防風　羌活各錢半
白芷　白附子　黄芩各一錢　甘草六分
右水煎服入犀角末服
玄參升麻湯 四八 治心脾壅熱舌上生瘡或木舌重舌或連頰兩邊腫痛或咽痛發斑並治之
玄參　升麻　赤芍藥　犀角鎊末
桔梗炒　管仲　黄芩各一錢　甘草五分
水二鍾煎八分入犀角末食後服
升麻黄連湯 四九 治胃經熱毒腮腫作痛或發寒熱
升麻　川芎　當歸各一錢半　連翹
黄連　牛蒡子　白芷各一錢
右水煎服○若腫連太陽加羌活連耳後加山梔柴胡
秘傳連翹湯 五十 治癰疽時毒腫痛焮腫

連翹　升麻　樸硝各一兩　玄參
芍藥　白歛　防風　射干各三錢
大黄一兩　甘草炙五錢　杏仁八十個去皮尖同麩炒黄另研
右每服五七錢水煎服下惡物後服內托之類
五香連翹湯 五一 治瘰癧癰疽時毒邪氣鬱滯不行者
乳香　木香　沉香　丁香
香附　黄芪　射干　連翹
升麻　木通　獨活　桑寄生
甘草炙各一錢

右水煎服

復元通氣散 五二 治乳癰便毒腫痛及一切氣滯腫毒或打撲損傷閃跌作痛及疝氣尤效

木香 舶上茴香炒 青皮 陳皮

白芷 甘草 貝母去心 川山甲炙

漏蘆等分 一方有玄胡索白牽牛炒用無白芷漏蘆

右為末每服二三錢溫酒調下

當歸散 五三 通經絡行血滯

當歸 川山甲灰炒 蒲黃炒各半兩 辰砂一錢

麝香少許

右為末每服二錢熱酒調下如不飲酒薄荷醋湯亦可

方脈流氣飲 五四 治瘰癧流注鬱結腫塊或走注疼痛或心胸痞悶咽塞不利脇腹膨脹嘔吐不食上氣喘急欬嗽痰盛面目四肢浮腫大小便秘

當歸 川芎 芍藥炒 茯苓

黃芪炙 炙甘草 紫蘇 青皮

烏藥 半夏制 桔梗炒 枳實麩炒

防風 陳皮各一錢 木香 大腹皮

枳殼麩炒 檳榔各五分

水二鍾薑三片棗一枚煎八分食遠服

瘡科流氣飲 五五 治流注及一切憂怒氣結腫痛或胸膈痞悶或風寒濕毒搏於經絡致成腫塊肉色不變或漫腫木悶無頭

人參 當歸酒拌 黃芪鹽水炒 芍藥

官桂 厚朴制 甘草 防風

紫蘇 枳殼 烏藥 桔梗炒各七分

檳榔 木香 川芎 白芷各五分

右水煎服

陳氏獨聖散 五六 凡患瘡瘍皆因氣血凝滯宜服香劑蓋香能行氣通血也如瘡初作便宜以此入茶飲之

香附子 薑汁浸一宿焙乾研末

右無時以白湯調服二錢○潰後以局方小烏沉湯為尤妙

乳香定痛散 五七 治瘡毒損傷血瘀氣滯腫痛拘攣筋骨疼痛

乳香 沒藥各五分 羌活 五靈脂

獨活各一錢 川芎 當歸 真綠豆粉

肉桂　白芷　白膠香各半兩

右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸細嚼薄荷湯或酒送下

手足損痛不能舉動加草烏五錢鹽湯送下

消毒散五八　治乳癰吹乳乳便毒如憎寒壯熱或頭痛者宜先服人參敗毒散一二劑方可服此藥如無前證即服此藥三二劑或膿不消宜服托裏散

金銀花　青皮　天花粉　柴胡

殭蠶炒　貝母　當歸酒拌　白芷各二錢

水二鍾煎一鍾食遠服如治便毒加大黃一二錢煨用空心

服

清熱消毒散五九　治一切癰疽陽證腫痛發熱作渴

黃連炒　山梔炒　連翹炒　當歸

甘草各一錢　川芎　芍藥　生地各一錢半

金銀花二錢

右水煎服

東垣黃連消毒散六十　治腦疽背疽焮腫疼痛或麻木

黃芪炒　羌活各一分　黃芩　黃柏

桔梗　藁本　防己各五分　歸尾

連翹　防風　獨活　知母炒

生地各四分　人參　甘草各一分　黃芪

蘇木　陳皮　澤瀉各一分

右水煎服

連翹消毒散六一　治癰疽實熱諸證〇亦名清涼飲亦即局方涼膈散

連翹一兩　梔子　大黃　薄荷葉

黃芩各五錢　甘草一兩半　朴硝半錢

右每服一兩水煎溫服

加味解毒湯六二　治癰疽實熱大痛不止

黃芪鹽水炒　黃連炒　黃芩炒　黃柏炒

連翹　當歸酒拌各七分　甘草炙　白芍藥

梔子炒各一錢

水二鍾煎服痛即止

解毒防風湯六三　治斑疹或痒或痛

防風一錢　黃芪　芍藥　地骨皮

枳殼炒　荊芥各二錢

水煎徐徐服

陳氏解毒防風湯 六四　方在痘疹五六

治痘疹毒氣熾盛

散腫潰堅湯 六五　治瘰癧堅硬氣血無虧宜用之

柴胡　黄芩各四分　白芍藥炒　升麻

連翹　黄柏酒炒　蓬术　三稜酒拌微炒

乾葛　歸尾各三分　知母酒炒　龍膽草酒炒

天花粉　桔梗　昆布各五分　炙甘草二分

右水煎服

瓜蔞托裏散 六六　治瘡瘍毒盛者未成則易消已成則易潰

既潰則生肌

黄瓜蔞一個杵碎　忍冬藤　乳香各一兩　蘇木五錢

沒藥三錢　甘草二錢

右用酒三碗煎二碗空心日午臨睡分三服○或以此爲末酒糊丸彈子大硃砂爲衣細嚼用當歸酒送下治打撲損傷尤妙

萬全散 六七　一名内托散○治癰疽已潰未潰者消毒破血之功

括蔞一個杵碎　沒藥一錢研　大甘草節一錢

右用酒二碗煎一碗去柤後入沒藥服

製甘草湯 六八　治懸癰不拘腫潰亦消惟症

用大甘草一兩切三寸長用澗水一碗浸透以慢火炙乾仍投前水浸透再炙至水乾爲度剉細用無灰酒二鍾煎七分空心服曾有人患此已破服兩劑瘡即合○一國老膏方用大甘草二斤以河水浸取濃汁去柤用銀石器熬成膏磁罐收貯每服一二匙酒調服或水亦可尤解丹藥之毒○一方治癰疽用生甘草爲末酒調服二錢連進數服自消

梅花飲子 六九　癰疽初起服之可防毒氣內攻

川芎　乾葛　天花粉　黄芪

烏梅　甘草　蘇木各一兩　忍冬藤四兩

右作四劑水煎服

牛膠散 七十　治癰疽使毒不內攻不傳惡證有益無損

牛皮膠廣中明者四兩

右用酒一碗重湯蒸化加酒服不能飲者加白湯

明膠飲子 七一　治一切癰疽瘡癤毒

明膠蛤粉炒　甘草各一兩　橘紅五錢

右作三劑水煎服

護心散 七二　解金石砒硫發疽之毒

綠豆末 一兩　明乳香 半兩研細

右以生甘草煎湯調時時與呷務使藥常在膈間

清心內固金粉散 七三　一名金花散○解毒清心流行氣血散滯清火凡焮腫熱痛飲食如常者大宜用之

綠豆 四兩研末　硃砂 另研　人參　甘草

白茯苓 各三錢　朴硝 另研　白豆蔻 各五分　麝香 另研

雄黃 各一錢　冰片 五分

右為末每服一二錢蜜湯調下

蠟礬丸 七四　一名黃礬丸○治金石發疽一切癰疽托裏止疼痛護臟腑神妙不問老少皆可服之

黃蠟 一兩黃色佳者溶開離火入礬末○一方止用七錢

白礬 一兩明亮淨者研末

右二味和勻衆手急丸桐子大每服二三十丸漸加至四五十丸熟水或鹽湯送下日進二三服服至三四兩之上愈見其功矣○如服金石發疽別用白礬末一兩作三五服溫酒調下尤效、一人遍身生瘡狀如蛇頭名曰蛇頭瘡尤宜服之○治蛇蠍毒蟲咬傷溶化熱涂傷處痛止毒出仍服兩許○此方不惟止痛生肌而已其護膜止瀉消毒化膿及內癰拔膿托裏之功甚大

千金化毒丸 七五　治諸惡毒

用白礬三錢糊丸以葱頭七莖煎湯送下則腫痛俱退再用仙方活命飲二劑以去其餘毒此本方原用礬末以葱湯調服因湯難服故易為丸○一方士治瘡疽不問腫潰先用此藥二三服後用消毒藥甚效常治瘡瘍之人用此即退不用托裏藥亦愈若金石毒藥發疽者尤效蓋礬能解金石之毒

也○一方用礬末五錢硃砂五分熱酒下亦效此藥托裏固內止瀉解毒排膿不動臟腑不傷氣血有益無損其藥易得其功甚大偏僻之處不可不知此方或蟲咬所傷溶化熱塗患處更以熱酒調末服皆效

五福化毒丹 七六　治咽喉牙口瘡毒腫痛並小兒一切熱毒瘡痛驚惕煩躁口舌生瘡夜臥不寧等證

玄參　桔梗 各二兩半　茯苓 二兩半　人參

牙硝　青黛 各一兩　甘草 七錢半　麝香 少許

金箔 二十片

右爲末，煉蜜丸，芡實大，每服一丸，薄荷湯化下。○若瘡毒上攻，口齒生瘡，以生地黃汁化服，及用鷄翎掃付患處。

奪命丹 七七　治疔瘡發背等證，或麻木，或嘔吐，重者昏憒。此藥服之，不起者即起，不痛者即痛，痛甚者即止，昏憒者即甦，嘔吐者即解，未成者即消，已成者即潰，有奪命之功，乃惡證中之至寶也。

蟾酥 酒化　輕粉　麝香 各五分　枯礬
寒水石 煅　銅綠　乳香　沒藥 各一錢
硃砂 二錢　蝸牛 二十個，另研，無亦可

右爲末，用蝸牛或酒糊搗丸，綠豆大，每服一二丸，溫酒或葱湯下。或用葱白三四寸，病者自嚼爛，吐於手心，包藥在內，用熱酒和葱送下，如人行五七里，汗出爲效，重者再服一二丸。或外用一丸，入瘡孔內，以膏藥貼之。

飛龍奪命丹 七八　治一切疔瘡惡毒，瘡出汗則愈，神效。

乾蟾酥 二錢，乳化　沒藥　硼砂　寒水石 煅
雄黃 各二錢　乳香　硃砂　血竭 嚼成餅
枯礬 各一錢　輕粉　冰片 各五分　蜈蚣 一條去頭，酒浸焙乾
蝸牛 以上九件研爲

右各研爲細末，取蝸牛、蟾酥研勻，入諸末，就搗丸綠豆大，硃砂爲衣，每服四五丸，嚼葱白一口，吐在手心，將藥包葱內，用溫酒吞下，須臾汗出，或少吐瀉即解。

立齋曰：前回生丹乃慓悍攻毒之劑也，蓋無經不至，無氣不動者。後奪命丹尚緩，若食一切禽畜毒物，及瘡脉浮緊細數，毒畜在內，並惡毒證，凡宜汗吐者，當用前丹，有神效。若老弱之人，或瘡毒稍輕者，宜用後丹，或更以隔蒜灸之爲良。

回生丹 七九　李願顏先生口授，非泛常之藥，萬寶之一秘，專治一切疔毒，並有神效。

金腳信　明硇砂　明乳香　半夏
上紅丹 各五分　巴豆肉 不去油　明雄黃　大南星
南硼砂 各一錢　大斑貓 十五個，去頭足翅

右爲細末，旋取蟾酥和丸，麻子大，硃砂爲衣，每服十五丸，好酒下。看瘡生上下，食前後服，能飲者令醉爲佳。凡腫毒失治，毒氣入腹，用此藥能起死回生，服藥後吐瀉俱作乃甦。

通氣散 八十　治時毒腫甚，咽喉不利，取嚏以泄其毒。

玄參 一錢半　牙皂　川芎 各一錢　藜蘆 五分，一方無此
羊躑躅花 二錢半

右為末用紙撚蘸少許入鼻內取嚏為度○按此方止用皂角川芎北細辛三味即可亦不必藜蘆躑躅之毒品也總不若通關散為妙方在肉部九十八

梔子仁湯八一　方在莫部十九

治發熱狂躁咽喉腫痛

六味梔子仁湯八二　治時毒腫痛大便秘結脈沉數

山梔炒　枳殼　大黃煨　升麻

牛蒡子炒　鬱金等分

右水煎服或為細末每服三錢蜜水調下

清肝益營湯八三　治肝膽小腸經風熱血燥筋攣結核或耳項胸乳脇肋作痛並一切肝火之證

山梔　當歸　木瓜不犯鐵　茯苓各一錢

柴胡　芍藥炒　川芎各七分　龍膽草八分

白朮一錢　熟地一錢半　炙甘草五分

右薑水煎服

清心湯八四　治瘡瘍腫痛發熱飲冷脈沉實睡語不寧右方即防風通聖散每料加黃連五錢每劑用一兩水煎服方在攻部十六

濟陰湯八五　治瘡瘍純陽腫痛發熱

連翹二錢　山梔炒　黃芩炒　黃連炒

甘草各一錢　芍藥一錢　牡丹皮一錢　金銀花一錢

水煎服○大便若秘加大黃一錢

地骨皮散八六　治瘡瘍氣虛內熱煩渴不寧

人參　黃芪　生地黃　地骨皮

柴胡各一錢半　白茯苓　石膏煅　知母各一錢

水薑煎服

一味苦參丸八七　治一切瘡瘍發熱作痛或煩躁

苦參不拘多少為末

右用水糊丸桐子大每服二錢溫酒下

除濕苦參丸八八　治遍身濕疥疙瘩

苦參四兩　玄參　黃連　大黃

獨活　枳殼　防風各二兩　黃芩

梔子　菊花各一兩

右為末煉蜜丸梧子大食後茶酒任下四十丸日二服

五利大黃湯八九　治時毒焮腫赤痛煩渴便秘脈實而數

大黃煨　黃芩　升麻各二錢　芒硝

梔子各一錢半

水一鍾半煎六分空心熱服

清涼飲九十　治癰瘍熱毒焮盛大便秘結○此即前連翹消毒散

連翹一兩　大黃　山梔子　薄荷

黃芩各五錢　甘草半兩　朴硝二錢半

右每服一兩水煎服

宣毒散九一　治一切癰毒其功不可盡述

大黃煨　白芷各五錢

水二鍾煎一鍾食前服

立齋曰此方乃宣通攻毒之劑若脉沉實便秘者毒在臟也宜服之其功甚大若臟腑調和脉不實者不可用薛林集要方用大黃一斤白芷六兩為末每服三錢熱酒調下更用茶清調搽患處名曰萬金散蓋因其功而珍之也或用水跌為丸以便於服亦可吳江申僉憲兄患背疽堅硬脉沉實乃毒在內用一服大小便下污物再服而消恐患者忽此一藥故以此嘗驗者告之

拔毒散九二　治一切癰疽腫毒其功不可盡述

乳香　沒藥　當歸　川山甲炮

木鱉子　連翹各一錢　甘草炙五分　瓜蔞仁八分

牙皂炒　貝母各七分　忍冬藤二錢　大黃生熟各一錢半

右水酒各一鍾煎一鍾食前服○此方攻毒止痛化膿之良劑也屢用屢驗若膿成或已潰者大黃可不用恐泄其真氣則膿者難潰潰者難斂也亦有膿雖潰脉仍洪數或沉實者泠者火邪尚在又所宜用

內疏黃連湯九三　治瘡瘍發熱而嘔大便秘結脉洪而實

黃連　芍藥　當歸　檳榔

木香　黃芩　梔子　薄荷

桔梗　甘草各一錢　連翹　大黃各一錢半

暫水煎仍量虛實治之

桃仁湯九四　逐瘀血

桃仁　蘇木各一兩　生地黃五錢　虻蟲去足翅炒

水蛭炒各三十個

右每服三錢水一盞煎六分空心服

瀉心湯九五　治臍痛疳瘡盛實者

黃芩　黃芪　甘草　連翹

沉香各五錢　大黃一兩微炒

右每服四五錢薑棗水煎服

千金漏蘆湯九六　治癰疽發背丹瘮疔腫熱毒赤腫焮痛

漏蘆　黃芩　白斂　連翹

枳殼麩炒　升麻　粉草　麻黃去節

大黃酒拌蒸煨　朴硝各一兩

右每服五六錢薑水煎去柤空心服下惡物為妙

漏蘆升麻湯九七　治時毒頭面紅腫咽嗌堵塞水藥不下若

臟腑素有積熱發為腫毒疙瘩一切紅腫惡毒

漏蘆二錢　升麻半錢　黃芩酒洗　生甘草

玄參　牛旁子炒研　苦梗　連翹各一錢

藍葉青黛代　加減用大黃酒煨量輕重用之

水煎服大利之結者加芒硝

潤腸丸九八　治脾胃伏火大腸乾燥或風熱血結宜用此丸

通之若結在直腸宜用豬膽汁導之蓋腎主五液開竅於二

陰若津液滋潤則大便通調若津液不足脾氣虧損必當培

補乃愈此藥

桃仁去皮尖　麻子仁各一兩　羌活　歸尾

大黃煨　皂刺　秦艽各五錢

右各另研為末煉蜜或豬膽汁丸桐子大每服二四十丸白

湯下若用豬膽汁導而糞不結燥者須參芪補元氣

沒藥丸九九　善逐瘀血

當歸一兩　桂心　芍藥各半兩　桃仁去皮尖研

沒藥各三錢　虻蟲去足翅　水蛭炒各十個

右為末醋糊丸桐子大每服三五丸空心醋湯下

當歸丸百　行血利水通大便

當歸半兩　大黃　桂心各三錢　赤芍藥

葶藶各一錢　人參　甘遂麪裹煨半錢

煉蜜丸如彈子大空心米飲化下一丸

破棺丹百一　治瘡瘍熱極汗多大渴便秘譫語發狂

大黃二兩半生半熟　芒硝　甘草各二兩

右為末煉蜜丸彈子大每服一丸童便研化下白湯亦可

忍冬酒百二　解諸癰毒

忍冬藤鮮者四五兩若乾者止用一兩搗

大甘草節一兩生用

二味入砂鍋內以水二鍾煎至一鍾再入無灰酒一鍾又煎

數沸去柤分三服病重者晝夜兩劑至大小便通利爲度另
用忍冬藤研爛入酒少許敷患處

金銀花酒 百三 治一切癰疽發背疔瘡喉痺等證

用金銀花藤葉搗爛取汁半鍾和熱酒半鍾温服甚者不過
三五服可保無虞

槐花酒 百四 治癰瘍熱毒并發痧

用槐花四五兩炒微黃乘熱入酒二鍾煎十餘滚去柤熱服
未成者二三服已成者一二服但察其有熱毒未潰者皆可
用槐花治濕熱之功最爲神速惟胃寒者不宜服大抵肺癰

并用蒜灸及槐花酒先去其勢雖用托裏諸藥其效未必甚
速

蒲公英酒 百五 治乳癰吹乳不問已成未成皆可用

用蒲公英一握搗爛入酒半鍾取酒温服柤貼患處甚者不
過二三服即愈

遠志酒 百六 能托散諸瘡治女人乳癰尤效

遠志 不拘多少用米泔浸洗搥去心

右爲末每服三錢用好酒一鍾調澄少頃飲之以滓付
患處

牛膝酒 百七 治楊梅風毒疼痛

牛膝 川芎 羌活 五加皮
杜仲 甘草 地骨皮 薏仁各一兩
生地黃十兩 海桐皮二兩

右㕮咀用帛裹入無灰酒浸二七日夏月三五日每服一盃
日三五次

消癭酒 百八

昆布二錢 海藻五錢 沉香 雄黃各一錢研末
海螵蛸二錢

右爲咀用好酒一升湯煮任意每服一二鍾或浸十餘日亦
可飲

桑枝煎 百九 大治口渴

取嫩桑枝細切一升炒以水三升煎一升日服三五劑更多
尤妙抱樸子云療風痒乾燥脚氣四肢拘攣上氣眩暈
久服補肺消食利小便輕身耳目聰明令人光澤其功不能
盡述

神仙飲法 百十 治癰疽發背一切惡瘡預服則毒氣不入內

綠豆粉 一斤銀器內熬十沸候冷

右用酒兩碗入油五盞通口熱服一日用盡後則數日服之
〇吳安世云吾家三世用之無有不效又聞俶者云凡中藥
箭急飲麻油藥毒即消屢用甚驗〇按右方凡大便秘結而
毒蓄於內者最宜用之以疏通其毒若陰毒及大便不實者
乃非所宜

砭法 百一十一

治丹毒疔瘡紅絲走散或時毒瘀血壅盛用細磁器擊碎取
有鋒鋩者一塊以箸一根劈開頭尖夾之用線縛定兩手指
輕撮箸尾令磁鋩正對患處約懸寸許再另用箸一根頻擊
箸頭令毒血遇刺皆出毒自消退若毒氣入腹膨脹者難治

刺少商穴 百十二　治咽喉急痛

穴在手大指內側去爪甲角如韭葉刺入二分許以手自臂
勒至刺處出血即消若重而膿成者必須針患處否則難治

以水佃蛭鍼法 百十三　凡癰腫勢熾毒盛血凝不散者宜用
此法以殺其勢

治癰初作先以筆管一筒入大螞蝗一條以管口對瘡頭使
蜞吮惡血得去其毒即散如瘡大須換三四條若吮正穴蜞
必死矣屢試屢效若血不止以藕節上泥塗之即止若瘡頭
末明以井邊泥塗上先乾處即是

騎竹馬灸法 百十四　治一切瘡瘍無有不愈

其法令病人以手肘凭几而坐男左女右將手臂竪起要直
乃用竹篾一條自臂腕中曲處横紋間量起貼肉直上至中
指尖盡處截斷為則不量指甲乃用竹扛一條令病人脫衣
正身騎定前後用兩人扛起令病者脚不着地又令二人扶定
勿令僵仆將前所量臂篾從竹扛上尾骶骨坐處直貼脊背
量至篾盡處點記之此取中之處非灸穴也又用薄篾量男左
女右手中指節兩横紋處截為同身寸法將此寸篾於前所

脊中點記處兩邊各開一寸盡處即是灸穴各灸五七壯疽
發於左則灸右疽發於右則灸左兩邊俱甚則左右皆灸蓋
此穴乃心脈所過之處凡癰疽皆心火之留滯灸此則心火
流通而毒自散矣有起死回生之功屢試屢驗

神仙隔蒜灸法 百十五　治一切癰疽瘡毒大痛或不痛或麻
木及治癰疔毒氣熾盛使諸瘡不能起發已起發者不能潰
膿已潰膿者不能收斂等證如痛者灸至不痛不痛者灸至
痛其毒隨火而散此攻散鬱毒從治之法也大有回生之功
其法用大蒜頭去皮切三分厚安瘡頂上用艾壯於蒜上灸

之五壯換蒜復灸或三五十壯或一二百壯愈多愈妙未成者即消已成者亦殺其大勢不能爲害如瘡大用蒜搗爛攤患處將艾鋪上燒之蒜敗再換或陰毒紫白色不起發不痛不作膿者尤宜多灸仍服托裏之劑如灸後仍不痛或不作膿不起發者不治此氣血虛極也

附子餅 百十六 治潰瘍氣血俱虛不能收斂或風寒襲之以致血氣不能運行皆令不斂用炮附子去皮臍研末以唾津和爲餅置瘡口上將艾壯於餅上灸之每日灸數壯但令微熱勿令痛如餅乾再用唾津調和務以瘡口活潤爲度

豆豉餅 百十七 治瘡瘍腫毒硬而不潰及潰而不斂並一切頑瘡惡瘡用江西豆豉餅爲末唾津和作餅子如錢大厚如三文錢置患處以艾壯於餅上灸之乾則再易如灸背瘡用漱口水調餅覆患處以艾鋪餅上灸之如未成者即消已成者亦殺其大毒如有不效必氣血虛敗也

木香餅 百十八 治一切氣滯結腫或痛或閃肭及風寒所傷作痛並效

木香 五錢 生地黃 一兩

右以木香爲末生地黃杵膏和勻量患處大小作餅置腫處以熱熨斗熨之

香附餅 百十九 治瘰癧流注腫塊或風寒襲於經絡結腫或痛

用香附爲末酒和量瘡毒大小作餅覆患處以熱熨斗熨之未成者內消已成者自潰若風寒濕毒宜用薑汁作餅

桑枝灸 百二十

治發背不起或瘀肉不潰此陽氣虛弱用桑枝燃着吹熄其焰用火灸患處片時日三五次以助肚潰若腐肉已去新肉生遲宜灸四畔其陰瘡瘰癧流注臁瘡惡瘡久不愈者亦宜

用之大抵此法未潰則解熱毒止疼痛消瘀腫已潰則補陽氣散餘毒生肌肉若陽證腫痛甚或重如負石初起用此法出毒水即內消其日久者用之雖潰亦淺且無苦楚惜患者不知有此治者亦不肯用此也

神效熨法 一二一 治流注結核骨疽鶴膝或漫腫塊或痛或不痛或風寒襲於經絡流注肢體筋攣骨痛或跌撲損傷止痛散血消腫之良法或先用隔蒜灸法而餘腫未消最宜用熨以助氣血而行壅滯其功甚大用葱頭細切杵爛炒熱敷患處冷即易之再或熱熨數次肿痛即止其效如神〇或

用葱煎湯蘸洗瘡處亦妙○或用葱一大把束其數節切為
薄餅置患處用熱物熨之○或鋪艾灸之亦可必易餅多熨為
妙

黃照方 一二三

雄黃　硃砂　血竭　沒藥各一錢

麝　分

右五味研細末用綿紙捲為粗撚約長尺許每撚中入藥三
分裹定以真麻油潤透點灼瘡上須離瘡半寸許自紅暈外
圈周圍徐徐照之以漸將撚收入瘡口上所謂自外而內也
更須將撚猛向外提以引毒氣此是手法此藥氣從火頭上
出內透瘡中則毒隨氣散自不內侵臟腑初用三條漸加至
五七條瘡勢漸消可漸減之蒸照後用後敷藥

廣陵李杜云背瘡所患惟內攻與外潰耳證屬火發腫脹斯
成不能外散勢必內攻不能中出勢必傍潰醫者往往以涼
藥圍箍多罹此患又陰瘡不起發者止有隔蒜灸一法然
亦未見緊要效此方初用藥撚蘸照以火引火毒氣外散
後用藥敷圍追膿止痛亦從孔竅及瘡頂中出可免傷潰矣
余行此照法但用此藥餅發傷證可保無虞此其奇

中大畧也照法日每一次初次用撚三根或四根次日用四
根或五根再次漸至六七根止大率看瘡輕重酌撚多寡重
者不過六七日腐肉盡化為膿從瘡口中陸續湧出新肉如
石榴子點點而生此時不必再照過照終始如一隨瘡勢大
小漸漸收入照罷後不可驟然用膏藥貼蓋以致毒氣悶鬱
止割葱藥葉蓋瘡口貼之凡照時先須用豬蹄煎湯登時洗去
圍藥如法薰照待瘡勢大愈肉生將滿始可用生肌散或護
以太乙膏不復後膏藥猶不可離此其始末細微也內服者
大要不出十宣散護心散等方最忌寒涼恐傷胃氣此瘡由
憤怒鬱結厚味所致發病以年計愈久則愈甚也調攝之法
非懲忿窒慾消散托裏治以前方即瘡痂復生有望而走耳
又前方初止治背疽其後一切腫毒無不收功蓋法無定則
神而變通神而明之存乎其人耳余不佞善術故留心方術
然未經累驗不敢授人此一方初驗於化南再驗於陳大參
景山及范中翰令初其他證亦嘗用以推廣皆應手取效輒
贊其奇於此其傳則道人孫氏今大播廣陵余先悉賴以保
安者廿年云

池陽宋陽伯云于李杜昃由為余言廣陵人有善神燈照者

瘡藥發背稍艮已求得其方矣余識之已酉歲余客廣陵
偶於膝比上發得所謂岳瘡者見之不勝丹愈又治友胡介
素患發背大如覆盂亦潰爛貴矣延醫治今以上分肉腐爛
方可用背發長肌勾問其術曰在此問其效曰百日果如其
說即令素將成局有矣遂託同弟輩求得前方刻本按法治
之一日痛止二三日神清如脫桎梏釋重負肉腫如盂者日
縮而小並未嘗腐爛也不月餘膿盡爽然起矣奇矣哉不表
而汗不針而潰不灸而陷樂不補而實不下而毒盡凡醫人
之針刺不必用也至理歸於易簡大道本在目前所謂不可

不思議者也古今道術入妙者皆如此類茲重刻之故為此
敘

曲梁孫雲翰云戊戌春轉余病疽京邸疽發背中前與心對
初發微若黍粒搔之痛非常心煩熱交作甫十日大若升再
十日大若斗食飲便結匝月日不一嚥醫方所載無死候案
已十犯八九兩絕復甦自分無生乎倏夜中偶從楊楚璞得
李倩所傳異人指授仙方如法薰敷起一日夜痛減有
起色不易方而竟瘥於斯初發決其勿歸家此以試人輒俾
踰月再亦不出自日暮不起者蓋余所感瘡極重甚極大又

治極遲內二十內外皆名醫皆束手失色以為從所不聞未
見及試人則收驗更捷甚者有輕重而有遲速無不應驗此
異方不能起余必死矣若非今之起死回生不能得此方之神
異余以此方活安恐天下人以此證危因處此方貞後廣佈
於天下又慮天下人想此方而不加篤信或亂於取効不已
出之醫口疑似轉盼間致悞大事而悔無及也因贅數語以
為此方之引

咸林王維英云丙午端陽日余左臂患疽其大如拳用騎竹
馬法灸之百十壯疱起如銅錢四圍腫覺退當中蓄此仙方

命製藥料欲俟破後敷之不識其初亦可薰也遂有傳言可
薰者因於當日即薰十條瘡頂高收四圍色白後偶爲內從
邊化為稠膿徐徐內潰稍同膠飴每日如法薰照洗患五六
日中央破爛落一條共有十三孔瘡外指許傍串三孔
且痛且痒即極力照之初出黃水次出稠膿後流清漿瘡息
日夜漸未見出其腐肉敗黃及次日不痒用蓋龍
止用金銀花三色收之乾則乾痂剝去之不數日未用生肌
散惟撲以火乙作月餘毒皆收盡左臂又患一疽正
對無二日照至十條數以熱熨之開調又蜂精一日數更次日

五條二日頂破膿出不痛不腫其毒盡散可昨有患者余每
余付此藥熏之隨氣即散可未成形難知是方也真仙方哉
真仙方哉持此療瘡天下無遺於毒矣余恐世人但知瘡破後可
照不識照初發者尤易散人恐因敷藥不全速安前力不識
敷藥不用亦可也故併述紀始以刪此方之用

洗藥神效散 一二三 洗陰蝕諸瘡

蛇床子二兩 朴硝一兩

右剉用一兩水二碗煎數沸洗淨拭乾搽生肌藥

雄黃解毒散 一二四 治一切癰腫潰爛毒勢甚者先用此藥二三次以後用猪蹄湯

雄黃一兩 白礬四兩 寒水石一兩半 煅

右俱為末用滾湯二三碗乘熱入藥末一兩洗患處以太乙膏或神異膏貼之

猪蹄湯 一二五 治一切癰疽杖瘡潰爛去惡肉潤瘡口止痛

白芷 黃芩 當歸 赤芍藥

獨活 生甘草 露蜂房各五錢 連子者佳

用猪蹄一隻水四五碗煮熟去油粗取清湯入前藥一兩許煎十數沸去粗溫洗惡肉隨洗而下隨用膏藥貼之○按此湯不必用黃芩或以白芷易之更佳

集香散 一二六 洗瘀血潰爛

白芷 藿香 茅香 香附

防風各三錢 木香 甘草各一錢

右用水三碗煎數沸去粗淋洗患處

立齋曰此乃芳香之劑也血氣聞香則行得臭則逆也凡瘡毒將盡未盡宜用之若有瘀肉宜先用雄黃解毒散解之後用此方洗後須即用膏藥貼護勿使風入則肉易生直至收口為度最忌用生肌之藥

敷藥方 一二七

車前草 豨薟草 金銀花 五爪龍草

右四味鮮草一處搗爛加多年陳米粉即常用糨衣者初起時仍加飛鹽少許共調稀糊敷瘡上中留一頂按膿出若冬月無鮮者用乾葉為末陳醋調敷亦可或五葉草一時難得即單用四味亦能奏功不必拘執也○陽伯曰瘡毒初起勢盛者須內服敗毒藥數劑其有氣血虛弱者亦須用托裏藥數劑則萬全之計耳

秘傳圍藥鐵井欄 一二八 敷一切惡毒即收斂結腫神效

牛糞灰晒乾燒灰用新磁罐盛之乾處加倍用

鐵線草 草烏 文蛤 白芨

白斂 貝母心 陳小粉炒極黃色各等分

右為末用高醋熬熱調塗如糊敷貼四圍中留錢孔以出毒氣乾則易之瘡勢盛者用飛龍奪命丹等藥出汗無不效

大黃揭毒散 一二八 敷熱癰腫毒

大黃半兩 白芨一兩 朴硝二兩

右為末井水調搽乾則潤之

草烏揭毒散 百三十 治一切癰疽腫毒

草烏 貝母 天花粉 南星

芙蓉葉等分

右為末用醋調搽四圍中留頭出毒如乾用醋潤之

抑陰散 一三一 治瘡瘍元氣虛寒腫不消或不潰斂或筋攣骨痛一切冷證

草烏一兩 南星煨 赤芍藥炒 白芷各一兩

肉桂五錢

右為末葱湯調塗熱酒亦可

抑陽散 一三二 一名洪寶丹○治瘡屬純陽腫痛發熱

天花粉三兩 薑黃 白芷 赤芍藥各一兩

右為末茶湯調搽患處

陰陽散 一三三 治瘡屬半陰半陽

紫荆皮五兩炒 獨活去節炒一兩 赤芍藥炒 白芷

石菖蒲各二兩

右為末葱酒調搽

神功散 一三四 諸發背癰疽及諸瘡不問腫潰皆效

黃栢炒 草烏炒各一兩

右為末用漱口水調入香油少許搽患處如乾仍用水潤之

清涼救苦散 一三五 治大頭瘟腫甚者以此藥敷之

芙蓉葉 霜桑葉 白斂 白芨

大黃 黃連 黃芩 黃栢

白芷 雄黃 芒硝 山慈菇

赤小豆 南星 金線重樓

右等分為末蜜水調敷腫處以翎頻掃之

二黃散 一三六 敷一切腫毒熱浮在外或時氣熱壅者

黃栢 大黃各等分

右為末用醋調搽如乾用水潤之

迴陽玉龍膏 一三七 治陰疔發背冷流注風濕冷痺諸腳
氣冷痛無紅赤者及跌撲所傷爲敷涼藥或人元氣虛寒腫
不消散或不潰斂及瘡腫堅硬肉色不變久而不潰潰而不
斂或鼓搥風筋攣骨痛一切陰寒冷證第一藥也

草烏 肉桂各五錢 薑黃炒 南星煨

白芷 赤芍藥炒各一兩

右爲末葱湯或熱酒調塗

冲和膏 一三八 治一切瘡腫不甚焮熱積日不消

紫荊皮炒五兩 獨活去節炒三兩 赤芍藥炒二兩 白芷

菖蒲各一兩

右爲末葱頭煎湯調搽

麥飯石膏 一三九 治癰疽初起先以麥飯石膏塗之後瘡根
漸收即敷神異膏斂之但麥飯石膏難於修合用神異膏亦
效

白麥飯石 炭火煆醋淬數次研極細二兩○按本草所
載凡石如飯團粒粒和糯成塊者即是皆可用也

鹿角 生取帶腦骨者斷之用炭火燒烟盡研極細四兩

右用米醋調和入砂器內以竹片不住手攪熬成膏先用猪

蹄湯洗患處以鵝翎拂於四圍乾則以醋潤之若腐爛者用
布帛攤貼之○李氏曰麥飯石膏治發背瘡神效倘世罕
知有患癤不潰而危者全用此膏久須潰凡疔得膿其毒
始解或有不潰者須用此膏故錄之○錦精擇修合以取十全
之功 嘗見世間醫者每有妙方秘而不傳或更改以惑人
誠可惡也余思丙華麥飯石膏守死不傳其立心私刻君子
鄙之矣

黑末子 一四〇 治痈毒

用羊角連內骨燒存性爲末酒調二錢分上下服之瘡可散

○立齋曰此方未嘗用蓋秘方也嘗治面上或身卒得赤斑
或痒或瘭子起而不治亦乃殺人以羖羊角燒存性研爲極
細末以雞子清調塗之其效本草亦云然

乳香定痛散 一四一 治瘡瘍潰爛疼痛不可忍諸藥不效者

乳香 沒藥各二錢 寒水石煅 滑石各四錢

冰片一分

爲細末搽敷患處痛即止此方乳沒性溫佐以寒劑制之故
寒熱之痛皆妙

烏金膏 一四二

治發背中央肉死塗之即腐未死塗之即生若初起只用點數處則解毒頓消若瘀肉腐黑塗之即潰若瘀腐頑瘡元氣無虧久不收斂者內有毒根以紙撚蘸紙其內有等發背因元氣虛弱或因克伐元氣虧損毒氣散漫中黯外赤不腐不潰須服大補之劑中塗三四寸許至五六日間赤黯之界自有裂紋如刀劃之狀中央漸潰漸脫內用純陽之藥以接其元氣庶能收斂若妄用刀鍼去肉出血則陽隨陰散元氣愈傷或塗涼藥則毒氣不解氣血愈虛并後無益通以苦之矣○其方用巴豆去殼炒黑研為膏點腫處或塗瘀肉上則自消化或加乳香少許亦可如塗瘡內或加香油少許調稀可用若餘毒不斂者以此抵之不致成漏

透骨丹 一四三　此潰膿藥外科不可缺

蟾酥　硼砂　輕粉　巴豆各五錢

蝸牛二箇　麝香一分

右先將巴豆研如泥次入蝸牛麝香再研後入各藥研極細以小磁瓶收藏每用少許以乳汁化開先用鐵鋒輕輕撥破毒頭挑藥米許納於瘡口外用清涼膏貼之

鍼頭散 一四四　治一切頑瘡內有膿管瘀肉或瘰癧結核不化瘡口不合宜此藥追蝕腐之

赤石脂五錢　輕粉　麝香各五分　乳香

白丁香各三錢　生砒　黃丹各錢　蜈蚣一條炙乾

右為末搽瘀肉上其肉自化若瘡口小或痔瘡用糯米糊和作細條陰乾紝入外以膏藥貼之凡瘡口久不合者內有膿管必須用此腐之內服托裏之藥

代鍼膏 一四五　治瘡瘍膿熟不潰

乳香二分　白丁香直者　巴豆炒焦　鹼各五分

右為末熱水調點瘡頭上常以鹼水潤之勿令其乾

替鍼丸 一四六　治膿成不潰者

白丁香　硇砂另研　真沒藥　乳香各錢

糯米四十粒先以礦灰拳大一塊置磁碗內量入井水待熱氣將息以米排入灰中良久候米如水晶狀取出用之如米未就再用灰製

右各另為末然後和勻收貯用時以飯丸麥粒大每用一粒水濕粘瘡頭上其膿自出○凡瘡瘍血氣壯實膿成不潰者宜用此藥以洩其毒則肌肉易生瘡口易斂若氣血虧損者須用甘溫之劑以培根本否則不惟不潰且難收斂若附骨

斑及緊要之地當及時針使出之為善

三合散 一四七　治癰疽不潰作膿

新巴豆肉　明礬　班貓 等分

右為細末糝瘡內惡肉自化

立齋曰此方藥性大毒果有惡毒之證宜用糝之取其以毒攻毒也若以陽氣虛不能腐化成膿者宜用大補之劑及桑木炙之丹溪云氣血壯實膿自湧出大抵瘡之潰斂遲速總由血氣之盛衰使然也

蒺藜膏 一四八

治一切瘡疽胬肉突出不問大小長短用蒺藜一味為末以生豬脂和研如膏塗患處周日易之

生肌散 一四九　治瘡口不合

木香　輕粉 各二錢　黃丹　枯礬 各五錢

右為細末用豬膽汁拌勻曬乾再研細摻患處

立齋曰此方乃解毒去腐搜膿之劑非竟自生肌藥也蓋毒盡則肉自生常見患者往往用龍骨血竭之類以求生肌殊不知餘毒未盡肌肉何以得生反增腐爛耳若此方誠有見

批

收口摻藥 一百五十

李氏云龍遊有患背疽者大潰五臟僅隔膜耳自謂必死用鯽魚去腸實以羯羊糞烘焙為末乾糝之瘡口自收此出洪氏方屢用有效故附於此須候膿少欲生肌肉時用之

桔梗湯 一五一　治咳嗽吐膿痰中有血胸膈兩脇作痛煩悶作渴或出臭濁已成肺癰者

桔梗 炒　貝母　當歸 酒浸　瓜蔞仁

枳殼 麩炒　薏仁　桑白皮 炒　百合 蒸，各一錢五分

五味子 炒　知母 炒　地骨皮　甜葶藶 炒

甘草節　防己　黃芪　杏仁 各五分

水二鍾煎服

新生 桔梗湯 一五二　治肺癰咳嗽膿血咽乾多渴大小便赤澁

方如前但少五味葶藶知母地骨皮四味

用水一鍾薑五片煎八分食遠服大便秘者加大黃

人參五味子湯 一五三　治氣血勞傷咳膿咯血寒熱往來夜出盜汗羸瘦困乏一切虛損肺痿之證並治

人參　五味子 杵炒　熟地黃　當歸 酒炒

白朮 炒　白茯苓　炙甘草　陳皮

桔梗炒 前胡各一錢 黃芪炙 地骨皮

桑白皮炒 枳殼炒 柴胡各七分

水一鍾半生薑三片煎八分食後服

四順散一五四 治肺癰吐膿五心煩熱壅悶欬嗽

貝母去心 紫菀去苗 桔梗炒一錢半 甘草七分

水一鍾半煎七分食遠服如欬嗽加杏仁亦可爲末白湯調服

合歡飲一五五 治肺癰久不斂口

用合歡皮 白斂二味同煎服 合歡皮即槿樹皮也亦名夜合

紫菀茸湯一五六 治飲食過度或煎煿傷肺欬嗽咽乾吐痰唾血喘急脇痛不得安臥肺痿等證

紫菀茸去苗 桑葉經霜者 欵冬花 百合蒸焙

杏仁去皮尖 阿膠蛤粉炒 貝母去心 半夏製

蒲黃炒各一錢 人參 犀角鎊末 甘草炙各五分

水一鍾半生薑三片煎七分入犀角末食後服

升麻湯一五七 治肺癰胸乳間皆痛吐膿腥臭

川升麻 桔梗炒 薏苡仁 地榆

黃芩炒 赤芍藥炒 牡丹皮 生甘草各一錢

水二鍾煎八分食遠服

如金解毒散一五八 治肺癰

桔梗一錢 甘草一錢半 黃連炒 黃芩炒

黃柏炒 山梔炒各七分

水二鍾煎八分徐徐細飲之不可急服○按此方乃降火解毒之劑也凡發熱煩渴脈洪大者用之即效若脈數欬嗽腥臭或唾膿痰者宜用桔梗湯

如聖栢黃丸一五九 治肺癰欬而腥臭或唾膿痰不問膿之

成否並效肺家之病雖有方惟此方功效甚捷不可忽之

栢黃一兩爲末 百齒霜即梳垢一錢

用糊爲丸如桐子大每服三五十丸米飲下○栢黃乃栢樹所生者其色黃狀如靈芝江南最多北方鮮有

葶藶散一六十 治過食煎煿或飲酒過度致肺壅喘不能臥及肺癰濁唾腥臭

甜葶藶 桔梗炒 瓜蔞仁 川升麻

薏苡仁 桑白皮炒 葛根各一錢 甘草炙五分

水一鍾半生薑三片煎八分食後服

知母茯苓湯 一六一 治肺痿喘嗽不已往來寒熱自汗

知母炒 茯苓 炙甘草 人參
白朮 五味子炒搗 麥門冬 半夏製
薄荷 桔梗 柴胡 款冬花各一錢
阿膠蛤粉炒 黄芩炒各二錢 川芎五分

水二鍾薑三片煎一鍾食遠服

四味排膿散 一六二 治肺癰吐膿五心煩熱壅悶欬嗽

嫩黄芪鹽水炒 白芷 五味子研炒 人參等分

右為細末每服三錢食後蜜湯調下

八味排膿散 一六三 治腸癰少腹脹痛裏急後重脉滑數或時時下膿

黄芪炒 當歸酒拌 金銀花 川山甲蛤粉炒
白芷 防風 連翹 瓜蔞各三錢

水二鍾煎八分食前服或為末每服三錢食後蜜湯調下如膿將盡去川山甲連翹倍當歸加川芎

薏苡仁湯 一六四 一名瓜子仁湯○治腸癰腹中疞痛或脹滿不食小便短澁婦人產後多有此證縱非癰服之尤效

薏苡仁炒五錢 瓜蔞仁三錢 牡丹皮 桃仁去皮尖各二錢

右水煎空心服

牡丹皮散 一六五 治腸癰腹濡而痛時時下膿

牡丹皮 人參 黄芪炒 白茯苓
天麻 白芷 桃仁去皮尖 薏苡仁
當歸 川芎各一錢 官桂 甘草各五分
木香三分

右水煎服

梅仁湯 一六六 治腸癰壅痛大便秘澁

梅仁九個去皮尖 大黄炒 牡丹皮 芒硝
犀角鎊各一錢 冬瓜仁研三錢

右水煎入犀角末服

大黄湯 一六七 一名牡丹皮湯○專治腸癰小腹堅腫而熱按之則痛肉色如故或焮赤微腫小便頻數汗出憎寒其脉沉緊膿未成者急服之

牡丹皮 瓜蔞仁各三錢 桃仁去皮尖 大黄煨
芒硝各二錢

水二鍾煎一鍾食前服○本方去瓜蔞即名大黄牡丹湯○立齋曰此方乃行血破血之劑也如發熱自汗惡寒小腹作

痛小便如淋脉未數者有效丹溪曰小腹腫痞按之痛小便如淋或自調發熱身無汗復惡寒其脉遲緊者膿未成宜下之當有血此結熱所成也故金匱用大黃利之即此方也若無前證恐不宜用其有脉滑數腹內脹痛或時時後重有膿已下宜用八味排膿散蠟礬丸及托裏之藥

射干湯 一六八 治胃脘癰吐膿血

射干去毛 山梔仁 赤茯苓 升麻各一錢

白朮五分 赤芍藥一錢

右水煎服

槐花散 一六九 治腸風臟毒下血

槐花炒 熟地黄 青皮 白朮炒

荆芥穗 當歸身酒洗 升麻各一錢 川芎四分

右為末每服三錢空心米飲調下水煎服亦可

除濕和血湯 百七十 方在和陣二一九

治陽明虛陷濕熱便血腹痛

夏枯草湯 一七一 治瘰癧馬刀已潰未潰或日久漏者

夏枯草六兩

水二鍾煎七分去柤食遠服○此生血治瘰癧之聖藥虛甚者當煎濃膏服並塗患處多服益善兼十全大補湯加香附貝母遠志尤善

必效散 一七二 治瘰癧氣血尚無虧損核不愈內服此藥外以鍼頭散潰之若氣血虛者先服益氣養榮湯數劑後服此藥服後瘡毒下再服前湯數劑

南硼砂二錢半 輕粉一錢 麝香五分 巴豆五個去殼

白檳榔一個 斑猫四十個去頭翅足同糯米炒

右同為極細末取雞子二個去黃用清調藥仍入殼內以濕紙數重糊口入飯甑蒸熟取出曬乾研末虛者每服半錢實

者一錢用炒生薑酒或滾湯於五更調服如覺小腹痛用益元散一服其毒俱從小便出胎婦勿餌瘡毒去後多服益氣養榮湯瘡口自合○此藥斑猫巴豆似峻利然巴豆能解斑猫之毒用者勿畏予於京師遇一富商項有瘰癧一片頗大詢其由彼云因怒而致困苦二年百法不應忽有方上與藥一服即退二三再服頓退四服而平旬日而痊以重禮求之乃是必效散因修合濟人無有不效丹溪亦云必效散與神效瓜蔞散相兼服之有神效當以二劑兼補劑用之甚效故錄之但此藥雖云峻利然瘰毒之深者非此不能解故

宜用之倘血氣虛者不可用恐其有誤也○又一道人治此證用雞子七個每個入班猫一枚飯上蒸熟每日空心食一個求者甚多考之各書瘰癧門及本草亦有之然氣血虛者恐不能治也

射干連翹散 一七三 治寒熱瘰癧

射干 連翹 玄參 赤芍藥
木香 升麻 前胡 梔子仁
當歸 甘草各一錢 大黃二錢

水煎食後服

如神散 一七四 治瘰癧已潰瘀肉不去瘡口不合

松香末一兩 白礬三錢

爲末麻油調搽乾摻亦可

遇仙無比丸 一七五 治瘰癧未成膿其人氣體如常宜服此丸形氣覺虛者宜先服益氣養營湯待血氣少充方服此丸核消後仍服前湯如潰後有瘀肉者宜用針頭散更不斂亦宜服此丸斂後再服前湯

白朮炒 檳榔 防風 黑丑半生半炒取頭末
密陀僧 郁李仁泡去皮 斑猫去足翅用糯米同炒去米不用
甘草各五錢

爲細末水糊丸梧子大每服二十丸早晚煎甘草檳榔湯下服至月許覺腹中微痛自小便中取下瘰毒如魚目狀已破者自合未膿者自消

附後治癭方 一七六

凡項下平結漸次成癭者用海藻一斤洗去鹹浸酒飲之不可間斷須要時時飲二三盃有酒氣方妙

神效開結散 一七七 治癭瘤甚效

橘紅四兩 沉香 木香各二錢 珍珠四十九粒入砂罐內以鹽泥封固煅赤取出去火毒用 豬靨肉子四十九枚用豚豬生項間如棗子者

右爲末每服一錢臨臥酒調徐徐嚥下患小者一五服大者一劑可愈切忌酸鹹油膩滯氣之物須用除日於靜室修合

生地黃丸 一七八 治師尼寡婦室女乍寒乍熱而患瘰癧及肩胸結核肝脉弦長而出魚際外無寒邪內多鬱火者宜此治之

生地黃酒洗杵膏兩 秦艽 黃芩 硬柴胡各半兩
赤芍藥一兩

右爲末入地黃膏加煉蜜爲丸桐子大每服三五十丸烏梅

湯日進二服

外臺崑布丸 一七九 治項下結囊欲成癭者

崑布 酒洗　海藻 酒洗各等分

右爲末煉蜜丸彈子大含化嚥之

濟生玉壺散 百八十 治三種癭瘻

海藻　海帶　崑布　雷丸 各一兩

廣茂　青鹽 各半兩

右爲細末老米飲爲丸榧子大不拘時噙化四五丸

神效瓜蔞散 一八一 治乳癰及一切癰疽初起腫痛即消膿

成即潰膿出即愈治癰之方甚多獨此方神效瘰癧瘡毒尤

效凡一切癰疽餘毒皆宜用之

瓜蔞 一個研　當歸 酒洗　生粉草 各半兩　乳香

沒藥 各一錢

右用酒煎服良久再服如不能飲以酒水各半煎之如數劑不效宜以補氣血之藥兼服之○若肝經血虛結核不消佐以四物柴胡升麻白朮茯苓○若肝脾氣血虛弱佐以四君芎歸柴胡升麻○若憂鬱傷脾氣血虧損佐以歸脾湯

海藻散堅丸 一八二 治肝經瘰癧

海藻　崑布　龍膽草 酒拌炒焦各二兩　小麥 醋煮炒乾四兩

右爲末煉蜜丸桐子大每服二三十丸臨臥白湯送下或噙化嚥之尤好凡患瘰癧服調治之藥未應宜佐以此上二方

○一方有柴胡二兩

連翹飲子 一八三 治乳內結核服數劑如不消宜兼服八珍湯初起有表證者宜先解散

連翹　川芎　瓜蔞仁 研　皂刺 炒

橘葉　青皮　甘草節　桃仁 各一錢半

右水煎食遠服

清肝解鬱湯 一八四 治肝經血虛風熱或鬱火傷血乳內結核或爲腫潰不愈凡肝膽經血氣不和之病皆宜用此藥

人參　熟地黃　芍藥 炒　茯苓

山梔 炒　貝母 各一錢　柴胡　牡丹皮

川芎　陳皮 各五分　當歸　白朮 各一錢半

甘草 五分

右水煎服

羌活白芷散 一八五 治風熱血燥手掌皴裂或頭面生瘡或遍身腫塊或膿水淋漓

羌活　白芷　荆芥　軟柴胡
蔓荆子　防風　甘草　牙皂
黄芩酒炒　黄連酒炒各一錢
右水煎服
胡麻散一八六　治風熱癮疹搔痒
胡麻子一兩二錢　苦參　荆芥穗　何首烏各八錢
威靈仙　防風　石菖蒲　牛蒡子炒
甘菊花　蔓荆子　白蒺藜炒　炙甘草各六錢
右為末每服二錢食後薄荷湯調服茶清亦可

四生散一八七　治癧瘋腿瘡痒不愈或眼目昏花名腎臟風並治風癬疥癩血風瘡證
黄芪　獨活　白附子真者　白蒺藜等分
右為末每服二錢用猪腰子一枚批開入藥濕紙包裹煨熟空心連腰子細嚼鹽湯送下
檳蘇散一八八　治風濕流注脚脛痠痛或麻痺不仁
檳榔　木瓜　陳皮　炙甘草各一錢
香附　紫蘇各五分
水一鍾半生薑三片葱白一莖煎一鍾空心服

升麻和氣飲一八九　治風瘡疥癬熱結大便不通
當歸　陳皮各一錢　枳殼麸炒　芍藥酒炒
半夏製　桔梗炒　白芷　蒼术米泔浸炒
乾葛　白茯苓　甘草炙各一錢　牛蒡炒
大黄各五分　升麻三分
右水煎服
當歸飲一百九十　治風熱血熱癮疹痒痛膿水淋漓瘡疥發熱等證
當歸　川芎　生地黄　白芍藥

白蒺藜炒　黄芪　何首烏不見鐵各錢半　防風
荆芥　甘草各一錢
右水煎服
羌活當歸散一九一　治風熱血熱頭面生瘡或赤或腫或成塊或癢搔痒膿水淋漓
羌活　當歸　川芎　升麻
防風　白芷　荆芥　鼠粘子炒
黄連酒炒　黄芩酒炒　連翹　甘草
右用酒拌晒乾酒煎服

一掃散 一九二 治癬疥

防風 荆芥 苦參 地骨皮

薄荷等分 甘草減半

右為末蜜水調服三錢不過三五服可淨○或煉蜜丸桐子大每服五七十丸食遠茶湯送下

烏金散 一九三 敷腎囊破爛一切等證

麩炭 紫蘇葉

右等分為末香油調搽用紫蘇葉包裹之

蛇床子散 一九四 治一切風癬疥癩搔痒膿水淋漓

蛇床子 獨活 苦參 防風

荆芥各二錢 枯礬 銅綠各一兩二味另為末

右為末麻油調搽

金黃散 一九五 敷天泡濕熱等瘡

滑石 粉甘草此當半用為是

右等分為末搽敷○此方或加綠豆末以治濕熱肥瘡更妙

嘗以此方加枯礬少半用治肥瘡大效

白粉散 一九六 治諸癬瘡

海螵蛸三分 白芨二分 輕粉一分

右為末先用漿水洗拭乾傅

滑石散 一九七 治小兒天泡瘡

好滑石 黃柏

右共為末傅之○仍內服荆防敗毒散或金銀花散熱甚者宜服大連翹飲○一方名碧玉散以青黛調前二味如泥用皂刺挑破泡水次付藥神效

秘方仙遺糧湯 一九八 治一切楊梅瘡不拘始終虛實皆可取效

土茯苓 即名仙遺糧用鮮者二兩洗淨以木石臼搥碎

用水三碗煎二碗去柤入後藥煎服

當歸 生地 防風 木通

薏仁各八分 金銀花 黃連 連翹各一錢

白朮 白鮮皮各七分 皂刺六分 甘草四分

加燈心二十根用遺糧湯二碗煎一碗食遠服

土萆薢湯 一九九 治楊梅瘡及瘰癧咽喉惡瘡癰漏潰爛筋骨拘攣疼痛皆妙○

用土萆薢即土茯苓二三兩以水三鍾煎二鍾不拘時徐徐服之 若患久或服攻擊之劑致傷脾胃氣血等證以

此一味爲主外加對證之藥無不神效

五加皮飲 二百 治楊梅綿花瘡百發百中亦可煮酒以治結毒

當歸 木瓜 生地黃 熟地黃

羌活 薏仁各一錢 防風 荊芥

川芎 苦參 大楓肉各七分 五加皮二錢

甘草 殭蠶各五分

右每服入土茯苓四兩猪肉四兩用水二大碗煎一碗食前温服渣再煎連肉食之忌生冷魚腥沙糖牛肉茶酒醋所用

土茯苓忌鐵器○若治瘋毒口服此藥外以此藥煎膏或丹收或粉收貼之

換肌消毒散 二百一 一名萆薢湯○治楊梅瘡不拘初起潰爛

土茯苓五錢或二兩 當歸 白芷

皂刺 薏仁各一錢半 木瓜不犯鐵 白鮮皮

木通 金銀花各八分 甘草六分

右水煎服○其各土茯苓用至四五兩更妙

蠲痹消毒散 二百二 治楊梅瘡肢節筋攣

羌活 土茯苓 獨活各五錢 白朮

當歸各錢半 芍藥一錢 白芷五分

右水煎服

七貼方 二百三 治楊梅綿花瘡

防風 忍冬 皂刺 蟬退去頭足

連翹 白鮮皮 五加皮 荊芥

穿山甲炒各一錢 生地 木瓜去心忌鐵 殭蠶炒各一錢半

皂子七個 薏仁二錢 土茯苓四兩

右用水四碗煎二碗食遠分二次服之○忌牛羊茶酒醋房事

茯苓湯 二百四 治楊梅瘡兼治瘋毒

當歸 白蒺藜 羌活 生地

熟地 甘草去皮 連翹 木通各二錢

土茯苓半斤

右爲粗末用水五六碗熬將半用絹濾去滓再熬成膏候冷每服一大酒鍾日二服輕者五六料重者十料全愈熬藥須用砂鍋○忌房事雞魚牛肉椒醋等發物

五寶丹 二百五 治九種楊梅結毒並及兒女者

琥珀透明血色者用甘草水煮過三分半

珍珠　炒過三分半　一方用豆腐包煮

硃砂　透明者三分半

鍾乳石　用木香甘草各一錢同煮乾用三分半

飛羅麵　炒過三分半

冰片　半分臨時加

右俱為極細末磁罐收貯聽用○服法每日用土茯苓疲塊者一斤洗淨用石臼碎先入水二升煮取汁四碗收磁器內將前粗再入水四五碗煮汁二碗並入前汁內為一日之用○若病在上者加木香二錢病在下者加牛膝一兩與土茯苓同煎病者不得另飲茶湯但將土茯苓湯時時飲之若飲湯半鍾加五寶丹二釐飲一鍾加四釐體厚者加六七釐一日內服盡此湯約度在上飽服在下饑服忌茶酒並一切發風動氣之物其毒若深須或加發散藥取汗若有輕粉等毒服藥後當盡發出無則不發也人忌房事輕者十服重者二七服全愈

醫統楊梅癰漏方二百六　不問年深者亦效

土茯苓五兩　金銀花一兩　皂刺　花椒

牛蒡　鬱金　當歸各五分

黑鉛一兩　鎔化入水銀五錢乘熱攪為粉分五分聽臨煎時另入煎藥用

右咀分作五貼用水二鍾入葱一根煎至一鍾去粗再入鉛粉一分煎至八分食遠服

右鉛粉煎後仍可取起蓋楊梅癰漏多因服輕粉積毒而成此以水銀花椒黑鉛仍收引輕粉之毒從頂而出也○此藥每以五貼為一料初服一貼要取微汗取汗法先以金銀花一兩或忍冬藤葉尤妙防風荊芥花椒各半兩煎湯二斗於不透風處先薰後洗自然汗出即患二三十年者只用此四料四汗之無不全愈忌牛肉燒酒真妙方也世人珍秘不傳余脊兩得之用以治人一一獲效故詳載之以濟人也

會膿散二百七　治瘀毒便毒初起之妙方也

白芷　殭蠶炒　川山甲炒各二錢　大黃五錢

乳香　沒藥各一錢

右為末以當歸尾五錢用酒水各一鍾煎一鍾去粗量人强弱或全用或一半調服之○此藥若嫌太多則改咀為飲大黃生加煎服之尤妙

壯蠣散二百八　治便毒亦名血疝

當歸酒洗 甘草節 滑石飛各一錢半 牡蠣二錢

大黃一錢 木鱉子五個有大黃者此味不可用有之亦不必用

水二鍾煎一鍾露一宿五更頓服冬月火溫服無論已未潰膿血俱從大便出○此方乃鹹寒導滯之劑若久瘡勞至大小便秘發熱脈痛或交感將強固精氣以致交錯壅滯而結為腫痛便秘者最宜用之若勞倦虛弱之人不甚脈痛大小便無熱秘者不宜輕用

牛黃雙解散 二百九 治便癰內蘊熱毒外挾風邪或交感強忍精氣以致溢精交錯壅結腫痛或大小便秘先用此藥通之

解更用調補之劑

肉桂 大黃炒 芍藥 牽牛杵炒

澤瀉 桃仁去皮尖炒各二錢半 炙甘草 乾薑各一錢

右分二劑水煎空心食前服

內托羌活湯 二百十 治臀癰腫痛兩尺脈緊按之無力者

羌活 黃柏各二錢 黃芪鹽水炒 防風

當歸尾 藁本 肉桂 連翹各一錢

炙甘草 蒼朮 陳皮各半錢

右水酒煎服

加味瀉肝湯 二一一 治肝經濕熱不利陰囊腫痛或潰爛皮脫睾丸懸掛或便毒及下疳腫痛或潰爛皆治之

龍膽草酒炒 當歸梢 車前子炒 生地黃

芍藥炒 澤瀉 黃連炒 黃柏酒炒

知母酒炒 防風各一錢 甘草梢五分

水二鍾煎八分食前服外敷烏金散

加味托裏散 二一二 治懸癰不消不潰

人參 黃芪鹽水炒 當歸 川芎

麥門冬 芍藥炒 黃柏酒炒 知母酒炒

金銀花 製甘草 柴胡各一錢

水二鍾煎八分食前服

加味十全大補湯 三 治懸癰潰而不斂或發熱飲食少思

人參 黃芪鹽水炒 白朮炒 熟地黃

當歸 川芎 芍藥炒 茯苓各一錢

甘草炙 肉桂 五味子杵炒 麥門冬各五分

水二鍾煎一鍾食前服○莖腫加青皮○小便赤加酒炒黃柏知母○小便澁加車前子山梔子俱炒用

五味當歸散 一一四 治婦人陰中突出一物長五六寸名陰挺

當歸 黃芩各二兩 牡蠣煅一兩半 蝟皮炙一兩

赤芍藥五錢

右為末每服二錢食前溫酒調下滚湯亦可如不應須以補中益氣湯倍加柴胡升麻兼服之○又方用當歸川山甲炒蒲黃炒各半兩辰砂一錢麝香少許俱為末每服二錢酒調下尤效

婦人陰瘡 一一五 治婦人陰戶生瘡作痒

杏仁炒 雄黃 白礬各五錢 麝香二分

右為末敷入患處

塌腫湯 一一六 治婦人陰戶生瘡或痒痛或膿水淋漓

甘草 乾漆各三錢 生地黃 當歸

黃芩 川芎各二錢 鱉甲炙五錢

右用水數碗煎數沸去柤常洗患處

白芷升麻湯 一一七 治婦人陰內膿水淋漓或痒或痛

白芷 升麻 黃連 木通

當歸 川芎 白朮 茯苓

右水煎服○更用塌腫湯浴洗之

痔漏腸紅方 一一八 其效無比

黃連去蘆毛淨一兩好酒浸一宿撈起曬乾為末

百草霜用草茅燒者松柴者不用一兩研細

烏梅肉一兩蒸軟取用煎浸黃連酒蒸爛

右以三味同搗一處為丸梧子大如太乾仍加煎酒搗丸之每空心用酒送下四五十丸三日見效十日全愈

地榆散 一一九 治血痔

右用地榆為細末每服二錢七食前米飲調下日三服

臭樗皮散 一百二十 治痔漏下血及膿不止

臭樗皮微炒 酸石榴皮 黃連去鬚 地榆

阿膠麩炒各一兩 艾葉微炒一錢

右為細末每服二錢食前粥飲調下

秦艽防風湯 一二一 治痔漏結燥大便作痛

秦艽 防風 當歸酒拌 白朮

黃栢 陳皮 柴胡 大黃煨

澤瀉各一錢 桃仁去皮尖 紅花 升麻

甘草各五分

右水煎空心服
猪臟丸 二二一 治大便時滴下血
猪大臟一條 槐花以槐花炒為末填入臟內兩頭扎定瓷器內
米醋煮爛
右搗和丸如梧桐子大每服五七十丸食前米飲或
當歸酒下○此方用黄連猪臟二味亦名猪臟丸尤效○一
方先用海螵蛸炙黄去殼為末以木賊草煎湯調下三日後
效或後服黄連猪臟丸
痔瘡方 二二三

雄黄一分 五靈脂 熊膽 五倍子 炒過 各一錢 沒藥三錢半 明者
白礬半生半熟 二錢
右為極細末用紙托貼瘡口上
三品錠子 二二四
上品 去十八種痔
白明礬二兩 白砒五分 乳香 沒藥各二錢半
牛黃三錢
中品 去五漏及翻花瘤氣核
白明礬二兩 白砒一兩三錢 乳香 沒藥各三錢半
牛黃一錢
下品 治瘰癧氣核疔瘡發背腦疽諸惡證
白明礬二兩 白砒一兩半 乳香 沒藥各一錢半
牛黃三分
右為砒末入紫泥罐內次用礬末蓋之以炭火煅令烟盡取
出並合為研極細末用糯米糊和為梃子狀如線香陰乾
紝瘡內三四次年深者五六次其根自腐如瘡在外更用
蜜水調搽乾上亦可○當作一 用此治瘰癧未可輕始
自為治其方法乃是中品錠子紝瘡內以膏藥貼之其根自

為不盡再用去盡更搽生肌藥數日即愈人多畏之凡見其
治氣血不虛者果驗惟氣血虛者雖潰去亦不能愈蓋此與
必效散相為表裏皆攻毒去邪之藥也
熊膽膏 二二五 治痔漏下痔瘡
熊膽一枚入片腦末一分置風處掛乾用時以涼水
化開塗敷患處內服槐子酒或加味涼膈湯名得熊膽更佳
如腫痛者點之尤效
水銀棗子膏 二二六 治蟲痔癢不止
水銀一兩 棗肉二兩

右和研水銀不見星撚如麥粒狀納縈肛門中明日取
出若痛加韶粉三分充內之
熊膽膏二〇七　治痔痛極效
熊膽半分　冰片一分
右研細用井花水調稀研搽痔上
蝸牛膏二〇八　傳痔痛極效
蝸牛一枚負殼　冰片　麝香各少許有角者
右同研爛以磁器盛次早取汁敷痔上
芫花線二〇九　繫痔漏肛核

用芫花一握洗淨入木臼搗爛加少水絞汁於石器中慢火
煎成膏將絲線於膏內度過曬乾以線繫痔當微痛候痔乾
落以紙撚蘸膏納竅內去根當永除根也〇一方只搗汁浸
線一夜用不得使水
枯痔水澄膏二百三十　治痔瘻內
鬱金　白芨各一兩　一方加黃連
右二味爲細末如患內痔候登厠時翻出在外用溫湯洗淨
側臥於床其痔即出用蜜水調藥得中以篦篾塗穀道四邊
好肉上留痔在外以紙蓋藥上良久然後用後枯藥搽痔上
仍用筆蘸溫水於紙上潤之勿令藥乾及四散
好白礬四兩　生信石二錢半　硃砂一錢研極細
右各研爲細末先將砒入紫泥罐底次將礬末蓋之用火煆
令烟盡其砒盡從烟去止借砒氣於礬內耳將礬爲極細末
看痔頭大小爲礬末於掌中乃入硃砂少許以唾調稀用篦
挑塗痔上周遍一日三上看痔頭顏色焦黑爲效至夜有黃
水出切勿他疑水盡爲妙至中夜上藥一遍來夜依然上藥
三次有小痛不妨換藥時以碗盛溫湯用筆輕洗去舊藥更
上新藥仍用護肉藥間用荊芥湯洗之三兩日之後黃水出

將盡可於藥中增硃砂減白礬則藥力即緩三兩日即可增
減漸漸取之庶不驚人全在看色增減傳藥厚薄方是活法
此藥只是借砒信之氣又有硃砂能以解之一方士將此二
方在京治人多效致富一監商以百金求得之錄於予予雖
未用傳人無不言效但枯藥則趙宜真煉師已刊於青囊雜
纂如神千金方則未見刊傳大抵今人言能取痔者皆此方
也其有氣血虛或挾內邪者還當兼治其內庶不有失
如神千金方二一一　治痔無有不效
好信石黃明者三錢打如豆粒　明白礬一兩爲末　好黃丹飛研五錢

蝎稍七個洗淨尾上焙乾爲末　草烏 先置醋去皮生研五錢

右用紫泥罐先將炭火煅紅放冷拭淨先下明礬燒令沸次下信入礬內拌勻文武火煅候沸再攪勻次看罐通紅烟起爲度將罐掇下候冷取研爲末方入黃丹草烏蝎稍二味再同研極細以瓷罐收貯如欲敷藥先煎甘草湯或葱椒湯洗淨患處然後用生麻油調前藥以鵝毛掃藥痔上每日數藥二次必去黃水如膠汁則痔頭漸消其年遠者不出十日可取盡日近者俱化爲黃水連根去淨更搽生肌之藥凡五痔皆可去之此乃臨安曹五方爲高宗取痔得效後封曹官至

察使

秘傳正骨丹 二三二　治跌打損傷骨折血瘀而傷之重者用此可續筋骨

降眞香　乳香　沒藥　蘇木

松節　自然銅 醋煅七次　川烏 炮　眞血竭 各一兩

地龍 去土酒浸焙乾　生龍骨 各五錢　土狗 十個油浸焙乾

右十二味共重八兩八錢同爲末每服五錢隨病上下酒調服覺藥自頂門而至遍身搜至病所則颯颯有聲而筋骨漸愈病人自知之○服藥後仍服人參白术黃芪當歸川芎肉桂甘草白芷厚朴以調補元氣

本事接骨方 二三三　治打折損傷

接骨木 半兩　乳香 半兩　當歸　赤芍藥

川芎　自然銅 炒醋淬 各一兩

右爲末用黃蠟四兩溶化入前藥攪勻衆手丸龍眼大如打傷筋骨及閃痛不堪忍者用一丸熱酒浸開乘熱飲之痛即止

沒藥降聖丹 二三四　治跌打損傷接續筋骨

當歸 酒炒　白芍藥　川芎　生地黃

蘇木　川烏頭 炮去皮臍　骨碎補 炙　乳香 另研

沒藥 另研　自然銅 火煅醋淬七次爲末各一兩

右爲末生薑汁與蜜和丸每一兩作四丸每服一丸用米酒各半盞煎至八分空心熱服○立齋曰肝藏血主筋若肝經風血虧損或血虛有熱而不合者當求其本而治之

十味沒藥丸 二三五　治打撲損傷筋骨疼痛或氣逆血暈或瘀血內停肚腹作痛或胸脹悶

沒藥　乳香　川芎　川椒

當歸　赤芍藥　紅花　桃仁

血竭各一兩　自然銅四錢火煅七次醋淬

右為末用黃蠟四兩溶化入前末速攪勻衆手丸彈子大每服一丸酒化下○立齋曰按接骨散沒藥丸惟元氣無虧者宜用若腎氣素怯或高年虛弱者必用地黃丸或補中益氣湯以固根本為善

花蕊石散二百三十六　治打撲損傷腹中瘀血脹痛欲死服之血化為水其功不能盡述

硫黃明者四兩　花蕊石一兩

右為末和勻先用紙筋和鹽泥固濟瓦罐一箇候乾入藥再用泥封口安在磚上虛書八卦方位用炭三十斤煅之候罐冷取出每服一錢童便調下○立齋曰前方若被傷已甚元氣虧損內有瘀血不勝疏導者用前藥一服其血內化又不動臟腑甚妙甚妙

黑丸子二百三十七　一名和血定痛散○治跌打損傷筋骨疼痛或瘀血壅腫或外感風寒肢體作痛或手足緩弱行步不前若流注膝風初結服之自消若潰後氣虛發熱與補藥兼服

白歛

百草霜　白芍藥各一兩　川烏炮　南星各三錢

赤小豆兩半　白歛二兩　白及　骨碎補

當歸各八錢　牛膝六錢

右各另為末酒糊丸梧子大每服三四十丸鹽湯溫酒任下孕婦忌服

封口藥二百三十八　凡損傷皮肉破裂者以此封之

牡蠣煅　赤石脂生研　紅丹水飛各等分

右為細末香油調塗擦上○若欲消腫散血令口加血竭乾摻之

當歸導滯散二百三十九　治跌撲瘀血在內胸腹脹滿或大便不通或喘咳吐血

大黃　當歸等分

右為末每服三錢溫酒下○若氣虛者須加肉桂

復元活血湯二百四十　治跌打損傷瘀血流於脇下作痛或小腹作痛或痞悶及便毒初起腫痛

柴胡半錢　天花粉　川山甲炒各一錢　當歸酒拌

大黃酒炒各一錢　紅花　甘草各七分　桃仁二十七去皮尖研

右水鍾半加酒半鍾煎八分食前服之以利為度

金瘡方二百四十一

凡金瘡出血不止用牛膽石灰摻之仰止其方以臘月牛膽入風化石灰懸當風候乾用一方單用三七擣爛敷之神效又方金瘡出血不止以五棓子生爲末乾貼之如不止而血熱者宜用犀角地黃湯之類○大凡金瘡出血不止若素本怯弱者當補其氣若陰虛或有熱者當補其血若因怒者當平肝若煩熱作渴昏憒者當補脾氣若筋攣搐搦者當養肝血不應用地黃丸以滋腎水

金瘡降眞散 二四二

降眞香用節佳　松香　文蛤

三味等分爲末無論[illegible]傷血出斷折摻破處夾縛定神效

金瘡灰蛋散 二四三　治金瘡出血不止及久年惡瘡

石灰細研　雞蛋清以和灰成餅爲度

右將灰蛋餅子煆過候冷研細過金瘡摻之若多年惡瘡以薑汁調敷○一方單以石灰摻傷處裹定亦血止而愈

龍骨散 二四四　治金瘡

龍骨　赤石脂　五棓子　黃丹

海螵蛸各等分

右各研入麝香少許共研勻摻上如乾先以鹽水洗挹乾摻之

桃花散 二四五　治金瘡並一切惡瘡

黃丹　軟石膏煆過各等分

和研勻如桃花色摻傷處甚妙

刀傷跌打經驗方 二四六

凡刀傷磕損跌撲腫痛或出血用葱白細切杵爛炒熱敷患處葱冷再易神效○一方以三七擣爛罨之神效

立齋曰醫學綱目稱前方有神效余嘗以治前證青腫不散死肉不潰佐以健脾胃之藥其功尤捷此內外所以合一也

損傷敷夾法 二四七

凡損傷骨折者先須整骨使正隨用川烏草烏等分爲末以生薑汁調貼之夾定然後服藥無有不效

挫跌閃腫痛 二四八

用生薑葱白同搗爛和麵炒熱罨之○如洗服而痛者用梔子加麵炒熱罨之

洗損傷方 二四九　凡傷重者用此淋洗然後傅藥

荊芥　土當歸　生葱切除一方用牛膝

右同煎湯溫洗或止用葱一味煎洗亦可

箭鏃竹木刺方 二百五十

百一方治竹刺在肉以螻蛄研敷立效

衍義方治竹木刺入肉嚼牛膝根署之即出

肘後方治箭鏃入骨以巴豆肉微炒同蜣螂研勻塗傷處候痒極拔出之

徐真人治箭鏃針刺折蝦蟆塗患處自出

拳跟打夾棍傷 二五一

生薑 陳酒糟各一斤

同搗爛炒熱罨傷處

治棍傷 二五二

凡棍傷手指者用皂礬二兩水四五碗砂鍋內熬滾將手薰洗良久即血活疼止不致潰爛熬水忌銅鐵器其洗手水過夜即臭惡不可聞

杖瘡四方 二五二

用川大黃一兩加上好炭片 分另研俱爲末和勻凉水調如糊擦杖處即時止痛 日後換膏藥貼之

又方加甘草一兩

又方攤藥

大黃 白芷 生半夏各七錢

右爲末以鮮韭汁調敷乾即再敷以黑處血紅爲度即換貼膏藥神效

又方

生半夏 松香各一兩

右研一處蔥水調成膏貼之勿令見風如乾再換一個即愈

治骨鯁物鯁 二五四

一治鯁骨鯁用苧麻根杵爛丸彈子大將所鯁物煎湯化下

一治魚骨鯁用細茶五棓子等分爲末吹入咽喉立愈

一治稻芒糠穀鯁喉將鵝吊一足取涎徐徐嚥之即消

一治吞釘鐵金銀銅錢等物但多食肥羊脂及諸般肥肉等味必隨大便而下

一治吞鐵或針用餳糖半斤濃煎艾汁調和服之

一治吞髮繞喉不出者取自己亂髮燒灰白湯調服一錢

破傷風敷藥 二五三 治打撲損傷傷風腫痛者

南星 半夏 地龍各等分

右爲末用生薑薄荷汁調搽患處

稀莶酒 二五八 治破傷風邪初入或風入於臟者神效

凡頭面身體因破損傷風者須刻發服遲則不救速用稀薟草一二兩酒水各半煎服被蓋發汗少頃即可消散能飲者純用酒煎尤妙

防風湯 二五七　治破傷風表證未傳入裏急服此

防風　羌活　獨活　川芎等分

右每服五錢水煎調蜈蚣散服方在後二六四

白朮防風湯 二五八　治破傷風服表藥過多自汗者

白朮　黃芪各一兩　防風二兩

右每服五七錢水煎服臟腑已和而自汗出者可服此藥若

臟腑秘小便赤而自汗者急以後大芎黃湯下之

羌麻湯 二五九　治破傷風在半表半裏間宜和解之急服此湯稍緩則邪入於裏不可用矣

羌活　麻黃　菊花　川芎

防風　細辛　前胡　蔓荊子

黃芩　石膏　白茯苓　枳殼

甘草各一錢　薄荷　白芷各五分

右每服五錢薑水煎日二三服

羌活防風湯 二百六十　治破傷風初傳在表脈浮緊

羌活　防風　藁本　當歸

芍藥　甘草各四錢　地榆　細辛各二錢

右㕮咀每服五七錢水一鍾半煎八分熱服量緊慢加減用之○熱盛加黃連黃芩各二錢○大便秘加大黃二錢○自汗加防風白朮各五分

大芎黃湯 二六一　治破傷風邪傳於裏舌強口噤項背反張筋惕搐搦痰涎壅盛宜疎導者急服之

川芎　羌活　黃芩　大黃各一兩

右每服五七錢水煎服

本事玉真散 二六二　一名定風散○亦名奪命丹○治打撲金刃破傷風重者牙關緊急腰背反張並瘋犬所傷

天南星湯泡七次如急用以濕紙裹煨　防風等分

右為末每服二錢溫酒調服若牙關緊急腰背反張者每服三錢用童便調服雖內有瘀血亦愈至於昏死心腹尚溫者連進二服亦可保全若破傷以熱口及瘋犬咬傷須用漱口水或鹽水洗淨以天南星為末摻之或以水調塗之出水為妙

養血當歸地黃湯 二六三　治破傷風氣血俱虛發熱頭痛服

此以養氣血祛風邪不拘新舊並可治之

當歸酒拌 熟地各二錢 芍藥 川芎

藁本 防風 白芷 北細辛各一錢

水二鍾煎一鍾食遠服甚者加酒助之

蜈蚣散 二六四

蜈蚣一對炙 鰾膠一錢煅

右爲末用防風白术煎湯調下

破傷風灸法 二六五

治跌打損傷或蟲獸傷破皮膚以致風邪入內牙關緊急腰

背反張或遍體麻木甚者不知人事急用蒜搗爛塗傷處將艾壯於蒜上灸之多灸爲妙仍用膏藥護貼內服玉真散如毒蛇風犬咬傷先刺患處去毒血如前法治之

愈風丹 二六六 治癘瘋手足麻木眉毛脫落遍身生瘡及癘風癮疹皮膚搔痒撓破成瘡並皆治之

皂角一斤剉寸許無灰酒浸一宿以水一碗揉成汁去渣用砂鍋文武火熬膏 苦參一斤取末四兩

烏梢蛇 白花蛇 土花蛇各一條去腸陰乾酒浸取淨肉晒乾爲末

右爲末入前二味和丸梧子大每服六七十丸空心煎通聖散送下乾物壓之日三服間日浴之汗出爲度

二聖散 二六七 疎風和血去瘡癬

皂角刺燒存性爲末 大黃半兩

右用大黃半兩煎湯調下皂刺末二錢早服樺皮散午以升麻湯下瀉青丸晚服二聖散

樺皮散 二六八 局方 治肺臟風毒遍身癮疹搔痒

樺皮 枳殼去穰各四兩俱燒存性 荊芥穗一兩

炙甘草半兩 杏仁二兩去皮尖用水一碗煮令減半取出晾乾爲研

右共爲末磁器收貯每服一錢食後溫酒調服

升麻湯 二六九 治諸風熱瘡肌肉極熱身如蟲行或唇反縱

裂

升麻二分 人參 茯神 防風

羌活 犀角鎊 羚羊角鎊各一錢 肉桂五分

水二鍾薑三片入竹瀝少許煎八分不拘時服○或用下瀉青丸

醉仙丹 二百七十 治癘風遍身麻木

胡麻子炒 牛蒡子炒 枸杞子 蔓荊子炒各一兩

白蒺藜 苦參 天花粉 防風各半兩

右爲細末每一兩五錢入輕粉二錢作丹每服一錢茶清調

晨午各一服至五七日於牙縫中出臭涎令人如醉或下臟血病根乃去仍量人虛實以用之病重者須先以再造散下之候元氣將復方用此藥忌一切魚腥發毒厚味止可食淡粥時菜及諸蛇肉以淡酒蒸熟食之亦可以助藥力

子和浮萍散 二七一 治風癬疥癩

浮萍四錢　荊芥　川芎　麻黃去節

當歸　赤芍藥　甘草各一錢

水二鍾葱二莖豆豉一撮煎服汗出為度

寶鑑換肌散 二七二 治癘風久不愈或眉毛脫落鼻梁崩壞其效如神

白花蛇　黑花蛇各三兩酒浸　地龍去土　當歸

川芎　赤芍藥　天門冬去心　甘草

何首烏不犯鐵　沙參　胡麻子炒　天麻

紫參　苦參　白蒺藜炒　細辛

白芷　蔓荊子　威靈仙　荊芥穗

菊花　木賊草　不灰木　石菖蒲

定風草即天麻苗　沙苑蒺藜　蒼朮　木鱉子各一兩

右各另為末和勻每服四五錢食後溫酒調服加飲數杯尤妙

通天再造散 二七三 治大風惡疾內熱宜此攻之

鬱金半兩　大黃炮　皂角刺炒黑各　白丑取頭末半生半炒六錢

右為細末每服五錢日未出時面東以無灰酒調下既利下黑頭小蟲病輕者只利臭穢之物○忌葷腥厚味半年犯則再作不可救此藥服三五次即愈

白花蛇丸 二七四 治癘風○丹陽荊上舍得癘疾一僧治而愈以數百金求方秘不肯傳館客袁生覓知藏於衣領中因醉之而竊錄焉用者多效

白花蛇一條去頭尾酒浸取肉生用　烏梢蛇一條去頭尾生用　蟬蛻去土

防風去蘆　金銀花葉　枸杞子　槐花

苦參　生地各一兩　全蠍醋浸一日去鹽味　黃芩

黃連　梔子　黃柏　烏藥

牛膝　川芎　牛蒡子　何首烏不犯鐵

連翹　天花粉　白蒺藜　威靈仙

荊芥穗　細辛　蔓荊子　金毛狗脊

胡麻子炒各一兩　漏蘆半斤洗淨去蘆取四兩

右為末米糊丸桐子大每服五六十丸茶清送下空心午前臨臥各一服

白花蛇膏 二七五 治諸風癘疾遍身生瘡

白花蛇 酒浸肉四兩 天麻 七錢 荊芥 薄荷葉 各三錢

右為細末用好酒二升蜜四兩以銀磁器熬成膏每溫服一酒杯日三次煎餅壓下於煖處發汗效

防風天麻丸 二七六 治癘風癩病此方廣廷仙傳一年中常療數人初服藥有嘔吐者不可疑服而得愈其效如神

防風 去蘆 天麻 升麻 白附子 炮

定風草 細辛 去苗 川芎 人參 去蘆

丹參 去蘆 苦參 玄參 去蘆 紫參 去蘆

蔓荊子 威靈仙 川山甲 炒 何首烏 另搗各二兩

蜈蚣 二條

右為細末同何首烏末拌勻外用胡麻一斤淘淨晒乾炒香熟另研為細末乃入前藥末二兩又拌勻煉蜜和為丸十丸每服一丸細嚼溫漿水送下不拘時候日三服宜食淡白粥一百二十日大忌房勞並將息慎口

行藥方 二七七 治癘毒

大黃 白牽牛 檳榔 各一兩 甘草 三兩

輕粉 五錢

右共為細末每服二錢用白蜜二匙薄荷汁一匙五更時調服病勢重者七日行一次稍輕者半月一次輕者一月一次或二十日一次以三五遍為度

皂角散 二七八 治大風

皂角刺 燒存性一錢 大黃 一錢 輕粉 五分

右為末空心酒調服取下惡物()服藥數日齒縫出血甚臭

雷丸散 二七九 取大風蟲

雷丸 貫仲 另研一兩先 阿魏 各一錢 麝香 一分

水銀 硫黃 雄黃 各二錢半用乳鉢入醋少許研令水銀盡為度

右為細末每服一錢天明溫酒送下

點虎丹 二百八十 治大風諸癩惡瘡毒蟲內蝕形骸變壞

天靈蓋 三兩 人中白 一兩 桃仁 泡去皮尖各二兩 老皂刺 燒存性

穿山甲 炒各半兩 輕粉 二錢 麝香 五分 乾蝦蟆 二個去頭足燒存性

右為末煉蜜丸梧桐子大每服二十丸月首五更米飲送日服取蟲蟲即愈○殺勞蟲通用

苦參酒 二八一 治癩風及瘡疹疥癬最多者

苦參 五斤切片

右以好酒三斗浸三十日每飲一合日服不絕覺痺即瘥

硫黃酒 二八一 殺癘風治蟲

明硫黃 研極細

右用酒浸窒入飲清汁明日添硫黃再研入酒如前飲之

七珍湯 二八二 浴洗大風

青蒿 艾葉 忍冬藤 蒼耳子

桑條 槐條 柳條 二條俱杻碎用

右煎水一桶入炒鹽半斤間日一洗浴密室中以簟席圍之洗出汗爲妙不過十次愈

烏頭湯 二八四 治大風癩瘡

草烏 麻黃根 艾葉 地骨皮

朴硝各一兩

右爲粗末用水一桶枚一合葱三十根同煎湯入醋一鍾於密室中自用手巾蘸搭周身候湯可浴令汗透務使面上如珠徐起或坐或臥片時汗乾有衣避風五日再浴如此二五次愈後更服換肌丹用合藥

敗瘡方 二八五

雄黃 硫黃 白礬 草烏

蛇床子 各半兩 分

右爲末用香油或濃茶水調敷患處

直指洗瘡方 二八六 浴洗大風瘡

苦參 荊芥 防風 白芷

羌活 獨活 藁本各一兩 洛陽花 四兩大酒煮過一宿

右作三次煎水洗令出汗

梅花白癩 二八七

用香油二碗入雞蛋黃一枚熬將焦去渣熬油至一碗許外用雄黃一錢 白礬二分 花椒五分 上共爲細末入油內再熬熱收貯候用○每用猪毛湯熱洗瘡垢搽油三五次即愈○愚按此方於蛋焦去粗之後入水銀五錢微火漸

熬之然後再加硃砂細末二錢並雄黃白礬等末攪熬勻熟收用必妙

癩梨瘡 二八八

用杏仁白枚炒焦炭入葱白擣爛共搗爛先用花椒煎湯洗淨然後用此藥搽之舊瘡者可用但勿見風方好

疥瘡二方 二八九

大楓子仁 木別仁 蛇床子各半兩 水銀三錢研散於內

右先以刀刮去瘡痂花椒湯洗淨外用麻油熬成珠調藥付

之八日即愈
又方　用猪骨髓和輕粉搗爛搽之過夜即愈
頭面黄水肥瘡　二百九十　治小兒頭面患瘡濃汁作痒痂厚
者名曰粘瘡當用此方或止用礬丹二味亦可○若作痒出
水水到即潰者名曰黄水瘡當用後一方
松香　枯礬　官粉　飛丹
右等分爲末麻油調傅或加香烟垢更效於香爐蓋上刮取
用之○一方用菉豆松香等分爲末麻油調傅極效或内服
荆防敗毒散等藥○又方用益元散加枯礬少許以麻油調

敷大妙大妙
諸瘡疥頑瘡　二九一
油核桃　大楓子　樟腦　水銀
右四色研勻搽之此治有蟲者大效○一九無蟲而忽爾生
瘡腫痛或濕爛者但以柏油搽之即可愈
白虎丹　一九二　發則頭面四肢眼目俱腫而惟額上指尖兩
耳不腫及不見赤色者方是其證
先將馬桶洗淨用沸湯傾入蓋少頃傾出盆内浴之數次即
退○再用車前草九里香馬蹄香枸杞苗即雁穢菜同搗爛
和麻油遍身自上而下搽之○大忌雞魚生冷炙煿日色火
光燈烟湯氣極須謹愼
又方　用生香附末冷茶調服一二錢即愈
又方　擂綠荳水去渣飲一二碗妙
紫白癜風歌　二九三
紫癜白癜一般風　附子硫黄最有功
薑汁調勻茄蒂搽　若經三度永無踪
又歌
紫癜白癜兩般風　水銀輕粉最成功

搗取生薑自然汁　只須一搽便無踪
又方　治紫白癜汗斑等風
雄黄　硫黄　黄丹　密陀僧
南星
右爲末先用薑搽患處次用薑蘸藥末搽之搽後漸黑次日
再搽黑散則愈矣
又四神散
雄黄　雌黄　硫黄　明凡
各等分先浴令通身微汗以薑蘸搽之再以熱湯淋洗當日

色淡五日除根

汗班四方 二九四

大黃二錢 枯礬 椒紅各五分

右用豬脂沙糖同搗爛俟浴起以細麻布包擦至痛而止數日即愈○或止用硫黃少入麻油研如糊浴用麻布蘸擦數次即愈

又方

蜜陀僧 硫黃各三錢 輕粉二錢 雄黃一錢 人言五分

右為末薑汁調用茄蒂蘸擦三日內不沐妙

又方

雄黃 雌黃各一錢 硫黃五分 麝半分

浴後蘸擦二三日勿洗

又方

硫黃一兩用醋煮半日海螵蛸三個共為末浴後以生薑蘸擦患處須避風少時數度即愈

漆瘡方 二九五

用香油調鐵銹塗之○胃氣實者內服黃連解毒湯○胃氣弱者以漆毒侵犯中氣致虛多有作嘔不能飲食者宜用六君加砂仁藿香酒炒芍藥之類○又解漆毒法見因陣二三五

手足甲疽 二九六

凡手足間或因修甲傷肉或因損足成瘡潰爛上腳用綠礬置鐵板上煆沸色赤如熔金色者為真沸定取起研末以鹽湯洗拭

生板瘡 二九七 腫痛多膿者

蜜陀僧 生礬 大黃

等分為極細末敷之

神效膏 二九八 治臁瘡腳瘡

先看瘡形大小用綿紙裁成四方塊十二張四角用小撚釘住聽用○外以好香油二兩用銅杓以文武火熬之先下花椒四十九粒煎黑取起○次下槐枝長一寸者四十九節煎黑又取起○再次下黃占一兩輕粉二分枯礬一分溶清却入前紙浸油內令透不可令焦取起聽用凡貼瘡時先將槐枝葱椒煎湯洗瘡令透拭乾乃此膏紙貼上外面再以油單紙蓋護乃用軟帛縛定一日取下揭去一層復用湯藥洗淨

又貼之盡十二張無有不愈者

隔紙膏 二九九 治臁瘡神效

黃芪末 五錢 輕粉 乳香 沒藥 各一錢

銀硃 一錢 血竭 五分 銅綠 二分

右為細末真香油調成膏攤油紙上再用油單紙一層以針刺孔數十遍當藥上貼之一日一易其膏

一味隔紙膏 三百 治臁瘡[并?]諸瘡

石膏 煅 枯礬 等分

右為末用桐油調成膏作隔紙膏貼之更服荊防敗毒散如數劑不愈再服黃芪人參湯

爛腿瘡久不愈方 三百一

用米糖即膠飴也以碗盛於飯鍋內蒸化先用花椒荊芥防風等藥煎湯洗瘡淨乃將膠飴薄攤瘡上外以軟竹箬蓋定用絹縛之數日即愈神效

凍瘡方 三百二

歷青末 黃蠟 各一兩 麻油 一兩

右三味溶化搽患處

湯火六方 三百三

凡初被湯火所傷速用令[竈?]柴草灰一二升入鹽少許以涼水調如稀糊帶味微鹹稍煖用以厚塗傷處覺熱則易之速易數次則火毒皆拔於灰中必無痛楚隨後破而愈誠神妙方也

又方 治潰爛腫痛者 用生桐油調人中白敷之即愈亦妙方也

又方 用皂礬研細和以冷水洗傷處其疼立止其腫即消

又方 用大黃芒硝等分為末雞子清調貼之神效

又方 用石膏末香油調敷即愈

又赤石脂散 治湯火傷肉爛赤痛

赤石脂 寒水石 大黃 等分

右為末新汲水調塗

湯火至聖膏 三百四

治湯火傷瘡用雞子黃置銀石器內熬油調胡粉傅之○錦衣楊永興廚下夜間回祿凡睡此房已死將死者[灌?]以生蘿蔔汁良久悉[甦?]凡遇此患者以此治之其應如響

湯火止痛散 三百五 止痛生肌

大黃末 微炒 當歸末 等分

右用麻油調搽或疙瘩亦可

小兒丹毒 三百六

此毒多生頭面四肢色赤或腫遊走不定甚者宜用前砭鍼
砭法使毒血遇刺皆出更以神功散傅之內服荊防敗毒散
或五福化毒丹若使毒氣入腹則不治或愈而復發皆因丹
食辛辣炙煿以致內熱宜於母藥中加漏蘆煎服或令自服
亦愈

小兒鵝口 三百七

凡小兒口內白屑滿口者為鵝口瘡則不能飲乳用髮或軟

絹纏指蘸井水拭舌上使淨如屑不能脫濃煮栗木湯以綿
纏筯頭拭洗却用飛過黃丹搽之

加味太乙膏 三百八 一切瘡瘍並宜貼之先用隔蒜灸更服
活命飲以收全功

當歸 生地黃 芍藥 玄參
大黃各二兩 加白芷四兩

用麻油二斤煎丹收

景岳會通膏 三百九 凡諸般癱瘓風氣骨節疼痛與所不
治

大黃 木別仁 當歸 川芎
芍藥 生地 麻黃 細辛
白芷 防風 荊芥 蒼朮
羌活 川烏 甘草 烏藥
南星 半夏 香附 官桂
蒼耳 骨碎補 草烏 艾葉
皂角 枳殼 三稜 蓬朮
蘿蔔子 水紅花子 巴豆 五倍
獨活 桃仁 蘇木 紅花

續斷 連翹 梔子 苦參
槐花 皂刺 乾薑 萆麻子
透骨草乾 穿山甲 全蝎 殭蠶
蜂房各一兩 蛇退一大條 蜈蚣十四根 蝦蟆三隻
血餘一團 獨蒜四頭

右五十四味用麻油五斤浸三日先煎血餘萆麻木別桃仁
巴豆蝦蟆獨蒜符半枯然後入餘藥煎黑去滓丹收後下細
藥十味

阿魏二兩 乳香制 沒藥製各一兩 木香

丁香　雄黃　硃砂　血竭

兒茶各五錢　麝香不拘一二錢

右麝香丁香木香三味宜最後下之以上收油法凡熬成熟油一斤下飛淨好紅丹八兩若欲微嫩則止下七兩五錢

神異膏二百十　治瘰疽瘡毒及收口甚效此瘡瘍中第一方也

麻油一斤　黃丹十二兩　黃芪　杏仁

玄參各一兩　蛇蛻半兩　男髮如雞子大一團　露蜂房子多者佳一兩

右先以黃芪杏仁玄參入油煎至將黑乃入蛇蛻蜂房亂髮

再煎至黑去租徐徐下丹慢火煎收黃丹不必拘數但以得中為度凡膏藥用火必至老硬煎時預留嫩膏少許如硬提和之

清涼膏二百十一　治一切瘡瘍潰後宜用之

當歸二兩　白芷　白芨　木鼈子

黃柏　白歛　乳香　白膠香各五錢

黃丹淨五兩　麻油十二兩

右用油煎前六味以槐柳枝頻攪油熟丹收然後下乳香等二味

阿魏膏二百十二　治一切痞塊更服胡連丸

羌活　獨活　玄參　官桂

赤芍藥　川山甲　生地黃　兩頭尖

大黃　白芷　天麻　紅花各半兩

木鼈十枚去殼　亂髮一團　槐柳桃枝各半兩

右用麻油二斤四兩煎藥黑去租入髮再煎髮化仍去租入上好真正黃丹煎收軟硬得中入後細藥即成膏矣

阿魏　芒硝　蘇合油　乳香

沒藥各五錢　麝香三錢

右凡貼膏藥須先用朴硝隨患處鋪半指厚以紙蓋用熱熨斗熨良久如硝耗再加熨之二時許方貼膏藥若是肝積加蘆薈末同熨之

硃砂膏二百十三　治一切頑瘡破瘡杖瘡癰疽發背破傷者最妙最佳

麻油一斤　飛丹六兩　水銀一兩　硃砂佳者兩半飛過

好黃蠟四兩

先下油熬數沸下雞子二枚敲開逐箇投之熬焦撈去方退火候油定下水銀五錢再加微火攪熬飯頃即入丹漸收成

膏後下黄占再攪候大温下極細好硃砂一兩五錢攪匀磁
罐收貯

神效當歸膏 三一四 治一切發背瘡瘍湯火疼痛等證去腐
肉生新肉其效如神凡洗瘡換膏必須預備即貼之新肉畏
風故也如用白蠟尤好此藥生肌止痛補血續筋故與新肉
相宜

當歸　生地黄　黄蠟各二兩　白蠟一兩減半　麻油六兩

右先將當歸地黄各一兩入油煎黑去柤又將二味各入一
兩煎至微焦復去滓乃入蠟溶化候冷攪匀即成膏矣用塗

患處以紙蓋之如有瘀肉須用利刀剪去則生肌尤速

攻堅敗毒膏 三一五 亦名乾坤一氣膏○專攻痞塊諸積等
痔漏

當歸　熟地　生地　白芍藥
赤芍藥　南星　半夏　三稜
蓬朮　木鼈　兩頭尖　川山甲
巴豆仁　肉桂　五靈脂　桃仁
續斷　玄參　玄胡索　萆麻子仁
白芷　羗活　獨活　大黄
紅花　川烏　草烏　蘇木
川芎　防風　杏仁各一兩

右用麻油四十兩浸諸藥三日桑柴火煎成丹收後下細藥
乳香製　沒藥製各一兩　真阿魏半兩　麝香二錢

右方於細藥中加蘆薈木香各一兩琥珀三錢即名消痞大
成膏

消痞膏 三一六

三稜　蓬朮　川山甲　木鼈仁
杏仁　水紅花子　萊菔子　透骨草晒乾
大黄各一兩　獨頭蒜四個

右用香油一斤入前藥十味煎油成以飛丹收之後下細藥
真阿魏　乳香　沒藥各一兩　麝香三錢

右先下乳沒阿魏三味後下麝香攪匀待冷傾水中浸數日
用磁罐收貯勿使洩氣用時以白布或堅白紙攤貼八九日
一換或見大便去膿血勿以為異亦有不去膿血而自愈者
若治瘧痢可貼臍腹忌房事生冷○凡貼癥積痞塊先用蕎
麥麪和作一圈圍住患處四邊其塊上放皮硝二三兩蓋厚
紙以熨斗熨令熱氣內達然後去硝用膏藥貼之○右原方

用白花菜同透骨草另煎膏二兩攪入膏内收用但白花菜惟西北方間有之求覓不易故余用獨蒜雜蓟子代之其功亦不减也

琥珀膏二一七　治頸項瘰癧及腋下初結小核漸加連珠不消不潰或潰而膿水不絶經久不瘥或成漏證

琥珀　白芷　防風　當歸

木鼈子　木通各一兩　丁香　桂心

朱砂　木香　松香各半兩　麻油二斤

右先將琥珀等六味為末其餘藥入油煎黑濾去柤徐入黄

丹再煎軟硬得中入前藥成膏貼之

貼痞琥珀膏二一八　貼癥積痞塊

大黄朴硝各一兩為末以大蒜同搗膏貼之

水紅花膏三一九　貼痞塊

用水紅花或子每一碗以水三碗用桑柴文武火熬成膏量痞大小用紙攤貼以無方為度仍將膏用酒調服忌葷腥油膩不飲酒者白湯下

火龍膏二百二十　治風寒濕毒所襲筋骨攣痛及濕痰流注經絡壅痛不能行步並治歷節風鶴膝風其效如神

小薑八兩取汁　乳香為末　沒藥為末各五錢　麝香一錢

真牛皮廣膠二兩

右先將薑汁並膠熔化方下乳香沒藥調勻待少溫下麝香即成膏矣攤貼患處更服五積散如鶴膝風須服大防風湯

紺府膏二二一　專貼疼痛腫毒

乾蝦蟆三個　全蠍　殭蠶各一兩　蜈蚣十條

斑蝥四十個　商陸根一兩六錢　花椒一錢　童子髮六分

雞内金一個　槐枝二寸長者四十根

細藥

兒茶　乳香　沒藥　血竭

龍骨　黄占　白占各五錢　麝香一錢

右用麻油二斤煎飛丹收

番陀膏二二二　此膏治臁瘡痔瘡瘋癩等證神效凡治疼痛

先以葱鹽擦患處洗後貼之

先用番陀僧一二斤打碎將童便煮之覺其濁性去而童便氣消乃止矣用時再滴油貼瘡不痛麻後研極細如麪候用

用桐油不拘幾斤熬至將黑為度每熬油一斤用陀僧六兩

收之於將成膏之頃取起離火候稍涼視膏多少入冷水數碗徐攪之恐其泛出俟少定即通去其水再上火熬化後入火數碗攪過如前或三次更妙然後放淨其水每油一斤再入宮粉二兩放收其色方黑凡熬此者銅鍋須大方可用

八仙紅玉膏 三二二 治諸瘡

龍骨　赤石脂　兒茶　血竭

沒藥　乳香各一錢　輕粉五分改一錢　冰片一分

右用麻油二兩入當歸五錢煎枯去滓入龍石茶竭四味再煎一二沸次入乳沒略煎勻後入黃占五錢溶化冷定入輕

冰獅貼

碧油膏 一二四 止痛排膿灸後宜用之

桃枝　柳枝　桑枝　槐枝各二兩

乳香另研　血竭各五錢　黃丹四兩

右用麻油十兩煎膏成後下乳香血竭

長肉膏 三二五

人參　黃芪　當歸　夜合樹皮

玄參各一兩　血餘二兩　老鼠一個

細藥

血竭　龍骨　赤石脂　白臘各五錢

右用麻油一斤煎飛丹收

保養元氣膏 三二六 此膏助元陽補精髓通血脈鎮玉池養竅存精百戰百勝得婦人經淨之時去膏而泄則可成孕並治腰膝疼痛五勞七傷諸虛百損半身不遂膀胱疝氣帶濁遺淋陰痿不舉無不效者此邵真人進御方也

麻油一斤四兩入甘草二兩先熬六七滾然後下諸藥

生地黃　熟地黃俱酒洗　麥門冬　肉蓯蓉酒洗

遠志肉　蛇床子酒浸　兔絲子酒浸　牛膝酒洗

鹿茸　川續斷　虎骨　紫稍花

木別仁　谷精草　大附子　肉桂各五錢

右熬成以蒸過松香四兩飛丹半斤收之次下細藥

次下龍骨　倭硫黃　赤石脂各一錢

又次下乳香　沉香　丁香　木香各錢

又次下陽起石二錢　麝香五分　蟾酥

鴉片各一錢

又次下黃占五兩　右煎成入井中浸二四日每用膏七八

錢紅絹攤貼臍上或腰眼間每貼五六十日再換

煮松香法 三二七 凡用松香收膏藥者必用水多煮一二遍去其澁燥之性方可貼瘡不痛○若用貼痞塊血塊則當加藥如後法煮過用之方妙

大都松香三斤 用皮硝一碗 水紅花四兩

大黃 當歸 生地各二 三稜

莪朮兩各一

右藥七味用水一桶先熬汁去滓淨用煮松香徐徐添入以汁完爲度收用之極佳○一收油之法凡煮過松香一斤入熬熟桑油五兩即成膏矣

以下通用方

四君子湯 三二八 方在補陣一

治瘡瘍脾胃虛弱或因尅伐腫痛不散潰斂不能宜用此以補脾胃諸證自愈若誤用攻毒則七惡隨至脾胃虛弱飲食少思或食而難化或欲作嘔或大傷不實若脾胃氣虛爲口出血吐血便血尤宜用之蓋氣能攝血故也凡氣血俱虛之症宜於此湯加當歸脾胃既旺飲食自進陰血自生若用沉陰之劑脾胃復傷諸症蜂起

六君子湯 三二九 方在補陣五

治脾胃虛弱或寒涼尅伐腫痛不消或不潰斂宜服此湯以壯營氣則諸證自愈

加味四君子湯 一百三十 方在補陣二

治痔漏下血面色痿黃凡諸氣虛脾虛不能攝血等證

四物湯 三三一 方在補陣八

治瘡瘍血虛發熱或因失血或因尅伐或因潰後致晡熱內熱煩燥不安皆宜服之蓋血生於脾脾虛不能生血者宜用四君子加當歸酒炒白朮以補脾

八珍湯 三三二 方在補陣十九

治瘡瘍脾胃損傷惡寒發熱煩躁作渴或瘡瘍潰後氣血虧損膿水清稀久不能愈

十全大補湯 三三三 方在補陣二十

治瘡瘍氣血虛弱腫痛不愈或瘡瘍膿清寒熱自汗盜汗食少體倦發熱作渴頭痛眩暈似中風狀者

補中益氣湯 三三四 方在補陣

治瘡瘍元氣虧損惡寒發熱或因尅伐肢體倦怠飲食少思或不能起發消散生肌收斂或兼飲食勞倦頭痛身熱煩躁

作渴脉洪大弦虛或微細軟弱

歸脾湯 三二五　方在補陣三十二

治瘡瘍甚思傷脾血虛發熱食少體倦或脾不攝血以致妄行吐下或健忘怔忡驚悸少寐或心脾作痛自汗盜汗或肢體腫痛大便不調或婦人經候不調晡熱內熱或行瘡流注及不能消散潰斂等症

獨參湯 三二六　方在補陣三十六

治瘡瘍一切失血或膿水出多氣血俱虛惡寒發熱作渴煩躁蓋血生於氣故血脫者宜補氣陽生陰長之理也用人參一兩棗十枚薑十片水煎徐徐服

人參養營湯 三二七　方在補陣二十一

治潰瘍脾胃虧損發熱惡寒血氣俱虛四體倦怠肌肉消瘦面色痿黃汲汲短氣食少作渴凡大病後最宜用此

五味異功散 三二八　方在補陣四

治脾胃虛弱飲食少思即四君子湯加陳皮

生脈散 三二九　方在補陣五十七

治瘡瘍胃氣虧損陰火上衝口乾喘促或肢體倦怠肌肉消瘦面色痿黃汲汲短氣汗出不止食少作渴或膿水出多氣血俱虛煩躁不安睡臥不寧或濕熱大行火土合病脾胃虛弱身重氣短或金為火制絕其水生化之源肢體痿軟腳軟眼黑等症

當歸補血湯 三百四十　方在補陣四十五

治瘡瘍脾胃虛損或服峻劑致血氣俱虛肌熱大渴引飲目赤面紅晝夜不息其脈洪大而虛重按全無此病多得於飢飽勞役者若誤服白虎湯必死

黃芪六一湯 三四一　方在補陣五十

治瘡瘍陰陽俱虛盜汗不止

參朮膏 三四二　方在補陣四十

治潰瘍中氣虛弱諸藥不應或因用藥失宜耗傷元氣虛症蜂起但用此藥補其中氣諸症自愈

東垣聖愈湯 三四三　方在補陣九十一

治脾胃虧損膿水不止或金瘡出血心煩不安眠睡不寧五心煩熱飲食少思

錢氏七味白朮湯 三四四　方在小兒七

治瘡瘍胃氣虛弱或因尅伐或因吐瀉口乾作渴飲食少思

陳氏五味子湯 三四五　方在補陣五十九

治瘡瘍腎水枯涸口燥咽乾喘促虛煩作渴

參附湯 三四六 方在補陣二十八

治瘡瘍失血過多或膿瘀大泄或寒涼汗下眞陽脫陷上氣喘急自汗盜汗氣短頭暈等證急服此湯以救元氣緩則不治

人參理中湯 三四七 方在熱陣一

治瘡瘍脾胃虛寒嘔吐泄瀉飲食少思肚腹作脹或痛或胸膈虛痞飲食不入

六味丸 三四八 方在補陣百二十一

此壯水之劑夫人之生以腎爲主凡病皆由腎虛而致此方乃天一生水之劑無有不可用者若腎虛發熱作渴小便淋秘痰氣壅盛欬嗽吐血頭目眩暈小便短少眼花耳聾咽喉燥痛口舌瘡裂齒不堅固腰腿痿軟五臟齊損肝經不足等症尤多用之水能生木故也若腎虛發熱自汗盜汗便血諸血失瘖此水泛爲痰之聖藥血虛發熱之神劑也

八味丸 三四九 方在補陣百二十二

治命門火衰不能生土以致脾胃虛寒而患流注鶴膝等症不能消潰收斂或飲食少思或食而不化臍腹疼痛夜多漩溺

陳氏加減八味丸 三百五十 方在古補百二十三

治腎水不足虛火上炎發熱作渴咽喉疼痛口舌生瘡寢汗憔悴等證

還少丹 三五一 方在補陣一三七

治足三陰經虛損致患鶴膝風等證又補脾腎進飲食之良劑也

大防風湯 三五二 方在補陣九九

治足三陰虧損外邪乘虛內患鶴膝風或附骨疽腫痛或腫而不痛不問已潰未潰用三五劑後更全用調補之劑

十宣散 三五三 方在痘疹十四

治瘡瘍脈緩澁體倦惡寒或脈浮緊細用之以散風助陽也

薛氏四神丸 三五四 方在熱陣一五二

治瘡瘍脾腎虛弱大便不實飲食少思或小腹作痛或產後泄瀉肚腹作痛不思飲食

五積散 三五五 方在散陣三九

治風寒濕毒客於經絡致筋攣骨痛或腰腳痠疼或拘急或身重痛皆治之

二陳湯 三五六 方在和陣一

治瘍癰中脘停痰嘔吐惡心或頭目不清飲食少思等症

小柴胡湯 三五七 方在散陣十九

治肝膽經風熱瘰癧結核或腫痛色赤或寒熱往來或日晡發熱或潮熱身熱黙黙不欲飲食或怒火口苦耳聾欬嗽皆用此藥

小青龍湯 三五八 方在散陣八

治肝肺受寒欬嗽喘急宜服此發散表邪

人參敗毒散 三五九 方在散陣三六

治瘡瘍外有表邪焮痛寒熱或拘急頭痛脉緊有力

不換金正氣散 三百六十 方在和陣二二

治瘡瘍脾氣虛弱寒邪相搏痰停胸膈致發寒熱服此以正脾氣則痰氣自消寒熱不作

加味逍遙散 三六一 方在補陣九四

治瘡瘍肝脾血虛內熱發熱或遍身搔痒寒熱或肢體作痛頭目昏重或怔忡頰赤口燥咽乾或發熱盜汗食少不寐或口舌生瘡耳內作痛或胸乳腹脹小便不利

防風通聖散 三六二 方在攻陣十六

治時毒熱毒便秘熱燥邪實等症若非大滿大實者不可輕用此藥

消風散 三六三 方在散陣四七四九

治風熱癮疹瘙痒及婦人血風瘙痒或頭皮腫痒或諸風上攻頭目昏眩項背拘急鼻出清水噴嚏聲重耳作蟬鳴

犀角散 三六四 方在痘疹六三

治瘡瘍熱盛煩躁多渴赤斑等症

黃連解毒湯 三六五 方在寒陣一

治瘡瘍焮痛煩躁飲冷脉洪數或發狂言

普濟消毒飲 三六六 方在寒陣十三

治天行時毒頭面腫痛或咽喉不利若饑饉之後患此者最宜用之仍當兼固胃氣

梔子清肝散 三六七 方在寒陣六十

治三焦足少陽風熱耳內作痒生瘡或出水疼痛或胸乳間作痛或寒熱往來

柴胡清肝散 三六八 方在寒陣五九

治鬢疽及肝膽三焦風熱怒火之症或項胸作痛或瘡毒發熱

加味龍膽瀉肝湯 三六九 方在寒陣六四
治肝經濕熱或囊癰便毒下疳懸癰焮腫作痛或潰爛不愈或睪丸懸掛小便澁滯或婦人陰瘡痒痛或男子陰挺痔漏腫痛或出膿水

清心蓮子飲 三百七十 方在寒陣三二
治膀胱陰虛濕熱玉莖腫痛或莖竅澁滯口苦咽乾小便色赤或白濁夜安靜而晝發熱

黃芩清肺飲 三七一 方在寒陣三八
治瘡瘍肺經陰虛火燥而小便不通

東垣清胃散 三七二 方在寒陣五四
治膏粱積熱唇口腫痛齒齦潰爛焮痛上連頭面或惡寒發熱

竹葉石膏湯 三七三 方在寒陣五
治癰疽胃火盛腫痛作渴

竹葉黃芪湯 三七四 方在寒陣七
治癰疽氣血虛胃火盛而作渴

滋腎丸 三七五 方在寒陣一六三
治瘡瘍腎經陰虛發熱作渴便赤足熱腿軟等證凡不渴而小便秘熱在下焦血分也最宜此藥經云無陰則陽無以化若脾肺燥熱所移此當清其化源

瀉青丸 三七六 方在寒陣百五一
治肝經實熱瘰癧腫痛寒熱或脇乳作痛大便秘結

大蘆薈丸 三七七 方在小兒百十五
治肝火下疳潰爛或焮腫作痛或治小兒疳膨食積口鼻生瘡牙齦蝕爛等瘡並蝕肛門痒痛

五苓散 三七八 方在和陣一八二
治瘡毒下部濕熱小便短少

五淋散 三七九 方在寒陣百十七
治膀胱有熱水道不通或尿如豆汁或如砂石或如膏油或熱沸便血

八正散 三百八十 方在寒陣百十五
治下疳便毒小便淋澁脉證俱實者

清肺飲 三八一 方在和陣三五一
治瘡瘍渴而小便不利乃肺徑有熱是絕寒水生化之源宜用此藥以清化源其水自生而便自利

益元散 三八二 方在寒陣百十二

治癃瘍小水不利內生煩熱作渴

四順清涼飲 三八三 方在攻陣二五

治癃瘍煩躁飲冷焮痛脉實大便秘結小便赤澁

玉燭散 三八四

治便癰初起腫痛發熱大小便秘宜用此行散之若邪實毒甚者宜桃仁承氣湯

人參平肺散 三八五 方在寒陣三七

治火尅肺金傳為疵瘍欬嗽喘嘔痰涎壅盛胸膈痞滿咽嗌不利

葶藶大棗瀉肝湯 三八六 方在和陣百四十

治肺證胸膈脹痛上氣喘急或身面浮腫鼻塞聲重

枳殼散 三八七 方在寒陣百一

治煩熱便血

失笑散 三八八 方在婦人百四

治跌撲產後心腹絞痛或不知人事或經行瘀血作痛成癰

槐角丸 三八九 方寒陣一七五

治痔漏腫痛便血脫肛

紫金錠 三百九十 方在因陣二百一

治癰疽諸毒

通關散 三九一 方在古因九八

搐鼻開牙關

景岳全書卷之六十四終